

# Stellingen

behorende bij het proefschrift

Chronic lateral instability of the foot

van Jan Willem Karel Louwerens

1. Tijdens het staan op één been en tijdens rustig lopen vervult de musculus peroneus longus een belangrijke rol bij het behoud van balans. Naarmate de loopsnelheid toeneemt wordt deze rol minder belangrijk.  
dit proefschrift
2. De talometatarsale hoek is een geschikte parameter voor de mate van cavus van de voet.  
dit proefschrift
3. De laterale opening van het subtalair gewricht, welke lijkt op te treden tijdens het maken van een Brodèn stressopname, is niet zozeer het gevolg van kanteling als wel van translatie en rotatie in dit gewricht.  
dit proefschrift
4. De orthopaedisch chirurg dient betrokken te zijn bij de behandeling van de misvormde neuropathische voet.
5. Operatieve behandeling van de misvormde neuropathische voet kan behoudender zijn dan conservatieve behandeling.
6. Resectie van de kopjes der metatarsalia, hetgeen regelmatig wordt uitgevoerd bij patiënten met reumatoïde arthritis, komt functioneel gezien vrijwel overeen met amputatie van de voorvoet.
7. Een te korte musculus triceps surae en hypermobilität van het eerste tarsometatarsale gewricht zijn atavistische kenmerken van de mens, die dikwijls de oorzaak zijn van het inzakken van het mediale voetgewelf ( met peritair dorsolaterale subluxatie) en van het ontstaan van hallux valgus met dysbalans in de voorvoet.  
S.T.Hansen jr.
8. Niet alleen conservatieve behandeling, maar ook operatieve behandeling van de hallux valgus is dikwijls slechts symptomatisch.
9. Vroege operatieve interventie bij progressieve cavovarus van de voet als gevolg van HMSN (hereditaire motore sensorische neuropathie) kan resulteren in verbetering van vorm en functie van de voet en kan tevens progressie tegengaan.
10. Neuro-endocriene cellen (amine precursor uptake and decarboxylation, APUD-cellen) in het maag-darm epitheel en in het luchtweg epitheel zijn afkomstig uit locale stamcellen en niet vanuit de neurale lijst.  
Bosman F.T. en Louwerens J.W.K., Am J Pathol 1981, 104:174-180

11. Voor optimale behandeling van de polytrauma patiënten dient men in Nederland het aantal ziekenhuizen waar deze patienten worden behandeld drastisch te verlagen.
12. Wie bij de behandeling van fracturen A zegt, moet niet a priori O zeggen.
13. Prestaties van het studenten wedstrijdroeien zijn meer afhankelijk van de capaciteiten van de coach dan van het talent van de roeiers.

Rotterdam, 8 mei 1996

