

اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص‌های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی،
Sparidentex hasta

نگار بیرمی، محمد ذاکری*، پریتا کوچنین، وحید یاوری، حمید محمدی آذرم

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۹/۲۹

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱/۲۰

چکیده

در این تحقیق اثرات لیزین و متیونین بر شاخص‌های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی (*Sparidentex hasta*) بررسی شد. بدین منظور تعداد ۱۸۰ قطعه بچه ماهیا میانگین وزن اولیه $\pm 1/4$ ۳۷/۵۹ گرم، به طور تصادفی در ۱۸ تانک توزیع شدند. ماهیان به مدت ۸ هفته، سه بار در روز در حد سیری و با ۶ جیره‌غذایی که عبارت‌بودند از: تیمار اول (شاهد): بدون مکمل‌اسیدآمینه، تیمار دوم: ۱۰۰ درصد متیونین، تیمار سوم: ۷۵ درصد متیونین و ۲۵ درصد لیزین، تیمار چهارم: ۵۰ درصد متیونین و ۵۰ درصد لیزین، تیمار پنجم: ۲۵ درصد متیونین و ۷۵ درصد لیزین، تیمار ششم: ۱۰۰ درصد لیزین و با میزان یکسان پروتئین ($11/0 \pm 0/05$ درصد) و چربی ($12/0 \pm 0/05$ درصد)، تغذیه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از مکمل‌های لیزین و متیونین بر شاخص‌های رشد و تغذیه‌به طور معناداری موثر است ($P < 0/05$). ماهیان تغذیه شده با جیره‌های غذایی با سطوح بالای متیونین، عملکرد رشد بهتری نسبت به گروه تغذیه شده با جیره‌غذایی شاهد و تیمار ۶ نشان دادند ($P < 0/05$). شاخص ضریب تبدیل غذایی، کارایی پروتئین و میزان ابقای پروتئین‌نیز در تیمار ۳ مطلوب‌ترین راندمان را نشان دادند. به طور کلی می‌توان گفتم ماهیان جوان صبیتی به مکمل متیونین در مقایسه با لیزین نیاز بیشتری دارند. بنابراین طبق نتایج این تحقیق، استفاده از مکمل‌های لیزین و متیونین در حد مطلوب در جیره‌غذایی ماهیان جوان صبیتی، می‌تواند تأثیر مثبتی در رشد و تغذیه این ماهیان با ارزش دریایی داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: ماهی صبیتی، اسیدآمینه، لیزین، متیونین، *Sparidentex hasta*

*نویسنده مسؤول، پست الکترونیک: zakeri.mhd@gmail.com

2006; Abimorad *et al.*, 2009; Yang *et al.*, 2010). لیزین به عنوان یک اسیدآمینه ضروری در مقدار و محتوای مناسب می‌تواند از طریق بهبود به کار گیری دیگر اسیدهای آمینه ضروری، میزان اکسیداسیون آن‌ها را کاهش دهد(Xie *et al.*, 2012). هر چند که مقادیر زیاد این اسیدآمینه در جیره‌ی غذایی ماهی در گونه‌های مختلف می‌تواند کاهش رشد را با توجه به سمیت جزئی آن در پی داشته باشد(Zhou *et al.*, 2007; Bicudo *et al.*, 2009; Farhat and Khan, 2013) از دیگر اسیدهای آمینه ضروری محدود‌کننده که در منابع پروتئینی به ویژه منابع گیاهی دیده‌می‌شود، متیونین است. متیونین یک اسیدآمینه‌ی سولفوری است که در تغذیه گونه‌های پرورشی ماهی بسیار مورد توجه قرار گرفته است(Farhat and Khan, 2014). ماهی‌ها به متیونین به عنوان یک اسیدآمینه ضروری در منابع پروتئینی جهت رشد طبیعی و عملکرد مطلوب متابولیکی نیازمند هستند(Tulli, 2010). متیونین عموماً اولین اسیدآمینه ضروری و محدود‌کننده در بسیاری از جیره‌های غذایی است(Mai *et al.*, 2006; Espe *et al.*, 2008). متیونین به همراه لیزین به عنوان پیش برنده و تقویت کننده فعالیت کارنیتینو همچنین در انتقال زنجیره‌های بلندگروههای آسیل چربی به میتوکندری و در عمل اکسیداسیون بتا نقش دارند(Li *et al.*, 2007). ماهی صبیتی از خانواده شانک ماهیان و از گونه‌های مهم و بالرزش اقتصادی و شیلاتی خلیج‌فارس محسوب می‌شود؛ این ماهی میزان صید بالایی در مناطق مختلف خلیج‌فارس به خصوص در سواحل استان خوزستان دارد و بومی آبهای کشور ایران، کویت، بحرین و سایر کشورهای حوضه خلیج‌فارس است (Teng *et al.*, 1999). مطالعات معدودی به بررسی اثرات همزمان لیزین و متیونین بر شانک‌ماهیان پرداخته‌اند که در این خصوص بر روی گونه‌های *Pagrus major* و *schlegelii Acanthopagrus* (Takagi *et al.*, 2001)

۱. مقدمه

در مدیریت مجموعه صنعت تکثیر و پرورش آبزیان، میزان تولید اهمیت فوق العاده‌ای دارد. هزینه‌های مدیریت تغذیه که از متغیرهای اساسی در میزان سوددهی در تولیدات صنعت آبزی پروری است، در مزارع پرورشی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ها را در آبزی پروری استفاده از جیره‌های غذایی کارآمد که دارای موادمغذی متعادل هستند، ضروری به نظر می‌رسد. به طوری که در سال‌های اخیر مطالعات متعددی جهت بررسی و تعیین جیره‌های غذایی مطلوب تجاری انجام شده است تا بتوان با یک جیره‌غذایی مناسب، حداکثر رشد و سلامتی را در Aprodu *et al.*, 2012; Garcia-Meilan *et al.*, 2013 پرورش ماهیان به دست آورد. در جیره‌غذایی ماهیان به ویژه ماهیان گوشت‌خوار به عنوان ترکیبی ضروری و گران محسوب می‌شود که به صورت موثری بر عملکرد رشد و نمو، نگهداری و ترمیم بافت‌های بدن ماهی تاثیر می‌گذارد و در برخی موارد نیز جهت تامین انرژی مصرف می‌گردد(NRC, 1993; Lee *et al.*, 2002). ماهی همانند دیگر حیوانات نه تنها به یک مقدار مشخص پروتئین، بلکه به ترکیب متعادلی از اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری در جیره‌غذایی خود نیاز دارد(Moor *et al.*, 1988). افزودن صحیح مکمل‌های غذایی اسیدآمینه به عنوان پیش‌ساز متابولیسم به جیره‌غذایی، سبب تهیه جیره‌غذایی با ترکیب متعادل اسیدهای آمینه و درنتیجه باعث بهبود عملکرد رشد و سودآوری صنعت آبزی پروری می‌شود(Hansen *et al.*, 2011). از این‌رو، افزودن اسیدهای آمینه آزاد به جیره‌های غذایی آبزیان، به یک عمل رایج تبدیل شده است که این مکمل‌ها تاحدودی قادر به جبران عدم توازن موادمغذی در جیره‌غذایی هستند(Li *et al.*, 2009). لیزین از اسیدهای آمینه مهم محدود‌کننده در ترکیبات مورد استفاده برای فرمولاسیون غذای تجاری ماهی‌ها است(Mai *et al.*, 2001).

به مدت ۵۶ روز غذاهی شدند. به منظور توزیع یکسان غذا در تانک، افزایش زمان ماندگاری غذا در آب و کاهش تلاطم آب، هوادهی در طول مدت غذاهی قطع شد و بعد از اتمام زمان تغذیه، هوادهی مجدداً انجام شد. بعد از هر وعدهی غذاهی، تانک‌ها سیفون و مقدار غذای خورده نشده محاسبه و براساس میانگین وزن قطعات غذا، مقدار دقیق غذای مصرف شده محاسبه شد (Sardar *et al.*, 2009; Hansen *et al.*, 2011). در روزهایی که زیست سنجی و نمونه برداری انجام شد، ماهیان به مدت ۲۴ ساعت غذاهی نشدنده. تعویض آب روزانه حدود ده‌درصد برای هر تانک انجام می‌شد.

هر تانک با استفاده از یک سنگ هوا به وسیله هواده مرکزی هوادهی شد. این آزمایش در سالن سرپوشیده با دوره نوری حدود دوازده ساعت روشنایی به دوازده ساعت تاریکی (12 L: 12 D) انجام گرفت. پارامترهای کیفی آب شامل دما و شوری به صورت روزانه قبل از غذاهی (دستگاه شوری سنج مدل AZ8371 - ژاپن) و اکسیژن آب و pH (دستگاه مولتی متر مدل HQ 40d - آلمان) به صورت هفتگی اندازه گیری شدند. در طول دوره‌ی آزمایش به طور میانگین دمای آب 26.1 ± 0.1 درجه سانتی‌گراد، میزان شوری آب 0.07 ± 0.04 قسمت در هزار، میزان اکسیژن محلول 6.64 ± 0.09 میلی‌گرم بر لیتر و میانگین pH برابر $8 - 7$ بود. این مطالعه در شش تیمار آزمایشی با سه تکرار انجام گردید. در این مطالعه شش جیره‌غذایی با ترکیباتی شامل پودر ماهی دریایی و پودرسویا به عنوان منابع اصلی پروتئین، روغن‌ماهی دریایی و روغنسویا به عنوان منابع اصلی چربی، آرد گندم، مکمل ویتامین‌ها و مواد معدنی و مقادیر مختلف مکمل اسیدهای آمینه کریستاله لیزین و متیونین، آزمایش شدند. جهت فرموله کردن دقیق جیره‌های غذایی آزمایشی، سطوح مواد معدنی موجود در هر جزء غذایی با استفاده از آنالیز استاندارد بیوشیمیایی جزء به جزء (AOAC, 1997) مواد

(Zhou *et al.*, 2011) مطالعه انجام شده است. براساس مطالعات مختلف نیاز پروتئینی خانواده شانک ماهیان در محدوده ۵۰ - ۴۰۰ درصد جیره‌غذایی گزارش گردیده است (Santinha *et al.*, 1999; Skalli *et al.*, 2004). با توجه به این اصل که پروتئین به عنوان منبع اصلی اسیدهای آمینه، باید تامین کننده اسیدهای آمینه ضروری در تغذیه ماهیان باشد (Palavesam *et al.*, 2008) مساله الزامی است که آیا در مقادیر و منابع متفاوت پروتئین در جیره‌های غذایی ماهیان، اسیدهای آمینه غلظت‌های موثری دارند یا اینکه نیاز به افزودن مکمل‌های اسیدآمینه متیونین و لیزین است؟ از این رو این مطالعه با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف مکمل اسیدآمینه‌ای لیزین و متیونین بر شاخص‌های رشد، مورفومتریک و تغذیه ماهیان جوان صیبتی (Sparidentex hasta) طراحی شد.

۲. مواد و روش‌ها

قبل از شروع آزمایش، تعداد ۲۰۰ قطعه ماهی جوان صیبتی (*S. hasta*) از ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) به وسیله ماشین مخصوص حمل ماهی مجهز به سیستم هوادهی، به آزمایشگاه خیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل شد. ماهی‌ها در تانک‌های استوانه‌ای شکل از جنس پلی‌اتیلن، به مدت ۳ هفته با شرایط آزمایشگاهی سازگار شدند. در طول مدت سازگاری ماهیان جوان صیبتی (*S. hasta*) با جیره‌غذایی پایه فرموله شده (۴۵/۷۳ درصد پروتئین و ۱۲/۴۳ درصد چربی)، سه بار در روز به روش سیری تغذیه شدند. تعداد $180 \pm 1/40$ عدد ماهی با میانگین وزن اولیه 37.59 ± 11.90 سانتی‌متر در ۱۸ عدد تانک استوانه‌ای شکل از جنس پلی‌اتیلن با ظرفیت ۳۰۰ لیتر ذخیره‌سازی شدند (۱۰ عدد ماهی در هر تانک). ماهیان سه بار در روز در ساعات ۰۰:۰۰، ۰۸:۰۰ و ۱۳:۰۰ بر اساس روش سیری (Yuan *et al.*, 2010) و

پس آزموندانکن (Duncan Post Hoc test) در سطح معنی داری ($P \leq 0.05$) استفاده شد.

۳- نتایج

نتایج مربوط به اثرات سطوح مختلف مکمل های غذایی لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و مرفومتریک در جدول ۳ آورده شد. در شاخص افزایش وزن بدن، بیشترین افزایش مربوط به ماهیان تغذیه شده با تیمار ۲ بود. کمترین مقدار افزایش وزن در تیمارهای ۱ (شاهد) و تیمار دارای ۱۰۰ درصد لیزین (تیمار ۶) مشاهده شد. تیمار شاهد و تیمار ۶ با تیمارهای ۱۰۰ درصد متیونین (تیمار ۲) و ۷۵ درصد متیونین (تیمار ۳) دارای اختلاف معنی دار بود ($P < 0.05$). تمام تیمارهای غذایی در مقایسه با تیمار شاهد دارای افزایش بیشتری در وزن بدن بودند. تیمار ۶ نیز از تیمارهای ۲ و ۳ به طور معناداری کمتر بود ($P < 0.05$). افزایش مکمل های اسید آمینه ای لیزین و متیونین در جیره های غذایی اثر معنی داری بر میزان نرخ رشد ویژه در تیمارهای مختلف آزمایشی نداشت ($P > 0.05$). کمترین مقدار این شاخص در تیمار شاهد مشاهده شد. ماهیان تغذیه شده با تیمار ۱۰۰ درصد متیونین (تیمار ۲) بیشترین مقدار شاخص کبدی را به طور معنی داری نشان داد که تفاوت معنا داری با سایر تیمارها به جز تیمار ۶ داشت ($P < 0.05$). شاخص احشایی در بین تیمارهای مختلف غذایی تفاوت معنی داری نداشت ($P > 0.05$). بیشترین و کمترین مقدار شاخص احشایی به ترتیب در تیمارهای ۱ (شاهد) و ۲ مشاهده شد. بیشترین مقدار چربی درون صفاقی، در تیمار ۵ و کمترین میزان آن در تیمار ۴ و سپس تیمار ۲ مشاهده شد که تیمار ۵ با این دو تیمار دارای اختلاف معنادار بود ($P < 0.05$). میزان چربی درون صفاقی در سایر تیمارها تفاوت معنادار نشان نداد. ضریب چاقی در ماهیان تغذیه شده با مکمل ۱۰۰ درصد لیزین (تیمار ۶) بیشترین مقدار را نشان داده و این تیمار دارای اختلاف معنی دار با سایر تیمارها بود ($P < 0.05$). هر

غذایی تعیین شد. پس از تعیین محتوای مواد مغذی اجزای غذایی، شش جیره غذایی با میزان یکسان پروتئین 11 ± 0.11 گرمی در صدو 45 ± 0.45 گرمی، فاقد مکمل های افزودنی، جیره ۲ تنها حاوی مکمل متیونین به میزان ۲ درصد وزن خشک جیره غذایی (۱۰۰ درصد مکمل متیونین)، جیره ۳ حاوی $1/5$ درصد وزن خشک متیونین و $5/5$ درصد لیزین (۷۵ درصد مکمل متیونین و 25 درصد مکمل لیزین)، جیره ۴ حاوی $1/10$ درصد متیونین و $1/10$ درصد لیزین (۵۰ درصد مکمل متیونین و لیزین)، جیره ۵ حاوی $5/5$ درصد متیونین و $5/5$ درصد لیزین (۲۵ درصد مکمل متیونین و 75 درصد مکمل لیزین) و در نهایت جیره ۶ دارای تنها مکمل لیزین به میزان ۲ درصد وزن خشک جیره غذایی (۱۰۰ درصد لیزین) طراحی و ساخته شد. آنالیز تقریبی ترکیبات بیوشیمیایی و ترکیب اسیدهای آمینه جیره های غذایی آزمایشی به ترتیب در جداول ۱ و ۲ آورده شده است. جهت ساخت غذا ابتدا اجزای غذایی به طور کامل با استفاده از آسیاب پودر شدند. سپس مواد غذایی توزینو به مدت ۴۰ دقیقه در همزن صنعتی با هم مخلوط گردید. در مرحله بعد مکمل ها و روغن ها به مخلوط افزوده و پس از ایجاد حالت خمیری، این ترکیب به مدت ۲۰ دقیقه مخلوط شد. در نهایت جیره های غذایی همگن شده، شکل گرفته و خشک شدند (AOAC, 1997). جیره های غذایی ساخته شده تا زمان استفاده در کیسه های پلاستیکی تیره و در بسته در دمای -20°C درجه سانتی گراد نگهداری شدند. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی انجام شد. داده ها در نتایج به صورت میانگین \pm خطای استاندارد آورده شده است. از رگرسیون خطی برای تعیین همبستگی بین لیزین و متیونین جیره غذایی با شاخص های مورد بررسی استفاده شد. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (one way ANOVA) جهت ارزیابی اختلاف بین سطوح مختلف مکمل اسیدهای آمینه استفاده شد. برای مقایسه تفاوت بین تیمارهای مختلف از

شاهد کمتر بود. بیشترین میزان این شاخص به طور مقایسه‌ای مربوط به تیمار شاهد است که با تیمار پنج و تیمار شش تفاوت معنادار نداشت و بهترین (کمترین) مقدار آن در تیمار ۳ و سپس تیمار ۲ دیده شد. شاخص کارایی غذایی و شاخص کارایی پروتئین دارای تغییرات مشابهی بوده و بین تیمارها اختلاف معناداری وجود داشت ($P<0.05$).

چند که در سایر تیمارها تفاوت معنادار وجود نداشت. نتایج مربوط به اثرات مکمل‌های غذایی لیزین و متیونین بر شاخص‌های تغذیه‌ای ماهیان جوان صبیتی (*S. hasta*) در جدول ۴ ذکر شده است. در شاخص ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای مختلف آزمایشی اختلاف معنی‌داری مشاهده شد ($P<0.05$). ضریب تبدیل غذایی تمام تیمارهای آزمایشی از تیمار

جدول ۱. اجزای غذایی و آنالیز تقریبی ترکیبات بیوشیمیایی جیره‌های غذایی آزمایشی (n=۳)

جیره‌های غذایی آزمایشی						
تیمار ۶	تیمار ۵	تیمار ۴	تیمار ۳	تیمار ۲	تیمار ۱	(شاهد)
(۱۰۰٪ لیزین)	(۷۵٪ متوسط)	(۵۰٪ لیزین، ۲۵٪ متوسط)	(۷۵٪ لیزین، ۵۰٪ متوسط)	(۱۰۰٪ لیزین)	(۷۵٪ لیزین)	اجزای غذایی ^۱ (گرم در کیلوگرم)
۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	پودر ماهی ^۲
۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	پودر سویا ^۲
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	آرد گندم ^۲
۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	روغن ماهی
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	روغن سویا
۲۰	۱۵	۱۰	۵	۰	۰	اسید آمینه لیزین
۰	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۰	اسید آمینه متیونین
۵	۵	۵	۵	۵	۵	مخلوط مواد معدنی ^۴
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	مخلوط ویتامین ^۵
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	زئولیت
آنالیز جیره‌های غذایی آزمایشی						
۴۴/۷۲	۴۵/۹۵	۴۶/۳۰	۴۵/۹۵	۴۵/۷۷	۴۵/۷۳	پروتئین
۱۲/۳۰	۱۱/۴۶	۱۱/۴۲	۱۲/۲۸	۱۲/۵۵	۱۲/۳۴	چربی
۱۱/۱۲	۱۰/۲۴	۱۰/۵۴	۱۰/۰۶	۹/۶۴	۱۰/۳۹	خاکستر
۵/۶۱	۵/۲۷	۵/۲۷	۵/۴۷	۵/۷۲	۵/۲۷	رطوبت
۲۵/۸۶	۲۷/۰۸	۲۶/۶۷	۲۶/۲۴	۲۶/۳۲	۲۶/۳۶	کربوهیدرات ^۶
۱/۹۸	۲/۰۰	۱/۹۹	۲/۰۲	۲/۰۳	۲/۰۲	انرژی کل ^۷ (MJ/Kg)

^۱. اجزای غذایی از کارخانه خوارک دام، طیور و آبزیان - شرکت تعاونی تولیدی ۲۱ بیضاء تهیه شد.^۲. آنالیز تقریبی اجزای غذایی بر اساس درصد وزن خشک: پودر ماهی (پروتئین خام ۶۴/۱۷ درصد و چربی ۳/۸۵ درصد)، پودر سویا: (پروتئین ۴۱/۶۵ درصد و چربی ۲/۱۷ درصد) آرد گندم: (پروتئین ۱۱/۳۹ درصد و چربی ۱/۱۹ درصد).^۳. هر کیلو مکمل ماده معدنی شامل: منگنز: ۲۶۰۰ mg، مس: ۴۰۰۰ mg، روی: ۶۰۰۰ mg، آهن: ۵۰۰ mg، سلنیوم: ۵۰۰ mg، ید: ۲۰۰۰ mg، کربالت: ۵۰۰ mg، کولین: ۱۲۰۰۰ mg، کلراید: ۱۲۰۰۰ mg.^۴. هر کیلو مکمل ویتامین حاوی ویتامین های IU، A=۶۰۰۰۰ IU، E=۴۰۰۰ mg، D3=۴۰۰۰۰ IU، B₆=۳۰۰۰ mg، B₂=۵۰۰۰ mg، B₁=۳۰۰۰ mg، C=۵۲۰۰۰ mg، Nیکوتینیک اسید: ۳۰۰۰۰ mg، دی کلسیم پانتوتونیک: ۹۰۰۰ mg، فولیک اسید: ۱۶۰۰ mg، دی بیوتین: ۱۶۰ mg، اینوزیتول: ۵۰۰۰ mg، آنتی اکسیدانت: ۲۴۰۰۰ mg.^۵. (رطوبت + خاکستر + چربی + پروتئین) - ۱۰۰ = کربوهیدرات^۶. (۰/۰۳۹۸ + ۰/۰۲۳۷ + ۰/۰۴۰۷) = انرژی کل

اختلاف معنادار نشان ندادند. مشابه این نتیجه برای شاخص کل غذای دریافتی نیز صادق بود با این تفاوت که تیمار پنج و سه با سایر تیمارها اختلاف معناداری داشتند ($P<0.05$).

کمترین مقدار شاخص ابقای پروتئین در تیمار ۴ و بیشترین مقدار آن در تیمار ۳ مشاهده شد که این دو تیمار دارای اختلاف معنادار بودند ($P<0.05$)، هر چند که بین سایر تیمارها اختلاف معنادار مشاهده نشد.

بیشترین میزان این دو شاخص مربوط به تیمار سه بود که با سایر تیمارها دارای اختلاف معناداری بود و کمترین میزان آن در تیمار پنج مشاهده شد که با تیمار شاهد و تیمار شش تفاوت معنادار نداشت. بیشترین مقدار شاخص غذای دریافتی روزانه و پروتئین دریافتی روزانه مربوط به تیمار پنج و کمترین آن مربوط به تیمار سه بود و اختلاف معناداری بین تیمار پنج و سه مشاهده گردید ($P<0.05$) و دیگر تیمارهای آزمایشی

جدول ۲. ترکیب اسیدهای آمینه در جیره های غذایی آزمایشی (بر اساس درصد پروتئین، $n=3$)

جیره های غذایی آزمایشی						اسیدهای آمینه ضروری (EAA)
تیمار ۶ (٪ لیزین) ۱۰۰	تیمار ۵ (٪ متوسطین، لیزین) ۲۵	تیمار ۴ (٪ لیزین، متوسطین) ۵۰	تیمار ۳ (٪ متوسطین، لیزین) ۷۵	تیمار ۲ (٪ متوسطین) ۱۰۰	تیمار ۱ (٪ شاهد) ۱۰۰	
۵/۵۸	۵/۵۵	۵/۵۶	۵/۵۴	۵/۵۳	۵/۷۱	آرژین
۱/۷۹	۱/۸۷	۱/۸۸	۲/۰۳	۲/۱۱	۱/۹۱	هیستیدین
۳/۵۸	۳/۶۶	۳/۸۰	۳/۸۵	۳/۹۵	۳/۶۴	ایزو لوسمین
۷/۱۰	۷/۰۶	۷/۰۲	۰۰۷	۶/۹۵	۷/۰۱	لوسین
۶/۸۱	۵/۸۴	۴/۸۲	۳/۹۰	۳/۱۰	۳/۳۸	لیزین
۲/۲۷	۲/۸۹	۳/۵۲	۴/۱۱	۴/۴۹	۲/۲۴	متوسطین
۴/۴۵	۴/۴۴	۴/۴۲	۴/۴۲	۴/۴۱	۴/۴۹	فنبل آلانین
۳/۳۵	۳/۳۴	۳/۳۴	۳/۳۲	۳/۳۲	۳/۳۱	ترؤونین
۳/۹۴	۴/۰۴	۴/۱۴	۴/۲۱	۴/۳۵	۴/۰۱	والین
اسیدهای آمینه غیرضروری (NEAA)						
۳/۲۱	۳/۲۳	۳/۲۶	۳/۲۵	۳/۳۱	۳/۱۹	آلانین
۵/۸۲	۵/۸۴	۵/۸۷	۵/۸۸	۵/۹۰	۵/۷۹	اسید آسپارتیک
۱/۷۲	۱/۷۶	۱/۷۷	۱/۷۶	۱/۸۲	۱/۶۸	سیستئین
۲۹/۹۱	۳۰/۱۰	۳۰/۱۴	۳۰/۴۹	۳۰/۶۲	۳۳/۴۵	اسید گلوتامیک
۳/۶۲	۳/۵۵	۳/۵۲	۳/۵۰	۳/۴۱	۳/۵۶	گلیسین
۹/۱۰	۹/۱۴	۹/۱۶	۹/۲۰	۹/۲۲	۹/۰۴	پروولین
۴/۴۱	۴/۲۷	۴/۲۰	۴/۱۳	۴/۰۱	۴/۳۳	سرین
۳/۲۸	۳/۳۳	۳/۴۰	۳/۴۷	۳/۵۲	۳/۲۴	تیروزین
۳۸/۸۷	۳۸/۶۹	۳۸/۵۰	۳۸/۳۸	۳۸/۲۱	۳۵/۷۰	^۷ TEAA
۶۱/۰۷	۶۱/۲۲	۶۰/۴۷	۶۱/۶۸	۶۱/۸۱	۶۴/۲۸	^۸ TNEAA
۶۳/۶۵	۶۳/۲۰	۶۳/۶۷	۶۲/۲۲	۶۱/۸۲	۵۵/۵۴	^۹ TEAA/TNEAA

^۷مجموع اسیدهای آمینه ضروری (Total essential amino acids)^۸مجموع اسیدهای آمینه غیر ضروری (Total non-essential amino acids)

همبستگی ($P = 0.002$ و $r^2 = 0.505$) با معادله $y = 0.382 - 0.320x$ را نشان داد. همچنین میزان ابقاء لیزین و متیونین در تیمار ۳ به طور معناداری بالاتر از سایر تیمارها بودند ($P < 0.05$). نتایج آزمون همبستگی در بین شاخص لیزین دریافتی بدن با لیزین موجود در جیره‌غذایی دارای رابطه همبستگی ($P = 0.0004$ و $r^2 = 0.823$) با معادله $x = 0.605 - 0.684y$ است.

بیشترین مقدار متیونین دریافتی با تفاوت معنادار نسبت به سایر تیمارها در تیمار ۲ گزارش گردید ($P < 0.05$) و کمترین آن در تیمار شاهد و سپس در تیمار ۶ مشاهده شد.

بیشترین مقدار لیزین دریافتی در تیمار ۵ و کمترین آن در تیمار ۳ مشاهده شد ($P < 0.05$). لیزین دریافتی در تیمارهای ۱، ۲ و ۳ به طور معناداری کمتر از تیمارهای دارای لیزین بودند. نتایج آزمون همبستگی در بین شاخص‌لیزین دریافتی بدن بالیزین موجود در جیره‌غذایداری رابطه همبستگی ($P = 0.0004$ و $r^2 = 0.823$) با معادله $x = 0.605 - 0.684y$ است. بیشترین مقدار متیونین دریافتی با تفاوت معنادار نسبت به سایر تیمارها در تیمار ۲ گزارش گردید ($P < 0.05$) و کمترین آن در تیمار شاهد و سپس در تیمار ۶ مشاهده شد. همچنین نتایج آزمون همبستگی بین متیونین جیره‌غذایی با میزان متیونین دریافتی بدن رابطه‌ی

جدول ۳: شاخص‌های رشد در ماهیان جوان صبیتی (*S. hasta*) تغذیه شده با سطوح مختلف لیزین و متیونین جیره‌غذایی (میانگین \pm خطای استاندارد، $n=3$)

شاخص‌های رشد						
تیمار ۶	تیمار ۵	تیمار ۴	تیمار ۳	تیمار ۲	تیمار ۱ (شاهد)	
طول اولیه (سانتی‌متر)						
11.9 ± 0.20	11.9 ± 0.20	11.9 ± 0.20	11.9 ± 0.20	11.9 ± 0.20	11.9 ± 0.20	
وزن اولیه (گرم)						
35.30 ± 0.35	39.39 ± 0.47	37.00 ± 0.12	38.11 ± 0.15	38.16 ± 0.19	37.62 ± 0.3	
طول نهایی						
13.90 ± 0.29	14.88 ± 0.18	14.02 ± 0.23	14.63 ± 0.26	14.60 ± 0.28	14.15 ± 0.24	
وزن نهایی						
51.95 ± 2.90	60.15 ± 2.0	53.32 ± 2.10	58.38 ± 2.73	57.11 ± 2.71	51.61 ± 2.40	
افزایش وزن (گرم)						
12.00 ± 1.64^a	15.91 ± 1.65^{ab}	15.79 ± 2.20^{ab}	20.42 ± 2.17^b	21.96 ± 2.31^b	10.73 ± 2.09^a	
نرخ رشد ویژه (درصد/روز)						
0.52 ± 0.08	0.68 ± 0.08	0.58 ± 0.08	0.63 ± 0.05	0.66 ± 0.09	0.51 ± 0.08	
شاخص‌های مورفومتریک (بر حسب درصد)						
شاخص کبدی						
$1/20 \pm 0.07^{bc}$	$1/10 \pm 0.04^{ab}$	$1/0.6 \pm 0.03^{ab}$	$1/0.7 \pm 0.03^{ab}$	$1/26 \pm 0.05^c$	$1/0.2 \pm 0.01^a$	
شاخص احشایی						
$3/84 \pm 0.18$	$3/73 \pm 0.16$	$4/16 \pm 0.18$	$3/90 \pm 0.29$	$3/66 \pm 0.17$	$4/24 \pm 0.16$	
چربی درون صفاقی						
0.81 ± 0.16^{ab}	$1/27 \pm 0.07^b$	0.61 ± 0.12^a	0.79 ± 0.15^{ab}	0.69 ± 0.19^a	0.87 ± 0.18^{ab}	
ضریب چاقی						
$b/91 \pm 0.02$	$1/79 \pm 0.02^a$	$1/81 \pm 0.02^a$	$1/76 \pm 0.02^a$	$1/80 \pm 0.02^a$	$1/77 \pm 0.02^a$	

*حرروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های آزمایشی است ($P < 0.05$)

همبستگی ($P = 0.002$ و $r^2 = 0.505$) با معادله $y = 0.382 - 0.320x$ را نشان داد. همچنین میزان

همچنین نتایج آزمون همبستگی بین متیونین جیره‌غذایی با میزان متیونین دریافتی بدن رابطه‌ی

(2008). استفاده از اسیدهای آمینه علاوه بر اینکه در جیره‌های غذایی نامطلوب از نظر پروتئینی و انرژی، ضروری است بلکه افزودن آن‌ها به عنوان مکمل به جیره‌های غذایی مرغوب (از لحاظ پروتئین و انرژی) نیز گاهی الزامی به نظر می‌رسد (Yamamoto *et al.*, 2005). هرچند بعضی از مطالعات نتایج مثبتی را از افزوختن اسیدهای آمینه به جیره‌غذایی گونه‌کپور Watanabe *et al.*, 1987; Cyprinus (carpio) مشاهده نکرده‌اند اما در بیشتر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، ماهیان تحت تأثیر مکمل‌های آمینو اسیدی لیزین و متیونین قرار گرفته‌اند.

ابقای لیزین و متیونین در تیمار ۳ به طور معناداری بالاتر از سایر تیمارها بودند ($P < 0.05$).

۴. بحث و نتیجه گیری

افزوختن اسیدهای آمینه آزاد به جیره‌غذایی ماهیان به روشنی متعارف جهت جبران فقدان یک یا چند اسید آمینه ضروری جیره‌غذایی، تبدیل شده‌است (Segovia Quintero and Reigh, 2004). رعایت مقدار متعادل و مناسب اسیدهای آمینه در جیره‌غذایی الزامی است. به طوری که فقدان اسیدهای آمینه در جیره‌غذایی سبب کاهش رشد و ابقاء پروتئین در ماهیان می‌شود (Saavedra *et al.*, 2004).

جدول ۴: شاخص‌های تغذیه در ماهیان جوان صبیتی (*S. hasta*) تغذیه شده با سطوح مختلف لیزین و متیونین جیره‌غذایی (میانگین \pm خطای استاندارد، $n=3$)

تیمارهای غذایی آزمایشی							
تیمار ۶	تیمار ۵	تیمار ۴	تیمار ۳	تیمار ۲	تیمار ۱ (شاهد)		
^b ۴/۰۸ ± ۰/۱۳	^b ۴/۱۹ ± ۰/۳۵	^{ab} ۳/۳۸ ± ۰/۷۰	^a ۱/۹۴ ± ۰/۴۰	^a ۲/۲۴ ± ۰/۲۲	^b ۴/۰۷ ± ۰/۸۶	ضریب تبدیل غذایی	
^a ۲۰/۷۴ ± ۰/۵۳	^a ۲۰/۱۱ ± ۱/۷۹	^{ab} ۲۹/۵۸ ± ۷/۱۱	^c ۵۵/۵۸ ± ۹/۷۱	^{bc} ۴۰/۱۱ ± ۳/۸۵	^a ۲۰/۲۷ ± ۴/۳۳	کارایی غذایی	
^a ۰/۴۶ ± ۰/۰۱	^a ۰/۴۳ ± ۰/۰۲	^{ab} ۰/۶۳ ± ۰/۱۵	^c ۱/۲۱ ± ۰/۲۱	^{bc} ۰/۸۷ ± ۰/۰۸	^a ۰/۴۴ ± ۰/۰۹	کارایی پروتئین	
^{ab} ۱/۴۶ ± ۰/۱۵	^b ۱/۸۱ ± ۰/۴۸	^{ab} ۱/۲۲ ± ۰/۰۶	^a ۰/۹۴ ± ۰/۱۸	^{ab} ۱/۲۸ ± ۰/۱۵	^{ab} ۱/۱۹ ± ۰/۰۵	غذای روزانه دریافتی	
^b ۵۷/۹۸ ± ۳/۲۲	^c ۷۳/۴۲ ± ۳/۰۵	^b ۵۰/۳۴ ± ۳/۳۷	^a ۳۸/۴۴ ± ۵/۶۵	^b ۵۶/۵۹ ± ۱/۰۲	^b ۵۲/۴۷ ± ۳/۰۴	کل غذای دریافتی	
^{ab} ۰/۶۵ ± ۰/۰۶	^b ۰/۸۳ ± ۰/۲۲	^{ab} ۰/۵۶ ± ۰/۰۲	^a ۰/۴۶ ± ۰/۰۶	^{ab} ۰/۵۹ ± ۰/۰۷	^{ab} ۰/۵۴ ± ۰/۰۲	پروتئین روزانه دریافتی	
^{ab} ۱/۲۸ ± ۰/۰۲	^{ab} ۱/۳۰ ± ۰/۲۹	^a ۰/۷۱ ± ۰/۳۲	^b ۲/۰۷ ± ۰/۲۰	^{ab} ۱/۴۲ ± ۰/۲۵	^{ab} ۱/۱۵ ± ۰/۴۹	میزان ابقاء پروتئین	
^c ۳/۱۶ ± ۰/۱۷	^c ۳/۵۱ ± ۰/۱۴	^b ۲/۰۰ ± ۰/۱۳	^a ۱/۲۲ ± ۰/۱۸	^a ۱/۴۳ ± ۰/۰۲	^a ۱/۴۵ ± ۰/۰۸	لیزین دریافتی	
^{ab} ۱/۰۵ ± ۰/۰۵	^d ۱/۷۴ ± ۰/۰۷	^{cd} ۱/۴۶ ± ۰/۰۹	^{bc} ۱/۲۹ ± ۰/۱۸	^e ۲/۰۸ ± ۰/۰۳	^a ۰/۹۵ ± ۰/۰۵	متیونین دریافتی	
^a ۰/۹۶ ± ۰/۰۷	^{ab} ۰/۹۹ ± ۰/۱۹	^a ۰/۹۱ ± ۰/۰۹	^c ۱/۳۹ ± ۰/۲۲	^a ۰/۸۷ ± ۰/۱۱	^a ۰/۶۵ ± ۰/۱	میزان ابقاء لیزین	
^a ۰/۵۷ ± ۰/۰۵	^{ab} ۰/۶۶ ± ۰/۱۳	^{ab} ۰/۸۱ ± ۰/۰۴	^c ۱/۳۱ ± ۰/۲۳	^{bc} ۰/۹۸ ± ۰/۰۵	^{ab} ۰/۶۲ ± ۰/۰۵	میزان ابقاء متیونین	

*حرروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های آزمایشی است ($P < 0.05$).

افزایش وزن در تیمار شاهد مشاهده شد. شاخص نرخ رشد ویژه نیز در تیمارهای آزمایشی بیشتر از گروه شاهد بود. به طور کلی افزایش سطوح مکمل متیونین

نتایج حاصل از این تحقیق بیان کرد که مکمل‌های لیزین و متیونین بر شاخص رشد ماهی تاثیر معنادار داشته، به طوری که کمترین میزان

اسیدهای آمینه موجود در منبع پروتئینی جیره‌غذایی باشد و این موضوع سبب می‌شود که اسیدهای آمینه آزاد به عنوان اسیدهای آمینه نامتعادل به بافت‌ها فرستاده شده و درنتیجه فرآیندهای کاتابولیسم این اسیدهای آمینه بیشتر از فعالیت سنتزی و تولید Tibaldi and Kaushik, 2005; Ambardekar and Reigh, 2007; Yang et al., 2011). در مطالعه‌ای بر ماهی سی باس اروپایی (*Dicentrarchus labrax*) گزارش شد، زمانی که منبع تامین پروتئین جیره‌غذایی خالص و تعداد دفعات غذادهی بالا باشد، مقدار بیشتری از اسیدهای آمینه آزاد را می‌توان استفاده کرد (Lin et al., 2013). سه بار غذادهی در روز ممکن است باعث بهبود کارایی اسیدهای آمینه آزاد شود که در نهایت این اثرات مثبت می‌توانند در شاخص‌های رشد خود را نشان دهند (Yu et al., 2013). همچنین براساس گزارشات مختلف تاثیر متیونین و لیزین به صورت مکمل غذایی بر ماهی به عوامل مختلفی از جمله اندازه ماهی و سن آن، شرایط آرمایشگاهی (دمای آب و تراکم ذخیره سازی)، ریتم غذادهی، جیره‌غذایی و کیفیت اجزای غذایی مورداستفاده با ترکیبات متفاوتی از اسیدهای آمینه در جیره‌غذایی پایه (پودر ماهی، پودر سویا و غیره) بستگی دارد (Forster and Dominy, 2006; Zhou et al., 2011).

لیزین موردنیاز بعضی از گونه‌های خانواده شانک ماهیان مانند شانک طلایی (*Sparus aurata*), ماهی سیم دریایی (*P. major*) و ماهی *Dentex dentex* به ترتیب برابر با ۵، ۳/۶ و ۴/۷ درصد پروتئین جیره و متیونین این گونه‌ها نیز ۲/۴، ۲ و ۲/۲ گزارش شده‌است (NRC, 1993; Forster and Ogata, 1998). در مطالعه حاضر لیزین در تیمار ۶ (۸/۱۰ درصد پروتئین جیره‌غذایی) بالاتر از مقادیر ارائه شده در گزارشات مذکور بود. احتمالاً ناچیز بودن افزایش وزن در ماهیان تغذیه شده با تیمارهای با سطوح بالای لیزین، به دلیل بالا بودن میزان لیزین در جیره‌غذایی باشد که باعث عدم تناسب و تعادل در

در جیره‌های غذایی، سبب ایجاد روند افزایشی در شاخص افزایش وزن گردید. با افزایش لیزین در جیره‌های غذایی شاخص افزایش وزن تفاوت معناداری با تیمار شاهد نشان نداد. کمترین مقدار افزایش وزن در تیمارهای شاهد (بدون مکمل) و تیمار دارای ۱۰۰ درصد لیزین مشاهده شد که مشابه این نتیجه در ماهیان جوان سیم دریایی (Takagi et al., 2001; Coyle et al., 2001; P. major 2000; Micropterus salmoides Piaractus. Mesopotamicus Abimorad et al., 2009) مشاهده شد. اسیدهای آمینه سولفوری مانند متیونین دارای وظایف بسیاری در جانوران از جمله ماهی‌ها هستند که از مهم ترین آن‌ها می‌توان به نقش اصلی این اسیدهای آمینه در سنتز پروتئین‌های ساختاری و رشد و توسعه مطلوب در ماهی اشاره نمود. همچنین کم بودن متیونین جیره‌غذایی می‌تواند کاهش رشد، کارایی تغذیه و کاهش محتوای پروتئینی را برای ماهی در پی داشته باشد (Khan and Khan, 2011 a, b). تعادل اسیدهای آمینه در جیره‌غذایی برای رشد مطلوب آبزی ضروری است (Zhou et al., 2011). اسیدهای آمینه ضروری وقتی به میزان زیاد و بیش از نیاز موجود مورداستفاده قرار می‌گیرند، ممکن است سبب واکنش‌های متفاوتی از Harper et al., 1970; جمله کاهش رشد شوند (Zhou et al., 2011). بیشتر محققان با افزایش اسیدهای آمینه به جیره‌غذایی، الگوهای مختلفی برای رشد ماهی ارائه داده‌اند. با افزایش مکمل متیونین و لیزین در جیره‌غذایی: ۱) رشد افزایش می‌یابد و در مقادیر بالاتر از حد موردنیاز ماهی، رشد ثابت باقی می‌ماند و یا ۲) رشد افزایش یافته و در حد بالاتر از نیاز گونه رشد ماهی بهطور معناداری کاهش می‌یابد (Luo et al., 2005; Nguyen and Davis, 2009). عدم تاثیرگذاری مکمل‌های آمینواسیدی بر رشد ماهی در برخی از مطالعات (Hansen et al., 2011; peik mousavi et al., 2011) ممکن است به دلیل جذب غیرهمزان اسیدهای آمینه کریستاله و

جیره‌غذایی تا حد مطلوب گونه، شاخص ضریب‌چاقی افزایش یافت و با تیمار شاهد اختلاف معناداری داشت. در تایید این نتایج می‌توان به یافته‌های Corraze (2001) اشاره کرد که بیان کرد مکان رسوب چربی در ماهیان متفاوت است و به طور کلی ممکن است چربی در بافت احشاء، کبد و ماهیچه و حتی در زیر پوست ماهی ذخیره شود. همچنین Peres و Oliva-Teles (2008) بیان نمودند در جیره‌هایی که محدودیت و عدم تعادل لیزین وجود دارد، اکسیداسیون کاهش یافته و سنتز پروتئین با محدودیت روبرو می‌شود و درنتیجه اسیدهای آمینه به جای سنتز پروتئین بعد از آمین زدایی به چربی و یا گلیکوزن تبدیل و در کبد ذخیره و رسوب می‌کنند (Yang et al., 2011) که می‌تواند یکی از دلایل بالا بودن شاخص‌های مرفومتریک در تیمارهایی با سطوح بالای لیزین در این مطالعه باشد. بنابراین غلظت بالای اسیدهای آمینه در جیره‌غذایی، سبب می‌شود، این اسیدهای آمینه اضافی کاتابولیزه شده و ساختمان کربنی آن در سنتز چربی استفاده گردد و در بافت‌ها ذخیره شود (Tantikitti and Chimsung, 2001).

ضریب‌تبديل‌غذایی از مهم ترین پارامترهایی است که توسط پرورش دهنده‌گان جهت ارزیابی عملکرد تغذیه‌ای گونه و مدیریت موثر تغذیه‌ای استفاده می‌شود. ماهیان جوان صبیتی (*S. hasta*) در تیمارهای ۲ و ۳ که دارای بالاترین سطوح اسیدآمینه متیونین در بین جیره‌های غذایی بودند، کمترین میزان شاخص ضریب‌تبديل‌غذایی و بهترین کارایی غذایی و کارایی پروتئین و بیشترین میزان ابقاء پروتئین را نشان دادند. تیمارهایی با سطوح بالای لیزین بدون تفاوت معنادار با تیمار شاهد کمترین کارایی را ارائه کردند. همسو با نتایج مطالعه حاضر، شاخص‌های کارایی غذایی، کارایی پروتئین و میزان ابقاء پروتئیندر ماهی سیم دریایی (*P. major*) در تیمار غنی سازی شده با مکمل متیونین به علاوه لیزین بهترین عملکرد را نشان داد و به طور معناداری بالاتر از گروه شاهد و تیمار لیزین بود. De la

ترکیبات اسیدهای آمینه ضروری در ماهی مورد آزمایش شده است (Takagi et al., 2001). در پایان دوره آزمایش، شاخص کبدی در تیمارهای دارای مکمل اسیدهای آمینه بالاتر از تیمار شاهد بوده و تیمار دارای ۱۰۰ درصد متیونین و سپس تیمار ۱۰۰ درصد لیزین با اختلاف معنادار از تیمار شاهد، بیشترین مقدار این شاخص را داشتند. هر چند که شاخص احشایی در تیمار شاهد دارای بالاترین میزان بود. بیشترین مقدار چربی درون صفاقی در ماهیان تغذیه شده با جیره‌غذایی حاوی ۲۵ درصد مکمل متیونین و ۷۵ درصد مکمل لیزین (تیمار ۵) بود. Espe و همکاران (2008) گزارش کردند که متیونین دریافتی بالا، منجر به بالا رفتن شاخص کبدی در ماهی سالمون آتلانتیک (*Salmo salar*) می‌شود. متیونین تحت تاثیر متابولیسم اسیدهای آمینه سولفوری کبد در ماهی قرار می‌گیرد. هر چند که در ماهی سیم دریایی (*P. major*) شاخص کبدی در گروه شاهد و تیمار دارای لیزین در کمترین مقدار و در گروه دارای مکمل لیزین به علاوه Takagi et al., (2001) Brown و همکاران (1992) بیان کردند که شاخص کبدی و چربی درون صفاقی بیانگر ذخیره مناسبی از انرژی در حفره شکمی و کبد هستند و این نکته واضح است که تغذیه با جیره‌های غذایی قادر است که اسیدهای آمینه یا اسیدهای ناکافی و نامتوازن منجر به ذخیره انرژی بیشتری به صورت چربی در کبد، بافت ماهیچه (فیله) یا حفره شکمی می‌شود. این تحقیق نشان داد که گروه تغذیه شده با ۱۰۰ درصد لیزین در شاخص ضریب‌چاقی بیشترین مقدار و کمترین میزان این شاخص در گروه شاهد و تیمار ۳ مشاهده شد. در مطالعات انجام شده بر روی ماهیان (*S. macrocephalus*) (Zhuet et al., 2010) *S. macrocephalus* (Lin et al., 2013) *Myxocyprinus asiaticus* (Yang et al., 2011) *Bidyanus bidyanus* Farhat and Khan, (Heteropneustes fossilis) نیز گزارش شد که با افزایش لیزین در

نمونه آن در قزل آلای رنگین کمان (Yamamoto *et al.*, 2000; *O. mykiss* Cirrhinus Ahmed and Khan, 2004; دلیل افزایش غذای دریافتی در تیمارهایی با سطوح بالای لیزین (با افزایش وزن جزئی) در این مطالعه احتمالاً می‌تواند به دلیل توانایی این اسیدآمینه در افزایش اشتها باشد که باعث بالا رفتن میزان غذا و پروتئین دریافتی شده است اما بهدلیل عدم تعادل آمینواسیدی در این جیره‌غذایی، نتوانسته با پروفایل سنتز پروتئین در بدن مطابقت ایجاد کند و افزایش رشد معناداری ایجاد نشده است. در ماهیان، تغذیه با جیره‌های نامتعادل از نظر اسیدهای آمینه، سبب می‌شود که اسیدهای آمینه خوراکی جذب شده با پروفایل سنتز پروتئین مطابقت نداشته باشند و درنتیجه اسیدهای آمینه بعد از آمین‌زادی در تولید انرژی و فرآیند گلوکونوژنز یا لیپوژنز به کار گرفته شوند (Ballantyne, 2001).

عملکرد پایین رشد، کاهش کارایی غذایی، کارایی پروتئین و میزان ابقای آن که در ماهیان تغذیه شده با مقادیر بالای مکمل لیزین در این مطالعه دیده شد، در گونه‌های دیگری مانند سیباس ژپنی (Mai *et al.*, 2006; *Lateolabrax japonicus* Zhou *et al.*, 2010; *S. macrocephalus* نیز مشاهده شده است. این نتایج می‌تواند به دلیل اثرات منفی مقادیر بالای لیزین آزاد در جیره‌غذایی و رابطه آنتاگونیسمی آن با اسیدهای آمینه‌ای همچون آرژنین باشد که سطوح مطلوب سایر اسیدهای آمینه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد (Mai *et al.*, 2006). این نتایج، اهمیت تعادل و تناسب اسیدهای آمینه جیره‌غذایی را نشان می‌دهد و می‌توان بیان نمود، همانطور که فقدان اسیدهای آمینه در جیره‌غذایی می‌تواند بر شاخص‌های تغذیه‌ای تاثیر گذارد، مقادیر بالای یک آمینواسید مانند لیزین نیز می‌تواند تاثیرات منفی خود را در شاخص‌های ذکر شده نمایان کند (Takagi *et al.*, 2001; Li *et al.*, 2008).

Higuera و همکاران (1998) بیان کردند که در جیره‌های با مقدار نامناسب لیزین نسبت به جیره‌غذایی غنی‌سازی شده با لیزین کافی، عملکرد رشد، غذای دریافتی و شاخص کارایی پروتئین به‌طور معناداری کمتر است. در این مطالعه افزایش وزن ماهی دارای رابطه همبستگی با شاخص‌های کارایی تغذیه (۰/۴۵ P=۰/۶۷۵ و $r^2=0/665$) با معادله $x = 11/69$ و $y = 2/65$ و کارایی پروتئین (۰/۴۸ P=۰/۵۷۱ و $r^2=0/251$) با معادله $x = 0/۰۵۷$ باشد که این ماهی قادر است می‌تواند بیانگر این نکته باشد که این ماهی قادر است اسیدهای آمینه آزاد در جیره‌غذایی را به خوبی جهت سنتز پروتئین و درنتیجه رشد به کار گیرد (Zhou *et al.*, 2010 Takeda *et al.*, 2010) درخصوص اهمیت تغذیه مناسب در ماهیان گزارش کردند که اگر جیره‌غذایی موردمصرف ماهی از سطح مطلوب مغذی‌برخوردار باشد، مواد غذایی به‌طور موثرتری هضم می‌شوند (Sudagar *et al.*, 2008) که می‌تواند تایید کننده این نتیجه باشد که نیاز آمینواسیدی در این آزمایش و برای این گونه با جیره‌غذایی ۳ مطابقت بیشتر در مقایسه با سایر تیمارها دارد.

شاخص غذای دریافتی کل و شاخص‌های مقدار غذا و پروتئین دریافتی روزانه در ماهیان جوان صبیتی (*S. hasta*) در پایان دوره دارای تغییرات و روند مشابهی بودند، به‌طوری که کمترین مقدار این سه شاخص در تیمار ۳، دارای ۷۵ درصد متیونین و ۲۵ درصد لیزین و بیشترین مقدار آن در تیمار ۵ دارای ۷۵ درصد لیزین و ۲۵ درصد متیونین مشاهده شد. از آن جایی که تیمارهایی با میزان رشد بیشتر احتمالاً دارای اسیدهای آمینه کافی و متعادل بودند، میزان غذا دریافتی در این تیمارها کمتر از جیره‌هایی بود که از این نظر نامتعادل بودند. فقدان اسیدهای آمینه و یا مقدار اضافی آنها (مانند تیمار شاهد و ۶ در این مطالعه)، احتمالاً سبب کاهش دلپذیری و طعم غذا باعث کم شدن غذای دریافتی و دریافت غذا شده که

متیونین در مقایسه با لیزین در سطح بالاتری است؛ چراکه مطلوب‌ترین حالت در اکثر شاخص‌های رشد و تغذیه در تیمارهای با سطوح بالای متیونین و سطح پایین لیزین مشاهده شد. به طور کلی با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، می‌توان جیره‌غذایی ۳ با میزان ۴۵/۹۵ درصد پروتئین و حاوی ۷۵ درصد مکمل متیونین و ۲۵ درصد مکمل لیزین را مناسب ترین جیره برای این گونه در نظر گرفت. زیرا ماهیان تغذیه شده با این جیره‌غذایی در مقایسه با سایر تیمارها در شرایط آزمایشی یکسان، عملکرد رشد مناسبی داشته و از نظر شاخص‌های تغذیه‌ای در بهترین حالت قرار داشتند.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان بر خود واجب می‌دانند از مسئولین و کارکنان دانشکده منابع طبیعی دریا به‌خاطر تامین امکانات لازم جهت انجام تحقیق تقدیر و تشکر نمایند.

منابع

Abimorad, E.G., Favero, G.C., Castellani, D., Garcia, F., Carneiro, D.J., 2009. Dietary supplementation of lysine and/or methionine on performance, nitrogen retention and excretion in pacu (*Piaractus mesopotamicus*) reared in cages. Aquaculture 295, 266-270.

Ahmed, I., 2012. Dietary amino acid l-tryptophan requirement of fingerling Indian catfish, *Heteropneustes fossilis* (Bloch), estimated by growth and haemato-biochemical parameters. Fish physiology and biochemistry 38, 1195-1209.

Ahmed, I., Khan, M.A., 2004. Dietary lysine requirement of fingerling Indian major carp, *Cirrhinusmrigala*(Hamilton).

Aquaculture 235, 499-511.

Ahmed, I., Khan, M.A., Jafri, A., 2003. Dietary methionine requirement of fingerling Indian major carp, *Cirrhinusmrigala* (Hamilton).Aquaculture international 11, 449-462.

Ambardekar, A.A., Reigh, R.C., 2007. Sources and utilization of amino acids in channel catfish diets: a review. North American journal of aquaculture 69, 174-179.

در این مطالعه شاخص متیونین دریافتی و شاخص کبدی ماهیان جوان صبیتی (*S. hasta*) دارای روند مشابه و یکسانی بود به‌طوری که بیشترین میزان متیونین دریافتی در تیماری مشاهده شد که بالاترین شاخص کبدی را داشت. متیونین علاوه بر شرکت در سنتز پروتئین، نقش مهم دیگری به عنوان دهنده گروه متیل دارد و از آنجایی که متیونین یک اسیدآمینه سولفوری است و متابولیسم سولفور به‌طور عمده در بافت کبد صورت می‌گیرد، بنابراین حدود نیمی از متابولیسم متیونین در این اندام انجام می‌شود (Espe et al., 2008). همچنین در مطالعه Espe و همکاران (2008) بر روی ماهی سالمون آتلانتیک (*S.salar*) بیان شد اندازه کبد تحت تاثیر متیونین دریافتی قرار گرفته است. در ماهیان جوان صبیتی‌لیزین دریافتی در تیمارهای دارای لیزین به‌طور معناداری بیشتر از سایر تیمارها بود. در ماهی شانک سیاه (*S. macrocephalus*) نیز افزایش لیزین دریافتی احتمالاً به دلیل عدم تعادل اسیدهای آمینه در جیره‌غذایی باشد که اثر آمینزدایی را تشديد می‌کند. آمینواسیدهای اضافی یا حاصل از جذب نامتناسب‌اند و یا بخشی از لیزین دریافتی هستند که بالاتر از سطح مطلوب و موردنیاز گونه بوده است.(Zhou et al., 2010).در این مطالعه بالاترین میزان ابقای لیزین و متیونین در تیمار ۷۵ (درصد متیونین و ۲۵ درصد لیزین) مشاهده شد که این نیز به نوبه خود می‌تواند جیره‌غذایی ۳ را در این مطالعه برای گونه موردنرسی مطلوب معرفی نماید. بر اساس نتایج مطالعه حاضر می‌توان اظهار داشت که ماهیان جوان صبیتی (*S. hasta*) تغذیه شده با جیره‌هایی بر پایه پودر ماهی با مکمل‌های آمینواسیدی لیزین و متیونین، تحت تاثیر این مکمل‌های کریستاله آمینواسیدی قرار گرفته و تیمارهای غنی‌سازی شده با سطوح مختلف لیزین و متیونین نتایج متفاوت و قابل توجهی را نشان دادند. همچنین به‌نظرمی‌رسد نیاز ماهیان جوان صبیتی (*S. hasta*) با شرایط تغذیه‌ای توصیف شده به اسیدآمینه

- Aprodu, I., Vasile, A., Gurau, G., Ionescu, A., Paltenea, E., 2012. Evaluation of nutritional quality of the common carp (*Cyprinus carpio*) enriched in fatty acids. Annals of the University "Dunarea de Jos" of Galati-Fascicle VI: Food Technology 36, 61-73.
- Association of Official Analytical Chemists (AOAC), 1995. Official Methods of Analysis of Official Analytical Chemists International, 16th edn. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
- Ballantyne, J., 2001. Amino acid metabolism. Fish physiology 20, 77-107.
- Bicudo, Á.J., Sado, R.Y., Cyrino, J.E., 2009. Dietary lysine requirement of juvenile pacu *Piaractusmesopotamicus* (Holmberg, 1887). Aquaculture 297, 151-156.
- Boonyoung, S., Haga, Y., Satoh, S., 2013. Preliminary study on effects of methionine hydroxy analog and taurine supplementation in a soy protein concentrate-based diet on the biological performance and amino acid composition of rainbow trout *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum). Aquaculture Research 44, 1339-1347.
- Brown, M.L., Nematipour, G.R., Gatlin, D.M., 1992. Dietary protein requirement of juvenile sunshine bass at different salinities. The Progressive Fish-Culturist 54, 148-156.
- Corraze, G., 2001. Lipid nutrition. Nutrition and Feeding of Fish and Crustaceans, 111-130.
- Coyle, S.D., Tidwell, J.H., Webster, C.D., 2000. Response of largemouth bass (*Micropterus salmoides*) to dietary supplementation of lysine, methionine, and highly unsaturated fatty acids. Journal of the World Aquaculture Society 31, 89-95.
- De la Higuera M., Garzón A., Hidalgo M.C., Peragón J., Cardenete G. & Lupiañez J.A. (1998) Influence of temperature and dietary-protein supplementation either with free or coated lysine on the fractional protein-turnover rates in the white muscle of carp. Fish Physiology and Biochemistry 18, 85-95.
- Espe, M., Hevroy, E.M., Liaset, B., Lemme, A., El-Mowafi, A., 2008. Methionine intake affect hepatic sulphur metabolism in Atlantic salmon, (*Salmo salar*). Aquaculture 274, 132-141.
- Farhat, and Khan, M. A. 2014. Total sulfur amino acid requirement and cysteine replacement value for fingerling stinging catfish, *Heteropneustes fossilis* (Bloch). Aquac. 426-427, Res. , 270-281.
- Farhat, and Khan, M.A., 2013. Dietary L-lysine requirement offingerling stinging catfish, *Heteropneustes fossilis* (Bloch) for optimizing growth, feed conversion, protein and lysine deposition. Aquac. Res. 44, 523-533.
- Forster, I., Ogata, H.Y., 1998. Lysine requirement of juvenile Japanese flounder (*Paralichthys olivaceus*) and juvenile red sea bream (*Pagrus major*). Aquaculture 161, 131-142.
- Forster, I.P., Dominy, W.G., 2006. Efficacy of three methionine sources in diets for Pacific white shrimp, *Litopenaeus vannamei*. Journal of the World Aquaculture Society 37, 474-480.
- García-Meilán, I., Valentín, J., Fontanillas, R., Gallardo, M., 2013. Different protein to energy ratio diets for gilthead sea bream (*Sparus aurata*): Effects on digestive and absorptive processes. Aquaculture 412, 1-7.
- Hansen, A.C., Hemre, G.I., Karlsen, Q., Koppe, W., Rosenlund, G., 2011. Do plant-based diets for Atlantic cod (*Gadus morhua* L.) need additions of crystalline lysine or methionine? Aquaculture nutrition 17, e362-e371.
- Harper, A.E., Benevenga, N.G. & Wohlhuetter, R.M. (1970) Effects of ingestion of disproportionate amount of amino acid. physiology. Rev., 50, 428-558
- Khan, M.A., Abidi, S.F., 2011a. Dietary arginine requirement of *Heteropneustes fossilis* fry (Bloch) based on growth, nutrient retention and hematological parameters. Aquac. Nutr. 17, 418-428.
- Khan, M.A., Abidi, S.F., 2011b. Dietary methionine requirement of Indian major carp fry, *Cirrhinus mrigala* (Hamilton) based on growth, feed conversion and nitrogen retention efficiency. Aquac. Res. 44, 268-281.
- Kim, J.-D., Lall, S.P., 2000. Amino acid composition of whole body tissue of Atlantic halibut (*Hippoglossus hippoglossus*), yellowtail flounder (*Pleuronectes ferruginea*) and Japanese flounder (*Paralichthys olivaceus*). Aquaculture 187, 367-373.
- Kitto, M., Tabish, M., 2004. Aquaculture and food security in Iraq. Aquaculture Asia 9, 31-31.

- Li, P., Burr, G.S., Gatlin, D.M., Hume, M.E., Patnaik, S., Castille, F.L., Lawrence, A.L., 2007. Dietary supplementation of short-chain fructooligosaccharides influences gastrointestinal microbiota composition and immunity characteristics of Pacific white shrimp, (*Litopenaeus vannamei*), cultured in a recirculating system. *The Journal of nutrition* 137, 2763-2768.
- Li, P., Mai, K., Trushenski, J., Wu, G., 2009. New developments in fish amino acid nutrition: towards functional and environmentally oriented aquafeeds. *Amino acids* 37, 43-53.
- Lin, Y., Gong, Y., Yuan, Y., Gong, S., Yu, D., Li, Q., Luo, Z., 2013. Dietary l-lysine requirement of juvenile Chinese sucker, *Myxocyprinus asiaticus*. *Aquaculture Research* 44, 1539-1549.
- Luo, Z., Liu, Y.-J., Mai, K.-S., Tian, L.-X., Yang, H.-J., Tan, X.-Y., Liu, D.-H., 2005. Dietary l-methionine requirement of juvenile grouper (*Epinephelus coioides*) at a constant dietary cystine level. *Aquaculture* 249, 409-418.
- Mai, K., Wan, J., Ai, Q., Xu, W., Liufu, Z., Zhang, L., Zhang, C., Li, H., 2006. Dietary methionine requirement of large yellow croaker, (*Pseudosciaenacrocea* R.) *Aquaculture* 253, 564-572.
- Mai, K., Zhang, L., Ai, Q., Duan, Q., Zhang, C., Li, H., Wan, J., Liufu, Z., 2006. Dietary lysine requirement of juvenile Japanese seabass, (*Lateolabrax japonicus*). *Aquaculture* 258, 535-542.
- Nguyen, T., Davis, D., 2009. Re-evaluation of total sulphur amino acid requirement and determination of replacement value of cystine for methionine in semi-purified diets of juvenile Nile tilapia, (*Oreochromis niloticus*). *Aquaculture nutrition* 15, 247-253.
- NRC (1993) Nutrient Requirements of Fish. National Academy Press, Washington, DC, USA, 114p.
- Palavesam, A., Beena, S., Immanuel, G., 2008. Effect of L-lysine supplementation with different protein levels in diets on growth, body composition and protein metabolism in pearl spot *Etroplussuratensis* (Bloch). *Turkish J Fish AquatSci* 8, 133-139.
- Peik mousavi, M., Bahmani, M., Savari, A., Hasani, M. and Haghi, N., 2011. Consider of different levels of methionine amino acid on growth indices and whole body composition of Juveniles Huso huso (Bluga). *Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi)* No 89, 12-19.
- Peres, H., Oliva-Teles, A., 2008. Lysine requirement and efficiency of lysine utilization in turbot (*Scophthalmus maximus*) juveniles. *Aquaculture* 275, 283-290.
- Rathore, R.M., Liaset, B., Hevrøy, E.M., El-Mowafy, A., Espe, M., 2010. Lysine limitation alters the storage pattern of protein, lipid and glycogen in on-growing Atlantic salmon. *Aquaculture Research* 41, e751-e759.
- Rawles, S.D., Fuller, S.A., Beck, B.H., Gaylord, T.G., Barrows, F.T., McEntire, M.E., 2013. Lysine optimization of a commercial fishmeal-free diet for hybrid striped bass (*Morone chrysops* × *M. saxatilis*). *Aquaculture* 396, 89-101.
- Saavedra, M., Conceição, L.E.C., Helland, S., Pousão-Ferreira, P., and Dinis, M.T., 2008. Effect of lysine and tyrosine supplementation in the amino acid metabolism of Diplodusargus larvae fed rotifers. *Aquaculture* 284, 180-184.
- Santinha, P., Medale, F., Corraze, G., Gomes, E., 1999. Effects of the dietary protein: lipid ratio on growth and nutrient utilization in gilthead seabream (*Sparus aurata* L.). *Aquaculture Nutrition* 5, 147-156.
- Sardar, P., Abid, M., Randhawa, H., Prabhakar, S., 2009. Effect of dietary lysine and methionine supplementation on growth, nutrient utilization, carcass compositions and haemato-biochemical status in Indian Major Carp, Rohu (*Labeo rohita* H.) fed soy protein-based diet. *Aquaculture nutrition* 15, 339-346.
- Segovia-Quintero, M.A., Reigh, R.C., 2004. Coating crystalline methionine with tripalmitin-polyvinyl alcohol slows its absorption in the intestine of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*). *Aquaculture* 238, 355-367.
- Skalli, A., Hidalgo, M., Abellán, E., Arizcun, M., Cardenete, G., 2004. Effects of the dietary protein/lipid ratio on growth and nutrient utilization in common dentex (*Dentex dentex*

- L.) at different growth stages. *Aquaculture* 235, 1-11.
- Sudagar, M., Imanpour, M. and Hosseinifar, S., 2008. Use of optimum probiotic in diet of cultured juvenile Beluga(*Huso huso*) and effect on growth performance and survival rate. *Journal of Nour Marine Sciences* 3(3), 41-46.
- Takagi, S., Shimeno, S., Hosokawa, H. and Ukawa, M. 2002. Effect of lysine and methionine supplementation to a soy protein concentrate diet for red sea bream (*Pagrusmajor*). *Fish. Sci.*, 67, 1088–1096.
- Takeda, M., Takii, K., 1992. Gustation and nutrition in fishes: application to aquaculture. *Fish chemoreception*. Springer, pp. 271-287.
- Tantikitti, C., Chimsung, N., 2001. Dietary lysine requirement of freshwater catfish (*Mystusnemurus* Cuv.& Val.). *Aquaculture Research* 32, 135-141.
- Teng, S.-K., El-Zahr, C., Al-Abdul-Elah, K., Almatar, S., 1999. Pilot-scale spawning and fry production of blue-fin porgy, *Sparidentexhastata* (Valenciennes), in Kuwait. *Aquaculture* 178, 27-41.
- Tibaldi, E., Kaushik, S., 2005. Amino-acid requirements of Mediterranean fish species. *Cah Options Mediterr* 63, 59-65.
- Tulli, F., Messina, M., Calligaris, M., Tibaldi, E., 2010. Response of European sea bass (*Dicentrarchus labrax*) to graded levels of methionine (total sulfur amino acids) in soya protein-based semi-purified diets. *British journal of nutrition* 104, 664-673.
- Xie, F., Ai, Q., Mai, K., Xu, W., Wang, X., 2012. Dietary lysine requirement of large yellow croaker *Pseudosciaenacrocea*, (Richardson 1846) larvae. *Aquaculture Research* 43, 917-928.
- Yamamoto, T., Shima, T., Furuita, H., Shiraishi, M., Sánchez-Vázquez, F., Tabata, M., 2000. Self-selection of diets with different amino acid profiles by rainbow trout (*Oncorhynchusmykiss*). *Aquaculture* 187, 375-386.
- Yamamoto, T., Sugita, T., Furuita, H., 2005. Essential amino acid supplementation to fish meal-based diets with low protein to energy ratios improves the protein utilization in juvenile rainbow trout (*Oncorhynchusmykiss*). *Aquaculture* 246, 379 – 391.
- Yang, S.-D., Liu, F.-G., Liou, C.-H., 2011. Assessment of dietary lysine requirement for silver perch (*Bidyanusbidyanus*) juveniles. *Aquaculture* 312, 102-108.
- Yu, D.H., Gong, S.Y., Yuan, Y.C., Luo, Z., Lin, Y.C., Li, Q., 2013. Effect of partial replacement of fish meal with soybean meal and feeding frequency on growth, feed utilization and body composition of juvenile Chinese sucker, *Myxocyprinus asiaticus* (Bleeker). *Aquaculture Research* 44, 388-394.
- Yuan, Y.-c., Gong, S.-y., Yang, H.-j., Lin, Y.-c., Yu, D.-h., Luo, Z., 2011. Effects of supplementation of crystalline or coated lysine and/or methionine on growth performance and feed utilization of the Chinese sucker, (*Myxocyprinus asiaticus*). *Aquaculture* 316, 31-36.
- Zhou, F., Shao, J., Xu, R., Ma, J., Xu, Z., 2010. Quantitative l-lysine requirement of juvenile black sea bream (*Sparus macrocephalus*). *Aquaculture nutrition* 16, 194-204.
- Zhou, F., Shao, Q.-j., Xiao, J.-x., Peng, X., Ngandzali, B.-O., Sun, Z., Ng, W.-K., 2011. Effects of dietary arginine and lysine levels on growth performance, nutrient utilization and tissue biochemical profile of black sea bream, (*Acanthopagrusschlegelii*), fingerlings. *Aquaculture* 319, 72-80.
- Zhou, F., Xiao, J., Hua, Y., Ngandzali, B., Shao, Q., 2011. Dietary l-methionine requirement of juvenile black sea bream (*Sparus macrocephalus*) at a constant dietary cystine level. *Aquaculture Nutrition* 17, 469-481.
- Zhou, Q.-C., Wu, Z.-H., Chi, S.-Y., Yang, Q.-H., 2007. Dietary lysine requirement of juvenile cobia (*Rachycentroncanadum*). *Aquaculture* 273, 634-640.

Effects of supplementation of amino acids, lysine and methionine on growth performance and feed utilization of Sobaity sea bream juveniles, *Sparidentex hasta*.

Negar Beyrami, Mohammad Zakeri*, Preeta Kochanian, Vahid Yavari, Hamid Mohammadi Azarm.

Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology

Abstract

This study was conducted to determine the effects of dietary supplementation of lysine and methionine on growth and nutrient utilization of Sobaity sea bream, *Sparidentex hasta*. A total of 180 juvenile fish with an initial weight of 31.38 ± 1.4 g were distributed randomly among eighteen tanks. Fish were fed to satiation three times per day (08:00, 13:00 and 18:00 hours) for 8 weeks with formulated diets containing six different levels of dietary methionine and/or lysine; Diet 1: a control diet without dietary amino acid supplementation; Diet 2: 100% methionine supplementation; Diet 3: 75% methionine and 25% lysine supplementation; Diet 4: 50% methionine and 50% lysine supplementation; Diet 5: 25% methionine and 75% lysine supplementation and Diet 6: 100% lysine supplementation. The results of this study showed that dietary lysine and methionine supplementation significantly affected ($P < 0.05$) growth parameters and feed utilization. The fish fed with high level of methionine supplementation had significantly improved growth performance than the group fed the control diet and treatment 6. Highest feed conversion ratio, protein efficiency ratio and protein retention were observed in diet 3. Though lysine and methionine supplementation showed positive effects on growth and feeding performance, our results suggested that Sobaity juveniles probably required more methionine than lysine. .

Keywords: Sobaity sea bream, amino acid, lysine, methionine, *Sparidentex hasta*.

Table1. Composition and proximate biochemical analysis of experimental diets (n=3).

Table2. Amino acid composition of the experimental diet.

Table3. Growth parameters of sobaity sea bream juveniles (*S.hasta*) fed diets containing different levels of methionine and lysine (mean \pm SD, n=3).

Table4. Feed utilization of sobaity sea bream juveniles (*S.hasta*) fed diets containing different levels of methionine and lysine (mean \pm SD, n=3).

*Corresponding author, E-mail: zakeri.mhd@gmail.com