

## تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخهای رفتاری در خرچنگ منزوی *Diogenes avarus*

نرگس بدری، نرگس امراللهی بیوکی\* و محمدشریف رنجبر

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۱۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۲/۷

[10.22113/jmst.2016.34143](https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34143) : (DOI) شناسه دیجیتال


### چکیده

غلظت میان کشندگی ( $LC_{50}$  96h) میزان حساسیت و پتانسیل ماندگاری موجودات را در برابر آلینده‌ها از جمله فلزات سنگین مشخص می‌کند. در طی این مطالعه میزان غلظت میان کشندگی نیترات سرب ( $Pb NO_3$ ) بر خرچنگ منزوی (*Diogenes avarus*) طبق روش استاندارد O.E.C.D (Heller, 1865) تعیین گردید. در آذر ماه ۱۳۹۳، ۸۴ قطعه خرچنگ منزوی *D. avarus* با میانگین وزنی  $19 \pm 0.1$  گرم در ۵ تیمار (۷۵، ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۵۰، ۱۷۵، ۲۰۰ میکروگرم بر لیتر سرب) با سه تکرار به همراه یک تیمار شاهد مورد استفاده قرار گرفت (۱۲ قطعه خرچنگ منزوی در هر تیمار). پارامترهای موثر فیزیکی و شیمیایی آب از جمله pH، سختی کل، اکسیژن محلول و درجه حرارت در طول دوره آزمایش کنترل گردید. در نهایت میزان غلظت میان کشندگی ( $LC_{50}$  96h) سرب با استفاده از برنامه آماری Probit analysis برابر با  $1840.45$  میکروگرم بر لیتر محاسبه شد. همچنین به وسیله‌ی رسم نمودارها میزان  $LC_{10}$ ,  $LC_{50}$ ,  $LC_{90}$  و  $96$  ساعت نیز محاسبه گردید؛ نتایج نشان داد که با افزایش زمان، غلظت کمتری از سرب لازم است تا باعث ایجاد مرگ و میر در خرچنگ منزوی *D. avarus* شود، همچنین درصد مرگ و میر با افزایش مدت زمان مواجهه خرچنگ با سرب و افزایش غلظت آن افزایش یافت. تغییرات رفتاری مشاهده شده در خرچنگ‌های منزوی *D. avarus* در طی دوره‌ی آزمایش شامل عدم تعادل در راه رفتن، کاهش فعالیت و جنبش، حرکت آهسته، عدم تحریک‌پذیری و همچنین تغییر رنگ در ناحیه‌ی شکم بود.

**کلمات کلیدی:** *Diogenes avarus*، غلظت میان کشندگی ( $LC_{50}$ )، نیترات سرب، خرچنگ منزوی، رفتار، فلزات سنگین.

\*نویسنده مسئول، پست الکترونیک: amrollahi@hormozgan.ac.ir

روی بسترهاي صخريهاي و ماسه اي و گلوي درنواحي کم عمق ساحلي تغذييه مي‌کنند، بيشتر در معرض آسودگي فلزات سنگين قرار مي‌گيرند و از اين لحاظ اين مسئله حائز اهميت مي‌باشد. اين موجودات گروهي از سختپوستان هستند که برای حفاظت از شکم نرم خود وابسته به صدفهاي خالي شكم پايان هستند، آنها يك مدل جانوري ايدهآل برای بررسی پاسخهاي رفتاري ايجاد شده تحت تأثير مواجهه با آلايندهها، مي‌باشند (Bilock and Dunbar, 2009).



شکل ۱ عکس شماتيک از خرچنگ منزوی (*D. avarus*) (۱) غلاف و ضمائير سر، (۲) چلا و کارپوس جنس ماده، (۳) چلا و کارپوس جنس نر، (۴) تلسون (منبع: McLaughlin and Dworschak, 2001).

همچنین اين جانوران از اعضاي مهم جوامع ماکروزئوبنتيك در نواحي جزر و مدی و زير جزر و مدی در سراسر جهان هستند (Biagi et al., 2006)، آنها در هرم تغذييه اي در سطح نزديك به سطوح اوليه اي تغذييه اي قرار دارند، پوده خوار و تنظيم کننده مواد آليه دتربيتوس هستند (Peura et al., 2013)، به همين دلائل نقش مهمی را در زنجيره غذائي دريائي ايفا مي‌کنند (Biagi et al., 2006) با توجه به اين که بستر و سواحل، جايگاه نهايى آسودگيها مي‌باشند و خرچنگهاي منزوی بنتيك مي‌باشند بيشتر در معرض آسودگيهاي همچون

## ۱. مقدمه

به طور کلي، حدود ۳۰ درصد از فعالیتهای حمل و نقل نفتی کل جهان در خلیج فارس صورت مي‌گيرد که سبب ورود فلزات سنگين به محیط زیست آبزی مي‌شوند (Pourrang et al., 2005). اين آلايندهها مي‌توانند روی موجودات اين منطقه و انسان تاثيرات جبران ناپذيری را به دنبال داشته باشند. فلزات سنگين به عنوان آلايندههاي مهم در محیطهاي آبی شناخته شده‌اند. اين آلايندهها هنگامی که در غلاظتهاي بالا در محیط باشند باعث آسيبهاي جبران ناپذير متابوليکي، فيزيولوژيکي و ساختاري در ارگانيسماهای آبزی مي‌شوند. برخوي فلزات سنگين در غلاظتهاي بسيار پايان برای بسياری از ارگانيسماهها سمی هستند و کاربرد مفيدي در بدن موجودات ندارند. فلزاتی از قبيل: جيوه، کادميوم و سرب از اين گروه‌اند (Sarmedian et al., 2015). فلزات سنگين مي‌توانند عملکرد اندامهاي حسي را تحت تأثير قرار دهند و بنابراین رفتار به وسیله‌ي کاهش يا تغيير ارسال اطلاعات به مغز تحت تأثير قرار مي‌گيرد (Blaxter and Ten Hallers-Tjabbes, 1992). سرب فلز سنگيني است که اغلب، کانال‌های انتقال یون و سيگنانل‌های سلولی را تحت تأثير قرار مي‌دهد بنابراین، داراي خاصيت نوروتوکسيکيني مي‌باشد (Garza et al., 2006) و مواجهه با اين آلاينده مي‌تواند سبب تغييرات رفتاري در موجودات زنده از جمله خرچنگ‌های منزوی شود و بقا آنها را تحت تأثير قرار دهد (Weis and Weis, 1998). آسودگي فلزات سنگين در رسوبات بستر برای کفريان، بنتوزخواران (پوده خواران) و همچنین گياهان آبزی اهميت ويزه‌اي دارد. در صورتی که ميزان آسودگي رسوبات از مقادير مشخصی تجاوز نماید، موجبات بر هم خوردن تعادل بوم‌شناختي و زوال زيستي اکوسيستم را فراهم مي‌نماید (Jalali Jafari and Aghazadeh Mshaki, 2007). از آنجايی که خرچنگ‌های منزوی جانوراني کفري و پوده خوار هستند و از جلبک‌هاي کوچک و ديگر ارگانيسماهای

در آذر ماه ۱۳۹۳، خرچنگ منزوی *D. avarus* به تعداد مورد نیاز ۸۴ قطعه خرچنگ منزوی) به صورت تصادفی و در زمان جزر از ساحل خواجه عطا بندرعباس نمونه برداری شد. منطقه نمونه برداری با طول و عرض جغرافیایی E ۲۱°۹۴' ۵۶° N ۱۹° ۲۱' ۳۴" ۵۹° ۱۰' ۲۷" در قسمت جنوب استان هرمزگان و در شهر بندرعباس قرار گرفته است (شکل ۲)، میزان نیترات سرب در آب این منطقه ۰/۱ میلی گرم بر لیتر و در رسوبات این منطقه ۰/۷ میلی گرم بر کیلوگرم رسوب می‌باشد. نمونه‌ها در گروه‌های ۳۰ تا یکی با کمترین استرس به آزمایشگاه زیست‌شناسی دانشگاه هرمزگان منتقل گردیدند. سپس یک هفته به خرچنگ‌ها مهلت داده شد تا با شرایط آزمایشگاه سازگار شوند. بعد از سازگاری، خرچنگ‌ها با کمترین استرس به روش گرم کردن نوک صدف از صدف‌شان خارج گردیدند (Hahn, 1998). بعد از خارج کردن خرچنگ‌ها از صدف‌شان، به منظور کاهش استرس ناشی از این کار (خارج کردن آن‌ها از صدف‌شان)، آن‌ها به مدت ۲ روز سازگار شدند (Ismail, 2012). تعویض آب به صورت روزانه انجام می‌شد. شرایط فیزیکوشیمیایی آب آزمایش در جدول ۱ مشخص شده است. خرچنگ‌ها دو بار در هفته با پلیت ماهی (Ismail, 2012; White et al., 2013) تغذیه‌ی خرچنگ‌ها ۲۴ ساعت قبل از شروع آزمایش قطع گردید. آزمایشات به صورت ساکن و بر اساس روش استاندارد (TRC, 1984) O.E.C.D انجام شد.


**جدول ۱. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب آزمایش**

مقدار	پارامتر
۲۳±۱	دما (سانتی گراد)
۸±۰/۱	pH
۵/۲±۰/۱	اکسیژن محلول (mg/l)
۴۴/۷±۰/۱	شوری (ppt)

فلزات سنگین قرار می‌گیرند. آن‌ها همچنین، نشانگرهای زیستی خوبی برای بازنگری غلظت فلزات سنگین در بسیاری از سرزمین‌ها در سراسر جهان هستند (Somasundaran and Ajmal, 2010). بنابراین، در این مطالعه یکی از گونه‌های (گونه *D. avarus*) شکل ۱) این جانوران مورد استفاده قرار گرفت.

تست تعیین غلظت میان کشندگی ۹۶ ساعته (LC<sub>50</sub>) برای سنجش قابلیت مستعد بودن و پتانسیل بقا جانوران در برابر مواد سمی از جمله فلزات سنگین می‌باشد (Sarmedian et al., 2015). با وجود این که در سال‌های اخیر، بررسی‌های زیست‌محیطی و زیست‌شناسختی تغییرات میزان فلزات سنگین در سواحل جنوبی کشور اکثرا معطوف به نواحی ساحلی خلیج فارس بوده است (Sadeghi et al., 2014) ولی مطالعات جامعی در خصوص تعیین محدوده‌ی کشندگی فلزات سنگین بر روی خرچنگ‌های منزوی این منطقه انجام نگرفته است. بنابراین، این مطالعه اولین تحقیق درخصوص تعیین غلظت میان کشندگی *Diogenes* (فلز سرب بر روی خرچنگ منزوی LC<sub>50</sub>) در ایران می‌باشد که هدف آن تعیین میزان کشندگی نیترات سرب (PbNO<sub>3</sub>) به عنوان یکی از سمی‌ترین ترکیبات برای موجودات زنده و بررسی تغییرات رفتاری این گونه در غلظت‌های مختلف فلز سرب می‌باشد. همچنین تعیین این غلظت در این گونه می‌تواند پایه‌ای برای مطالعات بعدی توکسیکولوژی و اکوتوكسیکولوژی در این گونه باشد. نتایج حاصل از این مطالعه می‌تواند راهنمای مناسبی برای انتخاب سمیت حاد و پایش اثرات سرب بر خرچنگ منزوی *D. avarus* باشد. همچنین پایش منظم و مداوم رفتار این خرچنگ منزوی می‌تواند نشانگر هشدار دهنده‌ی اولیه مسمومیت این گونه با نیترات سرب باشد.

## ۲. مواد و روش‌ها




شکل ۲ موقعیت جغرافیایی منطقه نمونهبرداری.

ظرف با حجم ۲ لیتر آب، ۴ عدد خرچنگ منزوی با میانگین وزنی  $0.19 \pm 0.01$  گرم، قرار داده شد. در طول ۹۶ ساعت آزمایش تغییرات رفتاری و ناهنجاری‌های ریخت‌شناختی خرچنگ‌های در معرض غلظت‌های مختلف نیترات سرب و همچنین خرچنگ‌های گروه شاهد به صورت منظم بررسی و ثبت گردید.


### ۳. نتایج و بحث

همان‌طور که قبله بیان شد، مرگ و میر نمونه‌های *D. avarus* برای دوزهای ۵۰ و ۲۵۰ میکروگرم بر لیتر سرب در طول مدت ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت مواجهه برای یافتن محدوده‌ی کشنده سرب بر گونه *D. avarus*، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که دامنه اصلی کشنده‌ی بین ۵۰- ۲۵۰ میکروگرم بر لیتر سرب می‌باشد. زیرا مشاهده شد که مرگ و میر در ۵۰ میکروگرم بر لیتر سرب برابر با صفر و در ۲۵۰ میکروگرم بر لیتر سرب برابر با ۱۰۰ درصد بود. بنابراین، مرگ و میر نمونه‌های *D. avarus* در اثر سرب، در غلظت‌های ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۵۰، ۱۷۵ و ۲۰۰ میکروگرم بر لیتر سرب در طول ۹۶ ساعت برای آزمایش با سه  $LC_{50}$  در هر


بر اساس جستجوهای انجام شده، اطلاعاتی در زمینه توکسیکولوژیک فلز سرب بر روی خرچنگ منزوی *D. avarus* موجود نیست و محدوده‌ی کشنده سرب برای این خرچنگ منزوی مشخص نیست. لذا قبل از انجام تست میان کشنده‌ی ( $LC_{50}$ ) سرب، تست تعیین محدوده‌ی کشنده سرب برای خرچنگ منزوی انجام شد. بنابراین مرگ و میر خرچنگ‌های منزوی *D. avarus* برای دوزهای ۵۰، ۱۵۰ و ۲۵۰ میکروگرم بر لیتر سرب (نیترات سرب مارک: Merck) در طول مدت ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت مواجهه، برای یافتن دامنه کشنده سرب بر روی گونه *D. avarus*، مورد آزمایش قرار گرفته شد. میزان مرگ و میر خرچنگ‌ها هر ۸ ساعت یکبار بررسی و خرچنگ‌های مرده از ظرف‌های خارج گردید (Sadeghi et al., 2014). بر اساس تکرار مجدد آزمایشات ذکر شده (سه تکرار)، تیمار نهایی برای فلز سرب با احتساب تیمار شاهد ۶ تیمار به دست آمد که به منظور افزایش دقیق آزمایش هر تیمار سه بار تکرار شد و تیمار شاهد فقط جهت اطمینان از سلامت کامل خرچنگ‌ها و شرایط فیزیکوشیمیایی مناسب آب در محلول آزمایش در نظر گرفته شد. در این آزمایش از ظرف‌های ۲ لیتری استفاده شد و در هر



شکل ۴. میزان درصد مرگ و میر نمونه‌های *D. avarus* در تست تعیین غلظت کشندگی حاد (LC<sub>50</sub>) در غلظت‌های مختلف سرب در طی ۴۸ ساعت



شکل ۵. میزان درصد مرگ و میر نمونه‌های *D. avarus* در تست تعیین غلظت کشندگی حاد (LC<sub>50</sub>) در غلظت‌های مختلف سرب در طی ۷۲ ساعت



شکل ۶. میزان درصد مرگ و میر نمونه‌های *D. avarus* در تست تعیین غلظت کشندگی حاد (LC<sub>50</sub>) در غلظت‌های مختلف سرب در طی ۹۶ ساعت


با استفاده از روش آماری Probit (USEPA, 1985) با سطح اطمینان ۹۵ درصد در محیط SPSS مقدار

تکرار مورد بررسی قرار گرفته شد. مشاهدات نشان داد که بیشترین میزان مرگ و میر در غلظت ۱۷۵ و ۲۰۰ میکروگرم بر لیتر سرب (۷ عدد) و کمترین میزان مرگ و میر در غلظت ۷۵ و ۱۰۰ میکروگرم بر لیتر سرب (۲ عدد) بود. همچنین در تیمار شاهد تلفاتی مشاهده نشد (جدول ۲).

جدول ۲. مرگ و میر تجمعی خرچنگ‌های منزوی *D. avarus* (تعداد در هر غلظت برابر با ۱۲) در آزمایش برای تعیین LC<sub>50</sub> ساعته

غلظت (میکروگرم بر لیتر)	۹۶ ساعت	۷۲ ساعت	۴۸ ساعت	۲۴ ساعت	ساعت
کنترل	.	.	.	.	.
۷۵	۲	۲	۱	۱	۷۵
۱۰۰	۲	۲	۲	۱	۱۰۰
۱۲۵	۳	۲	۱	۱	۱۲۵
۱۵۰	۳	۳	۲	۱	۱۵۰
۱۷۵	۷	۵	۳	۲	۱۷۵
۲۰۰	۷	۶	۴	۳	۲۰۰

میزان درصد مرگ و میر خرچنگ منزوی *D. avarus* در مواجه با سرب طی ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت در غلظت‌های انتخابی جهت تعیین غلظت میان کشندگی (LC<sub>50</sub>) به ترتیب در شکل‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ مشاهده می‌شود.



شکل ۳. میزان درصد مرگ و میر نمونه‌های *D. avarus* در تست تعیین غلظت کشندگی حاد (LC<sub>50</sub>) در غلظت‌های مختلف سرب در طی ۲۴ ساعت

می‌دهد که هر چقدر زمان افزایش پیدا می‌کند غلظت کمتری از سرب لازم است تا باعث ایجاد مرگ و میر در خرچنگ منزوی *D. avarus* شود.

تغییرات رفتاری در طول دوره‌ی آزمایش شامل عدم تعادل در راه رفتن، کاهش فعالیت و جنبش، حرکت آهسته، عدم تحریک‌پذیری و همچنین تغییر رنگ در ناحیه‌ی شکم و پاهای کج غیرمعمول بود. که تغییرات رفتاری و ریخت‌شناختی خرچنگ‌های منزوی *D. avarus* با افزایش غلظت نیترات سرب افزایش می‌یافتد.

*LC<sub>50</sub>* محاسبه شد که میزان آن برای سرب در خرچنگ منزوی *D. avarus* با میانگین وزنی  $184/0.45 \pm 0.01$  گرم برابر با  $112/871$  میکروگرم بر لیتر سرب محاسبه شد. همچنین مطابق با این روش‌های آماری ذکر شده مقادیر  $LC_{10}$ ,  $LC_{20}$ ,  $LC_{30}$  در  $24$ ,  $48$ ,  $72$ ,  $96$  ساعت سرب بر روی خرچنگ منزوی *D. avarus* اندازه‌گیری شدند. مقادیر  $LC_{10}$ ,  $LC_{20}$  در  $LC_{90}$  در  $24$ ,  $48$ ,  $72$ ,  $96$  ساعت سرب بر روی خرچنگ منزوی *D. avarus* در جدول ۳ آورده شده‌اند. نتایج به دست آمده در جدول ۳ شان

جدول ۳ غلظت‌های کشنده سرب در طی ۹۶ ساعت بر روی خرچنگ منزوی *D. avarus*

ساعت ۹۶	ساعت ۷۲	ساعت ۴۸	ساعت ۲۴	LC
۷۳/۱۴۷	۸۱/۸۱۶	۹۰/۱۹۴	۱۱۲/۸۷۱	$LC_{10}$
۱۱۵/۱۲۵	۱۲۳/۵۳۶	۱۷۴/۷۹۵	۳۲۳/۸۵۱	$LC_{20}$
۱۳۸/۵۸۷	۱۵۹/۲۲۵	۲۲۳/۷۸۵	۵۰۱/۰۹۳	$LC_{30}$
۱۶۲/۳۸۷	۱۹۷/۷۸۳	۲۷۶/۳۲۵	۷۲۷/۹۹۷	$LC_{40}$
۱۸۴/۰۴۵	۲۴۲/۴۴۳	۳۸۰/۴۰۲	۸۳۷/۹۰۵	$LC_{50}$
۲۱۸/۳۸۲	۲۹۶/۶۴۵	۴۰۹/۹۴۹	۱۴۶۳/۳۹۱	$LC_{60}$
۲۵۵/۸۸۶	۳۶۸/۴۸۰	۵۰۶/۲۵۷	۲۱۲۶/۰۴۴	$LC_{70}$
۳۰۸/۰۳۴	۴۷۴/۹۳۲	۶۴۸/۰۶۸	۳۲۹۱/۶۴۳	$LC_{80}$
۴۶۳/۰۷۹	۸۶۹/۰۵۳	۱۶۰۴/۳۸۱	۶۲۲۰/۲۴۹	$LC_{90}$

غشای بدن یا کوتیکول، متابولیسم، قابلیت دفع، جنس، سن، اندازه‌ی بدن، محل عملکرد آلاینده در بدن و رفتار می‌باشد (Oittitoloju and Dan-Pedro, 2002). در مطالعات صورت گرفته توسط محققان دیگر، Otitoloju و Don-Pedro (2002) غلظت  $LC_{50}$  ۹۶ ساعت سرب بر روی خرچنگ منزوی *Clibanarius africanus* بر لیتر برآورد گردید، این پارامتر  $LC_{50}$  ۹۶ ساعت سرب بر روی خرچنگ مانگرو *Sesarma huzardi* برای سرب با  $18/40.45$  میلی گرم برابر با  $2320/13$  میلی گرم بر لیتر بود و برای شکم پا *Tympanotonus fuscatus* برای سرب با  $60.9/779$  میلی گرم بر لیتر تخمین زده شده است. سطح نسبتاً بالای تحمل حیوانات به بعضی ترکیبات فلزی به دلیل مکانیسم‌های رفتاری آن‌ها می‌باشد، به عنوان مثال *T.*

#### ۴. نتیجه‌گیری

همان‌طور که در بخش نتایج بیان شد، میزان غلظت کشنده سرب طی ۹۶ ساعت برای گونه‌ی مورد مطالعه با میانگین وزنی  $184/0.45 \pm 0.01$  گرم برابر با  $112/871$  میکروگرم بر لیتر سرب می‌باشد. بر اساس این می‌توان نتیجه گرفت که حداقل غلظت مجاز (MAC value) بر اساس فرمول TRC (1984) که به عبارتی غلظت غیر موثر (NOEC) نیز خوانده می‌شود برای سرب  $18/40.45$  می‌باشد. و همچنین حداقل غلظت موثر (LOEC) این فلزات که به آن  $LC_{10}$  ساعت اطلاق می‌شود (Finney, 1990) برابر با  $147/73$  میکروگرم بر لیتر بود.

پاسخ‌های متفاوت جانداران به ترکیبات فلزی و دیگر مواد شیمیایی می‌تواند وابسته به چندین فاکتور نظیر

et al., 2006). در جانوران دارای سیستم عصبی پیچیده سرب از طریق جایگزینی با کلسیم درون پایانه‌های عصبی تاثیرات نوروترانسمیتری خود را روی سیستم عصبی می‌گذارد (Garza et al., 2006). سرب سبب تجمع زیستی در گونه‌ی *Strongylocentrotus purpuratus* می‌شود و همچنین تاثیر سمیت خود را به وسیله‌ی تخریب هموستازی Weber (Tellis et al., 2014) ارائه می‌دهد. یون Ca و همکاران (1991) اشاره کردند که اثرات رفتاری حاصل از مواجهه سرب احتمالاً به وسیله‌ی تغییر انتقال دهنده‌های عصبی ایجاد می‌شود. در طول آزمایش اخیر، عدم تعادل خرچنگ‌های منزوی *D. avarus* در راه رفتن مشاهده شد اگرچه این گونه سیستم عصبی پیچیده‌ای ندارد اما ممکن است سرب تاثیر مشابهی روی سیستم عصبی این جانور گذاشته باشد و در نتیجه سبب عدم تعادل این جانور در راه رفتن شده باشد. و همچنین در غلظت‌های پایین سرب شاهد میزان پوست اندازی بیشتری نسبت به غلظت‌های بالا بودیم و افرادی که در این غلظت‌ها در ساعات اولیه آزمایش پوست اندازی کرده بودند بعد از ۹۶ ساعت دارای پاهای غیر معمولی و کج شده بودند. احتمالاً خاصیت جایگزینی سرب با کاتیون‌های چند ظرفیتی علت مشاهده پاهای کج غیر معمول می‌باشد. همچنین نمونه‌های سالم یا همان شاهد دارای جنبش و فعالیت کمتری بودند. این کاهش فعالیت احتمالاً به این دلیل است که سرب فعالیت متابولیکی جانور را بالا برده است زیرا جانور در معرض آلودگی قرار گرفته شده بیشترین انرژی خود را صرف بار متابولیکی بالا می‌کند و این بار متابولیکی بالا اغلب به عنوان دلیلی برای تغییر در رفتار (به عنوان مثال کاهش جنبش) می‌باشد. از آنجایی که افراد در معرض آلودگی قرار گرفته شده هزینه مقابله با اثرات فیزیولوژیکی آلاینده را پرداخت می‌نمایند (به عنوان مثال دفع بالا برای حذف ترکیبات مضر) انرژی برای انجام سایر فعالیت‌های ایشان کاهش می‌یابد (White et

*fuscatus* بر پایه‌ی تشخیص ترکیبات مضر در محیط پیرامونش به درون صدف خود عقب‌نشینی می‌کند و روزنه صدف خود را به وسیله‌ی اپرکولومش (سرپوش آبششی) می‌پوشاند و از این طریق از ورود ترکیبات فلزی مضر جلوگیری می‌کند. تحمل نسبتاً پایین‌تر یا حساسیت بالاتر *C. africanus* به اثر سمی ترکیبات فلزی ممکن است احتمالاً به علت سطح بالاتر مواجهه با آلاینده سرب باشد. زیرا، این جانور دارای غشای نازک‌تر و نرم‌تر در ناحیه شکمی‌اش است، صدفی که جانور در آن سکنی گریده است صدفی است که آن را پیدا کرده است، بنابراین محافظت محدودی را برایش فراهم می‌کند زیرا نمی‌تواند روزنهاش را محکم بیندد. همچنین، مشاهدات نشان داد زمانی که خرچنگ‌های منزوی تحت تاثیر استرس (به طور مثال، مواجهه با فلز سنگین) قرار می‌گیرند، تمایل دارند از صدف‌شان بیرون بیایند، بنابراین، آن‌ها بیشتر در مواجهه با آلاینده قرار می‌گیرند، تمایل دارند از صدف‌شان کشیده شده بودند بیشتر در معرض سرب قرار گرفتند و در نتیجه حساسیت بیشتری به این فلز نسبت به خرچنگ منزوی *C. africanus* نشان دادند، علاوه بر این میزان  $LC_{50}$  ۹۶ ساعت با توجه به نوع گونه و شرایط فیزیکوشیمیایی آب متفاوت می‌باشد. عوامل فیزیکوشیمیایی آب بر میزان حلایت فلرات سنگین در آب و به دنبال آن افزایش یا کاهش سمتی آن‌ها موثرند (Aghazadeh Meshgi and Jalali Jafari, 2007).

سمیت سرب به دلیل خاصیت جایگزینی‌اش با دیگر کاتیون‌های چند ظرفیتی (به ویژه دو ظرفیتی‌ها نظیر  $[Zn^{2+}]$  و  $[Ca^{2+}]$ ) در سیستم مولکولی موجودات زنده می‌باشد، این خاصیت جایگزینی، به سرب اجازه می‌دهد تا فرایندهای زیستی مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. کانال‌های انتقال یون و سیگنال‌های سلولی بیشتر تحت تاثیر سرب قرار می‌گیرند که این امر به نوروتوکسینی مولکولهای سرب کمک می‌کند (Garza et

می باشد زیرا آلایندهها می توانند رفتارهای ارگانیسمها را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین با استفاده از رفتار می توان به طور اکولوژیکی یک سنجش وابسته به تأثیرات آلاینده را فراهم نمود، یعنی می توان با استفاده از رفتار تأثیرات آلایندهها را بر روی ارگانیسمها سنجید و از تغییرات رفتاری برای پیش گویی روش عملکرد ترکیبات ناشناخته، تعیین سمیت ها در فاضلاب های پیچیده و آزمایش آب فاضلاب قبل از تخلیهی آن درون محیط، استفاده کرد (Newman, 2009).

### منابع

- Biagi, R., Meireles, A. L., and Mantelatto, F. L. 2006. Bio-ecological aspects of the hermit crab *Paguristes calliopsis* (Crustacea, Diogenidae) from Anchieta Island, Brazil. Biological seines. vol. 78, no. 3.
- Finney, D., 1990. Probit Analysis. 1st Edn., Cambridge University Press, Cambridge, p: 1-222.
- Garza, A., Vega, R., and Soto, E. 2006. Cellular mechanisms of lead neurotoxicity. Medical Science Monitor. 12 (3): RA, p: 57-65.
- Hahn, D, R. 1998. Hermit crab shell use patterns; response to previous shell experience and to water flow. Journal of Experimental Marin Biology and Ecology. 228, p: 35- 51.
- Heller, C. 1865. Crustaceen Reise der Österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des Commodors B. von Wüllerstorff-Urbair. Zoologischer Theil, . vol. 2, part 3., 280 pp.
- Jalali Jafari, B., and Aghazadeh Meshgi, M. Fish poisoning due to heavy metals in water and its importance in public health, Tehran: Book Publishing. 134 pages. In Persian
- Ismail, T. G. 2012. Effects of visual and chemical cues on orientation behavior of the Red Sea hermit crab *Clibanarius signatus*. The Journal of Basic and Applied Zoology. 65, p: 95– 105.
- Khorasani, N., Shayegan, J., and Karimi Shahri, N. 2005. Determination of heavy

(al., 2013). همچنین مشاهده شده است که آلودگی *Pagurus bernhardus* مس نیز در خرچنگ منزوی سبب افزایش فعالیت متابولیکی بدن شده است و به همین دلیل در رفتار مشاجره ای شان بر سر صدف، مشاهده شد که افراد آلوده به مس ضربه هایی که وارد می کردند از نظر قدرتی ضعیفتر از افراد سالم بوده است (White et al., 2013).

آلایندهها علاوه بر این که در غلظت های خاصی سبب کشنده گی می شوند در غلظت های پایین تر نیز می تواند تأثیرات فیزیولوژیکی بر روی جانور گذاشته و جانور این تاثیر را با استفاده از تغییر رفتارش بروز دهد (Newman, 2009)، به عبارت دیگر رفتار یک نشانگر حساس به استرس سمیت در ارگانیسم های آبزی

- metals concentration (zinc, copper, iron, chromium and copper) in surface sediments of Bandar Abbas coasts. Iranian Natural Resources Journal. 85, p. 861- 869. In Persian
- Mortazavi, S., Esmaeili Sari, A., and Riahi Bakhtiari, AS. 2002. Zinc, Lead, Cadmium and Chromium Determination in Rocky Oysters (*Saccostrea cucullata*) on the coast of Hormozgan province. Iranian Journal of Marine Science. Volume 2, Issue 1, p. 67-76.
- Newman, M.C., 2009. Fundamentals of Ecotoxicology, Third Edition Hardcover – September 28, 2009, Tylor and Francis Group. Pp: 235- 239.
- Perua, J. F., Lovvorn, J. R., North, C. A., and Kolts, M. J. 2013. Hermit crab population and association with gastropod shells in the northern Bering sea. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 449, P: 10- 16.
- Sadeghi, P., Rari, A., Movahedinia, A., Saffehieh, A., and Azhdari, D. 1393. Determination of the mean lethal concentration (LC50) of potassium dichromate and the evaluation of behavioral responses in the epiglottis (*Epinephelus stoliczkae*). Journal of Oceanography, Vol. 5, No. 17, p. 1-9. In Persian.
- Sarmandian, S., Saffehiyeh, A., Z. Alkarnin, H., A., B., Hashemi, M. 1394. Determination of semi-lethal concentration (LC50 96h) of heavy metal cadmium in new species of oyster *crassostrea* sp .. Journal of Marine Science and Technology, Volume 14, Issue 2, 13 p. In Persian.

- Somasundaran, L., Ajmal, K. 2010. Larval development of hermit crab *Clibanarius longitarsus*: Synergistic effect of heavy metals. *Biologia Journal.* 65/4, p: 714-719.
- Tellis, M., S., Lauer, M., M., Nadella, S., Bianchini, A., and Wood, Ch, M. 2014. Sublethal mechanisms of Pb and Zn toxicity to the purple sea urchin (*Strongylocentrotus purpuratus*) during early development. *Aquatic Toxicology Journal.* Vol 146, p: 220-229.
- T.R.C. 1984. O.E.C.D. Guideline for testing if chemical section 2, on biotic systems, pp: 1-39.
- Weber, D. N., Russo, A., Seale, D. B., and Spieler, R. E. 1991. Waterborne lead affects feeding abilities and neurotransmitter levels of juvenile fathead minnows (*Pimephales promelas*). *Aquatic Toxicology Journal,* 21, p: 71– 80.
- Weis, J., and Weis, P. Effects of exposure to lead on behavior of mummichog (*Fundulus heteroclitus* L.) larvae. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology,* 222, p: 1- 10.
- White, S. J., Pipe, R. K., Fisher, A., and Briffa, M. 2013. Asymmetric effects of contaminant exposure during asymmetric contests in the hermit crab *Pagurus bernhardus*. *Animal Behaviour.* 86, p: 773- 781.

## Determination of Median lethal concentration lead (II) nitrate and Behavioral responses of hermit crab, *Diogenes avarus*

Narges Badri<sup>1</sup>, Narges Amrollahi Biuki<sup>1†</sup>, Mohammad Sharif Ranjbar<sup>1</sup>

Department of marine biology, Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan University

### Abstract

The LC50-96h test paradigm is used to measure the susceptibility and survival potential of organisms exposed to particular toxic substances, such as heavy metals. In this study, the statically acute toxicity of Pb on hermit crab *D. avarus* was determined according to standard methods O.E.C.D in 96h. 84 individual hermit crab with  $0.19 \pm 0.01$  g weight average were used in five different treatments (75, 100, 150, 175, 200 microgram per liter of lead) with three replicates and a control treatment (15 hermit crab per in each treatment). The effective physical and chemical parameters of water including pH, total hardness, dissolved oxygen and temperature were controlled throughout the experiment. Finally, the rate of the acute toxicity ( $LC_{50}$  96h) was determined to be 184.045 µg/l by using the statistic method Probit analysis. Furthermore, the rates of  $LC_{10}$ ,  $LC_{50}$ ,  $LC_{90}$  (24, 48, 72 and 96h) were calculated. Results indicate that when the experiment time is extended, lower concentration of Pb is leading to mortality in hermit crab *D. avarus*. The percentage of mortality increased with increasing duration of exposure of crab to different amounts of lead concentration. The behavioral changes observed in hermit crabs *D. avarus* in the experiment period included an imbalance in walking, reduced activity and movement, slow motion, no irritability and also color change of the abdomen.

**Keywords:** *Diogenes avarus*, median lethal concentration, Lead (II) nitrate, Hermit crab, behavior, heavy metals.

Figure 1 Schematic image of hermit crab *D. avarus*. (1) Pods and appendages of the head, (2) chella and carpus of female, (3) chella and carpus of male, (4) Telson (McLaughlin and Dworschak, 2001).

Figure 2 Geographical location of the sampling area.

Figure 3. The percentage of mortality of *D. avarus* samples in the test for determining concentration (LC50) at different concentrations of lead during 24 hours.

Figure 4. The percentage of mortality of *D. avarus* samples in the test for determining the lethal concentration (LC50) at different concentrations of lead during 48 hours.

Figure 5. The percentage of mortality of *D. avarus* samples in the test for determining the lethal concentration (LC50) at different concentrations of lead during 72 hours.

Figure 6. The percentage of mortality of *D. avarus* samples in the test for determining the lethal concentration (LC50) at different concentrations of lead during 96 hours.

Table 1. Physicochemical Factors of experimental water.

Table 2: Cumulative mortality of hermit crabs *D. avarus* (number in any concentration equal to 12) in the test LC50 96 hours.

Table 3 lethal concentrations of Lead over 96 hours on a hermit crab *D. avarus*