

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

عنوان طرح :

امکان سازگاری و تعیین بیونرماتیوهای تکثیر و پرورش کپور ماهیان هندی در ایران

مجری مسئول :

همایون حسین زاده صحافی

شماره ثبت

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

عنوان طرح : امکان سازگاری و تعیین بیونرماتیوهای تکثیرپرورش کپور ماهیان هندی در ایران

شماره مصوب: ۱-۱۲-۸۶۰۴

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارندهگان : همایون حسین زاده صحافی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول (اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد) : همایون حسین زاده

صحافی

نام و نام خانوادگی مجری / مجریان استانی : سید عبدالصاحب مرتضوی زاده (پژوهشکده تحقیقات آبزی

پروری جنوب کشور)، حسن صالحی(مؤسسه تحقیقات شیلات ایران)، همایون حسین زاده صحافی(پژوهشکده

تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور)

نام و نام خانوادگی همکاران : -

نام و نام خانوادگی مشاوران : عباس متین فر - جاسم مرمضی - ایرون ستی

نام و نام خانوادگی ناظر : -

محل اجرا : استان تهران

تاریخ شروع : ۸۶/۵/۱

مدت اجرا : ۵ سال

ناشر : مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان (تیتر از) : ۲۰ نسخه

تاریخ انتشار : سال ۱۳۹۱

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است . نقل مطالب ، تصاویر ، جداول ، منحنی ها و نمودارها با ذکر مأخذ بالامانع
است .

«سوابق طرح یا پروژه و مجری»

طرح : امکان سازگاری و تعیین بیونر ماتیوهای تکثیر و پرورش کپور ماهیان هندی

ایران

کد مصوب : ۱-۱۲-۸۶۰۴

تاریخ : شماره ثبت (فروست) :

با مسئولیت اجرایی جناب آقای همایون حسین زاده صحافی

دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته بیولوژی آبزیان می باشد.

طرح توسط داوران منتخب بخش اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان در تاریخ

۹۱/۸/۲ مورد ارزیابی و با نمره ۱۹/۳ و رتبه عالی تأیید گردید.

در زمان اجرای طرح مجری در :

ایستگاه مرکز پژوهشکده ستاد

با سمت هیئت علمی در موسسه تحقیقات شیلات ایران مشغول بوده است.

**MINISTRY OF JIHAD - E - AGRICULTURE
AGRICULTURAL RESEARCH, EDUCATION & EXTENSION ORGANIZATION
IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION**

Title:

Fesibility study on Indian Carps Aquaculture in I.R.IRAN

**Rrspnsible Executor :
Homayoon Hoseinzadeh Sahafi**

Registration Number

Ministry of Jihad – e – Agriculture
AGRICULTURAL RESEARCH, EDUCATION & EXTENSION ORGANIZATION
IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION

Title : Fesability study on Indian Carps Aquaculture in I.R.IRAN

Approved Number: 1-12-12-8604

Author: Homayoon Hoseinzadeh Sahafi

Rrspnsible Executor : Homayoon Hoseinzadeh Sahafi

**Executor (s):S.A.Mortazavizadeh(South Aquaculture Research Center),H. Hoseinzadeh
Sahafi(South Aquaculture Research Center)H.Salehi(Iranian Fisheries Research
Organization(IFRO)**

Collaborator : -

Advisor(s): A.Matinfar,J.Ghaflemarmazi,A.Seti

Supervisor: -

Location of execution :Tehran province

Date of Beginning : 2008

Period of execution : 5 Years

Publisher : *Iranian Fisheries Research Organization*

Circulation : 20

Date of publishing : 2012

**All Right Reserved . No Part of this Publication May be Reproduced or Transmitted
without indicating the Original Reference**

فهرست مندرجات

چکیده.....

فصل ۱ - مقدمه.....

- ۱- کلیات پرورش ماهیان گرم آبی در ایران.....
- ۲- ویژگی های زیستی کاتلا.....
- ۳- ویژگی های زیستی مریگال.....
- ۴- ویژگی های زیستی مریگال.....
- ۵- شرایط فیزیکی و شیمیایی پرورش ماهیان گرم آبی.....

فصل ۲ : روش کار.....

- ۱- ورود بچه ماهیان کپور هندی به کشور
- ۲- ویژگی کارگاه محل پرورش در گیلان و خوزستان
- ۳- تیمار بندی استخراهای پرورشی.....
- ۴- روش کار در استان خوزستان
- ۵- محاسبات و آنالیز آماری.....

فصل ۳ - نتایج

- نگهداری و پرورش بچه ماهیان نورس در استان گیلان.....
- نگهداری و پرورش بچه ماهیان نورس در استان خوزستان.....
- پرورش در استخراهای پروواری استان خوزستان :.....
- ۱-۱- رشد پروواری کپور ماهیان هندی در خوزستان
- پرورش در استخراهای پروواری استان گیلان :.....
- ۱-۲-۳- روند رشد ماهی کاتلا در گیلان
- ۲-۳- روند رشد ماهی روهو در گیلان
- ۳-۲-۳- روند رشد ماهی مریگال در گیلان
- نتایج هیدروشیمی استخراهای پرورشی گیلان.....
- نتایج بررسی پلاتکتونها در استخراهای پرورشی.....
- نتایج بررسی بنتوزها در استخراهای پرورشی.....
- نتایج هیدروشیمی استخراهای پرورشی خوزستان
- نتایج تحلیل اقتصادی

فصل ۴ - بحث.....

نتیجه گیری

پیشنهادات اجرایی و پژوهشی

تشکر و قدردانی

منابع

چکیده:

کپور ماهیان هندی به ویژه سه گونه کاتلا، روهو و مریگال از کپور ماهیان سریع الرشد خوراکی با ارزشی هستند که طی قرنها در ایالات شمال شرقی هند پرورش داده می شوند و نه تنها در هند شهرت عمومی دارند، بلکه در سایر کشورها از جمله تایلند، برم، فیلیپین، ژاپن و شوروی سابق نیز مورد توجه می باشند.

ویژگیها و نیازهای پرورشی این ماهیان تا حدود زیادی همانند کپور ماهیان چینی می باشد از آنجایی که بیشترین هزینه جاری در پرورش ماهی مربوط به تغذیه می باشد و با توجه به اینکه این ماهیان در مراحل اولیه پرورش (مراحله لاروی از غذاهای زنده گیاهی و جانوری حاصل از تولیدات طبیعی استخراج در مرحله جوانی وبلغ اصولاً) همه چیز خوار بوده واز انواع جلبک های رشته ای و بی مهرگان و دتریتوس تغذیه می نمایند، می توان قیمت تمام شده کمی برای تولید آنها متصور شد. در عین حال ورود این گونه ماهیان سبد مصرف را در آبزیان پرورشی متنوع تر میکند. در این پژوهش سه گونه کاتلا (*Catla catla*) روهو (*Labeo rohita*) و مریگال (*Cirrhina Mrigala*) در سال ۱۳۸۷ از کشور هندوستان وارد ایران گردید.

پس از طی مراحل قانونی نظیر اخذ مجوز های محیط زیست و دامپزشکی نسبت به واردات ۳۰۰۰۰ عدد بچه ماهی نورس از کپور ماهیان هندی از سه گونه کاتلا، روهو و مریگال اقدام و به نسبت مساوی (۱۵۰۰۰ عدد) بین دوپژوهشکده آبزی پروری شمال و جنوب تقسیم شدند. لارو ها در طی یک دوره پرورشی از تیر ماه پرورش داده شده و در طی این مدت پارامتر های نظیر وزن، طول، بازماندگی، درصد افزایش وزن بدن، درصد متوسط رشد روزانه و نرخ رشد ویژه در قالب پروژه های بررسی امکان پرورش کپور ماهیان چینی و هندی، به روش نیمه متراکم (در شرایط استان خوزستان و گیلان) ثبت شد. در عین حال نسبت به بررسی اقتصادی پرورش توأم کپور ماهیان هندی و چینی در بازار ایران اقدام گردید. همچنین پروژه مولده سازی و تعیین نرماتیو های تکثیر کپور ماهیان هندی در ایران به دلیل عدم تخصیص بودجه انجام نپذیرفت که در قالب طرح ملی جدید ارائه گردیده است.

به منظور انجام تیمار بندي از استخراج های پرورشی با متوسط بین ۴۵/۰ هکتار و عمق حدود یک متر استفاده گردید در استان گیلان دوره پرورش ۷ ماه در نظر گرفته شد آهک پاشی، حذف علف های هرز و ماهیان ناخواسته، کوددهی و غذادهی استخراجها با ۵۰۰۰ kg در هکتار کودگاوی در چهار نوبت مساوی کوده ای انجام شد. بچه ماهیان با تراکم ۳۲۰۰ عدد در هکتار ذخیره سازی گردیده و با سبوس برنج و کنجاله بصوت مخلوط به نبرای کپور ماهیان هندی و برای کپورو کپور ماهیان چینی تغذیه دستی و علوفه و کوددهی به استخراج برای رشد زئوپلانکتون ها تغذیه می شدند. بچه ماهیان در سه تیمار ۱ (۳۰٪ کپور هندی و ۷۰٪ کپور چینی) ۲ (۳۰٪

کپور هندی و ۷۰٪ کپور چینی) و ۳٪ (کپور هندی و ۳۰٪ کپور چینی) و در سه تکرار رها سازی شدند.

نتایج بدست آمده در طی ۷ ماه دوره پرورش حاکی از امکان سازگاری و رشد مناسب این گونه ها بوده بطوری که گرچه نرخ بازماندگی در گونه های مختلف متفاوت بوده لکن بیشترین آن مربوط به کاتala با ۹۷ درصد و کمترین مربوط به روهو با ۷۰ درصد بدست آمد. اختلاف معنی دار در وزن نهایی حاصل شده بین سه گونه معرفی شده در هر یک از تیمار های پرورشی وجود داشت ($P<0.01$). متوسط وزن نهایی در تیمار حاوی ۳۰٪ کپور هندی (تیمار ۱) در خصوص رoho، مریگال و کاتala به ترتیب ۶۴۷ گرم و ۳۵۶ گرم و ۵۸۸ گرم بود. در تیمار ۲ (با نسبت ۵۰٪ کپور هندی) متوسط وزن نهایی در خصوص رoho، مریگال و کاتala به ترتیب ۶۴۷ گرم و ۷۰۸ گرم بود (جدول ۴). در تیمار سوم (حاوی ۷۰٪ کپور هندی) نتایج حاکی از متوسط وزن نهایی در خصوص رoho، مریگال و کاتala به ترتیب معادل ۶۶۷ گرم و ۷۳۴ گرم و ۴۲۰ گرم بود. در عین حال نتایج تست دانکن افزایش معنی دار متوسط وزن نهایی روهو، مریگال و کاتala را به ترتیب از تیمار ۱ با ۳۰ درصد پور هندی تا تیمار ۳ با ۷۰ درصد کپور هندی تایید مینماید ($P<0.01$). تیمار ۳ از نظر میزان رشد کپور ماهیان هندی مناسب ترین تیمار میباشد. نتایج نشان میدهد که ماهی کاتala دارای حداقل وزن ۸۹۵.۶ گرم و حداقل ۴۷۴.۶ گرم و روهو حداقل وزن ۷۵۵.۳ گرم و حداقل ۴۸۴.۶ گرم و در خصوص مریگال حداقل وزن ۴۵۹.۰ گرم و حداقل ۲۹۵.۶ گرم و در مورد فیتوفاگ حداکثر وزن ۱۰۷۱.۰ گرم و حداقل ۶۷۱.۰ گرم و برای آمور حداقل وزن ۱۴۹۰.۲ گرم و حداقل ۹۳۵.۷ گرم و برای ییگ هد حداقل وزن ۱۸۴۰.۱ گرم و حداقل ۱۵۱۳.۱ گرم و برای کپور معمولی حداقل وزن ۴۳۶.۳ گرم و حداقل ۲۶۴۳.۷ گرم در پایان دوره پرورش می باشد. ضریب رشد ویژه در ماهی روهو مریگال و کاتala در ماههای اردیبهشت تا تیر به ترتیب معادل 0.34 ± 0.02 و 0.02 ± 0.02 در ماههای ابان و آذر به ترتیب معادل -0.09 ± 0.03 و -0.17 ± 0.07 و -0.13 ± 0.07 و -0.26 ± 0.09 محاسبه شد. همچنین ضریب رشد ویژه برای ماهی های فیتو فاگ و آمور و کپور معمولی و ییگ هد به ترتیب معادل 0.12 ± 0.02 و 0.27 ± 0.06 و 0.27 ± 0.03 بدست آمد. نتایج حاکی از وجود اختلاف معنی دار ($P<0.01$) در ضریب رشد ویژه گونه های مختلف کپور هندی و چینی در طی ماه های مختلف سال می باشد. در مجموع رشد کپور ماهیان هندی در شرایط اقلیم استان گیلان علیرغم اختلافات درجه حرارت و اقلیم بین کشور هندوستان و شرایط استان گیلان از روند قابل قبول برخوردار بوده و قابلیت بهره برداری در سبد مصرف را دارد. در عین حال در صورت زمان بندی دقیق عملیات پرورش در سال اول و رها سازی با وزن بالا تر در سال دوم پرورش و همچنین تعیین مناسب ترین ترکیب گونه ای در شرایط پلی کالچر میتوان نتایج اقتصادی و راندمان پرورشی بالاتر را انتظار داشت. در استان خوزستان بچه ماهیان در شرایط اقلیمی استان خوزستان با دمای حداقل ۷ وحدات حداکثر ۳۵ درجه سانتی گراد پرورش داده شدند

بچه ماهیان از رشد مناسبی برخوردار شده و در اردیبهشت ماه ۸۸ ماهیان کاتلا، روهو و مریگال به وزن متوسط $25/4 \pm 4/1$ ، $25/4 \pm 4/1$ ، $36/6 \pm 3/5$ و $58/8 \pm 4/5$ رسیدند. بیشترین تولید خالص در تیمار ۵۰ در صد جایگزین با میانگین $723/3$ کیلو گرم در استخراهای 1700 متر مربعی (۴۲۵۴/۹ کیلو گرم در هکتار) مشاهده گردید. بین تیمارهای آزمایشی با هم دیگر و با تیمار شاهد ($P < 0.05$) اختلاف معنی داری وجود ندارد. میانگین وزن نهائی ماهی روهو در ۳ تیمار آزمایشی به ترتیب 1136 ، 1129 و 1054 گرم و کاتلا و مریگال به ترتیب 726 ، 902 ، 839 و 894 گرم بوده و اختلاف معنی داری بین آنها وجود ندارد. ($P < 0.05$) همچنین حد اکثر میانگین وزن نهائی روهو 1293 گرم و کاتلا و مریگال به ترتیب 1089 و 1039 گرم بوده است که نشان دهنده پتانسیل بالای رشد این ماهی در شرایط پرورشی استان خوزستان است. میزان بازماندگی در ماهیان روهو، کاتلا و مریگال به ترتیب 92 ، 97 و 86 درصد بود. بیشترین ضریب رشد ویژه (SGR) مربوط به ماهی کاتلا ($1/92$) و کمترین مربوط به ماهی مریگال ($1/45$) می باشد در مجموع مطابق نتایج بدست آمده در این تحقیق کپور ماهیان هندی توانایی سازگاری، رشد ورسیدن به وزن بازاری در شرایط آب و هوایی استان خوزستان را دارند. با توجه به نتایج فوق امکان سازگاری کپور ماهان هندی با شرایط بومی و اقلیمی کشور وجود دارد.

از نقطه نظر اقتصادی نیز میزان هزینه های کپور ماهیان هندی در شمال کشور بیشتر از جنوب بوده و در مقایسه با کپور ماهیان چینی اختلاف معنی داری در هزینه ها مشاهده نشد. مهمترین هزینه ها مر بوط به کود با 62136 ریال به ازای 460 کیلو گرم و غذای کنسانتره به میزان 141.9 ریال به ازای هر کیلو گرم و بچه ماهی معادل 600 ریال به ازای عدد لارو میباشد.

کلید واژه ها: کپور ماهیان هندی، گیلان، خوزستان، روهو، کاتلا، مریگال، سازگاری

مقدمه ۴:

امروزه نقش آبزیان در تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز مردم جهان از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به محدود بودن میزان صید، پرورش آبزیان و بخصوص در محیط های مصنوعی بیش از بیش مورد توجه قرار می گیرد، در سالهای گذشته پرورش ماهی یک شغل ضمنی در کنار کشاورزی محسوب می شد، چراکه هنوز انسان کشاورزی وزراعت را چاره ساز مشکلات خوددر امر تغذیه می دید ولی امروزه پرورش ماهی از اساسی ترین و اصلی ترین شغلها در بسیاری از کشورها است، لذا در سالیان اخیر سعی گردیده است که به نحوی از انحصار بر میزان تولید آبزیان در واحد سطح افزوده شود که این امر علم پرورش ماهی را با سرعتی زیاد متحول ساخته و امروزه شاهد افزایش نسبی تولید در پرورش ماهی هستیم.

کپور ماهیان هندی از سالهای گذشته به منظور کارهای تحقیقاً تی و افزایش تنوع گونه ای به کشورهای روسیه، چین، آمریکا، کانادا و غیره برده شده است و امروزه یکی از اقلام تولیدی در بخش آبزی پروری می باشد (Beavan.. 1987.). در بسیاری از کشورهای آسیایی نظری هند، بنگلادش، پاکستان و... کونه های مختلف کپور ماهیان هندی به صورت تلقیقی با سایر کپور ماهیان چینی پرورش داده می شوند. نتایج حاکی از رشد قابل توجه در تولیدات استخراج های پرورشی بوده به طوری که در شرایط اقلیمی مربوطه بین ۳ تا ۷ تن در هکتا ر تولید شده است (Mathew., 1996). در عین حال مطالعات صورت پذیرفته حاکی از عدم بقاء لاروهای حاصل از هیبریداسیون بین کپور ماهیان هندی و کپور ماهیان چینی می باشد.

در عین حال در خصوصیات کاریو تایپ کپور های هندی نیز بررسی های لازم توسط مجری و همکاران صورت پذیرفته است (کلباسی و همکاران، ۲۰۰۴). این گونه ها که بومی رودخانه های شمال هندوستان بوده و در پاکستان و بنگلادش و سریلانکا نیز دیده می شود به کشورهای دیگری از جمله تایلند، فیلیپین، ژاپن و شوروی سابق منتقل شده اند و مطالعات زیادی در مورد آنها انجام شده است (نوروزی مقدم، ۱۳۷۲) تا کنون ۴ گونه از این ماهیان وارد سیستم پرورش جهانی شده اند که شامل: کاتلا (*Catla catla*) روهو (Labeo rohita) و مریگال (Labeo Calbasu) و کالباسو (Cirrhina Mrigala) بوده که عمدتاً از ۳ گونه اول همراه با کپور معمولی (Common Carp) و کپور نقره ای (Silver Carp) و آمور (Grass Carp) در پرورش توان مورد استفاده قرار می گیرد.

لذا به اختصار برخی از خصوصیات این گونه ها که در منابع مختلف ذکر گردیده بشرح ذیل می باشد (Landau, N, 1992): کاتلا از رشد بسیار سریعی برخوردار بوده و در عرض یک ماه می تواند ۱۰ - ۷/۵ سانتیمتر رشد طولی داشته باشد و همچنین

در عرض یک دوره پرورش به ۴/۱ - ۳/۱ کیلوگرم و بعد از ۲ سال پرورش به ۱۰/۹ کیلوگرم برسد. این ماهی در سال دوم پرورش به

بلوغ رسیده و از سال سوم می توان از آن بعنوان مولد استفاده کرد. زمانیکه متوسط وزن آن حدود ۳ کیلوگرم باشد. این ماهی در دوره

پرورش بازاری از سطح تغذیه نموده و مانند ماهی فیتوفاگ از فیتوپلانکتون ها تغذیه می کند. میزان هم آوری نسبی آن ۱۰۰۰۰ تا

۲۵۰۰۰ تخم در کیلوگرم وزن ماهی ماده می باشد. در جنوب هند امکان دو بار تخریزی آن در سال نیز وجود دارد و فصل

تخریزی آن از اواسط اردیبهشت تا اواخر مرداد ماه می باشد.

روهو نیز از رشد سریعی برخوردار بوده ولی رشد آن از کاتالا کمتر می باشد و می تواند در یک دوره پرورش به ۴۰ - ۳۵ سانتیمتر

برسد در دومین سال پرورش به سن بلوغ می رسد. بهترین رکورد ثبت شده رoho رسیدن به وزن ۱ کیلوگرم در سال اول و ۲/۶ - ۵/۴

کیلوگرم در دو سالگی است. هر چند احتمال بلوغ در یک سالگی آن نیز گزارش شده است در بنگلادش ۴ - ۳ سال می باشد. وزن در

اولین بلوغ ۵ کیلوگرم و هم آوری نسبی آن برابر ۱۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ تخم در کیلوگرم وزن بدن ماهی گزارش شده است. روهو در

ایالت موسون از ژوئن (خرداد ماه) تا سپتامبر(شهریور ماه) تخریزی می نماید این ماهی در دوره پرورش از کف و ستون آب تغذیه

می کند.

مریگال مهمترین گونه بعد از کاتالا و روهو در سیستم پرورش می باشد. مریگال از رشد کمتری نسبت به روهو و کاتالا برخوردار می

باشد این ماهی حداکثر به ۰/۷۵ متر می رسد این ماهی در دومین سال خود به بلوغ می رسد و نرها در یک سالگی می توانند به بلوغ

برسند این ماهی در دوره پرورش بازاری دتریت خوار بوده و از کف تغذیه می کند. دامنه هم آوری نسبی آن از ۱۰۰۰۰۰ هزار تا

۴۰۰۰۰۰ هزار تخم در یک کیلوگرم تخدمان ماهی ماده می باشد (Kohinoori 1991) با معرفی گونه های جدید به صنعت

آبزی پروری امکان تنوع بخشی به تولیدات و افزایش درآمد تولید کنندگان در کشور قابل پیش بینی خواهد بود .

کلیات پرورش ماهیان گرم آبی در ایران:

تنوع بخشی به آبزیان پرورشی بعنوان یک ضرورت همواره مورد تأکید اندیشمندان، متفکرین، صاحب نظران، مسئولین و

مقامات شیلاتی کشور بوده است. بیش از دو دهه موضوع تنوع گونه ای در دستور کار بسیار از نشست ها و محافل کارشناسی و علمی

بوده و چشم امید سرمایه گذاران آبزی پروری همچنان بر فعالیت های پژوهشی و اجرایی، طرح های پایلوت و ارائه طریق در خصوص

انواع گونه های قابل پرورش بومی و وارداتی بوده است. پرورش ماهیان گرم آبی اولین بار از سال ۱۳۶۵ در یک کارگاه کوچک

پرورش ماهی به مساحت ۵/۷ هکتار در مازندران شروع شد و با توجه به میزان دقیق هوادهی به استخراها، تولید ماهی به روش پلی کالچر در این کارگاه از ۵/۵ تن به ۵/۲ تن در واحد هکتار رسید. این میزان در سال ۱۳۶۸ به ۱۱/۳ تن و در سال ۱۳۶۹ در روش پرورش توام ماهی با اردک به ۱۵ تن در هکتار رسیده است (آذری تاکامی، ۱۳۷۴). کپور ماهیان هندی از سالهای گذشته به منظور کارهای تحقیقاً تی و افزایش تنوع گونه‌ای به کشورهای روسیه، چین، آمریکا، کانادا و غیره برده شده است و امروزه یکی از اقلام تولیدی در بخش آبزی پروری می‌باشد (Beavan, 1987). در بسیاری از کشورهای آسیایی نظیر هند، بنگلادش، نپال، پاکستان و... کونه‌های مختلف کپور ماهیان هندی به صورت تلفیقی با سایر کپور ماهیان چینی پرورش داده می‌شوند. نتایج حاکی از رشد قابل توجه در تولیدات استخراها پرورشی بوده به طوری که در شرایط اقلیمی مربوطه بین ۳ تا ۷ تن در هکتار تولید شده است (Mathew., 1996). در عین حال مطالعات صورت پذیرفته حاکی از عدم بقاء لاروهای حاصل از هیریداسیون بین کپور ماهیان هندی و کپور ماهیان چینی می‌باشد. در عین حال در خصوص کاریو تایپ کپورهای هندی نیز بررسی‌های لازم توسط مجری و همکاران صورت پذیرفته است (کلباسی و همکاران، ۲۰۰۴).

این گونه‌ها که بومی رودخانه‌های شمال هندوستان بوده و در پاکستان و بنگلادش و سریلانکا نیز دیده می‌شود به کشورهای دیگری از جمله تایلند، فیلیپین، ژاپن و شوروی سابق منتقل شده‌اند و مطالعات زیادی در مورد آنها انجام شده است (نوروزی مقدم، ۱۳۷۲) لذا به اختصار برخی از خصوصیات این گونه‌ها که در منابع مختلف ذکر گردیده بشرح ذیل می‌باشد (Landeu, N, 1992).

چینی‌ها اولین کسانی بودند که اقدام به پرورش ماهی نمودند. از سه هزار سال پیش پرورش ماهی که به شکل ساده و با جمع آوری تخم یا لارو یا بچه ماهی در چین آغاز شد تاکنون پیشرفت‌های زیادی کرده است. سابقه پرورش در این کشور به پیش از ۳ هزار سال قبل از میلاد در منطقه ین دیناستی مربوط می‌شود و فان لی (Fanli) در سال ۴۷۵ قبل از میلاد مسیح در مورد تخریزی و تکثیر ماهی کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) مطالب ارزنده‌ای نوشت و اولین کسی بود که اصول پرورش ماهیان آب شیرین را تدوین و از آن به عنوان یک شغل پرمنفعت یاد کرده است (صداقت، ۱۳۸۲؛ نظری، ۱۳۸۲).

در سال ۱۹۵۸ میلادی مولدین کپور نقره‌ای و سرگنده پرورش یافته در استخراهای خاکی با تزریق عصاره غده هیپوفیز ماهی کپور معمولی به صورت مصنوعی تکثیر شدند و در حال حاضر مولدین ماهیان مختلف با استفاده از هورمونهای مصنوعی و غده هیپوفیز ماهیان در سطح وسیع مورد تکثیر مصنوعی قرار می‌گیرند. اولین کارگاه تکثیر و پرورش کپور ماهیان در سال ۱۳۵۰ توسط شرکت دامپروری سفید رود رشت احداث گردیده است (قناعت پرست و همکاران، ۱۳۷۷). پرورش کپور ماهیان در سیستم توأم در سالهای اخیر در خوزستان توسعه کمی فراوانی داشته و از حدود ۲۵۰۰ هکتار در سال ۷۹ به پیش از ۶۰۰۰ هکتار در سال ۸۹ با متوسط تولید

۳۱۰۰ کیلو گرم در هکتار رسیده است (شیلات خوزستان، ۱۳۸۹) ولی همچنان مشکل بهره وری بیشتر از امکانات موجود و اقتصادی نمودن تولید به قوت خود باقی است از سال ۵۷ که پرورش ماهیان گرم آبی در این استان آغاز گردیده تاکنون گونه های استفاده شده در سیستم پرورش عمده شامل ۳ گونه کپور چینی مرسوم و ماهی کپور معمولی می باشد.

پرورش ماهیان گرم آبی در ایران به دهه ۱۳۴۰ بر می گردد. در این رابطه ماهی آمور از طریق روسیه، رومانی و چین در تابستان ۱۳۴۵ توسط شیلات ایران برای مبارزه با رویش نامتعادل گیاهان مرداب ارزلی به ایران آورده شد (عمادی، ۱۳۵۹). عموماً مزارع پرورش ماهیان گرم آبی به ۳ دسته استخراهای تولید لارو تا مرحله بچه ماهی نورس (Fry)، استخرهای تولید بچه ماهی نورس تا بچه ماهیان بزرگ مناسب برای پرورش یا انگشت قد (Fingerling) و استخرهای پرواربندی یا تولید ماهیان بازاری (Fatening). در عین حال پرورش ماهی از نظر ترکیب گونه ها شامل پرورش تک گونه ای یا منوکالچر که فقط یک گونه ماهی در استخر کشت داده می شود، پرورش دو گونه ای یا دی کالچر که دو گونه از ماهیان با یکدیگر پرورش داده شوند. در چنین حالتی گونه غالب ۹۰ درصد و گونه مغلوب ۱۰ درصد در نظر گرفته می شود و پرورش چند گونه ای یا کشت توازن که این روش به نوعی از پرورش ماهی گفته می شود که در آن تعدادی از انواع مختلف ماهی با یکدیگر پرورش داده شوند. در این روش چند گونه ماهی با یکدیگر در شرایط پرورش داده می شوند که دارای رژیم غذایی متفاوت بوده ولی از نظر تحمل شرایط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به هم نزدیک میباشند. نسبت رهاسازی ماهی ها طوری در نظر گرفته می شود که ماهی ها بتوانند از خاصیت Synergistic یا عمل متقابل (همکاری) حداقل استفاده را از یکدیگر بنمایند بدین ترتیب که کشت یکی بتواند محیط را برای کشت دیگر گونه های ماهی مساعد نماید (آذری تاکامی، ۱۳۷۲).

در کشور ما پرورش ماهی به صورت گسترده یا غیر مترافق با استفاده از تولیدات طبیعی آب و بدون استفاده از غذای دستی است در آبگیرها و دریاچه ها و سایر ذخایر آبی نظیر مخازن آب پشت سدها انجام می شود. در عین حال پرورش به صورت نیمه مترافق متداولترین روش پرورش کپور ماهیان در ایران بوده و معمولاً بصورت چند گونه ای انجام می شود و تغذیه ماهیان با تکیه بر تولیدات طبیعی استخرا که با کود دهنده مناسب افزایش می یابد و غذای مکمل که معمولاً شامل علوفه و غذای کنسانتره آماده یا دستی است انجام می شود (مشائی و همکاران، ۱۳۷۷). در این روش ۹۰ تا ۶۰ درصد غذای ماهی از طریق کوددهی و غذای طبیعی استخرا تأمین می گردد و بقیه غذا، با تغذیه دستی خواهد بود.

۴ گونه از این ماهیان وارد سیستم پرورش شده اند که شامل: کاتلا (*Catla catla*) (روهو) و مریگال (*Labeo rohita*) و کالباسو (*Labeo calbasu*) بوده که عمدها از ۳ گونه اول همراه با کپور معمولی (*Cirrhina mrigala*)

) و کپور نقره ای (Grass Carp) و آمور (Silver Carp) در پرورش توان مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های زیستی کاتلا:

کاتلا این ماهی جزء کپور ماهیان هندی است با نام علمی *Catla catla* که دارای سر بزرگ و برجسته می باشد. دهان تقریباً فرقانی، گرد و بزرگ، بدون برجستگی و فاقد سیلیک است. باله پشتی ۱۶-۱۴ ساعع دارد. این ماهی با استفاده از خارهای آبتشی بزرگ، از زئوپلاتنکتون های سطح استخراج تغذیه می کند. لاروهای ۲۰-۱۵ میلی متری این ماهی، هم از زئوپلاتنکتون ها و هم فیتوپلاتنکتون ها تغذیه می کنند. این ماهی حداقل ۸/۱ متر طول و ۴۵ کیلوگرم وزن پیدا می کند و در میان کپورهای هندی از گونه هایی است که رشد سریع دارد. در سال اول رشد، طول آن به ۳۵-۳۴ سانتی متر و وزن آن به ۵/۱-۲ کیلوگرم می رسد. در دو سالگی بالغ می شود و به طور طبیعی در طی فصول بارندگی در رودخانه ها تخم ریزی می کند. تخم های این ماهی غیر چسبنده و در آب شناورند. البته تکثیر مصنوعی این ماهی با تزریق هیپوفیز امکان پذیر است. این ماهی به طور گسترده ای در شمال هندوستان، پاکستان، بنگلادش و برمه پراکندگی دارد. از رشد بسیار سریعی برخوردار بوده و در عرض یک ماه می تواند ۱۰ - ۷/۵ سانتیمتر رشد طولی داشته باشد و همچنین در عرض یک دوره پرورش به ۴/۱ - ۳/۱ کیلوگرم و بعد از ۲ سال پرورش به ۹/۱۰ کیلوگرم برسد. این ماه در سال دوم پرورش به بلوغ رسیده و از سال سوم می توان از آن بعنوان مولد استفاده کرد (زمانیکه متوسط وزن آن حدود ۳ کیلوگرم باشد). این ماهی در دوره پرورش بازاری از سطح تغذیه نموده و مانند ماهی فیتوفاغ از فیتوپلاتنکتون ها تغذیه می کند. میزان هم آوری نسبی آن ۱۰۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ تخم در کیلوگرم وزن ماهی ماده می باشد. در جنوب هند امکان دو بار تخم ریزی آن در سال نیز وجود دارد و فصل تخم ریزی آن از اواسط اردیبهشت تا اواخر مرداد ماه می باشد.

ویژگی های زیستی روهو:

این ماهی نیز از رشد سریعی برخوردار بوده ولی رشد آن از کاتلا کمتر می باشد و می تواند در یک دوره پرورش به ۴۰ - ۳۵ سانتیمتر برسد در دومین سال پرورش به سن بلوغ می رسد. بهترین رکورد ثبت شده روهو رسیدن به وزن ۱ کیلوگرم در سال اول و ۶/۲ - ۴/۵ کیلوگرم در دو سالگی است. هر چند احتمال بلوغ در یک سالگی آن نیز گزارش شده است در بنگلادش ۳ - ۴ سال می

باشد. وزن در اولین بلوغ ۵ کیلوگرم و هم آوری نسبی آن برابر ۱۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ تخم در کیلوگرم وزن بدن ماهی گزارش شده است.

روهه در ایالت موسون از ژوئن (خرداد ماه) تا سپتامبر (شهریور ماه) تخمیریزی می نماید این ماهی در دوره پرورش از کف و ستون آب تغذیه می کند.

ویژگی های زیستی مریگال:

مهمترین گونه بعد از کاتلا و روهو در سیستم پرورش می باشد. مریگال از رشد کمتری نسبت به روهو و کاتلا برخوردار می باشد این ماهی حد اکثر به ۷۵/۰ متر می رسد این ماهی در دومین سال خود به بلوغ می رسد و نرها در یک سالگی می توانند به بلوغ برسند این ماهی در دوره پرورش بازاری دتریت خوار بوده و از کف تغذیه می کند. دامنه هم آوری نسبی آن از ۱۰۰۰۰۰ هزار تا ۴۰۰۰۰۰ هزار تخم در یک کیلوگرم تخدمان ماهی ماده می باشد (Kohinoorl 1991) .

شرایط فیزیکی و شیمیایی پرورش ماهیان گرم آبی :

نیازهای ماهیان پرورش گرم آبی عمدتا شامل: درجه حرارت آب، اکسیژن ، کدورت ، بلوم پلاتکتونی، قلیائیت و pH، میزان درجه حرارت آب برای پرورش ماهیان گرم آبی در دامنه حرارتی 29° - 14° قرار می گیرد. در دماهای بالاتر از 30° و کمتر از 14° درجه سانتی گراد تغذیه این ماهیان کاهش می یابد و در دماهای بالاتر از 32° و کمتر از 10° درجه سانتی گراد رشد کاملاً متوقف می شود. درجه حرارت 25° - 27° درجه سانتی گراد پرورش اقتصادی است و دماهای 22° درجه سانتی گراد دمای فیزیولوژیک ماهی است(عمادی، ۱۳۸۴). کدورت آب موجب عدم نفوذ نور کافی و کاهش تولیدات بیولوژیکی استخراها گشته و در توده بتروس کف تاثیر نامطلوبی دارد. کدورت نامطلوب، کدورتی است که از مواد معلق رسی و سیلتی ناشی گردد. اکسیژن محلول در آب بواسیله باد، جریان هوا از طریق نفوذ، اختلاط و پدیده فتوستنت بواسیله فیتوپلاتکتونها و گیاهان آبزی تولید می شود و بر اساس همین عوامل میزان اکسیژن بطور مداوم در طول ۲۴ ساعت شبانه روز تغییر می کند بطوریکه در سپیده دم (قبل از طلوع آفتاب) در کمترین حد خود رسانیده ، در طول روز افزایش یافته و در بعداز ظهر به حد اکثر مقدار خود می رسد و مجدداً در طول شب کاهش می یابد. میزان مصرف اکسیژن توسط ماهی به درجه حرارت آب، pH آب ، گونه ماهی ، اندازه ماهی ، شوری، فشار اتمسفر، شدت فعالیت ماهی، وضعیت تغذیه و غیره بستگی دارد (نظری، ۱۳۸۲؛ عمادی، ۱۳۸۴):

شفافیت و رنگ آب دو عامل کاملاً وابسته به هم هستند به نحوی که هر چه تولیدات زیستی آب بیشتر باشد شفافیت کمتر و رنگ آب

تیره تر است. بطور کلی شفافیت کمتر از ۱۵ سانتیمتر باعث ایجاد مشکلات کمبود اکسیژن در شب و بیشتر از ۳۰ سانتی متر حاکی از کمبود مواد غذایی آب خواهد بود که هر دو عامل در میزان رشد و نمو ماهی تاثیرگذار هستند. در روش‌های معمولی پرورش ماهی میزان شفافیت آب بین ۲۰-۲۵ سانتی متر نرمال است. شفافیت معیاری است که می‌توان با سنجش آن کوددهی را قطع و یا مبادرت به دادن آن نمود.

PH بیانگر اسیدی و قلیایی بودن یک محیط است که بهترین PH برای رشد، تولید مثل و شکوفایی پلاتکتونی مناسب ماهیان -۹/۶ است. (اقتباس از فرید پاک، ۱۳۸۵) سختی آب نیز بوسیله یونهای فلزی چند ظرفیتی موجود در آن ایجاد می‌شود. در آبهای شیرین یونهای کلسیم و منیزیم از عوامل اصلی ایجاد سختی هستند. بر اساس نوع املاح کلسیم و منیزیم سختی آب را به دو دسته تقسیم می‌کنند (اسماعیلی ساری، ۱۳۸۳). قلیائیت به مجموعه بی کربنات و کربناتهای محلول در آب اطلاق می‌گردد که بر حسب میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم (CaCO_3) بیان می‌شود. در استخراهای پرورش ماهی در شرایط قلیائیت ۴۰-۲۰ مقدار متوسط تولید ماهی در هکتار نسبت به شرایط قلیائیت ۸۰-۱۲۰ میلی گرم در لیتر کمتر از ۵۰ درصد بوده است (صدقت، ۱۳۸۲). همچنین میزان شوری آب تا حد ۲ گرم در لیتر آسیبی به ماهیان آب شیرین وارد نمی‌ساند. حداکثر شوری را که امکان زنده ماندن و رشد را برای ماهی کپور معمولی میسر می‌سازد ۹ گرم در لیتر می‌باشد (Clay, 1981). حد اپتیم EC برای پرورش ماهیان گرمابی ۸۰۰-۱۴۰۰ میکرومتر می‌باشد. گاز کربنیک از طریق هوا، بی کربناتهای کربناتهای فساد و تجزیه مواد ارگانیک در آب استخراهای پرورش ماهی سانتی متر می‌باشد. گاز کربنیک از طریق هوا، بی کربناتهای کربناتهای فساد و تجزیه مواد ارگانیک در آب استخراهای پلاتکتونهای گیاهی ظاهر می‌شود. این گاز در طی روز بوسیله زی شناوران گیاهی جهت عمل فتوستتر جذب و در شب در اثر تنفس پلاتکتونهای گیاهی تولید می‌شود. مقدار مناسب CO_2 بین ۱۰-۲۰ میلی گرم در لیتر می‌باشد.

آماده سازی اصولی استخراها، کود پاشی و بارورسازی آنها از عوامل مهم افزایش میزان غذاهای طبیعی موجود در استخر است. ماهی کپور از نظر ذائقه همه چیز خوار است در سیستم نیمه متراکم، کپور معمولی علاوه بر غذای طبیعی موجود در استخر به غذای دستی یا کنسانتره و ماهی آمور نیز علاوه بر استفاده از جلبکهای بزرگ و گیاهان آبزی نیاز به علوفه دارد. ولی فیتو فاگ و ماهی سرگنده از انواع پلاتکتونهای گیاهی و جانوری که با کودهی در استخر تولید می‌شوند تغذیه می‌کنند و لذا برای تولید آنها هزینه زیادی نیز صرف نمی‌شود. میزان غذای کپور بستگی به اندازه و سن ماهی، درجه حرارت آب، مقدار نسبی غذای طبیعی موجود در استخر و کیفیت غذا دارد. در جیره غذایی کپور باید حاوی ۲۲ تا ۲۵ درصد پروتئین حیوانی باشد اما بخش اصلی غذا را لارو حشرات کفزی، گیاهان آبزی، بذر و ریشه آنها تشکیل می‌دهد (مشانی و همکاران، ۱۳۷۷). از جمله عوامل موثر در حفظ و پرورش موفق آبزیان حفظ استانداردهای بهداشتی در محیط‌های پرورش آنهاست. با ورود آلودگی به مزارع زمینه‌ی ابتلای ماهیان به بیماریها فراهم می‌شود و در

چنین شرایطی علاوه بر آنکه مدیریت پرورش با مشکل مواجه می گردد ، در پاره ای موارد برگشت به شرایط مطلوب نیز غیر ممکن می شود. بنابراین رعایت دستورالعمل های بهداشتی و روشهای مناسب پیشگیرانه جزو اقدامات اولیه و ضروری برای یک تولید مطلوب است.

استانهای خوزستان و گیلان از استانهای مستعد برای پژوهش ماهیان گرم آبی می باشند . امروزه تولید در این استان به بیش از ۷۰۰۰۰ تن در سال رسیده است . با معرفی گونه های جدید به صنعت آبزی پروری امکان افزایش تولید و درآمد تولید کنندگان خواهد بود . پس از سال ها تلاش و کوشش و همت مجدانه کارشناسان موسسه تحقیقات شیلات ایران سه گونه از کپور ماهیان با نام های علمی کاتلا (*Catla catla*)، مریگال (*Labeo rohita*) و روهو (*Cirrhinus cirrhosus*) تحت نام کلی کپور ماهیان هندی در قالب یک طرح جامع وارد گردیده که این پژوهه تلاشی دز جهت بررسی امکان پرورش ورشد در شرایط پرورش در استخراخاکی با اقلیم استان های خوزستان و گیلان می باشد .

روش کار :

بر اساس برنامه ریزی استخراخاکی مد نظر در ایستگاه تحقیقات استانه اشرفیه و مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور شیبان (شکل ۱) آماده سازی شده و بلو م پلانکتونی ایجاد گردید . مراحل اصلی کار شامل ورود بچه ماهی ، آدپتاسیون ، تیمار بندی و بررسی مراحل رشد بود . آب مورد نیاز برای جبران نفوذ ، تبخیر و زمستان گذرانی در گیلان از طریق ۲ حلقه چاه و در استان خوزستان از طریق شاخه فرعی رودخانه کارون تامین میگردد .



شکل ۱- استخراخاکی محل ذخیره سازی کپور ماهیان وارد شده از کشور هندوستان در گیلان

ورود بچه ماهیان:

بچه ماهیان از کشور هندوستان در مورخ ۸/۶/۸۷ از طریق مرز فرودگاهی مهر آباد وارد شده(شکل ۲). و بلا فاصله از طریق مسیر جاده ای به کارگاه تکثیر و پرورش در استانه انتقال یافتند. در این راستا تعداد ۳۰۰۰۰ بچه ماهی با وزن متوسط ۳۰۰ میلی گرم (شکل ۳) از سه گونه کاتلا ، روهو و مریگال از کشور هندوستان(بمبئی) و پس از طی مراحل اخذ مجوز های قانونی وارد و به ایستگاه تحقیقات تکثیر و پرورش استانه اشرفیه (سفید رود) جهت قرنطینه آنها با همکاری سازمانهای ذیربط منتقل شدندهایانگین وزن بچه ماهیان بین ۰/۵ - ۰/۲ گرم و طول کل ۴۰-۲۵ ملیمتر ثبت گردید. با هماهنگی های انجام شده در بخش آبزی پروری موسسه وقراردادبا شر کت آبزیان آسیا و یا اخذ مجوزهای قانونی از جمله سازمان دامپزشکی ومحیط زیست تعداد ۱۵۰۰۰ عدد کپور هندی از سه گونه (روهو ، کاتلا ، مریگال) به ایستگاه تحقیقاتی در گیلان انتقال داده شدند (شکل ۴) . به منظور تطابق با شرایط محیطیماهیان مریگال و روهو و کاتلا به صورت مجزا در سه استخر نگهداری شدند.سلامت ظاهری و میزان تلفات حمل و نقل بچه ماهیان به هنگام رها سازی بررسی میشد(شکل ۵).



شکل ۲- ورود بچه ماهیان و بازینی در فرودگاه مهر آباد



شکل ۳- اندازه ماهیان در زمان ورود به کشور (میانگین ۳۰۰ میلی گرم)



شکل ۴- ذخیره سازی و هم دما کردن ماهیان در استخر های خاکی در ساعات اولیه روز



اقدامات بهداشتی قبل از ورود ماهیان:

باتوجه به اهمیت و از طرفی غیر بومی بودن کپور ماهیان هندی از بد و ورود این گونه ها به استان گیلان تمهدات لازم و اصول قرنطینه در ایستگاه تحقیقات شیلاتی سفیدرود آستانه اشرفیه رعایت گردید. بدینصورت که در مدخل ورودی ایستگاه، حوضچه آهک برای ضد عفونی کردن چرخهای خودروها تعییه گردید. استخرهایی که برای نگهداری کپور ماهیان در نظر گرفته شده بودند بطور کامل از سایر استخرهای موجود در ایستگاه جداسازی شدند.

برای ممانعت از ورود موجودات مزاحم از قبیل مار، قورباغه، لاک پشت و پرندگان حواشی استخرها با گونی چتایی محصور و بالای استخرها کاملاً بند کشی شدند (شکل ۶).

خروجی آب استخرها بطور کامل تحت کنترل قرار گرفت تا هیچ آبی از استخرها خارج نگردد همچنین قبل از خروجی مرکزی استخرها حوضچه ضد عفونی دیگری احداث شد تا در صورت نیاز به تخلیه یا تعویض بخشی از آب ابتدا تحت تاثیر آهک با غلظت بالا ضد عفونی و سپس وارد رودخانه گردند.

در مجموع شرایط قرنطینه نگهداری بچه ماهیان کپور هندی به قرار ذیل انجام پذیرفت :

۱. حصار کشی با گونی پلاستیکی در اطراف استخر نگهداری بچه ماهیان
۲. طناب کشی سطح استخرها جهت مهار پرندگان ماهیخوار
۳. مسدود نمودن دریچه خروجی اصلی پساب مرکز
۴. ضد عفونی آب خروجی با استفاده از هیپوکلراید
۵. جمع آوری و سوزاندن گیاهان هرز پیرامون و دیوارهای استخرها وزه کش
۶. آهک پاشی تمام مسیرهای دسترسی به استخرهای نگهداری بچه ماهیان
۷. مدت قرنطینه با توجه به بررسی های انجام شده توسط اداره دامپزشکی و تایید عدم وجود بیماری در نظر گرفته شد.



شکل ۶- بند کشی بالای استخر ها به منظور جلوگیری از نفوذ پرندگان

اقدامات بهداشتی بعد از ورود ماهیان:

همزمان با وارد سازی بچه ماهیان به ایستگاه و قبل از معرفی آنها به استخراهای پرورش با استفاده از نمک طعام ۵ درصد ضد عفونی

شدند. کلیه وسایل حمل، صید و جابجایی بچه ماهیان قبل و بعد از عملیات انتقال در آهک ضد عفونی گردیدند.

بررسی های منظم ماهیان در طول دوره پرورش بصورت ماهیانه و همزمان با زیست سنجی آنها و در صورت بروز شرایط خاص

بصورت صید موردی و نمونه برداری از آنها انجام گرفت. بررسی ماهیان شامل معاینه بخششای بیرونی از جمله پوست، باله ها، آبششها

، شفافیت چشم ها و مشاهده تحرک و جنب و جوش طبیعی ماهیان و در صورت تلفات بررسی اندامهای درونی آنها بوده است..

آداسیون:

مراحل آداسیون ماهیان در کنار استخر ها و در ساعات بامدادی به مدت ۳ تا ۴ ساعت به طول انجامید. در این مدت به تدریج آب

محیط انتقال و آب استخر های پرورشی جایگزین شده و در عین حال همدما می نیز صورت پذیرفت(شکل ۷). در مجموع تعداد ۱۵۰۰۰

لارو از سه گونه در استخر ها رها سازی شدند.



شکل ۷- همدایی صورت پذیرفته به هنگام رها سازی ذر استخر ها

گونه های مورد پرورش:

در این تحقیق تعداد ۷ گونه شامل ۳ گونه کپور هندی و ۳ گونه کپور چینی و ۱ گونه کپور معمولی مورد استفاده قرار گرفت. نام علمی گونه ها بشرح زیر می باشد :

<u><i>Catla catla</i></u>	-	Catla
<u><i>Labeo rohita</i></u>	-	Rohu
<u><i>Cirrhina mrigala</i></u>	-	Mrigal
<u><i>Hypophthalmichthys molitris</i></u>	-	Silver carp
<u><i>Aristichthys nobilis</i></u>	-	Bighead carp
<u><i>Cyprinus carpio</i></u>	-	Common carp
<u><i>Ctenopharyngodon idella</i></u>	-	Grass carp

تیمار بندی

در سال اول جهت انجام طرح مذکور از سه تیمار در سه تکرار به منظور حصول نتایج استفاده شد. برای این منظور در تیمار اول پرورش لاروهای نورس کاتala و در تیمار دوم پرورش لاروهای نورس روهو با روش مرسوم در کشور و مطابق شرایط آب و هوایی استان گیلان. و در تیمار سوم پرورش لاروهای نورس مریگال مورد بررسی قرار گرفت.

در سال اول تعداد استخراهای مورد نظر ۹ استخرا، هر کدام به مساحت ۰/۰۴۵ هکتار و عمق متوسط استخراها بین ۱/۵-۲ متر در نظر گرفته شده و میزان تراکم رهاسازی بچه ماهیان بر اساس ۱۰۰۰۰۰۰ عدد در واحد هکتار محاسبه گردید. وزن لاروهای نورس ۳۰۰ میلیگرم بود. در سال دوم اجرای طرح مجدداً اقدام به ادامه طرح جهت تعیین بهترین ترکیب پرورش توان کپورماهیان هندی و چینی در

۴ تیمار و سه تکرار به شرح جدول ۱ گردید:

جدول ۱- ترکیب تیمارهای مورد بررسی

سرگنده	آمور	کپور معمولی	فیتو فاگ	مریگال	روهو	کاتala	ترکیب پرورش	به درصد
							ترکیب اول	
۵	۱۵	۵	۴۰	۱۰	۲۰	۱۰	ترکیب دوم	
۵	۱۰	۵	۳۰	۱۰	۳۰	۲۰	ترکیب سوم	
				۲۰	۵۰	۳۰	ترکیب چهارم	
۵	۲۵	۱۰	۶۰					

در سال دوم تعداد استخراهای مورد نظر ۱۲ استخرا به مساحت ۰/۰۴۵ هکتار و عمق متوسط استخراها بین ۱/۵-۲ متر در نظر گرفته شده است میزان تراکم رهاسازی برای پرورش بندی ۳۲۰۰ عدد در واحد هکتار محاسبه گردید. متوسط وزن بچه ماهیان در سال دوم پرورش ۱۳.۵ گرم در نظر گرفته شد.

سیستم پرورش بر اساس تغذیه دستی با استفاده از غذای کنسانتره همراه با کوددهی جهت افزایش فیتوپلاتکتونها و زئوپلاتکتونها بوده (شکل ۸) و مدیریت پرورش در همه استخراها یکسان و شرایط برای همه آنها یکسان در نظر گرفته شد.



شکل ۸- آماده سازی و کود دهی استخرا به منظور ایجاد بلوم پلاتکتونی

طول مدت بررسی:

دوره پروش در استان خوزستان تا ۲۰ آبانماه و سردشدن دمای آب ادامه داشت (۶ ماهه) و بعداز آن اقدام به تخلیه استخراها و صید ماهیان

شد. کپور ماهیان چینی و کپور معمولی همراه با بخشی از کپور ماهیان هندی برای عرضه به بازار خارج گردید تعدادی از کپور ماهیان

هندی بیهوش گردیده و مورد زیست سنجی و شمارش قرار گرفته و به استخرا دیگری منتقل گردیدند.

طول مدت این بررسی در استان گیلان در سال اول ۲ ماه یعنی یک دوره پرورش لارو نورس تا مرحله بچه ماهی انگشت قد (کمتر از

دوره متداول در شرایط استان گیلان به دلیل محدودیت زمان وارد شدن ماهی به کشور) بود. در فاز دوم پرورژ طول مدت بررسی ۷

ماه یعنی یک دوره پرورش متداول در شرایط استان گیلان در نظر گرفته شد.

عملیات زیست سنجی:

به منظور زیست سنجی هر ماه یکبار نمونه برداری با استفاده از تورهای پرتابی (ماشک) و یا استفاده از تور پره انجام می پذیرفت. نمونه ها بلا فاصله

در محلول های بیهوش کننده قرارداده شده و به آزمایشگاه منتقل گردید.

عملیات زیست سنجی (شامل طول کل با دقت میلیمتر و وزن کل با دقت گرم) از بچه ماهیان در طول دوره پرورشی هر ماه صورت گرفت (شکل ۹ و ۱۰) که در آن ضریب رشد و وضعیت بهداشتی آنان و نیز وضعیت پلانکتونی و بنتوز استخراها مورد بررسی قرار گرفت. تعداد نمونه های مورد بررسی در هر دوره بیومتری از هر تیمار ۳۰ عدد در نظر گرفته شد. بچه ماهیان در پایان سال در استخراهای خاکی و با عمق حدود ۲ متر و از طریق تزریق آب چاه با درجه حرارت ۱۵ درجه سانتی گراد نگهداری شده و در سال دوم مورد استفاده قرار گرفتند.

در صد افزایش تولید در واحد سطح در تیمارها و درصد بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی و ضریب رشد ماهی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های رشد از طریق فرمول های زیر محاسبه گردید.

: (Weight Gain) افزایش وزن

$$\text{WG(g)} = \frac{\text{وزن اولیه (گرم)}}{\text{وزن اولیه (گرم)}} - \text{وزن ثانویه (گرم)}$$

: (Specific Growth Rate) ضریب رشد ویژه

$$\text{SGR}(\%/\text{day}) = \frac{((\ln W_t - \ln W_i)) * 100}{T}$$

W_t = وزن در زمان معین t (گرم)

W_i = وزن اولیه (گرم)

T = طول دوره آزمایش (روز)

: (Survival Rate) نرخ ماندگاری

$$SR = \frac{100 \times [\text{تعداد اولیه}}{\text{تعداد در پایان دوره پرورش}]$$

ماندگاری (تعداد) × وزن نهایی (گرم) = (گرم) بیomas : بیomas :



شکل ۹- بچه ماهی نورس در بدبو ورود به پژوهشکده آبزی پروری خوزستان (راست)، اندازه گیری طول کل در ماهی روهو(چپ)



شکل ۱۰- اندازه گیری وزن در ماهی روهو

روش بررسی هیدروشیمی:

در این مطالعه جهت اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی آب از روش کار استاندارد برای آزمایش آب ارائه شده توسط انجمن بهداشت عمومی آمریکا (Lenore et all,2005) استفاده شده است. اندازه گیری pH و هدایت الکتریکی بروش الکترومتری بوسیله دستگاه مولتی متر WTW multi340i انجام گرفت. اندازه گیری دما با دماسنج جیوه ای صورت پذیرفت. اندازه گیری ارتوفسفات به روش اسپکتروفوتومتری با استفاده از واکنشگرهای مولیبدات آمونیم، تارتارات پتاسیم و آنتیموان، و اسید اسکوربیک و تشکیل کمپلکس آبی رنگ انجام شد.

اندازه گیری نیتریت به روش رنگ سنجی با استفاده از واکنشگرهای سولفانیل آمین و ۱- نفتیل آمین و تشکیل کمپلکس صورتی رنگ صورت گرفت. در اندازه گیری نیترات ابتدا نیترات محلول با استفاده از روش کاہشی کادمیم به نیتریت تبدیل شده و نیتریت حاصل به

روش ذکر شده در بالا سنجش شد. اکسیژن محلول بروش وینکلر اندازه گیری شد. کلسیم و منیزیم و سختی کل (TH) به روش تیتریمتری با استفاده از واکنشگر اتیلن دی امین تراستیک اسید(EDTA) و در مجاورت شناساگرهای اریبوکرم بلاک تی و موروکسید سنجش شد. سختی کل (TH) بر حسب میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم گزارش شده است.

کلربه روش تیتریمتری با واکنشگر نیترات نقره در مجاورت شناساگر دی کرومات پتابسیم انجام شد. جهت سنجش کل نیتروژن و کل فسفر در آب به روش هضم پرسولفات پتابسیم عمل گردید. در این روش ترکیبات مختلف نیتروژن به صورت نیترات و ترکیبات فسفر به صورت فسفات تبدیل شده و نیترات و فسفات حاصله طبق روش مذکور در بالا سنجش شد. اکسیژن مورد نیاز شیمیایی(COD) بروش اسپکتروفتوتری بعد از اکسیداسیون تحت رفلکس بسته انجام شد. سولفات بروش اسپکتروفتوتری با استفاده از کدورت سنجی اندازه گیری شد.

سیلیس بروش اسپکتروفتوتری با استفاده از کمپلکس آبی اندازه گیری شد.
برای تعیین کلروفیل a حجم مشخص از آب بوسیله کاغذ صاف ۰/۴۵ میکرون GF/C/Nhatman و پمپ خلاء صاف گردید و نمونه صاف شده توسط الکل یا استون استخراج و در طول موجهای ۶۳۰ - ۶۴۵ - ۶۶۳ - ۷۵۰ نانومتر قرائت گردید.

روش نمونه برداری از پلانکتونها:

تعداد استخرها ۱۲ عدد، نمونه برداریهای پلانکتونی در سال ۱۳۸۸ بطور ماهیانه که از خردادماه شروع گردید. با توجه به عمق استخرها و نبود قایق، نمونه برداری پلانکتونی در آن به روش پیمانه ای و توسط سطل مدرج ۱۰ لیتری انجام گرفت، جهت فیتوپلانکتونها یک لیتر آب از استخر موردنظر بدون عبور از تورپلانکتون و برای نمونه برداری زئوپلانکتونی ۳۰ لیتر آب (درسه مرحله ۱۰ لیتری) را برداشت
و توسط تورپلانکتون ۳۰ میکرون فیلتر نموده و عصاره جمع شده در کلکتور ادرظرف نمونه برداری ریخته، و درنهایت نمونه ها را با فرمالین به نسبت ۴ درصد فیکس و جهت مطالعه به آزمایشگاه منتقل شدند. روش نمونه برداری و محاسبه تراکم جمعیتی پلانکتونها با استفاده از منابع ،

Sorina , 1978 و Boney , 1989 Standard metod , 1998 ،

و شناسایی گونه های پلانکتونی با استفاده از منابع ،

Edmonson,1959 ;Prescott,1962 Vol 1,2,3 ;Prescott, 1970 ;Kotykova 1970;Tiffany , 1971 . Ruttner-kolisko,1974 ;Pontin , 1978 ; Maosen , 1983 ; Krovichinsky and Smirnov , 1993

انجام گرفت. در آزمایشگاه نمونه های فیتوپلانکتونی بعد از همگن کردن توسط پیست به محفظه های ۵ میلی لیتری شمارش منتقل

وپس از زمان کافی (حداقل تا ۲۴ ساعت) جهت رسوب ، بوسیله میکروسکوپ اینورت بطور کمی و کیفی بررسی شدند.

نمونه های زثوبلانکتونی نیز بعد از تعیین حجم (عصاره آب فیلتر شده) مطابق روش گفته شده مورد شناسایی و شمارش قرار گرفتند. در نهایت

تراکم پلانکتونی در لیتر در هر استگاه تعیین و در فرم های اطلاعاتی شاخه بندی شده ثبت و تراکم شاخه ها و سرانجام تراکم کل محاسبه گردید .

روش نمونه برداری از بتوز ها:

نمونه برداری کفزیان درسه مرحله از ماههای پرورش تیر ، مرداد و شهریور سال ۱۳۸۸ انجام شد . نمونه ها بوسیله نمونه بردار اکمن

دهانه باز به ابعاد $16.5 \times 20\text{ cm}$ سپس نمونه ها در ظروف پلاستیکی نیم لیتری و در آزمایشگاه با فرم الین ۴٪ فیکس

گردید. شتشو وجود اسازی مواد زائد و رسوبات از نمونه ها و در نهایت اکثر نمونه تاحد گونه بعضی در حد جنس و ندرتا " تا حد راسته

شناسایی شد. بیومس هاستخرا با ترازوی دیجیتال الکترونیکی با دقیقه ۰.۰۰۱ گرم توزین و فراوانی هر نمونه در استخرا بدست آمد.

دارو درمانی برای کنترل لرنژیس:

در طول دوره پرورش بجز آلدگی به انگل خارجی و سخت پوست لرنژا آلدگی دیگری در بچه ماهیان مشاهده نشد که برای کنترل و

درمان لرنژیس و جلوگیری از شیوع آن، با توجه به منابع معتبر (جلالی، ۱۳۷۷) و با نظارت بخش بهداشت پژوهشکده آبزی پروری

آبهای داخلی، از سم ارگانوفسفاته تری کلروفون با نام تجاری مازوتون با غلظت 0.5 ppm از ماده مادر به فاصله ۷ روز یک بار و با

تکرار ۴ تا ۵ بار انجام گرفت. انتخاب تری کلروفون به علت اثرات سوء کمتر بر روی ماهیان و موجودات مفید موجود در استخراها

نسبت با سایر سموم بوده است. قابل ذکر است که عملیات سم پاشی در صحنه های روزهای آفتایی وزیر نظر آزمایشگاه انجام

پذیرفت. در طی عملیات دارو درمانی، غذادهی و کوددهی استخراهای مزبور بمدت ۲۴ ساعت قطع گردید در عین حال عملیات

اکسیژن دهی به کمک هواهای در طول سماپاشی انجام گرفت.

خوشبختانه انتخاب شیوه درمان جواب مثبتی بدنبال داشت به نحوی که بعد از هر مرحله سماپاشی از شدت آلدگی ماهیان کاسته شد و

در پایان مرحله ۴ و خاتمه سماپاشی آثاری از لرنژا در ماهیان تحت درمان مشاهده نشد.

با توجه به اینکه بچه ماهیان هندی در مرحله ورود به استخراها عاری از آلدگی به لرنژا بوده اند این احتمال که آلدگی را بصورت

افقی از کپور ماهیان چنی بویژه کپور علفخوار گرفته باشند دور از ذهن نیست. در صید نهایی کپور ماهیان هندی آلدگی دیگری

روش کار در استان خوزستان :

در استان خوزستان ۳ استخر با مساحت ۷۰۰ مترمربع برای بچه ماهیان نورس هندی در نظر گرفته شد. در ابتدا کلیه مراحل آماده سازی در استخرها انجام گرفت. و استخرها برای معزفی بچه ماهیان نورس آبگیری شدند. همچنین با توجه به لزوم قرنطینه بودن ماهیان اقدامات لازم جهت ایجاد محیط قرنطینه طبق مقررات سازمان دامپژوهشی از قبیل حصارکشی، مسدود نمودن خروجی آب به زهکش اصلی، آهک پاشی و احداث حوضچه ضدغونه ضدمتده موادی استخرهای انجام گرفت و در پایان با تائید نمایندگان دامپژوهشی استان مجوز لازم جهت ورود کسب گردید در طول مدت قرنطینه موادی مانند عدم سرریز آب استخر، ممانعت از ورود آب خروجی به زهکش اصلی و ضدغونه پساب استخرهای موجود انجام گرفت. بچه ماهیان از کشور هندوستان در مورخ ۸۷/۶/۸ از طریق مرز فرودگاهی مهر آباد وارد شده و تعداد ۱۵۰۰۰ قطعه مجدداً با هواپیماهه اهواز منتقل گردید تا خیر پرواز و مسافت طولانی باعث تلفات تعدادی از بچه ماهیان حین حمل گردید و در نهایت در نهم شهریور ۱۳۸۷ تعداد ۱۰۵۰۰ قطعه بچه ماهیان نورس زیست سنجی و به استخرها با تراکم ۳۵۰۰ قطعه که شامل ۴۶/۷ درصد کاتلا، ۳۵ درصد روهو و ۱۸/۳ درصد مریگال بود معرفی شدند. میانگین وزن و طول کل اولیه در نمونه ها به ترتیب ۰/۹۶±۰/۸ میلی گرم و ۰/۷۵±۰/۶ میلی متر در روهو، ۰/۱±۰/۰۳۵ گرم و ۰/۱۶±۰/۰۱ در کاتلا و ۰/۰۳±۰/۰۰ گرم و متر در مریگال بود. دما در این مرحله ۲۹ درجه بود.

بچه ماهیان قبل از رهاسازی در استخر با پرمنگنات پتاسیم ۴ درصد به مدت ۱۵ ثانیه ضدغونه گردید (Landau, 1992). زیست سنجی به صورت ماهانه و ثبت پارامترهای آب، غذاده، سرریز آب و بررسی تلفات بصورت روزانه انجام شد از ترازوی دیجیتالی با دقیقه ۱/۰۰ برای وزن نمودن و از خط کش فلزی برای اندازه گیری طول کل استفاده شد. برای سنجش اختلاف معنی داری بین $t=b-B/S_b$ محاسباتی و B مورد انتظار برای یک ماهی با رشد همسان از فر مول استفاده گردید (James, 1967). غذا بصورت کسانتره یکبار در روز به طور متوسط ۲ کیلو گرم در هر استخر به ماهیان داده شد با کاهش دما غذاده در ماههای آذر، دی و تا اواسط بهمن قطع شد. تعداد ۳۰ نمونه در هر زیست سنجی برای بررسی میزان رشد انتخاب شدند. وزن، طول کل و طول استاندارد در زیست سنجی به عنوان شاخص در نظر گرفته شدند.

در مرحله پرورش ماهیان بازاری طراحی آماری آزمایش براساس یک طرح بلوک کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار انجام گرفت تیمارها شامل تیمار شاهد که ترکیب ماهیان شامل کپور ماهیان چینی فیتوفاگ، ییگ هد، آمورو کپور معمولی با تراکم و ترکیب معمول در استان خوزستان بود و تیمارهای بعدی به ترتیب جایگزینی ۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصدی سه گونه کپور هندی کاتلا، روهو و مریگال با

ماهیان فوق مطابق با روش اعمال شده در استان گیلان بود. درین مرحله از آزمایش ۱۲ استخر خاکی مورد استفاده قرار گرفت. استخرها با شرایط کاملاً یکسان (از نظر اندازه، شکل ورودی، خروجی، حجم، ارتفاع آبگیری) از استخرهای کارگاه پرورشی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور (شیبان) انتخاب شد. هریک از استخر هادارای مساحت مفید ۱۷۰۰ متر مربع و عمق ۱۸۰ سانتی متر بود که برای اجرای این آزمایش بکار گرفته شد. استخرها قبل از انتقال به ماهیان آماده سازی شده و آبگیری گردید. بهجه ماهیان هندی از پرورش بهجه ماهیان نورس وارد شده و بهجه ماهیان کپور چینی و کپور معمولی از یکی از مزارع پرورشی استان خوزستان تأمین گردید.

روش بررسی اقتصادی:

برای تعیین هزینه تمام شده و سهم هزینه عوامل تولید کپور ماهیان پرورشی، شامل هزینه نیروی انسانی، هزینه انگشت قد، هزینه غذا و کود مصرفی، هزینه تعمیر و نگهداری، هزینه انرژی، هزینه استهلاک سازه ها، تجهیزات و ساختمانهای اداری و سایر هزینه ها در مراکز تحقیقاتی فوق در سال ۱۳۸۹ با استفاده از تجربیات و اطلاعات گذشته و سایر منابع و تجربیات خارجی پرسشنامه ای تهیه شد.

محاسبات و آنالیز آماری:

مقایسه میانگین های رشد طولی و وزنی با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن در سطح معنی دار ۰.۰۵ صورت پذیرفت. نتایج نهایی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) و تست دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. رسم نمودار ها براستفاده از نرم افزار Exell 2007 انجام پذیرفت.

نتایج:

بررسی نتایج حاکی از رشد بهجه ماهیان (شکل ۱۱) و قابلیت سازگاری ۳ گونه کپور ماهی معرفی شده به اقلیم پرورش کشور در شرایط آب و هوایی استان گیلان و خوزستان تا مرحله پرواری و اندازه مناسب بازار می باشد. در عین حال پژوهش بصورت کشت توام با گونه های کپور ماهیان چینی نیز با موفقیت همراه بوده و امکان نگهداری گونه های جدید با اعمال مدیریت آب (استفاده از آب چاه) در استخرها در فصل زمستان در هر دو استان خوزستان و گیلان وجود دارد.



شکل ۱۱- ماهیان رشد یافته در محیط پرورشی در طی ۲ ماه پس از رها سازی در استخراهای استانه اشرفیه

تکه‌داری و پرورش بچه ماهیان نورس در استان گیلان :

برای استان گیلان بچه ماهیان نورس یک روز پس از ورود به فرودگاه مهرآباد و انتقال به ایستگاه تحقیقاتی شیلاتی آستانه در استان گیلان در تاریخ ۸۷/۶/۸ در استخراها رهاسازی شدند. با توجه به اینکه بچه ماهیان تقریباً در انتهای دوره پرورش (به دلیل دسترسی به بچه ماهی از کشور هند در تاریخ مذکور) به استخراهای پرورشی گیلان معرفی شدند، لکن نتایج حاصل از بررسی روند رشد در طی ۲ ماه فرصت دمایی (۲۷ تا ۲۳ در جه سانتی گراد) نشان دهنده قابلیت بچه ماهیان نورس کپور هندی در شرایط پرورشی این منطقه می باشد. جدول ۲ ویژگی های طولی و وزنی سه گونه ماهی کاتلا روهو و مریگال را در زمان ذخیره سازی در استخراها را نشان می دهد

جدول ۲- طول و وزن ماهیان کاتلا، روهو و مریگال در زمان ورود به ایران (۸۷/۶/۸)

ردیف	نوع گونه ماهی	وزن / گرم	میانگین طول / میلی متر	میانگین
۱	کاتلا	۰/۲۷۷	۲۹	
۲	روهو	۰/۵۶۴	۴۰	

۳۴	۰/۳۰۷	مریگال	۳
----	-------	--------	---

بررسی های انجام شده در خصوص رشد بچه ماهیان نورس در طی ۲ ماه بررسی در سال ۱۳۸۷ نشان دهنده قابلیت تطابق ماهی با شرایط اقلیمی استان گیلان را داشته (شکل ۱۲) به نحوی که پس از این مدت میانگین رشد وزنی در آبان ماه در خصوص کاتلا 0.8 ± 16.3 گرم و در خصوص ماهی رoho 0.4 ± 14.5 و در خصوص مریگال 0.7 ± 10.3 بدست آمد . در عین حال نرخ رشد در خصوص سه گونه کپور هندی به شرح جدول ۳ تعیین گردید .



شکل ۱۲- بچه ماهیان رشد یافته در طی ۷۰ روز در ایستگاه تحقیقات استانه اشرفیه

چنانچه در جدول ۳ مشاهده می شود بچه ماهیان کاتلا از وزن اولیه 0.27 گرم در ابتدای دوره به میانگین وزنی 16.3 گرم در انتهای دوره پرورش اولیه رسیده اند . در خصوص ماهی رoho افزایش از 0.56 گرم در طی مدت ۷۰ روز به 14.5 گرم رسید و این در حالی است که ماهی مریگال در همین مدت از 0.30 گرم به وزن 10.3 گرم رسید . در این میان رشد هر سه گونه ماهی کپور هندی از اختلاف معنی دار نسبت به وزن اولیه برخوردار بود ($P<0.01$) .

جدول ۳- نرخ رشد کاتلا، روهو و مریگال در پایان دوره پرورش بچه ماهی نورس ۱۳۸۷

نام گونه	وزن اولیه بچه ماهی نورس	وزن بچه ماهی نورس در پایان دوره	نرخ رشد
کاتلا	۰/۲۷	۱۶/۳	۱/۱
روهو	۰/۵۶	۱۴/۵	۰/۸
مریگال	۰/۳۰	۱۰/۳	۰/۶

نگهداری و پرورش بچه ماهیان نورس در استان خوزستان:

میانگین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب در طی این بررسی ۷ ماهه برای دما در شهریور ($۲۹/۷۴\pm ۰/۴۵$) ، مهر ($۲۳/۷۴\pm ۰/۷۷$)، آبان

آذر ($۲۰/۱۲\pm ۰/۴۶$)، دی ($۱۵/۴\pm ۰/۶۷$)، بهمن ($۱۰/۱۹\pm ۰/۴۸$) و اسفند ($۱۹/۴۱\pm ۰/۴۹$) محاسبه شد میانگین

حداقل میزان دما $۱۰/۱۹\pm ۰/۴۸$ درجه سانتی گراد در ماه دی و میانگین حداکثر دما $۲۹/۷۴\pm ۰/۴۵$ درجه سانتی گراد در ماه شهریور بود


و اختلاف معنی داری با ماههای دیگر نشان داد ($P<0.05$). حداقل و حد اکثر دمای آب ثبت شده در ماه دی و شهریور

به ترتیب ۷ و ۳۴ درجه سانتی گراد می باشد. در این بررسی تغییری در میزان pH مشاهده نشد. طول و وزن بچه ماهیان نورس و رابطه


طولی و وزنی آنها نیز در شرایط اقلیمی استان خوزستان محاسبه شد . وزن بچه ماهیان نورس در هر ۳ گونه در شهریور و مهر با ماههای

دیگر اختلاف معنی داری را نشان داد (نمودارهای ۱ و ۲ و ۳). در حالیکه در بین گونه ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد


.($P>0.05$)




نمودار ۱- نمودار میانگین دمای آب در ماههای مختلف در استخرهای بچه ماهیان نورس هندی




نمودار ۲- نمودار رابطه طولی وزنی در بچه ماهیان نورس روهو



نمودار ۳- مودار طول و وزن بچه ماهیان نورس کاتلا در ماههای مختلف



نمودار ۴- نمودار رابطه طولی وزنی در بچه ماهیان نورس کاتالا



نمودار ۵- نمودار طول و وزن بچه ماهیان نورس مریگال در ماههای مختلف

شاخص های اندازه گیری شده برای بچه ماهیان نورس هندی (روهو، کاتلا و مریگال) شامل طول کل و وزن می باشد. وزن اولیه برای روهو، کاتلا و مریگال در شهریور به ترتیب 16 ± 0.1 ، 13 ± 0.1 و 10 ± 0.1 گرم بود. طول کل در ماهی روهو به ترتیب 33 ± 0.35 میلی متر، در ماهی کاتلا 75.5 ± 0.75 میلی متر و در ماهی مریگال 34.8 ± 0.96 میلی متر بود (جدول ۳). میزان طول کل در

وزن اولیه گونه های مختلف، اختلاف معنی داری را نشان نداد ($P > 0.05$). در ماه مهر، وزن بچه ماهیان نورس در ماهی روهو $11/31 \pm 2/11$ گرم، کاتالا $3/30 \pm 0/41$ گرم و مریگال $6/23 \pm 0/46$ گرم بود که اختلاف معنی داری در گونه ها مشاهده نشد ($P > 0.05$). طول کل در ماه مهر در بچه ماهی روهو $10/1/26 \pm 6/25$ میلی متر، کاتالا $1/29 \pm 0/23$ میلی متر و مریگال $1/46 \pm 1/44$ میلی متر بود که اختلاف معنی داری در گونه ها مشاهده شد (شکل های ۶ و ۲۰). در ماه آبان، وزن بچه ماهیان در ماهی روهو $4/75 \pm 1/41$ گرم، کاتالا $3/38 \pm 0/13$ گرم و مریگال $8/48 \pm 0/19$ گرم بود که اختلاف معنی داری در گونه روهو با کاتالا و مریگال مشاهده شد ($P < 0.05$). طول کل در ماه آبان در بچه ماهی نورس روهو $1/92 \pm 1/49$ میلی متر، کاتالا $1/33 \pm 1/10$ میلی متر و مریگال مشاهده شد ($P < 0.05$). مترو مریگال $1/50 \pm 1/22$ میلی متر بود که اختلاف معنی داری در گونه ها مشاهده شد ($P < 0.05$). در ماه آذر، وزن بچه ماهیان نورس در ماهی روهو $5/27 \pm 1/42$ گرم، کاتالا $0/74 \pm 0/17$ گرم و مریگال $5/48 \pm 0/19$ گرم بود که اختلاف معنی داری در گونه روهو با کاتالا و مریگال مشاهده شد ($P < 0.05$). طول کل در ماه آذر در بچه ماهی نورس روهو $1/73 \pm 1/50$ میلی متر، کاتالا $1/32 \pm 0/10$ میلی متر و مریگال مشاهده شد ($P < 0.05$). کاتالا $1/32 \pm 0/124$ میلی متر بود که اختلاف معنی داری در گونه ها مشاهده شد ($P < 0.05$). در ماه دی، وزن بچه ماهیان نورس در ماهی روهو $3/45 \pm 1/18$ گرم، کاتالا $1/28 \pm 0/18$ گرم و مریگال $1/25 \pm 1/19$ گرم بود که اختلاف معنی داری در گونه روهو با کاتالا و مریگال مشاهده شد ($P < 0.05$). طول کل واستاندارد در ماه دی در بچه ماهی نورس روهو $1/24 \pm 1/31$ میلی متر، کاتالا $1/15 \pm 0/46$ میلی متر و مریگال $1/46 \pm 0/111$ میلی متر بود که اختلاف معنی داری در گونه ها مشاهده شد ($P < 0.05$). (جدول ۴)

جدول ۴- زیست سنجی بچه ماهیان نورس هندی در ماههای مختلف سال

ماه	طول کل (میلی متر)	وزن (گرم)	طول کل (میلی متر)	وزن (گرم)	طول کل (میلی متر)	وزن (گرم)	وزن (گرم)
شهریور	$3/26 \pm 0/35$	$0/3 \pm 0/0$	$23/6 \pm 0/75$	$0/1 \pm 0/0$	$3/4 \pm 0/96$	$16 \pm 0/01$	
مهر	$1/26 \pm 6/25$	$11/31 \pm 2/11$	$22/23 \pm 1/29$	$6/23 \pm 0/3$	$8/46 \pm 1/41$		
آبان	$1/92 \pm 1/49$	$4/75 \pm 1/41$	$10/1 \pm 1/33$	$13/66 \pm 0/38$	$1/12 \pm 1/122$	$1/88 \pm 0/84$	
آذر	$1/73 \pm 1/50$	$42/77 \pm 1/52$	$10/8 \pm 0/42$	$17/56 \pm 0/74$	$1/32 \pm 0/124$	$1/68 \pm 0/54$	
دی	$1/24 \pm 1/24$	$45/29 \pm 1/34$	$111/46 \pm 4/1$	$18/66 \pm 1/28$	$1/125 \pm 5$	$1/25 \pm 1/18$	

۱۹/۵۵±۰/۸۸	۱۲۶±۳/۱۳	۱۸/۹۴±۱/۲۸	۱۱۳/۴۶±۴/۱۲	۴۶/۲۹±۱/۳۴	۱۵۵/۴۳±۳/۲۳	بهمن
۲۱/۵۵±۰/۸۸	۱۲۹±۳/۲۳	۲۵/۹۱±۲/۳۴	۱۲۱/۶۸±۴/۰۳	۴۵/۹۹±۱/۳۴	۱۵۵/۳۱±۱/۲۴	اسفند

در ماه بهمن، وزن بچه ماهیان نورس درماهی روهو $18/94 \pm 1/34$ گرم، کاتالا $128/46 \pm 1/29$ گرم و مریگال $19/55 \pm 0/88$ گرم بود که اختلاف معنی داری در گونه روهو با کاتالا و مریگال مشاهده شد ($P < 0.05$). طول کل در ماه بهمن در بچه ماهی نورس روهو $113/46 \pm 4/12$ میلی متر، کاتالا $126/43 \pm 3/13$ میلی متر و مریگال $155/43 \pm 3/23$ میلی متر، کاتالا $121/68 \pm 4/03$ میلی متر بود که اختلاف معنی داری در گونه ها مشاهده شد ($P < 0.05$). در ماه اسفند، وزن بچه ماهیان نورس درماهی روهو $45/99 \pm 1/34$ گرم، کاتالا $25/91 \pm 2/34$ گرم و مریگال $21/55 \pm 0/88$ گرم، بود که اختلاف معنی داری در گونه روهو با کاتالا و مریگال مشاهده شد ($P < 0.05$). طول کل در ماه اسفند در بچه ماهی نورس روهو $155/31 \pm 1/24$ میلی متر، کاتالا $121/68 \pm 4/03$ میلی متر و مریگال $129 \pm 3/23$ میلی متر بود که اختلاف معنی داری در گونه ها مشاهده شد ($P < 0.05$). رابطه طولی - وزنی در بچه ماهیان نورس هندی در ۳ گونه ارتباط بالایی را نشان داد (شکل های ۴ و ۸). بطوری که این ارتباط بالای ۹۰ درصد بود. بر اساس تست پائولی اختلاف آن با عدد ۳ معنی دار بوده و رشد بصورت آلمتریک مثبت نشان داده شد.


تعداد بچه ماهی ذخیره شده در شروع آزمایش 3500 قطعه در هر استخر بود در انتهای دوره تعداد بچه ماهیان شمارش شدند. نتایج نشان داد (جدول ۵) که تعداد بچه ماهیان در انتهای دوره در استخرهای شماره ۱، ۲ و ۳ به ترتیب 3215 ، 3350 و 2812 قطعه بود که در صد بازماندگی در استخرها به ترتیب $91/85$ ، $91/91$ و $80/6$ درصد محاسبه شد. درصد رها سازی بچه ماهیان نورس در گونه های کاتالا، روهو و مریگال به ترتیب $46/7$ ، $46/7$ و $18/3$ درصد بود (جدول ۵)

جدول ۵ - مقایسه درصد بازماندگی بچه ماهیان نورس کپور ماهیان هندی

درصد بازماندگی	تعداد بچه ماهی برداشت شده	تعداد بچه ماهی ذخیره شده	درصد بچه ماهیان نورس ذخیره شده در استخر			استخر
			مریگال	روهو	کاتلا	
۹۱/۸۵	۳۲۱۵	۳۵۰۰	۱۸/۳۰	۳۵	۴۶/۷	۱
۹۵/۷۱	۳۳۵۰	۳۵۰۰	۱۸/۳۰	۳۵	۴۶/۷	۲
۸۰/۶	۲۸۲۱	۳۵۰۰	۱۸/۳۰	۳۵	۴۶/۷	۳

پژوهش در استخراهای پرواری استان خوزستان :

جدول ۶ میزان تولید کلی ماهیان در تیمارهای مختلف را نشان میدهد، بیشترین تولید در تیمار ۵۰ درصد جایگزین با میانگین 4254.9 کیلو گرم در استخرهای 1700 متر مربعی ($4254/9$ کیلو گرم در هکتار) مشاهده گردید. آنالیز واریانس میانگین تیمارهای فوق نشان داد بین تیمارهای آزمایشی با هم بیگروباتیمار شاهد ($P<0.05$) اختلاف معنی داری وجود ندارد. نمودار ۶ مقایسه میزان تولید خالص در تیمارهای مختلف را نشان می دهد.



نمودار ۶ - نمودار مقایسه میزان تولید خالص در تیمارهای مختلف

جدول ۶- مقایسه میزان تولیدنهاei در واحد سطح در تیمارهای مختلف آزمایشی


کل	شاهد			۷۰ درصد جایگزین			۵۰ درصد جایگزین			۳۰ درصد جایگزین			تیمارها استخر
	A9	A3	B2	A6	A2	B3	A8	A4	B6	A5	A1	B5	
	647. 9	638. 0	814. 0	681. 0	641. 0	681. 0	732. 0	803. 0	635. 0	685. 2	560. 0	858. 0	ماهی صید شده (kg)
698. 0	700. 0 a			667. 7 a			723. 3 a			701. 0 a			میانگین در استخر (kg)
25. 3	57. 1			13. 3			48. 7			86. 4			Std. Erro
4105. 9	4117. 4			3927. 4			4254. 9			4124. 0			میانگین در هکتار (kg)
148	335. 8			78. 4			286. 4			508. 2			Std. Erro
3294. 1	3752. 9			3770. 6			3735. 3			3294. 1			حداکثر (kg)
5047. 1	4788. 2			4005. 9			4723. 5			5047. 1			حداقل (kg)

ادامه جدول ۶ - وزن نهائی (W. G) کپور ماهیان هندی در تیمارهای مختلف

کاتلا				مریگال				روهو				
حداکثر (گرم)	حداقل (گرم)	Std. Error	میانگین (گرم)	حداکثر (گرم)	حداقل (گرم)	Std. Error	میانگین (گرم)	حداکثر (گرم)	حداقل (گرم)	Std. Error	میانگین (گرم)	تیمار
945	523	122	a 726	864	595	89	a 773	1167	1111	16	a1136	۳۰درصد جایگزین
1033	763	78	a 902	1039	659	125	a 788	۱۲۹۳	1007	85	a 1129	۵۰درصد جایگزین
1089	520	168	a 839	1039	672	106	a 849	1120	987	38	a 1054	۷۰درصد جایگزین


وزن نهائی (WG)

وزن نهائی ۳ گونه کپور هندی کاتلا، روهو و مربیگال بعد از ۶ماه پرورش در جدول ۶ آمده است. حداکثر میانگین وزن روهو در تیمار ۵۰ درصد جایگزین با ۱۲۹۳ گرم، حداکثر میانگین وزن مربیگال در تیمارهای ۷۰ و ۵۰ درصد جایگزین با ۱۰۳۹ گرم و حداکثر میانگین وزن کاتلا در تیمار ۷۰ درصد جایگزین با ۱۰۸۹ گرم مشاهده شده است. همچنین حداکثر وزن یک قطعه ماهی روهو، مربیگال و کاتلا به ترتیب ۱۶۷۱ و ۱۳۳۴ و ۱۲۰ گرم بوده است. مقایسه میانگین وزن نهائی گونه های مختلف در تیمارهای آزمایشی در نمودار ۷ نشان داده شده است.




نمودار ۷- نمودار مقایسه میانگین وزن نهائی گونه های مختلف در تیمارهای آزمایشی


همچنین منحنی رشد ماهیان پرورشی در طی دوره پرورش در نمودار های ۷ تا ۱۴ بررسی شده است .




نمودار ۸- نمودار رشدماهی روهو در تیمارهای مختلف در طول دوره پرورش




نمودار ۹- منحنی رشدماهی مریگال در تیمارهای مختلف در طول دوره پرورش




نمودار ۱۰- منحنی رشدماهی کاتلا در تیمارهای مختلف در طول دوره پرورش




نمودار ۱۱- منحنی رشدماهی فیتوفاگ در تیمارهای مختلف در طول دوره پرورش



نمودار ۱۲ - نمودار رشدماهی آمور در تیمارهای مختلف در طول دوره پرورش



نمودار ۱۳ - نمودار رشدماهی کپور معمولی در تیمارهای مختلف در طول دوره پرورش




نمودار ۱۴ - نمودار رشدماهی بیگ هد در تیمارهای مختلف در طول دوره پرورش

میزان بازماندگی (SVC)


میزان بازماندگی ماهیان در طول دوره پرورش در جدول ۷ نشان داده شده است، باز ماندگی در اغلب گونه ها بالا بوده و بین ۳ تیمار جایگزینی کپور ماهیان هندی و تیمار شاهد اختلاف معنی داری وجود ندارد (شکل ۱۹) ولی آنالیز واریانس میانگین های هر یک از گونه ها صرف نظر از تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری را نشان داد که این اختلاف بین بیگ هد با سایر گونه ها بود ولی تفاوت معنی داری بین ۳ گونه کپور هندی و سایر کپور ماهیان مرسوم (جز بیگ هد) مشاهده نگردید. (نمودار ۱۵ و ۱۶)

جدول ۷ - مقایسه میزان بازماندگی در گونه های مختلف کپور هندی و کپور ماهیان مرسوم

ماهیان	د و هو	مریگال	کاتلا	فیتوفاگ	آمور	کپور	بیگ هد	کل
میانگین	a 86	a 92	a 97	a 96	a 91	a 98	b 68	89
Std. Error	6.7	3.4	2.7	1.4	4.3	1.4	13.5	2.8
حداصل	38	77	76	88	65	85	0	0



نمودار ۱۵ - نمودار مقایسه میزان بازماندگی (SVC) در تیمارهای مختلف آزمایشی



نمودار ۱۶ - نمودار مقایسه میزان بازماندگی (SVC) در گونه های مختلف کپور هندی و کپور ماهیان مرسوم

افزایش وزن روزانه

میزان افزایش وزن روزانه در کپور ماهیان هندی کاتلا، روهو و مریگال در جدول ۸ نشان داده شده است، آنالیز واریانس داده های فوق نشان میدهد میزان افزایش وزن در تیماری که کپور ماهیان هندی استفاده شده برای ماهیان روهو، مریگال و کاتلا یکسان بوده و اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود ندارد. همچنین بیشترین افزایش وزن روزانه با میانگن ۷ گرم در روز متعلق به ماهی روهو و در تیمار ۵۰ درصد جایگزین و کمترین افزایش وزن روزانه با میانگن ۲.۷ گرم در روز متعلق به ماهی کاتلا و در تیمار ۷۰ درصد جایگزین مشاهده شده است.

جدول ۸ - افزایش وزن روزانه کپور ماهیان هندی در تیمارهای مختلف

گونه ماهی	تیمار	میانگین (گرم)	Std. Error	حداکثر (گرم)	حداقل (گرم)	حداکثر (گرم)
روهو	درصد جایگزین ۳۰	6. 13	. 09	6. 30	6. 00	
	درصد جایگزین ۵۰	6. 07	. 48	7. 00	5. 40	
	درصد جایگزین ۷۰	5. 67	. 20	6. 00	5. 30	
مریگال	درصد جایگزین ۳۰	4. 00	. 50	4. 50	3. 00	
	درصد جایگزین ۵۰	4. 03	. 68	5. 40	3. 30	
	درصد جایگزین ۷۰	4. 37	. 58	5. 40	3. 40	
ساقلا	درصد جایگزین ۳۰	3. 90	. 67	5. 10	2. 80	
	درصد جایگزین ۵۰	4. 87	. 43	5. 60	4. 10	
	درصد جایگزین ۷۰	4. 50	. 95	5. 90	2. 70	

میزان افزایش وزن روزانه کپور ماهیان مرسوم (جدول ۸) در تیمارهای مختلف آزمایشی برای ماهیان فیتوفاگ و کپور معمولی متفاوت بوده و اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود دارد. در فیتوفاگ بیشترین افزایش وزن روزانه در تیمار ۷۰ درصد جایگزینی (۸ گرم) مشاهده گردید که با سایر تیمارهای تفاوت معنی داری رانشان داد. در ماهیان کپور معمولی این تفاوت مربوط به تیمار شاهد با ۱۰/۱ گرم افزایش وزن روزانه با سایر تیمارها ۱۵/۸ تا ۱۶/۹ گرم افزایش وزن روزانه می باشد.

جدول ۹ - افزایش وزن روزانه کپور ماهیان مرسوم در تیمارهای مختلف

گونه ماهی	تیمار	میانگین (گرم)	Std. Error	حداکثر (گرم)	حداقل (گرم)	حداکثر (گرم)
فیتو فاگ	درصد جایگزین ۳۰	5. 1	. 4	4. 4	5. 9	
	درصد جایگزین ۵۰	6. 9	. 2	6. 6	7. 3	
	درصد جایگزین ۷۰	8. 1	. 7	7. 0	9. 5	


6. 2	5. 0	. 4	5. 5	شاهد	
10. 1	7. 7	. 7	9. 0	۳۰ درصد جایگزین	آمور
12. 0	9. 4	. 8	10. 8	۵۰ درصد جایگزین	
13. 0	9. 7	1. 0	11. 5	۷۰ درصد جایگزین	
9. 8	5. 7	1. 3	8. 2	شاهد	
18. 6	13. 8	1. 4	16. 0	۳۰ درصد جایگزین	کپور معمولی
17. 6	13. 1	1. 4	15. 9	۵۰ درصد جایگزین	
18. 5	16. 1	. 8	17. 0	۷۰ درصد جایگزین	
12. 1	8. 9	1. 0	10. 1	شاهد	
9. 7	4. 8	2. 5	7. 3	۳۰ درصد جایگزین	بیگ هد
14. 2	10. 1	2. 1	12. 2	۵۰ درصد جایگزین	
15. 3	9. 4	1. 7	12. 3	۷۰ درصد جایگزین	
11. 3	7. 7	1. 0	9. 5	شاهد	

افزایش وزن روزانه در ماهیان آمور و بیگ هد در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری ندارند. بیشترین میزان افزایش

وزن روزانه در کپور ماهیان مرسوم در ماهی کپور معمولی با $18/6$ گرم و در تیمار 70 درصد جایگزین و کمترین میزان

افزایش وزن روزانه در ماهی فیتوفاگ $4/4$ گرم در تیمار 30 درصد جایگزین مشاهده گردید. در نمودار 17

نمودار افزایش وزن روزانه ماهیان پرورشی در دوره پرورش مقایسه شده است.



نمودار ۱۷- نمودار افزایش وزن روزانه ماهیان پرورشی در دوره پرورش

ضریب رشد ویژه (SGR)


ضریب رشد ویژه (SGR) گونه های مختلف کپور هندی و کپور ماهیان مرسوم در جداول ۹ و ۱۰ نشان داده شده است میزان SGR کلی (۱۸۰ روزه) کپور ماهیان هندی در تیمارهای مختلف یکسان بوده و اختلاف معنی داری نشان نداد. حد اکثر میزان SGR در ماهی کاتلا و در تیمار ۳۰ درصد جایگزین مشاهده گردید.

SGR کلی (۱۸۰ روزه) در کپور ماهیان آمور و بیگ ھد در تیمارهای مختلف یکسان بوده و اختلاف معنی داری نشان نداد، ولی در فیتوفاگ و کپور معمولی متفاوت بوده و اختلاف معنی دار است، در کپور معمولی اختلاف بین تیمار ۳۰ درصد جایگزین باسایر تیمارها و در فیتوفاگ بین تیمار شاهد و تیمار ۷۰ درصد جایگزین بیشتر است.

میزان SGR کلی انواع گونه های مختلف آزمایشی صرف نظر از تیمارها و تکرارها در جدول ۱۱ نشان داده شده است بیشترین ضریب رشد ویژه در ماهی کپور معمولی (میانگین ۴۱/۲ وحداکثر ۵۳/۲) و کمترین در ماهی مریگال (میانگین ۲۹/۱ وحداکثر ۴۵/۱) مشاهده گردید.

جدول ۱۰- میزان SGR کلی انواع گونه های مختلف آزمایشی

بیگ ھد	کپور معمولی	آمور	فیتو فاگ	کاتلا	مریگال	روهو	گونه ماہی
۰۷.۲ed	۴۱.۲e	۱۳.۲d	۸۴.۱b	۹۲.۱bc	۴۵.۱a	۹۱.۱bc	میانگین (گرم)
۰۰.	۰۴.	۰۳.	۰۳.	۰۰.	۰۴.	۰۱.	Std. Error
۶۲.۱	۱۲.۲	۸۴.۱	۶۵.۱	۶۸.۱	۲۹.۱	۸۵.۱	حداقل (گرم)
۲۹.۲	۵۳.۲	۲۹.۲	۰۷.۲	۰۹.۲	۶۰.۱	۰۰.۲	حداکثر (گرم)



نمودار ۱۸- منحنی مقایسه میزان ضریب رشد ویژه (SGR) کلی انواع گونه های مختلف آزمایشی (درصد

مقایسه ضریب رشد ویژه انواع گونه های استفاده شده در ترکیب توام کپور ماهیان هندی و کپور ماهیان مرسوم در

طول دوره پرورش ۶ ماهه صرف نظر از تیماروتکرارهای ازمایشی در شکل نشان داده شده است . در بین ماهیان هندی

بیشترین SGR مربوط به ماهی کاتلا (۱/۹۲) و کمترین مربوط به ماهی مریگال (۱/۴۵) می باشد.

همچنین میزان ضریب رشد ویژه (SGR) در کپور ماهیان هندی در تیمارهای مختلف آزمایشی در جدول ۱۲ نشان

داده شده است، آنالیز واریانس داده های جدول فوق نشان می دهد در هر ۳ گونه کپور هندی بین تیمارهای مختلف

تفاوت معنی داری وجود ندارد، بیشترین SGR مربوط به ماهی روهو در تیمار ۷۰ درصد جایگزین (۲) و کمترین

مربوط به ماهی مریگال در تیمار ۳۰ درصد جایگزین مشاهده گردید.

جدول ۱۱- میزان ضریب رشد ویژه (SGR) در کپور ماهیان هندی در تیمارهای مختلف

گونه ماهی	تیمار	میانگین (گرم)	Std. Error	حداکثر (گرم)	حداقل (گرم)	حداکثر (گرم)
روهو	۳درصد جایگزین	a 1. 92	. 01	1. 94	1. 91	1. 94
	۵درصد جایگزین	a 1. 92	. 04	2. 00	1. 86	2. 00
	۷درصد جایگزین	a 1. 89	. 02	1. 92	1. 85	1. 92
مریگال	۳درصد جایگزین	a 1. 43	. 07	1. 50	1. 29	1. 50
	۵درصد جایگزین	a 1. 43	. 08	1. 60	1. 35	1. 60
	۷درصد جایگزین	a 1. 48	. 07	1. 60	1. 36	1. 60
کاتلا	۳درصد جایگزین	a 1. 85	. 10	2. 01	1. 68	2. 01
	۵درصد جایگزین	a 1. 98	. 05	2. 06	1. 89	2. 06
	۷درصد جایگزین	a 1. 92	. 12	2. 09	1. 68	2. 09

میزان ضریب رشد ویژه (SGR) در کپور ماهیان مرسوم در جدول ۱۲ نشان داده شده است، آنالیز واریانس داده های

جدول فوق نشان می دهد در ۲ گونه فیتوفاگ و کپور معمولی بین ۴ تیمار آزمایشی تفاوت معنی دار می باشد، آزمون

دانکن نتایج حاصله بیانگر وجود تفاوت معنی دارین تیمار شاهد (۱/۷۲ فیتو فاگ و ۲/۱۸ در کپور) و با تیمارهای جایگزینی

کپور هندی در هردو گونه فیتوفاگ و کپور معمولی (به ترتیب ۱/۹۷ و ۲/۴۷) در تیمار ۷۰ درصد جایگزین می باشد.

جدول ۱۲- میزان ضریب رشد ویژه (SGR) در کپور ماهیان مرسوم در تیمارهای مختلف

گونه ماهی	تیمار	میانگین (گرم)	Std. Error	حداکثر (گرم)	حداقل (گرم)	حداکثر (گرم)
فیتو فاگ	۳درصد جایگزین	1.72	.05	1.65	1.81	1.81
	۵درصد جایگزین	1.89	.02	1.87	1.92	1.92
	۷درصد جایگزین	1.98	.05	1.90	2.07	2.07
	شاهد	1.77	.04	1.72	1.84	1.84
آمور	۳درصد جایگزین	2.09	.04	2.01	2.15	2.15
	۵درصد جایگزین	2.18	.04	2.11	2.25	2.25
	۷درصد جایگزین	2.22	.05	2.13	2.29	2.29
	شاهد	2.03	.09	1.84	2.14	2.14
کپور معمولی	۳درصد جایگزین	2.44	.05	2.37	2.53	2.53
	۵درصد جایگزین	2.44	.05	2.34	2.50	2.50
	۷درصد جایگزین	2.48	.02	2.45	2.52	2.52
	شاهد	2.19	.05	2.12	2.29	2.29
بیگ هد	۳درصد جایگزین	1.86	.19	1.67	2.04	2.04
	۵درصد جایگزین	2.16	.10	2.06	2.25	2.25
	۷درصد جایگزین	2.16	.08	2.03	2.29	2.29
	شاهد	2.03	.06	1.92	2.13	2.13

ضریب چاقی ((condition Factor

میزان ضریب چاقی در ماهیان مختلف صرف نظر از تیمار و تکرارهای آزمایشی برای هر یک کوچک از گونه هادر طول دوره

پرورش محاسبه گردیده و در جداول ۱۴ و ۱۵ آمده است آنالیز واریانس میانگین ضریب چاقی در ماهی میریگال در طول

دوره مشابه اختلاف معنی داری بین آنها وجود ندارد ولی این اختلاف در ماهیان روح و کاتلا در ماهیان مختلف باهم

متفاوت بوده و اختلاف بین آنها معنی دارمی باشند. آزمون دانکن داده های فوق نشان میدهد در ماهیان روح و کاتلا این

اختلاف بین ابتدای دوره (اردی بهشت) و سایر ماهیان نمونه گیری و انتهای دوره میباشد (نمودار ها ۱۹ و ۲۰).


جدول ۱۳- میزان ضریب چاقی کپور ماهیان هندی در طول دوره پرورش

حداکثر (گرم)	حداقل (گرم)	Std. Error	میانگین (گرم)	تیمار	گونه ماهی
1. 28	1. 07	. 02	1. 16	۱۲۰ اردیبهشت	روهو
1. 75	1. 11	. 02	1. 39	اول تیرماه	
1. 58	1. 05	. 01	1. 37	۱۵ مردادماه	
2. 57	1. 20	. 03	1. 39	اول مهرماه	
1. 51	1. 17	. 01	1. 32	۲۰ آبانماه	
1. 10	. 95	. 02	1. 02	۱۲۰ اردیبهشت	مریگال
1. 59	1. 00	. 03	1. 14	اول تیرماه	
1. 35	. 91	. 02	1. 14	۱۵ مردادماه	
1. 29	. 94	. 01	1. 11	اول مهرماه	
2. 70	. 85	. 01	1. 11	۲۰ آبانماه	
1. 36	1. 11	. 02	1. 23	۱۲۰ اردیبهشت	کاتلا
1. 89	1. 21	. 02	1. 66	اول تیرماه	
2. 28	. 43	. 04	1. 57	۱۵ مردادماه	
1. 68	1. 23	. 01	1. 51	اول مهرماه	
2. 34	. 98	. 01	1. 49	۲۰ آبانماه	


جدول ۱۴- میزان ضریب چاقی کپور ماهیان مرسوم در طول دوره پرورش

حداکثر (گرم)	حداقل (گرم)	Std. Error	میانگین (گرم)	تیمار	گونه ماهی
1. 50	. 84	. 02	1. 21	اول تیرماه	فیتوفاگ
1. 44	. 79	. 01	1. 13	۱۵ مردادماه	
1. 39	. 40	. 02	1. 13	اول مهرماه	
1. 36	. 14	. 01	1. 14	۲۰ آبانماه	
1. 78	. 56	. 04	1. 44	اول تیرماه	آمور
2. 21	. 87	. 03	1. 47	۱۵ مردادماه	
1. 86	1. 20	. 02	1. 51	اول مهرماه	
1. 70	. 80	. 01	1. 34	۲۰ آبانماه	
3. 14	. 99	. 07	1. 89	اول تیرماه	کپور
2. 58	. 78	. 06	1. 78	۱۵ مردادماه	

2. 54	1. 60	. 03	1. 98	اول مهرماه	
2. 24	1. 19	. 02	1. 74	آبانماه	۲۰
3. 06	. 84	. 07	1. 37	اول تیرماه	
1. 66	. 67	. 03	1. 14	مردادماه	۱۵
1. 51	1. 02	. 02	1. 19	اول مهرماه	
1. 84	. 30	. 02	1. 17	آبانماه	۲۰
					بیک هد



نمودار ۱۹ - نمودار تغییرات ضریب چاقی در کپور ماهیان هندی در طول دوره پرورش



نمودار ۲۰- نمودار مقایسه ضریب چاقی در کپور ماهیان هندی با سایر کپور ماهیان

پرورش در استخراهای پروواری استان گیلان:

نتایج پرورش ماهی در استخرهای پرووار بنده در سال ۱۳۸۸ نیز نشان دهنده قابلیت رشد ۳ گونه ماهی وارداتی (کاتلا - روهو - مریگال) در شرایط اقلیمی استان گیلان می باشد(شکل ۱۳). بررسی نتایج نشان میدهد نرخ بازماندگی در گونه های مختلف متفاوت بوده که بیشترین آن مربوط به کاتلا با ۹۷ درصد و کمترین مربوط به روهو با ۷۰ درصد بدست آمد . اختلاف معنی دار در وزن نهایی حاصل شده بین سه گونه معرفی شده در هر یک از تیمارهای پرورشی وجود داشت($P<0.01$) . متوسط وزن نهایی در تیمار حاوی ۳۰٪ کپور هندی (تیمار ۱) در خصوص روهو ، مریگال و کاتلا به ترتیب ۳۳۶ گرم و ۵۸۸ گرم بود . در تیمار ۲ (با نسبت ۵۰٪ کپور هندی) متوسط وزن نهایی در خصوص روهو ، مریگال و کاتلا به ترتیب ۴۶۴ گرم و ۴۷۵ گرم و ۷۰۸ گرم بود (جدول ۱۵). در تیمار سوم (حاوی ۷۰٪ روهو ، مریگال و کاتلا به ترتیب ۴۶۷ گرم و

کپور هندی) نتایج حاکی از متوسط وزن نهایی در خصوص روهو ، مریگال و کاتلا به ترتیب معادل ۶۶۷ گرم ۴۲۰ و ۷۳۴ گرم بود . در عین حال نتایج تست دانکن افزایش معنی دار متوسط وزن نهایی روهو ، مریگال و کاتلا را به ترتیب از تیمار ۱ با ۳۰ درصد پور هندی تا تیمار ۳ با ۷۰ درصد کپور هندی تایید مینماید ($P<0.01$) .

جدول ۱۶ بیانگر رشد وزنی و طولی ماهی کپور هندی و چینی در کشت توام با نسبت های مختلف در قالب تیمار های ۳ گانه می باشد . در پایان دوره پرواری در تیمار ۱ میانگین وزن ماهی روهو $۲۰۱/۷۱ \pm ۶۳۴/۵۶$ گرم و میانگین طول معادل $۳۳۶/۸۳ \pm ۱۰۵/۱۰$ ۳۵/۹ ± ۳/۴۸ سانتی متر بدست آمد . در خصوص مریگال میانگین وزن و طول به ترتیب $۴۹.۵۸۸ \pm ۳/۱۶$ گرم وزن و $۱۸.۳۲ \pm ۳/۱۸$ سانتی متر بود . کاتلا نیز به ترتیب دارای $۱۵۴/۹۷ \pm ۳۴/۶۷$ گرم و $۷۱۵/۲۹ \pm ۱۱۰/۶$ گرم و $۱/۷۷$ سانتی متر طول بود . این در حال است که میانگین وزن و طول در ماهی فیتو فاگ $۱۲۰۱/۹۲ \pm ۳۰۷/۲۹$ گرم و $۴۰/۰۱ \pm ۳۳۴/۳۰$ سانتی متر ، در آمور $۱۲۰۱/۹۲ \pm ۳۰۷/۲۹$ گرم و ۴۲.۴۷ ± ۲۲.۳ سانتی متر در کپور معمولی متر $۳۴۲۸/۰۳ \pm ۰/۷۲$ گرم و $۵۴/۰۴ \pm ۰/۷۲$ سانتی متر و در بیگ هد $۱۳۱۵/۸۹ \pm ۲۴۷/۸۲$ گرم و $۴۸/۰۱ \pm ۲/۹۵$ سانتی متر بدست آمد .

جدول ۱۵- تولید کل ماهیان از سه گونه کپور هندی

تیمار ۳ (هندی ۷۰؛ چینی ۳۰)			تیمار ۲ (جینی ۵۰؛ هندی ۵۰)			تیمار ۱ (هندی ۳۰؛ چینی ۷۰)			تیمار	پارامتر
کاتلا	مریگال	روهو	کاتلا	مریگال	روهو	کاتلا	مریگال	روهو		
۲۱	۲۱	۶۳	۱۵	۴۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	تعداد ذخیره سازی	
۹۷	۹۲	۷۰	۸۹	۹۴	۷۱	۹۱	۹۳	۸۹	نرخ ماندگاری	
۱۶	۱۰	۱۴.۱۷	16.2	۱۰.۳۳	۱۴.۶۷	۱۶	۱۰.۵۳	۱۴.۷۰	متوسط وزن اولیه (g)	
۷۳۴.۰۵	۴۲۰.۳۳	667	۷۰۸.۹۹	۳۵۶.۲۷	۶۴۷.۷۴	۵۸۸.۴۹	۳۳۶.۸۳	۶۳۴.۵۶	متوسط وزن نهایی (g)	
۷۱۸.۰۵	406.33	656.83	697.99	۳۳۹.۹۴	۶۴۰.۰۷	۵۷۲.۴۹	۳۲۲.۱۶	۶۲۳.۸۶	متوسط افزایش وزن بدن (g)	
۱۵.۴	۹.۳	۲۸.۹	۹.۷	۱۴.۶	۷	۸	۴.۷	۸.۷۱	کل تولید به ازاء استخر / سال (kg)	
۳۴۲	۲۰۶	۶۴۲	۲۱۵	۳۳۴	۱۵۵	۱۷۶	۱۰۵.۵	۱۹۳	کل تولید به ازاء هکتار / سال (kg)	

جدول ۱۶- رشد وزنی و طولی گونه های ماهی کپور هندی در کشت توان با نسبت های مختلف هندی و چینی

شاهد (کپور چینی) ٪ ۱۰۰	۳ نسبت کپور چینی به هندی (۷۰:۳۰)	۲ نسبت کپور چینی به هندی (۵۰:۵۰)	۱ نسبت کپور چینی به هندی (۳۰:۷۰)	تیمار گونه
-----	۹۵۶.۸۳ ± 92.66	647.74 ± 164.23	634.56 ± 201.71	وزن (g) روهو
-----	۳۱.۰۸ ± 8.90	36.79 ± 2.36	35.93 ± 3.48	طول(cm)
-----	420.33 ± 17.45	356.27 ± 29.46	336.83 ± 105.10	وزن (g) مریگال
-----	34.79 ± 0.57	32.74 ± 0.70	32.18 ± 3.18	طول(cm)
-----	734.05 ± 118.66	708.99 ± 112.05	588.49 ± 154.97	وزن (g) کاتلا
-----	37.30 ± 1.64	37.24 ± 1.83	34.67 ± 3.16	طول(cm)
876.55 ± 264.80	1081.35 ± 145.98	896.03 ± 104.04	715.29 ± 110.60	وزن (g) فیتوفاگ
42.29 ± 4.1	45.45 ± 1.85	42.79 ± 2.43	40.01 ± 1.77	طول(cm)
882.87 ± 547.98	1385.74 ± 128.92	1170.84 ± 312.52	1201.92 ± 307.29	وزن (g) آمور
43.48 ± 8.76	49.40 ± 2.08	47.68 ± 3.59	47.42 ± 3.22	طول(cm)
3646.00 ± 677.62	3310.47 ± 801.22	3579.58 ± 454.42	3428.03 ± 334.30	وزن (g) کپور
56.04 ± 2.46	53.87 ± 3.32	54.96 ± 1.74	54.04 ± 0.72	طول(cm)
2245.50 ± 301.133	1873.33 ± 216.01	1871.67 ± 195.78	1315.89 ± 247.82	وزن (g) بیگ هد
54.94 ± 5.16	54.42 ± 1.91	53.25 ± 1.91	48.01 ± 2.95	طول(cm)



شکل ۱۳- نمونه ای از تور کشی سال ۱۳۸۸ از استخر کپور ماهیان هندی و چینی

میانگین تولید در استخر های پرورشی در خصوص گونه های مختلف در جدول ۱۷ آورده شده است . نتایج حاکی از اختلاف معنی دار در میزان تولید ماهیان براساس گونه در استخر های پرورشی تحت تیمار بوده ($P<0.01$) به نحوی که روهو با $25/2$ گیلو گرم بیشترین مقدار را در تیمار ۳ و مریگال با 15 کیلو گرم در تیمار ۲ و کاتلا با 14 کیلو گرم در تیمار ۳ از بیشترین میزان تولید برخوردار بوده اند . نتایج نشان داد که بین میانگین تولید حاصله از کپور ماهیان چینی و هندی اختلاف معنی دار وجود دارد ($P<0.01$) . از بین کپور ماهان چینی کپور نقره ای با $38/1$ کیلو گرم در تیمار ۱ و آمور با $30/7$ کیلو گرم در تیمار ۱ و کپور معمولی با $28/4$ کیلو گرم در تیمار ۱ و ماهی بیگ هد با 8 گیلو گرم در تیمار ۲ بیشترین مقادیر تولیدی را به خود اختصاص داده اند . در مجموع کپور معمولی بیشترین اختلاف معنی دار را در بین تولیدات گونه های مختلف در تیمار ها به خود اختصاص داد ($P<0.01$) .

جدول ۱۷- میانگین تولید و انحراف معیار تولید کپور ماهیان چینی و هندی در تیمارهای مورد بررسی در استخر های ۴۵۰ متر مربع

تیمار		30H/70C	50H/50C	70H/30C
Roho	انحراف معیار \pm میانگین (گرم)	8405.33 ± 2483.00	6627.33 ± 823.91	25216.54 ± 7143.93
Merigal	انحراف معیار \pm میانگین(گرم)	4751.00 ± 1724.36	15025.67 ± 191.01	9888.33 ± 296.76
Catla	انحراف معیار \pm میانگین(گرم)	7912.67 ± 1584.01	9326.73 ± 1973.83	14881.55 ± 2039.88

Silver carp	انحراف معیار \pm میانگین(گرم)	38181.00 \pm 6226.75	35454.00 \pm 4149.25	26258.00 \pm 2989.03
Grass Carp	انحراف معیار \pm میانگین(گرم)	30743.92 \pm 7219.39	20755.64 \pm 5968.13	14368.18 \pm 2165.74
Common Carp	انحراف معیار \pm میانگین(گرم)	28439.67 \pm 969.93	20243.67 \pm 3048.79	12472.33 \pm 9017.57
Big head	انحراف معیار \pm میانگین(گرم)	7895.33 \pm 1486.93	8046.00 \pm 501.96	5476.00 \pm 1231.06

میانگین ، حداکثر ، حداقل وزن و طول ماهیان کپور هندی و چینی و کپور معمولی در یک دوره پرورش در جدول ۱۸ اورده شده است. نتایج نشان میدهد که ماهی کاتلا دارای حداکثر وزن ۸۹۵.۶ گرم و حداقل ۴۷۴.۶ گرم و روهو حداکثر وزن ۷۵۵.۳ گرم و حداقل ۴۸۴.۶ گرم و در خصوص مریگال حداکثر وزن ۴۵۹.۰ گرم و حداقل ۲۹۵.۶ گرم و در مورد فیتوفاگ حداکثر وزن ۱۰۷۱.۰ گرم و حداقل ۶۷۱.۰ گرم و برای آمور حداکثر وزن ۱۴۹۰.۲ گرم و حداقل ۹۳۵.۷ گرم و برای بیگ هد حداکثر وزن ۱۵۱۳.۱ گرم و حداقل ۱۸۴۰.۱ گرم و حداقل ۲۶۴۳.۷ گرم می باشد . معمولی حداکثر وزن ۴۳۴۶.۳ گرم و حداقل ۲۶۴۳.۷ گرم می باشد.

جدول ۱۸- میانگین ، حداکثر ، حداقل وزن ماهیان کپور هندی و چینی و کپور معمولی در یک دوره پرورش

عامل گونه ماهی	حداقل		حداکثر		میانگین	
	cm/ طول	g / وزن	cm/ طول	g / وزن	cm/ طول M \pm SD	g / وزن M \pm SD
کاتلا	33.1	474.6	39.9	895.6	36.4 \pm 2.4	677.2 \pm 131.2
روهو	34.1	484.6	38.3	755.3	37.9 \pm 5.5	616.8 \pm 142.9
مریگال	31.2	295.6	35.2	459.0	33.2 \pm 2.0	371.1 \pm 67.0
فیتوفاگ	39.5	671.0	45.4	1071.0	42.7 \pm 2.9	897.6 \pm 190.3
آمور	44.5	935.7	51.5	1490.2	48.2 \pm 2.8	1252.8 \pm 249.6
بیگ هد	49.7	1513.1	53.9	1840.1	51.9 \pm 3.6	1687.0 \pm 337.7
کپور معمولی	50.7	2643.7	58.5	4346.3	54.3 \pm 2.0	3439.4 \pm 503.7

بررسی نتایج حاصل از افزایش رشد وزنی ماهی در ماه های مختلف سال حاکی از وجود اختلاف معنی دار ($P < 0.01$)

در میانگین وزنی هر ۷ گونه ماهی ائم از کپور های چینی و هندی در ماه های مختلف بوده بطوری که ماهی در ماه اردیبهشت تا تیر ماه بیشترین میزان افزایش وزن و در ماه آبان تا آذر کمترین میزان افزایش وزن حاصل شد. چنانچه در جدول ۱۹ نشان داده شده است ماهی روهو در فاصله ماه های اردیبهشت تا تیر افزایش وزنی معادل 5.25 ± 20.85 و با روند کاهشی در آبان و آذر به 0.02 ± 0.04 - رسیده است. در خصوص گونه مریگال در فاصله ماه های اردیبهشت تا تیر افزایش وزنی معادل 2.99 ± 6.68 و با روند کاهشی در آبان و آذر به 0.11 ± 0.07 - و در مورد کاتلا در فاصله ماه های اردیبهشت تا تیر افزایش وزنی معادل 9.38 ± 22.70 و با روند کاهشی در آبان و آذر به 0.03 ± 0.06 رسید. این روند در خصوص کپور ماهیان چینی نیز مشابه بوده و روند کاهشی افزایش وزن از اردیبهشت تا آذر ماه قابل مشاهده است(شکل ۱۳). در عین حال کپور معمولی بطور معنی داری در طی ماه های شهریور تا مهر افزایش وزن داشته ($P < 0.01$) و سپس روند کاهش ورن در این ماه نیز قابل مشاهده است.

جدول ۱۹- افزایش وزن کپور ماهیان هندی و چینی در تیمار پرورشی در ماه های مختلف سال در ایستگاه سفید رود

گونه	اردیبهشت - تیر $M \pm SD$	مرداد - شهریور $M \pm SD$	شهریور - آبان $M \pm SD$	آبان - آذر $M \pm SD$
روهو	20.85 ± 5.25	1.02 ± 0.17	0.33 ± 0.05	-0.04 ± 0.02
مریگال	6.68 ± 2.99	0.38 ± 0.09	-0.05 ± 0.50	-0.07 ± 0.11
کاتلا	22.70 ± 9.38	1.33 ± 0.50	-0.20 ± 0.53	-0.06 ± 0.03
فیتو فاگ	12.54 ± 4.85	1.50 ± 0.11	-0.12 ± 0.70	-0.01 ± 0.06
آمور	37.83 ± 9.15	1.01 ± 0.32	0.40 ± 0.18	-0.04 ± 0.58
کپور معمولی	61.37 ± 22.49	1.77 ± 0.65	0.76 ± 0.22	-0.06 ± 0.50
بیگ هد	17.00 ± 5.54	1.23 ± 0.15	0.50 ± 0.02	0.02 ± 0.03

ضریب رشد ویژه در ماهی روهو مریگال و کاتلا در ماههای اردیبهشت تا تیر به ترتیب معادل 0.34 ± 0.391 ، 4.51 ± 0.13 و $2.24 \pm 0.09 \pm 0.17 \pm 0.26$ و $6.02 \pm 0.02 \pm 0.13$ و 0.07 ± 0.07 محسوبه شد (جدول ۲۰). همچنین ضریب رشد ویژه برای ماهی فیتو فاگ و آمور و کپور معمولی و بیگ هد به ترتیب معادل $0.12 \pm 0.02 \pm 0.03$ ، $0.18 \pm 0.12 \pm 0.06$ و $0.27 \pm 0.27 \pm 0.06$ بودت آمد. نتایج حاکی از وجود اختلاف معنی دار ($P < 0.01$) در ضریب رشد ویژه گونه های مختلف کپور هندی و چینی در طی ماه های مختلف سال می باشد (شکل ۱۲).

جدول ۲۰- ضریب رشد ویژه کپور ماهیان هندی و چینی در تیمار پرورشی در ایستگاه سفید رود در ماه های مختلف سال


گونه	اردیبهشت - تیر $M \pm SD$	تیر - مرداد $M \pm SD$	مرداد - شهریور $M \pm SD$	شهریور - آبان $M \pm SD$	آبان - آذر $M \pm SD$
روهو	4.51 ± 0.34	2.34 ± 0.27	0.95 ± 0.13	0.35 ± 0.04	-0.09 ± 0.03
مریگال	3.91 ± 2.24	2.77 ± 0.73	1.06 ± 0.21	0.34 ± 0.04	-0.17 ± 0.26
کاتلا	6.02 ± 3.02	2.42 ± 0.32	0.84 ± 0.28	0.12 ± 0.08	-0.13 ± 0.07
فیتو فاگ	4.99 ± 2.59	3.05 ± 0.14	1.62 ± 0.20	0.48 ± 0.13	-0.02 ± 0.12
آمور	6.72 ± 2.00	2.29 ± 0.56	1.10 ± 0.44	0.40 ± 0.24	-0.18 ± 0.12
کپور معمولی	7.65 ± 2.71	3.33 ± 0.84	1.87 ± 0.44	0.36 ± 0.25	0.27 ± 0.27
بیگ هد	5.48 ± 2.59	2.67 ± 0.22	1.36 ± 0.04	0.22 ± 0.11	0.03 ± 0.06

همچنین بررسی نرخ ماندگاری در گونه های مختلف در دوره پرورش نیز اختلاف معنی دار ($P < 0.01$) را بین این گونه ها نشان داد(جدول ۲۱). کمترین نرخ ماندگاری مربوط به ماهی روهو (۷۷٪) و بیشترین آن مربوط به ماهی آمور (۹۸٪) می باشد(جدول ۱۰ و شکل ۱۱).

جدول ۲۱- نرخ ماندگاری ماهیان در پرورش توان کپور چینی و هندی


	Roho	Merigal	Catla	Phytophag	Grass Carp	Common Carp	Big head
نرخ ماندگاری	77	93	92	82	98	78	97

مقایسه میانگین نرخ ماندگاری کپور ماهیان هندی در سه تیمار پرورشی




شکل ۱۱- میانگین درصد بقا به تفکیک تیمار های ماهیان پرورشی در ایستگاه استانه اشرفیه

نمودار مقایسه میانگین ضریب رشد ویژه ماهیان کپور هندی و چینی




شکل ۱۲- ضریب رشد ویژه در طی ماه های مختلف




شکل ۱۳- تغییرات میانگین وزن در ماههای مختلف پرورش

نتایج حاصل از تولید بیانگر وجود اختلاف معنی دار ($P<0.01$) در سه تیمار پرورشی از نظر حجم کل تولید محصول بوده به طوری که تیمار ۱ از بیشترین سهم و تیمار ۳ از کمترین سهم تولید برخوردار بوده اند . میانگین تولید در تیمار های مختلف نسبت به شاهد کاهش نسبی و معنی داری را نشان می دهد(شکل ۱۴) . همچنین میانگین برداشت بر اساس گونه ها نیز نشان دهنده غالیت دو گونه کپور معمولی و فیتوفاگ وسپس آمور و روهو در تیمار های پرورشی می باشد(شکل ۱۵).




شکل ۱۴- متوسط تولید کپور ماهیان به تفکیک تیمار های پرورشی



شکل ۱۵- متوسط تولید کپور ماهیان به تفکیک گونه در هر یک از تیمارهای پرورشی

میانگین رشد طولی کپور ماهیان چینی و هندی به تفکیک گونه در هر یک از تیمارهای پرورشی در شکل ۱۶ آورده شده است. کمترین طول مربوط به مریگال در هر ۳ تیمار پرورشی بوده و بیشترین طول مربوط به کپور معمولی و بیگ هد میباشد. علیرغم وجود اختلاف معنی دار ($P < 0.01$) در میانگین رشد طولی کپور ماهیان هندی و چینی در تمامی تیمارها، لکن در تیمار شاهد اختلاف معنی دار در طول کپور معمولی و بیگ هد و همچنین بین آمور و فیتو فاگ مشاهده نشد.



شکل ۱۶- میانگین رشد طولی کپور ماهیان چینی و هندی به تفکیک گونه در هر یک از تیمارهای پرورشی

روند رشد پرواری کاتلا:

ماهی کاتلا در طی دوره پرورش در استان گیلان دارای نرخ رشد روزانه ۴ تا تیر ماه و ۸/۹۹ تا نیمه مرداد و ۴/۹۷ تا نیمه شهریور و ۰/۸۶ تا آبان و نهایتا ۰/۸۴ بوده است. میانگین وزن ماهی به هنگام رها سازی ۱۱/۲ کیلوگرم بوده که در مدت ۲۰۴ روز به وزن ۶۷۷ کیلوگرم رسیده است (جدول ۲۲). اشکال ۱۷ و ۱۸ مونه های ماهی رشد یافته کاتلا در شرایط اقلیمی استان گیلان را نشان می دهد.

جدول ۲۲- شاخص های رشد کاتلا در استخرخاکی همرا با کپور چینی

شاخص رشد		فاصله دو بین بیومتری (روز)	مدت زمان پرورش (روز)	شاخص های بیومتری		تاریخ
نرخ رشد روزانه (گرم) در روز)	SGR (%)			میانگین وزن گرم)	طول سانتی متر)	
		0	0	11.20	9.86	۸۸/۲/۲
4.00	5.18	37	37	251.82	24.15	۸۸/۴/۸
8.99	2.42	36	73	521.40	31.83	۸۸/۵/۱۳
4.97	0.84	35	108	677.02	34.72	۸۸/۶/۱۷
0.86	0.12	47	155	715.91	36.34	۸۸/۸/۳
-0.84	-0.13	54	204	677.18	36.40	۸۸/۹/۲۷



شکل ۱۷- ماهی کاتلا پرورش یافته در استخراهای استانه اشرفیه در سال ۱۳۸۸



شکل ۱۸- وزن ۸۵۰ گرم از ماهی کاتلا پرورش یافته در استخراهای استانه اشرفیه در سال ۱۳۸۸

روند رشد پرواڑی روهو:

ماهی روهو در طی دوره پرورش در استان گیلان دارای نرخ رشد روزانه $3/11$ تا تیر ماه و $6/62$ تا نیمه مرداد و $4/31$ تا نیمه شهریور و $2/03$ تا آبان و نهایتا $0/52$ -تا دیماه سال ۸۸ بوده است . میانگین وزن ماهی روهو به هنگام رها سازی $8/95$ گرم بوده که در مدت 20.4 روز به وزن 594 گرم رسیده است(جدول ۲۳). شکل 19 نمونه‌ی ماهی رشد یافته روهو در شرایط اقلیمی استان گیلان را در سال 1388 نشان می‌دهد .

جدول ۲۳-شاخص‌های رشد روهو در استخرخاکی همرا با کپور چینی

شاخص رشد		فاصله دو بین بیومتری (روز)	مدت زمان پرورش (روز)	شاخص‌های بیومتری		تاریخ
نرخ رشد روزانه (گرم) در روز)	SGR (%)			میانگین وزن (گرم)	طول سانتی متر)	
		0	0	8.95	10.14	۸۸/۲/۲
3.11	5.11	37	37	195.59	22.68	۸۸/۴/۸
6.62	2.34	36	73	401.19	29.78	۸۸/۵/۱۳
4.31	0.95	35	108	483.41	32.72	۸۸/۶/۱۷
2.03	0.35	47	155	644.92	35.92	۸۸/۸/۳
-0.52	-0.09	54	204	594.89	37.83	۸۸/۹/۲۷



شکل ۱۹- ماهی روهو پرورش یافته در استخر های استانه اشرفیه در سال ۱۳۸۸

روند رشد پرواری مریگال:

ماهی مریگال در طی دوره پرورش در استان گیلان دارای نرخ رشد روزانه $1/53$ تا تیر ماه و $4/43$ تا نیمه مرداد و $3/01$ تا نیمه شهریور و $1/24$ تا آبان و نهایتا $0/61$ - تا دیماه سال ۸۸ بوده است . میانگین وزن ماهی مریگال به هنگام رها سازی $13/7$ گرم بوده که در مدت $20/4$ روز به وزن 393 گرم رسیده است(جدول ۲۴). اشکال 21 و 20 نمونه های ماهی رشد یافته مریگال در شرایط اقلیمی استان گیلان را در سال ۱۳۸۸ نشان می دهد .

جدول ۲۴- شاخص های رشد مریگال در استخر خاکی همراه با کپور چینی

شاخص رشد		فاصله دو یعنی بیومتری (روز)	مدت زمان پرورش (روز)	شاخص های بیومتری		تاریخ
نرخ رشد روزانه در روز)	SGR (%)			میانگین وزن گرم)	طول سانتی متر)	
		0	0	13.70	11.18	۸۸/۲/۲
1.53	3.32	37	37	107.75	20.83	۸۸/۴/۸
4.43	2.77	36	73	238.23	27.14	۸۸/۵/۱۳
3.01	1.06	35	108	362.52	31.24	۸۸/۶/۱۷

1.24	0.34	47	155	373.82	32.85	۸۸/۸/۳
-0.61	-0.17	54	204	393.10	33.34	۸۸/۹/۲۷



شکل ۲۰- ماهی مریگال پرورش یافته در استخر های استانه اشرفیه در سال ۱۳۸۸



شکل ۲۱- ماهی مریگال با ورن بیشتر از ۵۰۰ گرم پرورش یافته در استخر های استانه اشرفیه در سال ۱۳۸۸

روند رشد پرواری کپور ماهیان چینی :

کپور ماهیان چینی در طی دوره پرورش در استان گیلان دارای بیشترین نرخ رشد روزانه ۳۵/۶۸ ، ۸/۷۳ ، ۱۷/۵۷ و ۱۲/۷۴ به ترتیب برای کپور معمولی و فیتو فاگ و بیگ هد و آمور در سال ۸۸ بوده که در دیماه به حداقل خود رسیده اند . (جداول ۲۵-۲۶-۲۷-۲۸).

جدول ۲۵- شاخص های رشد فیتوفاک در استخرخاکی همراه با کپور هندی

شاخص رشد نرخ رشد روزانه (گرم) در روز)	SGR (%)	فاصله دو بین بیومتری (روز)	مدت زمان پرورش (روز)	شاخص های بیومتری میانگین وزن گرم)	طول سانتی متر)	تاریخ
		0	0	13.00	10.63	۸۸/۲/۲
2.59	4.28	37	37	166.46	24.11	۸۸/۴/۸
8.41	3.05	36	73	410.08	32.33	۸۸/۵/۱۳
8.73	1.62	35	108	676.81	39.42	۸۸/۶/۱۷
3.72	0.48	47	155	896.17	42.56	۸۸/۸/۳
-0.15	-0.02	54	204	895.46	42.70	۸۸/۹/۲۷

جدول ۲۶- شاخص های رشد آمور در استخرخاکی همراه با کپور هندی

شاخص رشد نرخ رشد روزانه (گرم) در روز)	SGR (%)	فاصله دو بین بیومتری (روز)	مدت زمان پرورش (روز)	شاخص های بیومتری میانگین وزن گرم)	طول سانتی متر)	تاریخ
		0	0	10.40	9.77	۸۸/۲/۲
6.35	6.06	37	37	377.30	28.34	۸۸/۴/۸

12.74	2.29	36	73	747.81	37.52	۸۸/۵/۱۳
10.16	1.10	35	108	1053.56	43.47	۸۸/۶/۱۷
5.06	0.40	47	155	1295.47	47.95	۸۸/۸/۳
-2.38	-0.18	54	204	1215.84	47.70	۸۸/۹/۲۷

جدول ۲۷- شاخص های رشد کپور معمولی در استخرخاکی همرا با کپور هندی

شاخص رشد نرخ رشد روزانه گرم) در روز(SGR (%)	فاصله دو بین بیومتری (روز)	مدت زمان پرورش (روز)	شاخص های بیومتری میانگین وزن گرم)(طول سانتی متر)	تاریخ
		0	0	10.50	9.29	۸۸/۲/۲
9.30	6.82	37	37	609.11	29.68	۸۸/۴/۸
29.72	3.33	36	73	1398.85	39.34	۸۸/۵/۱۳
35.68	1.87	35	108	2357.44	46.64	۸۸/۶/۱۷
10.86	0.36	47	155	3109.59	51.88	۸۸/۸/۳
11.20	0.27	54	204	3460.02	54.47	۸۸/۹/۲۷

جدول ۲۸- شاخص های رشد بیگ هد در استخرخاکی همرا با کپور هندی

شاخص رشد نرخ رشد روزانه گرم) در روز(SGR (%)	فاصله دو بین بیومتری (روز)	مدت زمان پرورش (روز)	شاخص های بیومتری میانگین وزن گرم)(طول سانتی متر)	تاریخ
-----	-----	0	0	24.10	13.55	۸۸/۲/۲
6.84	4.76	37	37	435.85	31.37	۸۸/۴/۸
17.57	2.67	36	73	971.19	41.18	۸۸/۵/۱۳
16.22	1.36	35	108	1463.81	47.24	۸۸/۶/۱۷
3.60	0.22	47	155	1578.49	51.21	۸۸/۸/۳
0.41	0.03	54	204	1742.82	52.20	۸۸/۹/۲۷

نتایج هیدروشیمی در استان گیلان:

نتایج آنالیز فیزیکی و شیمیایی آب در ۴ دور نمونه برداری در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در جداول ۲۹ و ۳۰ نشان داده شده

است. در سال ۱۳۷۷ تیمارها در سه استخر و در سال ۱۳۸۸ در ۱۲ استخر توزیع شده بودند.

براساس داده های اندازه گیری شده در چهار دور نمونه برداری، در طبقه بندی آب بر اساس هدایت الکتریکی و میزان شوری (عابدینی ، ۱۳۸۴) آب موجود در استخراها در طبقه آبهای شیرین تا اویلگو سالین قرار می گیرند. همچنین بر طبق این داده ها در طبقه بندی آب بر اساس میزان سختی (Claude , 1990) آب موجود در استخراها در طبقه آبهای سخت قرار می گیرند . طبق این اندازه گیری ها و در طبقه بندی آب بر اساس مقدار pH آب استخراها در طبقه آب سفت قرار می گیرند. قلیایی قرار میگیرد.

جدول ۲۹- پارامتر های فیزیکی و شیمیایی استخراها پرورشی(۳ استخر) در ابتدای دوره پرورش سال ۱۳۸۸

ابستگاه	۱ استخر	۲ استخر	۳ استخر
(oC) دمای آب	21	21.2	21.1
(ms/cm) هدایت الکتریکی	0.79	0.7	0.71
PH	8.12	8.27	8.10
(F.T.U) کدورت	34	50	28
(mg/l) کلسیم	67.7	65	61
(mg/l) منیزیم	13	17	23
(mg/l) سدیم	25.5	25.3	25.5
(mg/l) پتاسیم	2.63	2.46	1.97
(mg/l) سختی کل	222	232	246
(mg/l) کلروور	146	149	147
(mg/l) اکسیژن محلول	8.2	11.7	11.3

کربنات (mg/l)	-	12	-
بیکربنات (mg/l)	152.5	134.2	140.3
گاز کربنیک (mg/l)	1	-	1
قیلائیت تام (mg/l)	2.5	2.6	2.3
فسفات محلول (mg/l)	0.051	0.06	0.055
فسفات کل (mg/l)	0.076	0.173	0.077
اوز نیتریت (mg/l)	0.029	0.001	0.001
اوز نیترات (mg/l)	0.05	0.017	0.037
اوز کل (mg/l)	0.762	1.21	0.598
سیلیس (mg/l)	27.6	20.7	35.2
سولفات (mg/l)	34.7	33.3	30.9
T.S.S (mg/l)	0.022	0.049	0.03
Satu%	103.2	146.4	141.5

جدول ۳۰- پارامتر های فیزیکی و شیمیایی استخر های پرورشی در انواع دوره پرورش سال ۱۳۸۸

ایستگاه	۱۲ استخر	۱۱ استخر	۱۰ استخر	۹ استخر	۸ استخر	۷ استخر	۶ استخر	۵ استخر	۴ استخر	۳ استخر	۲ استخر	۱ استخر
دهمای آب (oC)	21	22	21	22	21	22	21	22	21	21	20.5	
هدایت ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	836	753	816	796	814	772	836	787	835	841	832	الکتریکی
PH	7.65	7.58	7.79	7.68	7.64	7.52	7.71	7.56	7.66	7.72	7.82	
کدوروت (F.T.U)	21	51	47	50	23	23	24	16	14	68	27	
کلسینیوم (mg/l)	76	37.5	54	57	69	63	39	49	58	58.5	74	
منیزیم (mg/l)	10	26	15	12	11.5	8.6	29	27	24	28	18.2	
سختی کل (mg/l)	230	302	196	194	220	194	217	234	246	262	261	
کلرور (mg/l)	130	137	138	130	137	139	146	142	144	142	146	
کسیزن (mg/l) محلول	3.5	2	4	4	2	2	4	3.5	1.5	3.6	6.3	
کربنات (mg/l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
گاز کربنیک (mg/l)	275	244	262	262	275	232	281	256	262	262	275	
فیلائیت تام (mg/l)	1.5	2	2	2	4	4.5	4	4	2	1.5	1	
فسفات محلول (mg/l)	4.5	4	4.3	4.3	4.5	3.8	4.6	4.2	4.3	4.3	4.5	
فسفات کل (mg/l)	0.041	0.050	0.045	0.033	0.059	0.056	0.042	0.059	0.052	0.055	0.028	
اوز نیتریت (mg/l)	0.119	0.167	0.168	0.132	0.134	0.125	0.123	0.126	0.115	0.143	0.086	
اوز نیترات (mg/l)	0.009	0.002	0.007	0.007	0.004	0.005	0.02	0.004	0.005	0.022	0.004	
اوز کربنیک (mg/l)	0.032	0.059	0.154	0.037	0.038	0.027	0.062	0.022	0.032	0.042	0.057	

0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.006	(mg/l) آمونیاک
0.087	0.049	0.158	0.158	0.175	0.056	0.160	0.245	0.343	0.312	0.451	(mg/l) ازت آمونیم
1.184	1.002	1.252	0.956	1.24	1.033	1.14	1.058	1.17	1.21	1.06	(mg/l) ازت کل
14	23	22	19	26	17	16	22	30	17	30	(mg/l) سولفات
22.6	17.2	19.8	20	20	20.24	19.9	21.4	21.2	20	19.2	(mg/l) سیلیس
39.5	23	45	46	22.5	23	45	40.2	16.9	40.5	70	Satu%
4.2	22.4	4.2	10.7	0.4	6.8	0.4	0.4	16	31.4	5.5	COD(mg/l)
189	210	208	267	156	170	210	166	126	244	117	T.S.S(mg/l)
1.6	3.3	1.39	1.62	0.7	2.48	3.44	2.43	0.78	3.4	2.6	BOD5(mg/l)
93.6	63.6	55.7	44	61.3	72.7	89	72.9	72.3	68.5	84.6	Satu%

نتایج فیتو پلانکتون:

در مطالعات فیتو پلانکتونی استخراهای پرورشی کپور ماهیان هندی در سال ۱۳۸۸، هفت شاخه شناسایی شدند، که

شامل شاخه جلبک های سبز Bacillariophyta (Diatoms)، شاخه Chlorophyta، و شاخه جلبک های زرد

سبز Xanthophyta، شاخه جلبکهای طلازی Chrysophyta، شاخه جلبکهای سبز آبی

Cyanophyta شاخه او گلنوفیتا Pyrrophyta و شاخه پیرو فیتا Euglenophyta بودند(شکل ۲۲).

در این بررسی شاخه های کلروفیتا با میانگین فراوانی ۶۰۵۶۴ عدد در لیتر و ۵۳/۷ درصد فراوانی وباسیلاریوفیتا با

میانگین فراوانی ۳۹۲۱۷۵۵ عدد در لیتر و ۳۴/۷ درصد بیشترین فراوانی را دارا بودند. شاخه های نامبرده در تمامی

استخراها دوره های نمونه برداری غالیست داشتند. فراوانترین و پر جمیعت ترین جنسهای شاخه کلروفیتا عبارت از

Schroederia، Oocystis، Carteria، Dictyosphaerium، Scenedesmus، Ankistrodesmus

و پر جمیعت ترین جنسهای شاخه باسیلاریوفیتا عبارت از Melosira و Coccconeis


بودند.

شاخه اوگلنوفیتا در رده بعدی است. این شاخه با میانگین فراوانی ۷۵۱۳۱۸ عدد در لیتر ۶/۷ درصد جمعیت فیتوپلانکتونی را دراستخرهای مورد بررسی دارد. مهمترین جنسهای این شاخه *Phacus*, *Euglena*, *Strombomonas*, *Trachelomonas* بودند.

شاخه سیانوفیتا در رده بعدی است. این شاخه ۴/۲ درصد فراوانی فیتوپلانکتونی دراستخرهای پرورشی را دارا است. مهم ترین جنسهای این شاخه *Gomphoshaeria*, *Merismopedia*, *Oscillatoria*, *Microcystis* و *Romeria* بودند.

سایر شاخه های فیتوپلانکتونی که جمعیت کمی دارند عبارتند از شاخه *Xanthophyta* با جنسهای *Pyrrophyta* و ۵/۰ درصد فراوانی و شاخه *Centritractus*, *Botryococcus*, *Ophiocytium* و *Mallomonas* با جنس *Chrysophyta* و ۰/۰ درصد فراوانی و شاخه *Gymnodinium* و *Peridinium* ۵/۰ درصد فراوانی از فیتوپلانکتونهای مشاهده شده دراستخرهای پرورش کپورماهیان هندی هستند.

طی دوره نمونه برداری تیرماه بالاترین و مهرماه کمترین فراوانی فیتوپلانکتونی را دارا هستند، استخر ۹ در تیر ماه با فراوانی ۴۷۸۹۵۶۰۰ عدد در لیتر بیشترین و همین استخر (۹) در خرداد ماه با فراوانی ۲۸۰۰۰۰ عدد در لیتر کمترین جمعیت را دارا بودند. در مجموع (میانگین استخراها در طول بررسی) استخر ۸ با میانگین ۱۶۴۳۶۱۵۰ عدد در لیتر بیشترین واستخر ۲ با میانگین ۳۳۰۷۵۰۰ عدد در لیتر کمترین جمعیت را دارا بودند.




شکل ۲۲- فراوانی گروه های فیتوپلانکتونی در استخراهای پرورشی ۱۳۸۸

نتایج زئوپلانکتون

در بررسی زئوپلانکتونی استخراهای پرورشی کپور ماهیان هندی در سال ۱۳۸۸ از زیرسلسله Protozoa و شاخه های ریزوپودایا ریشه پایان وسیلیوفورا یا مژه داران (جنسهای مختلف مژه داران بدلیل حساس بودن در برابر ماده تثیت کننده فرم اصلی خود را از دست داده و تحت عنوان Unkown نامیده شدند). و شاخه های Gasrotricha کننده فرم اصلی خود را از دست داده و تحت عنوان Unkown نامیده شدند. و شاخه های Copepoda و Arthropoda و Nematoda و Rotatoria و Tardigrada و خانواده های سیکلوبوئیده و کالانوئیده بهمراه ناپلی آنها و راسته Cladocera بهمراه مرحله جنینی آنها شناسایی شدند(شکل ۲۳). در طی مطالعه شاخه های روتاتوریا (گردانتنان) با میانگین فراوانی ۱۱۹۲ عدد در لیتر و ۶۱/۸ درصد وسیلیوفورا با میانگین فراوانی ۶۱۱ عدد در لیتر و ۳۱/۷ درصد بیشترین فراوانی را داشته اند. شاخه های نامبرده در تمامی استخراها و دورهای نمونه برداری جمعیت قابل توجهی داشته اند. پرجمیت ترین جنسهای شاخه روتاتوریا عبارت از Filinia، Trichocerca، Polyarthera، Keratella، Brachoinus، Anuraeopsis سیلیوفورا فرم Unkown با بیشترین فراوانی و جنس *Tintinnidium* را میتوان نام برد. شاخه آرتروپودا با رده کپه پودا (پاروپایان) در مرتبه بعدی قرار دارد. این رده در مجموع ۴ درصد زئوپلانکتونی را در استخراهای مطالعاتی در برداشت. از این رده جنس Cyclops از خانواده سیکلوبوئیده و جنس Diaptomus از خانواده کالانوئیده و ناپلی آنها از مهمترین زئوپلانکتونهای این گروه هستند. از همین شاخه راسته کلادوسرا با جنسهای Scaphoeloberis، Simocephalus، Moina، Daphnia و مرحله جنینی آنها دارای ۱ درصد فراوانی زئوپلانکتونی در این استخراها هستند. شاخه ریزوپودا ۱/۴ درصد جمعیت زئوپلانکتونی را در استخراهای مطالعاتی داراست، مهمترین جنسهای این شاخه عبارت از *Diffugia* و *Centropyxis*، *Arcella* هستند.

سایر گروههای زنoplانکتونی که جمعیت کمی دارند عبارت از شاخه های Tardigrada با ۰/۰۶ درصد ۰/۰۲ با Nematoda درصد داشتند ، در ضمن از شاخه آرتروپودا و خانواده Gastrotricha با ۰/۰۱ درصد بودند ، در استخراهای آرتروپودا و خانواده Shireronomidae جنس Shireronomus (مرoplانکتون) جمعیت ناچیزی (۰/۰۴ درصد) دراستخراهای پرورش کپورماهیان هندی مشاهده شد.

در طی دوره های نمونه برداری شهریور ماه بالاترین فراوانی و خرداد ماه کمترین فراوانی زنoplانکتونی را داشتند. استخر ۱۲ در شهریور ماه (۷۷۸۰ عدد در لیتر) بیشترین واستخر ۹ در خرداد ماه (۲۴ عدد در لیتر) کمترین فراوانی را داشته اند . در مجموع (میانگین استخراها در طول بررسی) استخر ۱۲ با میانگین ۲۸۰۱ عدد در لیتر بیشترین واستخر ۱۱ با میانگین ۱۱۹۵ عدد در لیتر کمترین جمعیت را دارا بودند.



شکل ۲۳- فراوانی گروه های زنoplانکتونی در استخراهای پرورشی ۱۳۸۸

نتایج بتوزع ها :


کفریان استخراهای شناسایی شده شامل سه گونه و خانواده نمف و لارو حشرات ، چهار گونه و جنس کرمهای که منبع تغذیه ماهیان است و دو گونه حلزون مارپیچی ، یک گونه تخت و یک گونه دوکفه ای که درین لاروها خانواده Shireronomidae غالب و درین حلزون *Physa acuta* واژ میان کرمها توبی فیکس غالیست را داشت.

نتایج هیدروشیمی در استان خوزستان :


نتایج آنالیز فیزیکی و شیمیایی آب در استان خوزستان نیز در طی نمونه برداری در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در نرمودار های

۲۹ تا ۲۶ نشان داده شده است. در سال ۱۳۷۷ تیمارها در سه استخر و در سال ۱۳۸۸ در ۱۲ استخر توزیع شده بودند.


براساس داده های اندازه گیری شده در طبقه بندي آب بر اساس هدایت الکتریکی و میزان شوری (عابدینی ، ۱۳۸۴) آب موجود در استخرها در طبقه آبهای شیرین قرار می گیرند. همچنین بر طبق این داده ها در طبقه بندي آب بر اساس میزان سختی (Claude , 1990) آب موجود در استخرها در طبقه آبهای سخت قرار می گیرند.




نمودار ۲۱ - نمودار مقادیر اکسیژن محلول اندازه گیری شده در تیمارهای مختلف در ماههای مختلف نمونه برداری




نمودار ۲۲- نمودار مقادیر BOD5 اندازه گیری شده در تیمارهای مختلف در ماههای مختلف نمونه برداری




نمودار ۲۳- نمودار مقادیر نیترات اندازه گیری شده در تیمارهای مختلف در ماههای مختلف نمونه برداری




نمودار ۲۴- نمودار مقادیر فسفات اندازه گیری شده در تیمارهای مختلف در ماههای مختلف نمونه برداری




نمودار ۲۵ - نمودار مقادیر نیتریت اندازه گیری شده در تیمارهای مختلف در ماههای مختلف نمونه برداری




نمودار ۲۶- نمودار مقادیر سختی کل اندازه گیری شده در تیمارهای مختلف در ماههای مختلف نمونه برداری



نمودار ۲۷- نمودار مقادیر کدورت اندازه گیری شده در تیمارهای مختلف در ماههای مختلف نمونه برداری



نمودار ۲۸- نمودار مقادیر قلایشت اندازه گیری شده در تیمارهای مختلف در ماههای مختلف نمونه برداری



نمودار ۲۹ - نمودار مقادیر شوری اندازه گیری شده در تیمارهای مختلف در ماههای مختلف نمونه برداری



شکل ۲۴ - ماهی بازاری کاتالا (۲۸۰۰ گرم) در پایان دوره پرورش در شرایط اقلیمی ایران (خوزستان)

نتایج تحلیل اقتصادی

بطور کلی از نظر قیمت در بازار کپور ماهیان از ماهیان ارزان قیمت هستند. بنابراین، گودها، لاروها و ترکیبات غذایی و از طرفی نیروی کار ارزان باعث شده است که قیمت ماهی پایین نگه داشته شوند. ترکیبات غذایی بیش از ۵۰ درصد از کل هزینه ها را در پرورش توام کپور ماهیان پوشش می دهد.

همانطور که در جدول شماره ۳۰ نشان داده می شود در استخراهای مورد بررسی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در استان گیلان (ایستگاه تحقیقاتی شهرستان آستانه اشرفیه)، بطور متوسط در هر استخر با رهاسازی ۱۵۳/۵ لارو با قیمت متوسط ۹۲۱۰۰ ریال و استفاده از ۴۶۰/۲۷ کیلوگرم کود با هزینه متوسط ۶۲۱۳۶/۰۴ ریال و ۱۴۱/۱۸ کیلوگرم غذا با قیمت متوسط ۷۰۹۰۲۲ ریال دوره پرورش آغاز گردید و در پایان این دوره از هر استخر به طور متوسط ماهی با وزن متوسط ۱۲۰/۱۹ کیلوگرم برداشت شد.

جدول ۳۰: مشخصات مزارع شمال کشور (هزینه ها به ریال و مقادیر و وزن به کیلوگرم می باشد)

حداکثر	حداقل	حداکثر واریانس	انحراف استاندارد	مد	میانه	خطای استاندارد میانگین	متوسط	فاکتور مورد ارزیابی	مقدار	کود
۴۶۰/۲۷	۴۶۰/۲۷	۱/۴۶	۱/۱۹	۴۶۰/۲۷	۴۶۰/۲۷	۱/۱۳	۴۶۰/۲۷			
۶۲۱۳۶/۴	۶۲۱۳۶	۰/۰۲	۰/۱۴	۶۲۱۳۶	۶۲۱۳۶	%۸	۶۲۱۳۶/۰۴			هزینه
۴۵/۴۵	۴۵/۴۵	۵/۶۱	۷/۴۹	۴۵/۴۵	۴۵/۴۵	۷/۱۱	۴۵/۴۵	مقدار		کستانتنره
۲۰۴۵۲۵	۲۰۴۵۲۵	۰	۰	۲۰۴۵۲۵	۲۰۴۵۲۵	۰	۲۰۴۵۲۵	هزینه		غذا
۹۵/۷۳	۹۵/۷۳	۰	۰	۹۵/۷۳	۹۵/۷۳	۰	۹۵/۷۳	مقدار		فرموله
۵۰۴۴۹۷/۱	۵۰۴۴۹۷	۰/۰۰۱	۰/۰۳۱	۵۰۴۴۹۷	۵۰۴۴۹۷	۰/۰۱۸	۵۰۴۴۹۷	هزینه		شده
۱۶۱	۱۵۱	۱۶/۰۵	۴/۰۰۶	۱۵۱	۱۵۱	۳/۳	۱۵۳/۵			تعداد
۹۶۶۰۰	۹۰۶۰۰	۵۷۸۰۰۰	۲۴۰۴/۱۶	۹۰۶۰۰	۹۰۶۰۰	۱۹۸۰	۹۲۱۰۰			هزینه
۱۵۲	۱۰۸	۱۶۹/۴۳	۱۳/۰۱۶	۱۲۱	۱۳۰/۵	۱۰/۷	۱۲۹/۹	تعداد		برداشت

۱۵۵/۱۷	۹۱/۳۴	۴۰۱/۳۸	۲۰/۰۳	---	۱۱۹/۷۵	۱۵/۹۶	۱۲۰/۱۹	وزن	
--------	-------	--------	-------	-----	--------	-------	--------	-----	--


همانطور که در جدول ۳۱ نشان داده می شود در استخرهای مورد بررسی در پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب در استان خوزستان (اهواز)، بطور متوسط در هر استخر با رهاسازی ۵۱۶/۴۱ لارو با قیمت متوسط ۵۶۸۰۵۸/۳۳ ریال و استفاده از ۳۹۸۸/۳ کیلوگرم کود با هزینه متوسط ۱۴۶۳۳۴۹/۰۸ ریال و ۲۵۷۵/۷۹ کیلوگرم غذا با قیمت متوسط استفاده از ۵۷۸۹۹۸۴/۱۶ ریال دوره پرورش آغاز گردید و در پایان این دوره از هر استخر به طور متوسط ۴۸۲/۵۸ ماهی با وزن متوسط ۶۳۵/۸۰ کیلوگرم برداشت شد.

جدول ۳۱ - مشخصات مزارع جنوب کشور (هزینه ها به ریال و مقدار و وزن به کیلوگرم می باشد)

حداکثر	حداقل	واریانس	انحراف استاندارد	مد	میانه	خطای استاندارد میانگین	متوسط	فاکتور مورد ارزیابی	
۴۸۸۵/۱	۲۷۷۶	۴۲۸۹۷۸/۲	۶۵۴/۹۶	---	۳۸۱۲	۵۲۲/۱۵	۳۹۸۸/۳	مقدار	کو
۱۸۷۸۶۲	۱۰۰۲۱۳	۷۱۶۰۸۶۶۶۳۴	/۹۵	---	۱۳۷۹۱۰	/۲۷	/۰۸	هزینه	د
۲۰۶/۴	۱۵۴/۵	۶۵۲/۹۹	۲۵/۵۵	۱۵۴/۵	۱۵۴/۵	۲۳/۰۶	۱۷۱/۸	مقدار	کتس
۸۸۷۵۲۰	۳۶۵۵۰۰	۱۲۰۷۳۹۰۲۷۶	/۳۱	۶۶۴۳۵	۶۶۴۳۵۰	۹۹۱۸۶/۶۶	۷۳۸۷۴۰	هزینه تانتره	غذ
۲۹۰۸	۱۸۰۴	۷۰۴۸۶/۷۴	۲۶۵/۴۹	---	۲۴۵۱/۲۵	۱۹۶/۴۵	۲۴۰۳/۹۹	مقدار فرمو	۱
۵۷۱۱۷۴	۴۲۸۴۶۰	۲/۰۱۵۱۷	/۱۹	---	۵۰۶۷۴۰	۳۹۱۲۶۷/۵	/۱۶	هزینه له شده	


۵۵۲	۴۶۶	۶۴۸/۲۶	۲۵/۴۶	---	۵۲۱/۵	۱۹/۴۴	۵۱۶/۴۱	تعداد	لار
۶۰۷۲۰۰	۵۱۲۶۰۰	۷۸۴۴۰۰۸۳۳	۲۸۰۰۷/۱۵	---	۵۷۳۶۵۰	۲۱۳۸۸/۸۸	۵۶۸۰۵۸/۳۳	هزینه	و
۵۲۳	۴۱۵	۱۱۱۳/۱۷	۳۳/۳۶	۵۰۹	۴۸۶/۵	۲۷/۹۱	۴۸۲/۵۸	تعداد	برداشت
۷۷۷/۱۴	۵۳۷/۵۱	۶۳۴۴/۴۱	۷۹/۶۵	---	۶۱۹/۲۲	۶۶/۷۵	۶۳۵/۸۰	وزن	

نمودار ۳۱ سهم عوامل مختلف هزینه های عملیاتی تولید را در استخراج های آستانه اشرفیه مورد بررسی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در استان گیلان (ایستگاه تحقیقاتی شهرستان آستانه اشرفیه)، نشان میدهد. غذا با ۳۹٪ و نیروی انسانی با ۱۵٪ بترتیب بیشترین سهم را در بر می گیرند.



نمودار ۳۱- متوسط سهم هزینه های عملیاتی تولید در استخراهای مورد بررسی در شمال کشور

نمودار ۳۲ سهم عوامل مختلف هزینه های عملیاتی تولید را در استخراهای مورد بررسی در پژوهشکده آبزی پروری آب-های جنوب در استان خوزستان (اهواز)، نشان میدهد. غذا با ۳۸٪ و نیروی انسانی با ۱۳٪ بترتیب بیشترین سهم را در بر می گیرند.



نمودار ۳۲- متوسط سهم هزینه های عملیاتی تولید در استخراهای مورد بررسی در جنوب کشور

بحث و نتیجه گیری:

امروزه بسیاری از گونه های ماهیان در دنیا پرورش داده می شوند. در حقیقت پرورش ماهیان گرمآبی تنوع گونه ای قابل ملاحظه بوده و انواع خانواده های ماهیان متعلق به مناطق گرمسیری را در بر می گیرد. بیشترین سهم به خانواده کپور ماهیان (درآبهای شیرین) و سپس سپیلاید (درآبهای شیرین - لب شور و شور) و ماهیان خاویاری و کفال ماهیان تعلق دارد. کپور ماهیان یکی از محصولات شیلاتی است که تولید آن در کشور ما سابقه طولانی دارد. تولید ماهیان گرمابی به عنوان مصرف داخلی و بالا بردن درصد پروتئین روزانه مصرفی در سبد خانوار باعث شد که افزایش سطح زیر کشت

این محصول گسترش یابد . عامل اصلی گسترش سطح زیرکشت این محصول را می توان ارزان بودن آن و قابلیت جایگزینی آن به جای انواع گوشت های دیگر برای خانواده های کم درآمد و همچنین استغال زائی کیفی وبالا بردن سطح زندگی آنان در مناطق محروم اشاره کرد . میزان تولید ماهیان گرمابی کشور در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۲۰۰۰ تن بوده است. که سهم منابع آبی ۳۰ هزار تن بوده و الباقی به مزارع و آب بندانها اختصاص دارند(گزارش عملکرد سازمان شیلاتات ۱۳۸۸).

شناسایی، انتخاب و معرفی گونه های ماهیان گرمابی سازگار و با عملکرد کمی و کیفی بیشتر، نسبت به گونه های تجاری موجود، به منظور انتخاب بهترین گزینه کشت تلفیقی و تنوع بخشی به سبد مصرف آبزیان کشور ، از اهداف توسعه در بخش اصلاح گونه های ماهیان گرمابی می باشد.

کپور ماهیان همواره از بیشترین سهم در تولید ماهیان پرورشی در آب شیرین برخوردار بوده و چهار گونه کپور نقره ای - کپور علفخوار - کپور معمولی و کپور سرگنده در بین کپور ماهیان پرورشی همواره ، صدرنشین بوده اند. کپور علفخوار با بالاترین نرخ رشد در بین گونه های ماهیان صدرنشین از سال ۱۹۹۱ داشته و جای کپور معمولی در مکان دوم تولید قرار گرفته است . بخش اعظم کپور ماهیان پرورشی در قاره آسیا تولید می شود و در سال ۲۰۰۶ ، کشورهای چین و هند به ترتیب بیشترین سهم از کل تولید جهانی کپور ماهیان پرورشی را در اختیار داشته اند (FAO , 20006).

تجربیات بین المللی ، تنها چند سال پس از اجرای روش های کشت تک گونه ای کپور ، دریافت که در شرایط اقلیمی ماهیان گرم آبی در کشور ها ، جمعیتهای کپوری که در استخر ها به تهایی پرورش می یابند ، نمی توانند غذاهای طبیعی موجود در استخر را به خوبی استفاده کنند . همچنین ، مشخص شد که ماهیان کپوری که اندازه های متفاوت دارند ، از غذاهای طبیعی مختلف استخر استفاده می کنند . این امر ، پایه توسعه روش کشت توازن قرار گرفت(Mathew, 1989) . در بازار داخلی ایران، یکی از محصولات شیلاتی که همواره شائبه وجود انحصار در بازار آن وجود داشته است، ماهیان گرمابی می باشد. علاوه بر این از شاخص های مهم بازار ماهیان گرمابی در ایران وجود نوسانات قیمت و عدم ثبات در این بازار است که نزدیک به نیمی از این تغییرات قیمت غیرقابل پیش بینی می باشد (به دلیل بازارهای منطقه ای نظیر عراق). عدم توانایی تولید کنندگان در پیش بینی قیمت بازار مصرف ماهیان گرمابی دارای اثرات ضد رفاهی بالایی است(حسین زاده و همکاران، ۱۳۸۸).

در حال حاضر در ایران چهار گونه پرورشی در اشل اقتصادی مورد بهره برداری قرار می گیرند که عبارتند از سه گونه کپور ماهیان چینی و یک گونه کپور ماهی معمولی که پرورش داده می شود. البته بیوتکنیک تکثیر چند گونه بومی وجود دارد و در مقیاس محدود در بخش اقتصادی پرورش داده می شوند که شامل سیم، سوف و بنی می باشد.

ماهیان گرمابی همانطور که از نامشان پیداست گروهی از ماهیان گرمادوست هستند که در سرمای شدید و تغییرات سریع دما، تحمل زیادی دارند. سوخت و ساز بدن این ماهیان و نیاز غذایی آنها با کاهش درجه حرارت کم میشود و در دمای ۴ درجه سانتیگراد متوقف میگردد. قدرت رشد سریع این ماهیان در دمای بالای ۲۰ درجه سانتیگراد بهتر آشکار میگردد. این ماهیان نسبت به تغییرات میزان املاح داخل آب تحمل بالای داشته و قادر است در آبهای لب شور و آبهای قلیابی با $pH=9$ نیز زندگی نماید. در ضمن این ماهیان نسبت به نوسانات اکسیژن محلول در آب مقاوم هستند. به همین دلیل میتوان آن را در آبهایی به مقدار ۳-۴ میلی گرم اکسیژن در لیتر برای پرورش داد. رشد آنها سریع بوده و برخی تا ۲۰ کیلو گرم و بیشتر در شرایط مساعد میرسند. کپور ماهیان که عمدۀ ترین این ماهیان میباشند از موجودات کفزی داخل آب و زئوپلانکتونهای بزرگ تغذیه میکند. این گروه قادر هستند از مواد پوسیده گیاهان آبزی و دانه های گیاهی نیز تغذیه نمایند. گرچه پرورش ماهیان گرم آبی در دنیا از سابقه نسبتاً طولانی برخوردار است لکن سابقه این موضوع در کشور ایران به پنج دهه ختم می گردد. در طول دوره اخیر تلاشها در جهت افزایش تنوع گونه ای و سبد مصرف و نیز ارتقاء راندمان تولید در مزارع گرم آبی کشور افزایش یافته لکن همچنان راندمان تولید در واحد سطح در حد انتظار و مطلوب نبوده و برنامه ریزی در خصوص افزایش تولید در واحد سطح همچنان در دستور کار بسیاری از بخشهاي اجرایی و تحقیقاتی قرار دارد. بدیهی است راهکار تنوع گونه ای می تواند بعنوان یکی از راهکارهای مؤثر در ارتقاء راندمان تولید محسوب شده که در این رابطه بسیاری از کشورهای دنیا سیاست پرورش چند گونه ای را در دستور کار تولید ماهیان گرم آبی قرار داده اند. در عین حال نقش پرورش توام کپور ماهیان هندی با تولیدی قریب به ۳ میلیون تن در سال در این زمینه غیر قابل انکار بوده به نحوی که در بسیاری از کشورهای جهان نفعاالت های کشت توام در سطح تولیدی و پژوهشی ادامه دارد. از این میان می توان به گزارشات ارائه شده توسط Vasudevappa و همکاران در سال ۱۹۸۹ در خصوص ترکیب چهار گونه ای کاتلا، روهو، مریگال و فیتوفاگ که منجر به افزایش تولید به میزان ۴ تن در هکتار گردید و نیز گزارش Alem و همکاران در سال ۱۹۹۶ و Mathew در سال ۱۹۸۹ اشاره کرد که تأثیر مثبت ترکیب تلفیقی کپور ماهیان چینی و هندی را در استخراهای خاکی نشان داده اند. به همین منظور و با هدف ایجاد تنوع گونه

ای و ارتقائی راندمان تولید و افزایش درآمد پرورش دهنده‌گان کپور ماهیان پرورشی در کشور طرح بررسی امکان سازگار کپور ماهیان هندی در شرایط اقلیمی ایران تدوین گردید. در این راستا مجموعه ای از فعالیت‌ها در قالب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در نظر گرفته شد که موضوع امکان سازگاری سه گونه کاتلا، روهو و مریگال در گام اول در دو حوزه اقلیمی شمال(گیلان) و جنوب کشور(خوزستان) مد نظر قرار گرفت. در عین حال موضوع تکثیر و بومی سازی تکنولوژی تکثیر سه گونه از دیگر اهداف کوتاه مدت طرح میباشد که در اینجا فقط به نتایج حاصل از امکان سازگاری ماهی های کاتلا، روهو و مریگال به شرایط اقلیمی شمال کشور اکتفا شده است. لهذا در برنامه های میان مدت موضوع دستیابی به مناسب ترین تراکم و تنوع گونه ای از کپور ماهیان هندی و چینی و معمولی در دستور کار قرار دارد.

از آنجایی که واردات بچه ماهیان نورس در شهریور ۱۳۸۷ صورت پذیرفت لذا زمان مناسب رشد و پرورش در استان گیلان در سال اول برای این ماهیان بسیار محدود بود به نحوی که نتایج رشد طولی و وزنی در کپور ماهیان هندی (سه گونه کاتلا روهو و مریگال) در طول ۲ ماه دوره پرورش اولیه در استخراه ایستگاه تحقیقات پل استانی اشرفیه نشان دهنده سازگاری بچه ماهیان نورس با اقلیم منطقه و شرایط آب و هوایی و در عین حال رشد مطلوب گونه ها در سال اول پرورش بوده (پرورش از بچه ماهی نورس به بچه ماهی انگشت قد) که در شرایط اقلیم استان گیلان (با توجه به اینکه دوره پرورش در استان از ماه اردیبهشت تا مهرماه می باشد) و با در نظر گرفتن زمان رها سازی بچه ماهیان در استخراها که از اواسط شهریور (بدلیل فصل تکثیر کپور ماهیان هندی که در هندوستان از اواخر خرداد تا شهریور ماه ادامه دارد) شروع شده است، رشدی قابل قبول را رائه می نماید. در طول ۵۷ روز دوره پرورش برای ماهی کاتلا متوسط وزن 0.8 ± 0.3 گرم (از وزن اولیه ۲۷۰ میلی گرم) و برای ماهی روهو 0.4 ± 0.5 گرم (از وزن اولیه ۵۶۴ میلی گرم) و برای ماهی مریگال متوسط وزن 0.7 ± 0.3 گرم (از وزن اولیه ۳۰۷ میلی گرم) بدست آمد. مطالعات انجام شده توسط محققین ایرانی بر روی رشد بچه ماهیان کپور چینی در اقلیم استان گیلان در سال اول نشان دهنده وجود رشد مشابه در بچه ماهیان نورس یک تابستانه می باشد. بطوری که در پروژه بررسی بچه ماهیان نورس (Fry) و انگشت قد کپور ماهیان به روش چینی نتایج حاصل از پرورش بچه ماهی های انگشت قد در سال ۱۳۷۲ بر روی (Fingeling) ماهی فیتوفاگ نشان دهنده افزایش وزن از ۱ گرم تا ۲۶ گرم و ماهی آمور از ۱ گرم تا ۴۷ گرم و ماهی کپور معمولی از ۱ گرم تا حداقل ۵۰ گرم در طی ۱۰۱ روز پرورش از ۵/۹/۷۲ تا ۲۰/۸/۷۲ در استخراه ای مرکز تکثیر و پرورش شهید

انصاری رشت و استخرهای بخش خصوص می باشد (رضابی خواه نرگسی، ۱۳۷۲). همچنین وزن بچه ماهیان انگشت قد

یک تابستانه از مرحله بچه ماهی نورس در طی مدت ۴ ماه بین ۱۰ تا ۴۰ گرم و طول ۸ تا ۱۲ سانتی متر گزارش شده

است (شکوریان و همکاران، ۱۳۷۷). در عین حال افزایش وزن انفرادی بچه ماهیان کپورچینی در سال اول پرورش از

۳۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم به متوسط وزن ۲۵-۳۰ گرم (برای انواع کپورماهیان چینی (نظیر فیتفاگ و آمور) و کپور معمولی

گزارشی شده است (فرید پاک، ۱۳۶۵).

همچنین حسین زاده و همکاران در سال ۱۳۸۶ نسبت به پرورش انواع بچه اهیان نورس کپور ماهیان هندی در شرایط

آب و هوایی استان گیلان و خوزستان اقدام که نتایج بدست آمده در طی ۳ ماه دوره رشد در جنوب و ۲ ماه دوره رشد

در شمال کشور حاکی از رشد مناسب این گونه ها بوده بطوری که در سال اول (۱۳۸۶) در استان خوزستان ، طی مدت

۳ ماه (۹۰ روز) از تاریخ ۱۷/۵/۸۶ الی ۱۷/۸/۸۶ طول کل ماهی کاتلا از میانگین ۲۹ میلی متر به میانگین ۲۲۹ میلی متر

رسید. طول کل ماهی روهو از میانگین ۴۰ میلی متر به میانگین ۱۸۶ میلی متر و طول کل ماهی مریگال از میانگین ۳۴

میلی متر به میانگین ۱۳۸ میلی متر رسید. در عین حال در خصوص وزن ماهیان در طی ۹۰ روز نگهداری در سال ۱۳۸۶

نتایج حاکی از افزایش رشد وزنی از میانگین ۲۳۰ میلی گرم به میانگین ۱۸۳ گرم در ماهی کاتلا و از ۵۶۰ میلی گرم به

میانگین ۷۲ گرم در ماهی روهو و نیز از میانگین ۳۱۰ میلی گرم به میانگین وزن ۲۴ گرم در ماهی مریگال رسید)

نتایج حاکی از افزایش رشد وزنی از میانگین ۲۳۰ میلی گرم به میانگین ۱۸۳ گرم در ماهی کاتلا و از ۵۶۰ میلی گرم به

میانگین ۷۲ گرم در ماهی روهو و نیز از میانگین ۳۱۰ میلی گرم به میانگین وزن ۲۴ گرم در ماهی مریگال رسید)

با این وجود به نظر می رسد رشد کپورماهیان هندی در مقایسه با کپورماهیان چینی در Hosseinzadeh,2008)

شرایط اقلیمی شمال کشور دارای تشابهاتی بوده لکن محدودیت دوره پرورش در استان های شمالی ۱۵۰ تا ۲۰۰ روز

عامل قابل ملاحظه ای در توسعه فعالیتهای پرورش ماهی در این استانها می باشد. بدیهی است شرایط اقلیمی در استان

خوزستان و سایر استانهای گرمسیری می تواند در بهبود روند رشد بچه ماهیان انگشت قد مؤثر باشد.

در عین حال در سال ۱۳۸۶ در استان گیلان نیز نتایج حاکی از افزایش رشد وزنی از میانگین ۲۳۰ میلی گرم به میانگین

۱۶۸ گرم در ماهی کاتلا و از ۵۶۰ میلی گرم به میانگین ۴۳ گرم در ماهی روهو و نیز از میانگین ۳۱۰ میلی گرم به

میانگین وزن ۲۳ گرم در ماهی مریگال رسید(حسین زاده و همکاران ۱۳۸۶).نتایج حاصل از پژوهش اخیر نیز حاکی از

توان بالقوه مناطق اقلیمی شمال کشور در امکان سازگاری و رشد بچه ماهیان در این منطقه می باشد بویژه در این

پژوهش نسبت به زمستان گذرانی بچه ماهیان در شرایط سخت زمستانی با استفاده از آب چاه با درجه حرارت ۱۳-۱۴

در جه سانتی گراد اقدام گردید و بازماندگی صدرصد بچه ماهیان حاکی از قابلیت نگهداری آنان در زمستان با استفاده

از آب چاه بعنوان راهکار تداوم نگهداری بچه ماهیان حاصل از تکثیر در آینده می باشد . در عین حال نتایج رشد در سال دوم پرورش نیز حاکی از سرعت رشد نسبتاً مناسب در گونه رoho و کاتلا بود لکن هر سه گونه قابلیت تطابق با شرایط اقلیمی شمال کشور را نشان دادند بطوری که گونه های رoho ، مریگال و کاتلا به ترتیب از وزن متوسط ۱۴ تا ۱۰ و ۱۶ گرم اولیه به وزن نهایی ۶۵۶ گرم و ۴۰۶ و ۷۱۸ گرم رسیده که این روند در طی دوره ۲۴۰ روزه اتفاق افتاده است. فرید پاک در سال ۱۳۶۵ به افزایش وزن تا حد ۱ کیلوگرم برای بچه ماهیان انواع کپورچینی (فیتوفاگ و آمور) و کپورمعمولی (از وزن اولیه ۲۵ تا ۳۰ گرم) در سال دوم پرورش اشاره داشته است. در عین حال افزایش وزن ماهی کپور سرگناه از وزن اولیه ۲/۱ گرم به وزن ۹۳۵ گرم در طی ۱۸۰ روز و نیز افزایش وزن ماهی فیتوفاگ از وزن اولیه ۱۶/۷ گرم به وزن ۹۳۵ گرم در سال دوم (پروار بندی) در شرایط استان گیلان گزارش شده است (دانش خوش اصل، ۱۳۷۵) گرچه کپورماهیان چینی نیز در دهه ۱۳۴۰ به کشور وارد گشته و در طی این مدت چندین بار با ورود مولدین جدید تقویت گشته اند لکن به استناد نمودار تغییرات درجه حرارت، تغذیه و رشد بسیار خوب ماهی های کپور چینی در ابتدای خرداد ماه تا انتهای مرداد بوده و رشد و تغذیه خوب از اوایل شهریور تا اوایل مهرماه و رشد و تغذیه متوسط از اوایل مهرماه تا اواخر آبان ماه و رشد و تغذیه ضعیف در طی ماه های آذر و دی اتفاق می افتد (فرید پاک، ۱۳۶۵). به این ترتیب کپورماهیان هندی از نظر رشد قابلیت رقابت با کپورماهیان چینی را داشته (گرچه در حد پایین تری نسبت به رشد کپور ماهیان چینی قرار دارند) لکن مطالعات بیشتر به منظور مقایسه اقتصاد تولید مورد نیاز است. در عین حال باید اذعان نمود که بدلیل تغییر در شرایط اقلیمی این گونه ها و اساساً دمای سردتر محیط و آب نسبت به شرایط اقلیمی در کشور هندوستان رشد گونه ها از سرعت و شتاب کمتری برخوردار بوده لکن بنظر می رسد با گذشت زمان و انجام عملیات تکثیر در طی چند نسل در شرایط استان گیلان و در عین حال انتقال برخی از پیش مولدین و بچه ماهیان انگشت قد کپورماهیان به اقلیم استان خوزستان در آینده افزایش رشد بسیار سریعتر از نتایج حاصل از این تحقیق اتفاق افتاد. گزارش Ranjan Rout در سال ۲۰۰۵ نیز حاکی از رشد بچه ماهیان نورس از وزن اولیه ۴۵۰ میلی گرم (۵۸۰ میلی گرم برای کاتلا، ۳۴۰ میلی گرم برای Roho و ۴۳۰ میلی گرم برای مریگال) در طی مدت ۶۰ روز در شرایط اقلیم کشور هندوستان (دمای متوسط ۲۶ درجه سانتی گراد، pH متوسط ۷/۵ و اکسیژن ۳/۴ میلی گرم بر لیتر) به بچه ماهیان انگشت قد با وزن متوسط ۹/۶ گرم (۱۱/۱ گرم برای کاتلا، ۶/۸ گرم برای Roho و ۱۰/۹ گرم برای مریگال) می باشد.

نتایج حاصل از این تحقیق در استان خوزستان نیز نشان داد بچه ماهیان نورس روهو در مقایسه با کاتلا و مریگال رشد

بیشتری داشته و اختلاف معنی داری را نشان دادند ($P < 0.01$). بیشترین رشد بچه ماهیان در طول دوره پرورش از

شهریورماه تا آبان ماه که دما از 20°C - 30°C درجه سانتی گراد در نوسان بود، مشاهده شد، با کاهش دما در آذر ماه (15°C)

درجه سانتی گراد) توقف رشد این گونه ها تا اسفندماه (19°C درجه سانتی گراد) مشاهده گردید. Hoar در سال ۱۹۴۳ با

پرورش بچه ماهی نورس کپور هندی بامیانگین طول 31 cm میلی متر و میانگین وزن 0.15 kg و با نسبت کاتلا: 3 :

روهو: 4 : مریگال 1 و کپور کالباسو 2 عدد در 4 استخر مشاهده نمود، میزان رشد طولی کاتلا $15/6$ - $25/11$ سانتی متر،

روهو $10/75$ - $13/75$ سانتی متر و مریگال $8/75$ سانتی متر بود. و بیشترین رشد در بچه ماهیان کاتلا و درصد بازماندگی نیز 80% -

72 درصد گزارش شد. در حالیکه در تحقیق انجام شده در استان خوزستان بیشترین رشد در بچه ماهی نورس روهو

مشاهده شدوبا تحقیقات Hora مغایرت دارد. به نظر می رسد دلیل این مغایرت تراکم بالای کاتلا نسبت به گونه های

دیگر باشد، از کل بچه ماهیان رهاسازی شده $46/7$ درصد به گونه کاتلا تعلق داشت در حالیکه روهو 35 درصد و

مریگال $18/3$ درصد بود. میانگین تغییرات طول و وزن در ماه شهریور، مهر و آبان نسبت به ماههای بررسی شده بالا بود

و در ماههای آذر، دی، بهمن و اسفند، میانگین وزن، و طول کل تغییرات محسوسی را نشان نداد که علت اصلی را

میتوان در کاهش دما دانست که در این ماهها به حداقل می رساند. بهترین دما برای رشد و بقای بچه ماهی کپور هندی $15/1$

26 درجه گزارش شده است (Jagannadhan, 1947). و چنین دمایی در طی بررسی در ماه شهریور و مهر ثبت گردید

و در این ماهها بیشترین رشد مشاهده که تایید کننده نتایج بالا بود. Salim و Kausar در سال 2006 با مطالعه اثر دما

روی عملکرد رشد و ضریب تیدیل غذا در بچه ماهی روهو نشان دادند که بهترین دما برای این گونه 26°C -می باشد

(Kausar and Salim, 2006). بالا رفتن دما فعالیت آنزیم های گوارشی را افزایش می دهد که این عمل ممکن

است هضم مواد غذایی را سرعت بخشد (Shcherbina and Kazlaukene, 1971). در سال 1985 Higle

بهترین رشد گونه گربه ماهی را در محدوده 25°C - 28°C معرفی نمود که دما 27 درجه بهترین دما ثبت شده است. افزایش

رشد در گونه روهو از دما 19°C درجه شروع می شود و در دمای $14/8$ به پایین متوقف می شود (Khan et al.

, 2004). به هر ترتیب، بهترین محدوده دمایی برای رشد گونه کپور ماهیان هندی 25°C - 30°C درجه سانتی گراد می باشد

(Kausar and Salim, 2006). که در ماههای گرم سال دمای آب به این حد می رسد و نتایج نیز تایید کننده این

امر است. Osborne and Riddle در سال 1999 مشاهده کردند کارایی غذا در دمای بالا نسبت به دمای پایین در

محدوده ۲۷-۱۷ درجه سانتی گراد بالاتر است. بچه ماهی کپور هندی محدوده دمایی ۳۷/۵-۱۸ درجه را تحمل می کند و در دمای زیر ۱۶/۷ درجه و بالای ۳۹/۵ درجه تلف می شوند (Mukherjee et al., 1946). در حالیکه در ماه دی، بهمن و اسفند میانگین دمایی کمتر از ۱۶ درجه مشاهده شد همچنین در ماه دی و بهمن دما به ۷/۵ درجه سانتی گراد و ماه شهریور به ۳۳ درجه سانتی گراد رسید و میزان بازماندگی در انتهای دوره ۹۵/۷۱-۸۰/۶ درصد در ۳ استخرا مشاهده شد که با تحقیقات Mukherjee و همکاران در سال ۱۹۴۶ مغایرت دارد. و نشان دهنده این موضوع است که دامنه تحمل کپور ماهیان در استان خوزستان از نظر دمایی با مشکلی مواجه نیست در پرورش بچه ماهی انگشت قد حدود ۳۰ درصد مربیگال، ۴۰ درصد روهو و ۳۰ درصد کاتلا می باشد که غذادهی و باروری در استخراها مشابه فاز نوزادگاهی مطابق با تراکم پرورش و تولید طبیعی و درصد بازماندگی از ۶۰-۷۰ درصد در نوسان است مربیگال درصد بازماندگی بیشتری نسبت به کاتلا و روهو دارد (www.FAO.com).

از شهریور تا آبان زمانیکه محدوده دمایین ۷۴/۱۲-۲۹/۱۲ بود افزایش وزن و طول در ماهیان در هر ۳ گونه مشاهده شد و پس از آن از آذر تا اسفند که محدوده دما بین ۱۹/۴-۱۵/۴ درجه سانتی گراد بود تغییراتی در وزن و طول بچه ماهیان مشاهده نشد. در بین این گونه ها، کاتلا در ماه اسفند افزایش وزن و طول را نشان داد. بالاترین میزان رشد پس از ۳ ماه در بچه ماهی نورس کاتلا، روهو و مربیگال به ترتیب ۱۵/۶، ۱۱/۲۵-۱۳/۷ و ۸/۷۵-۱۰/۱۳ متر دراستخرا گزارش داده شد.

(Hora, 1943)

مقایسه این نتایج با نتایج حاصله از پرورش کپور ماهیان هندی در سال دوم در شرایط اقلیمی استان گیلان (۶ ماه دوره پرورش) حاکی از روند رشد مناسب گونه های روهو و مربیگال در سال دوم پرورش می باشد Hosseinzadeh et al. 2010 در عین حال گزارشات دیگر مبنی بر رشد مضاعف کپور ماهیان هندی تا وزن ۲-۳ کیلو گرم در سال دوم پرورش ارائه شده است (Jhingran and Pullin, 1985).

Chakrabarty و همکاران در سال ۱۹۷۹ با رها سازی کپور ماهیان هندی در استخراهای ۰/۱۷ هکتاری در طی مدت ۳۵ یکسال موفق به تولید کاتلا با وزن ۷۱۹-۸۴۲ گرم (وزن اولیه ۱۵۹ گرم) روهو با وزن ۷۲۳-۶۴۱ گرم (وزن اولیه ۳۵ گرم) و مربیگال با وزن ۵۴۴-۶۱۰ گرم (وزن اولیه ۳۶ گرم) شدند.

روابط رشد وزنی شامل نرخ رشد روزانه و ضریب رشد ویژه نیز در ماهیان کاتلا و روهو و مربیگال نشان دهنده قابلیت تطابق و رشد هر سه گونه در منطقه شمال کشور می باشد (King, 1997). بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق

ماهی روهو در فاصله ماه های اردیبهشت تا تیر افزایش وزنی معادل 5.25 ± 20.85 و باروند کاهشی در آبان و آذر به 0.02 ± 0.04 رسیده است. در خصوص گونه مریگال در فاصله ماه های اردیبهشت تا تیر افزایش وزنی معادل 6.68 ± 2.99 و باروند کاهشی در آبان و آذر به 0.11 ± 0.07 و در مورد کاتلا در فاصله ماه های اردیبهشت تا تیر افزایش وزنی معادل 22.70 ± 9.38 و باروند کاهشی در آبان و آذر به 0.03 ± 0.06 رسید (جدول ۸).

همچنین ضریب رشد ویژه در ماهی روهو مریگال و کاتلا در ماههای اردیبهشت تا تیر به ترتیب معادل 0.34 ± 4.51 و -0.13 ± 3.02 و 3.91 ± 2.24 و در ماه های ابان و آذر به ترتیب معادل -0.09 ± 0.03 ، 0.26 ± 0.17 و 0.07 ± 0.02 محاسبه شد (جدول ۹). و همکاران نیز در سال ۱۹۹۹ در خصوص رشد کپور ماهیان هندی در استخر های پرورشی به رشد نسبتا کند این ماهیان نسبت به کپور ماهیان چینی اضهار داشته و در عین حال بر کشت توان این گونه ها تاکید نمودند. علیرغم رشد قابل توجه کپور ماهیان چینی در ایران تلاقی بین گونه ای در میان کپور ماهیان چینی بعنوان یکی از دلایل کاهش عملکرد مزارع پرورشی از یک سو و تغییر در خصوصیات مورفولوژیک گونه ها از سوی دیگر بوده است. یکی از دلایل انتخاب گونه ای در این پژوهش نیز عدم امکان تلاقی کپور ماهیان چینی و هندی بود.

گزارشات حاکی از عدم امکان هیریداسیون بین انواع کپور ماهیان هندی و کپور ماهیان چینی می باشد (Zhang and Reddy, 1990)

تغییرات پارامترهای محیطی بویژه در استان گیلان تاثیر انکار ناپذیر در رشد گونه ها داشته بطوری که درجه حرارت آب در طی ماههای تیر، مرداد و شهریور بین ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتیگراد متغیر بوده و بهترین شرایط دمایی را برای رشد هر سه گونه فراهم آورده است. در عین حال تغییرات pH و اکسیژن در محدوده تعريف شده برای پرورش کپور ماهیان هندی قرار داشته و حتی نوسانات اکسیژن در طی دوره پرورش در میانگین ۵ میلی گرم در لیتر بوده که حداقل ۳ میلی گرم در لیتر مورد نیاز می باشد. محدود قابل تحمل pH بین $\frac{7}{3}-\frac{8}{5}$ تعريف شده است (Jhingran and Pullin, 1985, Sen and Chatterjee, 1978) دهنده وجود $n=50$ در این گونه ها بوده که با سایر منابع مطابقت دارد و نشان دهنده عدم وجود پلی پلوئیدی در این ماهیان است (Kalbassi et al., 2005).

در پرورش ماهی ، کیفیت آب به این صورت تعريف شده است: مطلوبیت آب برای بقا و رشد ماهی و معمولاً این مطلوبیت تحت تاثیر چند متغیر است حال تامین کیفیت و کمیت مناسب آب یکی از الزامات اولیه برای انتخاب مکان و

برای مدیریت تولید آبزی پروری می باشد. بعلت اینکه ماهی بطور کامل وابسته به سطوح بالائی آب برای تنفس ، تغذیه رشد ، دفع مواد زائد ، نگهداری تعادل نمک موجود در بدن ، و تولید مثل می باشد پس دانستن ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب در موقیت آبزی پروری نقشی بسیار حیاتی دارد . برای رسیدن به میزان رشد مطلوب ، آب ، موقیت یا شکست یک پروژه آبزی پروری را تعیین می کند (رومیانی ، ۱۳۸۵) . همراه با توسعه آبزی پروری در اوخردهه ۱۹۳۰ مطالعات مخازن آبی با بررسی پلانکتونها، بتوزوهاو ماهیان شروع و هدف از آن افزایش تولیدات ماهی (Wickliff and Roac 1937) که این امر وابستگی تام به تولیدات اولیه بوده است (Bennett, 1976).

فیتوپلانکتونها گیاهانی میکروسکوپی و قادر به تولید کنندگان اولیه در اکوسیستمهای آبی از اهمیت خاصی برخوردارند . زئوپلانکتونها بعد از فیتوپلانکتونها قرار داشته که خود توسط گروه بعدی زنجیره غذایی مورد مصرف قرار گرفته و غذای آغازین بیشتر بچه ماهیان هستند ، چنانچه بسیاری از لاروهای ماهیان از رو تغذیه می کنند (Watanabe, 1993).

Awalss در سال ۱۹۹۱ بیان داشت که رو تیرهابخصوص *Brachoinus calyciflorus* غذای مناسبی برای تغذیه لارو ماهیان آب شیرین به عنوان غذای آغازین میباشد ، وی همچنین بیان داشت که میزان بقاء و رشد لارو بچه ماهی صوف هنگامی که از این رو تیره تغذیه می کند بسیار بالاست . اهمیت رو تیرهار در تغذیه لارو ماهیان از نظر میزان پروتئین و انرژی بخصوص اسیدهای چرب نوع امگا، سه قابل توجه است . رژیم غذایی و محل تغذیه ماهیان پرورشی در استخراها با هم فرق داشته، ماهی کپور معمولی و مریگال در کف بستر به جستجوی غذا پرداخته و از موجودات کفزی مانند حلزونها، کرمها، لارو حشرات و نظایر آن تغذیه می نمایند. ماهی آمور و تاجدی ماهی روهو از گیاهان کناره های استخرا و یا علوفه هایی که توسط پرورش دهنده در سطح آب ریخته می شود، تغذیه می کنند. ماهی کاتلا، کپور نقره ای و کپور سرگنده در لایه های میانی آب به سر برده و به ترتیب از فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها تغذیه می کنند. در شرایطی که مواد غذایی اختصاصی هر یک از ماهیان پرورشی در دسترس نباشد، ماهیان از مواد غذایی دیگر و یا غذاهای دستی استفاده می نمایند . تشکیل مواد غذایی در اکوسیستم های آبی به کمک جریانهای بیولوژیک پیچیده صورت می گیرد. مواد معدنی محلول در آب توسط تولید کنندگان اولیه جذب شده و با استفاده از ثیبیت بیوشیمیایی انرژی تابشی، در پیکره آنها به مواد آلی غیر محلول (تکه ای) تبدیل می شود. بنابراین می توان اظهار داشت که جلبکهادر واقع نقش کارگاه

ساخت مواد را بازی می کنند به طوری که قادرند مواد غذایی غیر آلی را در کارگاه خود به مواد آلی حاوی انرژی تبدیل

نمایند و به همین عالت به آنها توتروف یا خود غذا می گویند.

قسمتی از مواد آلی تولید شده بعنوان غذا توسط مصرف کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد. این ارگانیزم‌های انرژی

موردنیاز خود را از تغییر شکل مواد آلی (غلب موجودات زنده) بدست می آورند و درست به این علت به

آنها توتروف یا دگر غذامی گویند. بخش دیگری از مواد آلی ساخته شده در بدن جلبکها به صورت مواد آلی محلول

به خارج از بدن آنها دفع می شود. کپورماهیان هندی در چند دهه گذشته به منظور امکان سازگاری و تعیین الگوی کشت به

کشورهای مختلفی نظیر ماداگاسکار، زیمباوه، موریتانی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام انتقال یافته اند (Jhingran

and Pullin, 1985) این ماهیان از انواع ماهیان گرم آبی محسوب شده که بعد از کپورماهیان چینی در دنیا مقام دوم

را از نظر تولید بخود اختصاص داده اند. سه گونه مهم از آنها بنامهای کاتلا، روهو و ریکال هستند، که در این بین گونه

روهو بیشترین میزان تولید را بخود اختصاص داده است. این ماهی گونه ای بتپولازیک بوده و قادر به زیست در آبهای

شیرین و لب شور بوده و از دیتریتها، گیاهان آبری و برخی از بی مهر گان تغذیه می کند. گزارشات متعددی در مورد تاثیر

مثبت ترکیب تلقیقی از کپورماهیان هندی و چینی در استخراج های خاکی موجود است (Alam et al., 1996)

(Mathew, 1989) و (Sinha et al., 1973). با توجه به اینکه در حال حاضر میزان تولید در واحد سطح

کپورماهیان چینی در کشور حدود ۳/۵ تن در هکتار می باشد (گزارش عملکرد تولید، ۱۳۸۴) که تنها با پرورش

کپورماهیان چینی بدست می اید. حشرات آبری علاوه بر زیست در محیط های آبی برخی از مراحل زیستی خود یا

تکاملشان بصورت نمف یا شفیرگی و لارو در آب بسر می برند بعضی دیگر تمام مراحل زیست را در محیط آبی سپری

می کنند و طیف وسیعی از آنها پراکنش گسترده ای در این محیطها دارند. تغذیه آنها از دیتریتوس، گیاهان آبری سبز،

مواد آلی پوسیده، خزه ها، جلبکها و برخی از آنها شکارچی هستند.

خانواده شیرونومیده Chironomidea با ۲۶ جنس و ۴۰۰ گونه که بیشتر آنها در مرحله لاروی قبل تشخیص نیستند

به دلیل تنوع آنها از غذاهای خوب برای اکثر آبزیان محسوب می شوند. *Limnae sp.* حازون راست گرد صدف دور

محوری پیچ خورده و طولش بیشتر از عرض وفاقد سرپوش، طول متوسط این گونه بیشتر از گونه قبلی است. در واقع همه

گونه ها به استثنای حلوانها تا حدود زیادی مورد تغذیه کپور معمولی بصورت عمدت است ولی درخصوص کپور هندی شواهدی دال بر تغذیه این کفزیان موجود نیست.

درخصوص نتایج دوره اصلی پروار بندی در پرورش توام ماهیان میزان تولید، نقش اساسی رادر معرفی یک گونه جدید به سیستم پرورش به عهده دارد، با توجه به اینکه در تیمارهای آزمایشی از میزان تراکم کپور ماهیان مرسوم کاسته شده و کپور ماهیان هندی جایگزین آنها شده (۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصد) نتایج حاصله نشان داد درمجموع در همه تیمارها میزان تولید از میزان متوسط استان (۳۲۰۰ کیلو گرم در هکتار، شیلات خوزستان ۱۳۸۹) و از تحقیقات مشابه در استان گیلان (حسین زاده و همکاران ۱۳۸۹) با لاتر بوده است. در آنالیز واریانس تفاوت معنی داری بین تیمارهای جایگزینی هندی و تیمار شاهد وجود نداشت، یعنی استفاده از هریک از تیمارهای جایگزینی کپور هندی در مقایسه با شاهد نه تنها باعث کاهش تولید نگردید بلکه می تواند باعث افزایش تولید هم گردد. (تیمار ۵۰ درصد جایگزینی) همچنین میزان تولید با گزارشات ارائه شده توسط Vasudevappa و همکاران در سال ۱۹۸۹ در خصوص ترکیب چهار گونه ای کاتلا، روهو، مریگال و فیتوفاگ که منجر به افزایش تولید به میزان ۴ تن در هکتار گردید و نیز گزارش Alem و همکاران در سال ۱۹۹۶ و Mathew در سال ۱۹۸۹ در اشاره کرد که تأثیر مثبت ترکیب تلفیقی کپور ماهیان چینی و هندی را در استخراج های خاکی نشان داده اند و میزان تولید مرسوم در هندوستان که با استفاده از غذاهای تجاری به ۴-۵ تن در هکتار در سال می رسد. (FAO,2008) مطابقت دارد. همچنین SUMAIRA ABBAS در سال ۲۰۱۰ با آزمایش انواع کودها با غذای دستی مکمل در پرورش توام کپور معمولی با کاتلا و روهو حداقل تولید ۲۹۹۷ کیلو گرم در هکتار را تولید کرد که از تولید نهائی در تیمارهای آزمایشی این پروژه کمتر می باشد.

وزن نهائی ماهیان و رسیدن به اندازه بازاری از مهمترین فاکتورهای موثر در توسعه پرورش یک گونه می باشد. و می تواند بر قیمت بازاری ماهی و ارزش اقتصادی تولید تاثیر زیادی داشته باشد. میانگین وزن نهائی ماهی روهو در ۳ تیمار آزمایشی به ترتیب ۱۱۳۶، ۱۱۲۹ و ۱۰۵۴ گرم بوده و اختلاف معنی داری بین آنها وجود ندارد. به نظر می رسد دلیل این همسانی این است که این ماهی عمدتاً از غذای دستی استفاده نموده و محدودیتی در زمینه دسترسی به غذا نداشته، هر چند در تیمار ۳۰ درصد بدليل تراکم کمتر از رشد بالاتری برخوردار بوده است. همچنین در یکی از استخراجها

(استخراج A8) (بامیانگین وزن نهائی ۱۲۹۳ گرمی و حداکثر وزن یک عدد ماهی، ۱۹۰۶ گرمی روهو موواجه می شویم که

نشان دهنده پتانسیل بالای رشد این ماهی در شرایط پرورشی استان خوزستان است.

همچنین میانگین وزن نهائی ماهیان کاتلاومریگال در ۳ تیمار آزمایشی به ترتیب ۷۲۶، ۹۰۲، ۸۳۹ و ۷۷۳

۸۹۴ گرم بوده و اختلاف معنی داری بین آنها وجود ندارد. همچنین در بعضی از استخراها با میانگین وزن

نهائی کاتلاومریگال به ترتیب ۱۰۸۹ و ۱۰۳۹ گرم و حداکثر وزن یک عدد ماهی ۱۲۲۴ گرمی کاتلاو ۱۳۳۴ گرمی

مریگال موواجه می شویم که نشان دهنده پتانسیل بالای رشد این گونه ها ورسیدن به وزن بازاری در شرایط پرورشی

استان خوزستان است. Chakrabarty و همکاران در سال ۱۹۷۹ با رها سازی کپور ماهیان هندی در استخراهای ۰/۱۷

هکتاری در طی مدت یکسال موفق به تولید کاتلا با وزن ۸۴۲-۷۱۹ گرم (وزن اولیه ۱۵۹ گرم) روهو با وزن ۷۲۳-۶۴۱

گرم (وزن اولیه ۳۵ گرم) و مریگال با وزن ۵۴۴-۶۱۰ گرم (وزن اولیه ۳۶ گرم) شدنده در بعضی از گونه ها از وزن

بدست آمده در این پژوهه کمتر بوده است. Abbas و همکاران در سال ۲۰۱۰ اظهار داشتند که روهو و کاتلا در عرض

یکسال به حداکثر وزن ۱۲۱۵ و ۱۲۵۶ گرم دست یافته اند که در مقایسه با کپور معمولی با ۱۱۱۹ گرم بیشتر بوده است.

Aminur, 2011 و همکاران در کشت توان کاتلا، روهو و مریگال بعداز ۹ ماه پرورش و در تراکم ۷۵۰۰ قطعه در هکتار

(کاتلا ۳۰۰۰ و روهو و مریگال هر کدام ۲۲۵۰ عدد) ماهیان کاتلا و روهو و مریگال به میانگین وزن ۶۳۱، ۵۸۱ و ۴۴۶ گرم

دست یافته اند.

همانگونه که در منحنی های رشد زمانی در استان خوزستان مشاهده می گردد، در آخر دوره رشد ثابت یا کم شده

است که دلیل آن محدودیت های روش نمونه گیری در استخراهای خاکی است، در آخر دوره کل جامعه آماری (ماهیان

موجود در استخر) صید، شمارش وزن گردیده است ولی در طول دوره از روش پره کشی نمونه گیری استفاده شده

است.

میزان بازماندگی ماهیان، از فاکتورهای اساسی در معرفی گونه های جدید می باشد باز ماندگی کلی ماهیان در همه

تیمارها یکسان بوده و بین ۳ تیمار جایگزینی کپور ماهیان هندی و تیمار شاهد اختلاف معنی داری وجود ندارد ولی

مقایسه میانگین های هریک از گونه ها صرف نظر از تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری را نشان داد که این اختلاف

بین بیگ هد با سایر گونه ها بود ولی تفاوت معنی داری بین ۳ گونه کپور هندی و سایر کپور ماهیان مرسوم (بجز بیگ هد) مشاهده نگردید.

میزان بازماندگی در ماهیان روهو، کاتلا و مریگال به ترتیب ۹۲، ۸۶ و ۹۷ درصد بود که در مقایسه با کپور ماهیان مرسوم دراستان مناسب می باشد . همچنان Aminur و همکاران در سال ۲۰۱۱ در درکشت توام کاتلا، روهو و مریگال بعد از ۹ ماه پرورش میزان بازماندگی سه گونه فوق را به ترتیب ۸۹، ۸۵ و ۹۰ درصد اعلام نمود که باداده های این آزمایش مطابقت دارد.

تعدادماهی ذخیره شده بیگ هد درهایی از استخرها پائین بوده و تلفات کلی دریکی از استخرها می تواند دلیل معنی دار بودن اختلاف بین بیگ هد با سایر گونه های پرورشی باشد.

متوسط میزان افزایش وزن روزانه در کپور ماهیان هندی کاتلا، روهو و مریگال از کپور ماهیان مرسوم کمتر است هر چند این فاکتور در ماهی روهو (۶ گرم در روز) با فیتوفاج (۶/۸ گرو در روز) تفاوت معنی داری ندارد، Sarkar و همکاران در سال ۱۹۹۹ رشد نسبتا کندتر کپور ماهیان هندی نسبت به کپور ماهیان چینی ردر استخر های پرورشی راعلام نموده و در عین حال بر کشت توام این گونه ها تأکید نمودند.

میزان افزایش وزن روزانه کپور ماهیان مرسوم در تیمارهای مختلف آزمایشی برای ماهیان فیتوفاج و کپور معمولی متفاوت بوده و اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود دارد. در فیتوفاج بیشترین افزایش وزن روزانه در تیمار ۷۰ درصد جایگزینی (۸ گرم) مشاهده گردید که با سایر تیمارهای تفاوت معنی داری راشن داد. در ماهیان کپور معمولی این تفاوت مربوط به تیمار شاهد با ۱۰/۱ گرم افزایش وزن روزانه با سایر تیمارها ۱۵/۸ تا ۱۶/۹ گرم افزایش وزن روزانه می باشد که در هر دو مورد بدلیل کاهش تراکم ماهیان فوقدار تیمارهای جایگزینی که نتیجتا باعث ایجاد فرصت برای رشد این گونه ها می گردید، می باشد.

در بین ماهیان هندی بیشترین ضربی رشد ویژه (SGR) مربوط به ماهی کاتلا (۱/۹۲) و کمترین مربوط به ماهی مریگال (۱/۴۵) می باشد که با گزارش FAO, 2008 و همچنان Sarkar و همکاران در سال ۱۹۹۹ مطابقت دارد.

Abbas و همکاران (۲۰۱۰) با پرورش توام ۳ گونه کپور معمولی با کاتلا و روهو میزان SGR آنها را به ترتیب .

۱/۰۴۹، ۱/۷۷ و ۱/۴۷ در صد محاسبه نمودو Aminur و همکاران در سال ۲۰۱۱ در درکشت توان کاتلا، روهو و مریگال

بعد از ۹ ماه پرورش میزان SGR سه گونه فوق را به ترتیب ۱/۳۴، ۱/۲۵ و ۱/۲۵ در صد اعلام نمود که بنتایج این پروژه

تطابق دارد.

در ۲ گونه فیتوفگ و کپور معمولی بین ۴ تیمار آزمایشی تفاوت معنی دار می باشد، آزمون دانکن نتایج حاصله

ییانگر وجود تفاوت معنی دارین تیمار شاهد (۱/۷۷ فیتو فگ و ۲/۱۸ در کپور) با تیمارهای جایگزینی کپور هندی در

هردو گونه فیتوفگ و کپور معمولی (به ترتیب ۱/۹۷ و ۲/۴۷) در تیمار ۷۰ در صد جایگزین می باشد که به نظر می رسد

بدلیل کاهش تراکم ماهیان فوق در تیمارهای جایگزینی که نتیجتا باعث ایجاد فرصت برای رشد این گونه ها می گردید،

می باشد.

ضریب رشد ویژه (SGR) ماهیان هندی از کپور ماهیان مرسوم کمتر میباشد که بالغلب مطالعات پیشین مطابقت

دارد، هرجند Dhawan و kaur در سال ۲۰۰۲ درکشت توان آزمایشی ماهیان کاتلا، روهو، با ۳ گونه کپور حوض،

کپور معمولی و کپور علفخوار میزان ضریب رشد ویژه (SGR) روهو را بالاتر و به ترتیب ۰/۹۱، ۰/۱۶، ۱/۰۹ و ۰/۷۶

اعلام نمودند.

ضریب چاقی (Condition Factor) شاخصی برای بررسی روند رشد ماهی و خوب یا بد بودن شرایط پرورش

یک گونه است، در آزمایشی توسط بساک کاهکش و همکاران (۱۳۸۵) در پرورش توان ماهی بنی با ماهیان کپور

معمولی، آمور، فیتوفگ و بیگ هد ضریب چاقی حد اکثر گونه های فوق به ترتیب ۱/۷۱، ۱/۶، ۲/۶، ۱/۵۴، ۱/۵۴ و ۱/۲۲

بدست آمد. مقایسه میزان ضریب چاقی در ماهیان هندی در طول دوره پرورش حاکی از همسان بودن این فاکتور برای

ماهی مریگال در طول دوره پرورش و مناسب بودن شرایط برای رشد و تغذیه آن ماهی بوده است. همچنین اختلاف

معنی دار ضریب چاقی بین ابتدا (۱/۱۶ روهو و ۱/۲۳ کاتلا) و انتهای دوره (۱/۱۳۹ روهو و ۱/۵۱ کاتلا) نشان دهنده بهبود

شرایط پرورش و رشد مناسب ماهی است.

با توجه به اینکه بیشترین سهم هزینه های تولید در هر دو استان به تغذیه ارتباط داشته است، بنابراین مدیریت تغذیه

مهمنترین عامل در افزایش سود دهی مزرعه محسوب می شود. در هندوستان در سیستم گسترده با سطح تولیدی ۳-۲ تن /

هکتار هزینه تولید در حدود $kg\ 0.3$ دلار امریکامی باشد در حالیکه هزینه ها در سیستم نیمه متراکم با هدف تولید -۸-

۴ تن / هکتار قریب $0/5-0/5$ دلار امریکا می باشد.

در مجموع به نظر می رسد رشد کپور ماهیان هندی در شرایط اقلیم استان گیلان علیرغم اختلافات درجه حرارت و اقلیم بین کشور هندوستان و شرایط استان از روند قابل قبول برخوردار بوده و امید تسریع در رشد طولی وزنی این ماهیان در شرایط اقلیم استانهای گرمسیر نظیر خوزستان و حتی بخش هایی از استان گلستان را تقویت می بخشد. با وجود اینکه کپور ماهیان هندی در سال اول پرورش همچنان نسبت به شرایط محیطی حساس هستند امید است در طی چندین سیکل تولید مثلی و تکثیر در مراکز تکثیر و پرورش زمینه آدانسیون این گونه ها با شرایط اقلیمی استانهای شمالی کشور که بیش از ۶۰٪ تولیدات ماهیان گرم آبی را به خود اختصاص داده اند محقق شود. در عین حال تکمیل مطالعات و تحقیقات با بررسی های دقیقت بر روی شاخص های رشد و تغذیه و ضریب مرگ و میر و مقایسه آنها در شرایط اقلیمی استانهای گیلان و خوزستان می تواند راه گشای بسیاری از سوالات باقیمانده در خصوص ترکیب کشت و زمان مناسب و ... در کشت تلفیقی گونه ها باشد. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از این مطالعه امکان سازگاری و رشد سه گونه کپور ماهیان هندی را با اجرای تمهیداتی مدیریتی نظیر استفاده از استخراهای زمستانی گذرانی و نیز استفاده از بچه ماهیان با وزن بالاتر را در شرایط اقلیم استان گیلان تأیید می نماید.

پیشنهادات:

۱- بر اساس نتایج حاصل کونه های کپور ماهیان هندی قابلیت رشد در شرایط آب و هوایی ایران(شمال کشور)

را داشته و میتوان براساس پروژه جامع تحقیقاتی نسبت به بررسی نرماتیو های رشد و تکثیر و اقتصاد تولید به

صورت مقایسه ای در ترکیب های مختلف گونه ای در دو استان گیلان و خوزستان اقدام نمود.

۲- نتایج نشان میدهد که ماهی کاتلا نسبت به سایر ماهیان از تحمل پایین تری نسبت به سرما برخوردار بوده (به

دلیل سطح زی بودن) لکن به نظر میرسد اجرای تمهیداتی نظیر استفاده از چاه با دمای $13-14$ درجه سانتی

گراد(مشابه طرح حاضر) جهت زمستان گذرانی کپور ماهیان هندی می تواند در تسریع تطابق گونه ها به

شرایط اقلیمی کشور موثر باشد.

- ۳- با توجه به رشد مناسب در شرایط اقلیم شمال کشور به نظر می رسد انتقال و جابجایی تعدادی از ماهی ها از استان خوزستان در سال آینده منجر به رشد سریعتر و تطابق بیشتر گونه ها خواهد شد.
- ۴- ارائه اعتبارات لازم از سوی سازمان شیلات ایران به مؤسسه تحقیقات جهت تکمیل طرح ماهیان کپور هندی بمنظور بررسی امکان کشت تلفیقی و تعیین تراکم های اقتصادی
- ۵- انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی بصورت همزمان با اجرای برنامه های پژوهشی در استانهای گیلان و خوزستان.
- ۶- به منظور تسريع در روند بررسی ها و مطابقت با اصول علمی رایج در کشور هندوستان لازم است گروهی از کارشناسان برای کسب تجربیات بیشتر به این کشور اعزام گردد.
- ۷- انجام مطالعات بازار برای کپور ماهیان هندی در حین اجرای پروژه های تکثیر و پرورش در قالب واردات محدود (۱۰۰۰ تن) این گونه ها و ارزیابی کیفیت و بازار پسندی توصیه می گردد.
- ۸- مطابق نتایج بدست آمده در این تحقیق کپور ماهیان هندی توانائی سازگاری، رشد و رسانیدن به وزن بازاری در شرایط آب و هوایی استان خوزستان را دارند لذا پیشنهاد می شود در انجام مطالعات زیست محیطی (EAI) (جهت معرفی گونه های فوق به مزارع پرورشی استان تسريع به عمل آید).
- ۹- نتایج بدست آمده در این پروژه اولین قدم در معرفی گونه های فوق به صنعت آبزی پروری استان بوده و با توجه به حساسیت های لازم در حفظ ذخیره محدود این گونه ها در کشور اجراء شده است، قطعاً تکرار تجربه فوق در سایر مزارع بدون حساسیت های کار تحقیقاتی می تواند نتایجی بهتری در برداشته باشد.
- ۱۰- با توجه به تکثیر مصنوعی موافقی آمیز ۳ گونه فوق توسط نگارنده و همکاران در سالهای ۸۹ و ۹۰ اعتبار لازم جهت تکمیل مطالعات مربوط به تکثیر مصنوعی در قالب پروژه های تحقیقاتی مصوب در اختیار پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور قرار گیرد.
- ۱۱- پیشنهاد می شود جهت شناسائی رفتار ماهیان در قالب یک پروژه تحقیقاتی پرورش توام ماهیان بصورت مجزا و بدون کپور ماهیان مرسوم مورد بررسی قرار گیرد.

۱۲- پیشنهاد می شود در قالب یک پروژه تحقیقاتی، پرورش توام کپور ماهیان هندی با کپور ماهیان مرسوم

بصورت تراکم های افزودنی (نه جایگزینی) مورد بررسی قرار گیرد

۱۳- به منظور تسريع در روند بررسی ها و مطابقت با اصول علمی رایج در کشور هندوستان لازم است گروهی از

کارشناسان برای کسب تجربیات بیشتر به این کشور اعزام گردند.

تشکر و قدردانی :

لازم می دانم تا از حمایت هاو مساعدت های ریاست محترم موسسه تحقیقات شیلات ایران ، معاونت محترم تحقیقاتی موسسه و همچنین معاونت محترم پشتیبانی وقت موسسه تشکر و قادر دانی نمایم . همچنین از روئسای محترم پژوهشکده آبزی پروری جنوب و شمال کشور و نیز از تمامی همکاران پژوهشکده های فوق الذکر و بویژه ریاست محترم ایستگاه تحقیقاتی آستانه اشرفیه تشکر می نمایم. از تمامی همکاران این پژوهش ائم از کارشناسان ، همکاران بخش های پشتیبانی و نیز همکاران بخش خدماتی در هر دو پژوهشکده که نهایت تلاش خود را در به ثمر رسیدن این پژوهش داشته اند کمال تشکر را دارم . همکاری ارزشمند سازمان های حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی کشور در امر واردات گونه های مربوطه قابل تقدیر بوده و نهایتاً در اجرای طرح پرورش سعی گردید تا اصول مدنظر دو سازمان مذکور رعایت و تا حصول نتایج رشد این گونه ها، از هر گونه جابجا بی ممانعت بعمل آید. در مجموع بسیاری از دستگاه ها و مجموعه ها در این امر مشارکت داشته که از جمله می توان به گمرک جمهوری اسلامی ایران، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، شرکت آبزیان آسیا، اداره کل محیط زیست استان خوزستان و گیلان، اداره کل دامپزشکی استان گیلان و خوزستان و ... اشاره نمود.

منابع :

- احمدی، م و نفیسی، م . ۱۳۸۰. شناسایی موجودات شاخص بی نهره آبهای جاری. چاپ اول . انتشارات خیر. صفحات -۲۱ . ۲۳۰
- اسکونزاد، م. ۱۳۶۸. اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پژوهه های صنعتی. مؤسسه مطبوعاتی علمی. تهران: ۳۹۵.
- اسماعیلی ساری . عباس. ۱۳۷۹. مبانی مدیریت کیفی آب در آبزی پروری . موسسه تحقیقات شیلات ایران ، مدیریت اطلاعات علمی . ص ۱۵۷ .
- بانی.ع . ۱۳۷۵ . بررسی ترکیب فتیوپلانکتونی حاصل از انواع کودهادر استخراهای پرورش ماهیان گرم آبی . پایان نامه کارشناسی ارشد.

بساک کاهکش ف، نیک پی، م، امیری؛ ف، ۱۳۸۲، تعیین تراکم مناسب ماهی بنی در سیستم چند گونه‌ای، موسسه تحقیقات

شیلات ایران

حسین زاده صحافی، ه، رجبی، ن، طلوعی، م. ح. و سبحانی، م. ۱۳۸۷. شاخصهای رشد بچه ماهی نورس کپور هندی

- (Labeo rohit) تا مرحله یک ساله در شرایط اقلیمی استان گیلان. پژوهش و سازندگی. شماره ۷۸ بهار ۱۳۸۷-۱۷۵

۱۶۷

حسین زاده، ه، مرتضوی س. ع.، معاضدی ج، ولی پور ح. صیادفر ج، ۱۳۸۷ گزارش وضعیت رشد و برآورد خسارت تلفات

کپور ماهیان هندی ناشی از سهل انگاری سازمان دام پزشکی، موسسه تحقیقات شیلات ایران

حسین زاده، ه، روحانی، م، معاضدی، ج، مظلومی، م، شرفیان، م، امینی، ۱۳۸۸، برنامه راهبردی ماهیان گرم آبی، موسسه

تحقیقات شیلات ایران

حسین زاده صحافی، ه، ۱۳۸۳، مروری بر روند تولید مهمترین گونه‌های آبزیان پرورشی در سال ۲۰۰۲ ایران و جهان، اداره

کل تولید و پرورش ماهی، معاونت تکثیر و پرورش شیلات.

دانش خوش اصل، ع، ۱۳۷۵. گزارش نهایی تعیین بهترین نسبت کشت ماهی سیم با کپور چینی، مرکز تحقیقات شیلات استان

گیلان

دفتر طرح و توسعه، ۱۳۸۴. پیش نویس سند برنامه پنجساله چهارم شیلات و آبزیان (۱۳۸۴-۱۳۸۸). شیلات ایران.

تهران: ۱۷۷

دفتر طرح و توسعه، ۱۳۷۸. برنامه سوم توسعه شیلات، شیلات ایران. تهران: ۳۸

رضایی خواه نرگسی، م، ۱۳۷۲، گزارش نهایی پرورش بچه ماهیان نورس و بچه ماهی انگشت قد کپور ماهیان به روش چینی،

مرکز تحقیقات شیلات استان گیلان، ص. ۴۳.

شکوریان و همکاران، ۱۳۷۷، پرورش ماهیان گرم آبی (تکمیلی)، اداره کل آموزش و ترویج، معاونت تکثیر و پرورش.

صالحی، ح، ۱۳۸۲. بازاریابی کلید موفقیت آبزی پروری. اداره کل آموزش و ترویج معاونت تکثیر و پرورش آبزیان.

شیلات ایران. تهران: ۱۱۵.

طلاء، مریم، ۱۳۸۴. بیولوژی کپور ماهیان هندی، آبزی پرور، بهار ۸۴ شماره ۱۳ و ۱۴، ص ۱۳-۱۰.

عابدینی، علی. ۱۳۸۴. گزارش نهایی طرح بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی قنوات و چاههای عمیق استان خراسان (شهرستان بردسکن) با هدف پرورش ماهیان سرد آبی، وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات شیلات ایران. ۶ ص.

فرید پاک، ف. ۱۳۶۵. دستور العمل فنی تکیر و پرورش ماهیان، معاونت تکیر و پرورش ماهیان آب شیرین کلباسی، م. سعیدی، س. مصدقی، فر، س. کارخانه، آ و حسین زاده، ه، ۲۰۰۵، تایید کرومومزهای کپور ماهیان هندی وارد شده به ایران، هفتمین گردهمایی شیلات هندوستان، ۱۲-۸، نوامبر ۲۰۰۵ بنگلور، هندوستان.

گزارش عملکرد تولید. ۱۳۸۸. اداره کل تولید و پرورش ماهی. معاونت تکیر و پرورش آبزیان شیلات ایران. گزارش عملکرد اداره کل تولید و پرورش ماهی، ۱۳۸۳، معاونت تکیر و پرورش آبزیان شیلات ایران. میر هاشمی نسب، س. ف، سعیدی و امیدوار، ص. ۱۳۸۴. مبارزه بیولوژیک انگل دیپلوستوموم با استفاده از لای ماهی گزارش نهایی پروژه. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران صفحات ۳۲ تا ۳۶.

میگلی نژاد، ا. ۱۳۷۹. عوامل موثر بر مصرف آبزیان در شهرهای منتخب غیرساحلی و چگونگی افزایش مصرف آبزیان با بهره گیری از روش تصمیم سازی دلفی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران. تهران: ۸۵

نوان مقصودی، م. ۱۳۷۵. بررسی توان تولید رودخانه شمرود سیاهکل گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد لاهیجان. صفحات ۴۱ تا ۴۰.

نیازی، لووس ۱۳۶۹، حشره شناسی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد چاپ سعدی، چاپ اول.

American public helth Association. 1998. Standard Metod for the Examination of Water and Wastewater.USA.1193 P.

Aminur R., M., Arshad, Nurul Amin A. S. M. 2011, African Journal of Biotechnology Vol. 10 (15), pp. 2999-3008, 11 April, 2011 Available online at <http://www.academic journals>.

- Awaless, A.1991. Mass Culture and Nutritional quality of The Fresh Water Rotifre
- Bennett, G.W.1967. Management of Artificial Lakes and Ponds.Reinhold publish,
p.455
- Biswass S.P. 1993, Manuall of methods in fish biology, South Asian Publishers,
PVR.LTD. India, P.157.
- Blakley D.R. Hursa T., 1988, Inland aquaculture development network, Fishing
Newse Books, PP. 184
- Boney, A. D. 1989. Phytoplankton. Edward annoid. British Library Cataloguing Carp
species to different protein sources in pelleted feeds, Aquaculture Research,
Vol.4.
- Chakrabarty, R.D. Sen, P., Rao, N.G.S., Ghosh, R., 1979, Intensive culture of Indian
major carps, in Advances in Aquaculture Fishing News LTD, England, pp. 153-
157.
- Claude, E. Boyd., 1990. Water quality in ponds for aquaculture.Department of
fisheries and applied aquaculture. 114 P.
- Dhawan A. ,Kaur S ,2002, Pig Dung as Pond Manure Effect on Water Quality, Pond
Productivity and Growth of Carps in Polyculture System Aquabyte ,Vol. 25, No. 1
- Edmondson, W.T.1959., Fresh Water Biology.New Yourk, London.John Wiley and
Sons In .1248 P.
- FAO, 2008, Fish State Pluss, Statistical Softwer, FAO, Rome.
- Hosseinzadeh,H., A. valipour,J. sayadfar, S. Behmanesh, K. Gharra J. Moazadi,
2010, Indian Majour Carp(*Labeo rohita*)Fingerling Grouth in Gillan, North of
IRAN ,Austalian Aquaculture ,Tasmania, 23-26 May,2010
- Hosseinzadeh,H., 2008, Introduction of indian majour carp *labeo rohita* to the north
part of Iran, Aquaculture Europ 2008, Krakow,15-18 Sep., POLAND
- Hora, S. L. , 1943, Role of vegetation in fishery tanks. Sci Cutl, 8: 324-327.

Hilge, V. 1985, Influence of temperature on the growth of the European catfish (*Ictalurus glanis*), Z. Angew Ichthyol. , 1 (1): 27-31.

<http://www.npwrc.usgs.gov/resource/1998/classwet/tab2.htm>

Jhingran V. G., 1966. Fish and fisheries of India, Hindustan Publishing Corporation, PP.727

Jhingran V.G., and R.S.V. Pullin, 1985; A hatchery manual for the common Chinese and Indian major carps, Asian Development Bank. P.191.

Jagannadhan, N. ,1947, A note on the collection, conditioning and transport of fingerlings of catla in Madras presidency. j. Bombay. Nat. His. Soc. 47: 315-319. Society, 1, pp. 132pp.

King M., 1997. Fishing Biology Assessment and Management, Fishing News Books, P.497.

Kotykova,L.A.1970 .,Eurotatoria .CCCP.Leningrad.743 P.

Kausar, R. and Salim, M. 2006. Effect of water temperature on the growth performance and feed conversion ratio of Labeo rohita. Pakistan Vet. J. , 26 (3): 105-108.

Krovchinsky, N. and Smirnov .N. 1994. Introduction of Cladocera. Publication data.118 P.

Lenore s . Clesceri , Arnold E . Greenberg, Andrew D. Eaton, Mari Ann H .Franson, 2005 .Standard Method for the examination or water and waste water, 20th Edition, published by American public Health Association (APHA).

Maosen.H.1983. Fresh Water Plankton Illustration.Agriculture publishing house.85 P.

Mathew, P.M, 1989, Role of exotic carps in composite fish culture, p. 85-89.in M.Mohan Joseph (ED) Exotic aquatic special of India, Special publication 1, India.

Mukherjee, H. K. , Ganguly, D. N. and Sengupta, S. N. , 1946. The optimum range of temperature of water for fingerlings of major carps of India. Sci Cult 11: 383-384.

Nash, C. E. Novotny, A. G., 1995, Production of aquatic animals, Elsevier, PP.405
Pontin, R. M. 1978. A Key to the Fresh Water Planktonic and Semiplanktonic

Rotifera of the British Isles. Titus Wilson and son. Ltd .178 P.

Presscot, G. W .1962. Algae of the western great lakes area. Vol. 1, 2, 3. WM. C Brow Company Publishing, IowaUSA.933 P.

Presscot, G.W.1970. The Fresh Water Algae.WM.C.Brown Company Publishing, Iowa.USA.348 P.

Ranjan Rout, P. 2005. Areation an Additional input in rearing of fingerlings for increasing productivity in Orissa, Seminar on Inland Fisheries Management, 21-26-sep. 2005.

Ruttner-Kolisko, A .1974. Plankton Rotifers, Biology and Taxonomy, Austrian Academy of Science.146 P.

Sarkar, S.K, Medda, C., Ganguly, S., Basu, T.K., 1999, Length, Weigth Relationship and relative condition of Bundh and hatchery *labeo rohita* during early period of development, Asian Fishery Society, vol., 12 no.2.

Sea, P.R chatterjee D.K., 1976, Enhancing production of Indian major carp fry and fingerling by use of growth promoting substances, Advances in Aquaculture Fishing News Books LTD, FAO, pp.134-141.

Shcherbina, M. A. and Kazlauskene, O. P. 1971. Water temperature and digestibility of nutrient substances by carp. Hydrobiologia, 9: 40-44.

Sinha, VRP. Nanerjee, MK, and D., Kumar, 1973; Composite fish culture at Kalyani west Bengal, J. Inland. Fish. Soc.Ind., 5, 283-290.

Sourina, A. 1978. Phytoplankton manual, United Nations Educational, Scientific and Culture Organization.337 P.

Tiffany, L.H and Britton .M.e., 1971.The Algae of Illinois.Hanfer publishing Company, Newyork.407 P.

- Tripathi, S.D. 1989; *Hypophthalunicthys molitrix* and *Ctenopharynogodon idella* exotic elements in freshwater carp polyculture in India, p.21-23, in Mohan Joseph (Ed) Exotic Aquatic Species in India. 132 pp.
- Watanabe, T and T.C, Kitajima and S.Fujita.1983.Nutritional Values of Live Organisms Used in Japan for mass Propagation of Fish.A Review Aquaculture.pp.115 - 143.
- Wickliff, E.L., and L.S, Roach. 1937. Am.fish.soc.trans.66:PP. 78-86.
- Zafar, M., Mussadeg, S, Akhtar S. Sultan, A, 2003, Weight-length and condition factor in *Catla catla*, Pakistan Journal of Biological Science, 6(17):1532-1534.

Abstract

15000 juvenile Indian majour carps (*Labeo Rohita,Cirhinus merigala, Catla catla*) imported (2004) and transferred to the earthen ponds in Astaneh Fisheries Research Station , In order to assess the viability of rearing under the climatic condition of north part of Iran and also achieve some growth parameters from the larval stage to market size.The fry with 300 mg weight, were released in to 12 ponds.specimens were separated to tree experimental categories: 1= (30%indian carp and 70% chinees carp) , 2= (50%indian carp and 50% chinees carp) , 3= (70%indian carp and 30% chinees carp) .single chinees carp production were used as control . fishes were fed with artificial food and also with the natural products of the ponds which were enriched with organic fertilizers, after being equally stocked in the ponds .During the experiment, oxygen level ,PH, turbidity, and temperature were measured . Monthly fry samples were taken, for weight and length biometrical analysis and also determination of the weight gain percentage, average daily growth rate, specific growth rate. Results have indicated adaptations and considerable growth in this species, with an increase from the initial weight of 300 mg to an average of 13.5 ± 1.6 mg in 50 days period until the end of November for fingerlings. Also the average weight of growing phase (second year of production) was 647g. for *Labeo Rohita* ,420 g. for *Cirhinus merigala* and 734g. for *Catla catla*. The special growth rate(SGR)in Roho was 4.51 %.and 3.9 % for merigal and 6.2 % for Catla while for Chinees carps SGR was 4.9, 6.7, 7.6 and 5.8 for silver carp,grass carp, common carp and big head respectively. Results revealed that the Indian majour carps compatibility with the condition in Gilan province was succesfull and the combination of

species and optimization of their compatibility were remind for future studies.

The culture period was 6 month in the Khuzestan province. Once every 45 days by using signebeach net samples were taken from ponds and biometry tests were done. The maximum net production was observed at 50% situated treatment, with average weight 723. 3 kg per 1700 m² ponds (4254. 9 kg ha). There is no significant differences between experimental treatments with each other and with control ($P < 0.05$).

Mean final weight of Rohu in 3 experimental treatments were 1136, 1129 , 1054 g and in Catla and Mrigal were 726,902, 839 g and 773,788,894. There was not significant difference between them ($P < 0.05$). Survival rate in Rohu, Catla and Mrigal was 92%, 97% and 86% respectively. The maximum specific growth rate (SGR) of fish related to Catla (1. 92) and the minimum SGR of fish was observed in Mrigal (1. 45) .Also in accordance with the results of this study, the Indian carp fishes can able to adapt, grow and reach to market weight in the khuzestan province's weather conditions.

Key words: Indian carp, I.R.IRAN, Growth, *Labeo Rohita,Cirhinus merigala, Catla catla*