

LA TERRE ET LA VIE

8^e ANNÉE. — N° 4

JUILLET-AOUT 1938

LA CONSERVATION DU PELAGODOXA HENRYANA

par

M. GUILLAUMIN

Professeur au Muséum.

En 1907, M. D. Bois ¹ a fait connaître un très curieux Palmier, découvert par M. C. Henry, connu aux îles Marquises sous le nom d'*Enu* et que Beccari ² a décrit sous le nom de *Pelagodoxa Henryana*, en ajoutant que c'était « un des Palmiers les plus remarquables du monde entier.

Ultérieurement ³, il a insisté sur la valeur ornementale de cet arbre à feuilles flabelliformes, vertes en dessus, blanc d'argent en dessous. Dans le même article, il signalait un premier essai infructueux d'introduction au Muséum en 1920, puis un semis effectué en 1921, qui avait donné trois plantes dont les deux survivantes avaient péri en 1923 par suite de la maladie des jeunes Palmiers, causée par le *Penicillium incarnatum*. Il ajoutait que « deux exemplaires existaient dans un établissement horticole de la région parisienne ». Il s'agissait de la maison J. Chantrier à Morte-fontaine (Oise) qui présenta un pied à l'Exposition d'Horticulture de printemps, à Paris, en 1924, où il remporta un certificat de mérite de la Société nationale d'Horticulture de France ³. Le

Pelagodoxa Henryana est localisé dans la vallée de Typée, dans l'île de Nukahiva, dans un endroit où il ne voit jamais le soleil; M. J. Chantrier précisait qu'on n'en connaissait qu'une dizaine de pieds. Ayant signalé, par l'entremise de M. Rode, à M. le Gouverneur des Établissements français d'Océanie, l'intérêt qu'il y aurait à protéger ce Palmier rarissime, M. Chastenet de Géry veut bien me faire connaître que M. H. W. Smith, professeur américain fixé depuis 20 ans à Tahiti, où il a fait de son domaine un admirable jardin botanique, a introduit le *Pelagodoxa Henryana* :

1° au Coconut Grove Palmetum (Californie) où il pousse fort bien et d'où des plants ont été envoyés dans d'autres jardins ;

2° en Floride où le taux de germination a été satisfaisant ;

3° au Canal Zone experiment Garden, à Summit (Canal Zone) et au Royal botanic Garden de Peradenyia (Ceylan). Il ajoute, d'après M. H. W. Smith, qu'il existe quatre pieds à Papeari (Tahiti) dans la propriété de ce dernier, plusieurs dans le jardin botanique administratif de Papeete, enfin un autre dans le jardin de M^{me} Deflesselle, également à Papeete. En admettant qu'un cata-

1. *Rev. Hort.*, p. 302-304, fig. 76-79, 1916-1917.

2. *Ibid.*, p. 133-140, fig. 47, 1924-1925.

3. *Journ. Soc. nat. Hort. France*, 4^e sér., XXV, p. 328, fig 26, 1924.



Photo Crake à Papeete.

Pelagodoxa Henryana Beccari dans le jardin de M^{me} Deflesselle à Papeete. Décembre 1937.
A noter que, dans la station naturelle, les feuilles adultes sont entières.

clysmme fasse disparaître cette espèce de la station naturelle où les indigènes se gardent bien de la détruire à cause

du caractère sacré qu'ils lui attribuent, la conservation du *Pelagodoxa Henryana* semble donc assurée.