



Palpares libelluloides - Envergure réelle : 100 à 120 mm - Photo : Vincent Derreumaux

Actualisation de la liste des insectes patrimoniaux pour la Réserve de biosphère Luberon-Lure

Pierre FRAPA*

RÉSUMÉ

L'auteur actualise la liste d'espèces présentée antérieurement en fonction de différents nouveaux éléments en y ajoutant 197 taxons, alors que 79 autres en sont retirés, le nombre total s'établissant alors à 705.

Mots-clés: insectes, protection, espèces menacées, patrimoine, listes.

TITLE

Insect heritage for Biosphere reserve Luberon-Lure (Addenda)

ABSTRACT

The author updates the list of species previously presented according to various new elements by adding 197 new taxa, and by removing 79 taxa, the total number rising to 705.

Keywords: *insects, protection, endangered species, patrimony, lists.*

* Entomologiste, membre du Conseil scientifique du PNRL et de la RB Luberon-Lure – coleo_et_cie@orange.fr

Introduction

Dans le numéro 11 de la présente publication j'avais présenté une liste d'espèces d'insectes dont la « valeur patrimoniale » pouvait être considérée comme attestée par leur mention dans une des listes publiées qui étaient présentées. (Frappa, 2012) La démarche me semble encore d'actualité, même si les listes utilisées sont susceptibles de subir des changements importants.

Ainsi, celle concernant les espèces déterminantes et remarquables pour les ZNIEFF en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) a subit un remaniement très conséquent en 2016 : de nombreux taxons y ont été ajoutés, en particulier dans des groupes précédemment peu pris en compte (Dreal-Paca, 2016a et b). Néanmoins, comme on peut le constater dans le tableau et la figure 1, certains groupes (Diptères, Hyménoptères en particulier) restent peu représentés au regard de leur importance numérique.

De plus, la liste rouge régionale des Rhopalocères et des Zygoptères, parue entretemps (Bence, 2014) permet de compléter ce qui concerne les lépidoptères. Les informations concernant les insectes aquatiques sur le site dédié du groupe « Benthos » de l'Office pour les insectes et leur environnement (<http://www.opie-benthos.fr>) sont plus complètes.

Enfin quelques espèces ont été entretemps observées sur le territoire, renforçant la nécessité de cette mise au point. Il est aussi apparu que les critères ayant conduit à ne pas retenir certains taxons, supposés absents du territoire, étaient

un peu trop sévères et qu'il semblait préférable d'envisager parfois une présence potentielle même si elle n'était pas formellement avérée, par exemple pour des taxons dont l'aire connue de répartition nationale, voire européenne, englobe le territoire Luberon-Lure où leur biotope existe *a priori*.

À l'énumération des listes prises en considération, il convient d'ajouter celle établie par Masselot & Brulin (2000) concernant les Éphéméroptères puisque l'une des espèces qu'ils mentionnent a été inventoriée selon Benthos (programme 1994-2015) dans le Var, le Gard, l'Ardèche... qui la signale comme « en danger ». Je la considère comme potentielle sur notre territoire, elle est notée « MB » dans la colonne « Autres ».

Par ailleurs, il est apparu utile de distinguer les espèces effectivement connues du territoire de celles qui n'y sont que plus ou moins potentielles. Pour cette actualisation, outre l'expertise d'un certain nombre d'entomologistes cités plus bas et une importante bibliographie impossible à citer ici, mais qui est disponible sur demande, ont été consultés les Bases de données de l'INPN (2017), Silène Faune (2017) et PNR-PACA (2017), ainsi que le Catalogue des coléoptères de France (Tronquet, 2014).

On trouvera donc ci-après un tableau qui doit se substituer à celui paru dans le Courrier scientifique n° 11 (2012). Le texte qui précède celui-ci reste d'actualité dans l'ensemble, complété et corrigé par les éléments contenus dans le présent texte.




Tableau et fig. 1 : répartition des ordres d'insectes dans les taxons ZNIEFF en région PACA.

Caractéristiques de la nouvelle liste des espèces patrimoniales pour le territoire Luberon-Lure

Compte tenu des modifications induites par les différents éléments cités, la nouvelle liste comporte 705 taxons et se décompose comme suit¹ présentés en annexe : Coléoptères : 394 (3,0% de la faune française) dont Cerambycidés : 55

Elateridés : 47

Carabidés : 36

Chrysomélidés : 36

Curculionidés : 28

Scarabéidés (dont Aphodiinés et Cetoniinés) : 26

Buprestidés : 21

Ténébrionidés : 19

Histéridés : 13

Staphylinidés (dont Psélaphinés et Scydméninés) : 12

Autres : 101

Lépidoptères : 103 (1,7%)

dont Rhopalocères : 41 (11,4%)

Hétérocères : 61 (2,8%)

Orthoptères : 62 (18,2%)

dont Acrididés : 23

Tettigoniidés : 19

Hémiptères : 56 (1,5%)

Odonates : 29 (26,4%)

Hyménoptères : 24 (0,3%)

Diptères : 11 (0,1%)

Névroptères : 7 (4,2%)

Trichoptères : 7 (1,5%)

Ephéméroptères : 5 (3,3%)

Plécoptères : 4 (1,9%)

Dictyoptères : 3 (6,3%)

REMERCIEMENTS

Je dois encore remercier ici les entomologistes consultés qui m'ont apporté leur expertise dans la sélection des taxons et notamment dans leur répartition et qui m'ont aussi fait profiter de leur documentation : Cédric Alonso, Robert Constantin, Jacques Coulon, Olivier Courtin, Gérard Delvare, Yves Doux, Mathieu Lagarde, Thierry Noblecourt, Christian Pérez, Philippe Ponel, Pascal Rousse, Tim Struyve, Alain Thiéry, Lionel Valladarès, Thomas Weirich.

Merci également à Vincent Derreumaux pour sa photo de *P. libelluloides*.

1. La référence pour la faune française métropolitaine du domaine continental est la version 10.0 du référentiel national de l'INPN (téléchargeable sur la page <https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo>)

Bibliographie additionnelle

BENCE Stéphane (Coord.), 2014. *Liste rouge régionale des Rhopalocères et Zygènes de Provence-Alpes-Côte d'Azur.* CEN PACA, Aix-en-Provence, 22 p.

DREAL-PACA, 2016a. *Znieff continentales : liste des espèces de faune déterminante en région PACA.* Direction régionale de l'environnement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille, 35 p.
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF_EspecesDeterminantes_Faune_2016.pdf

DREAL-PACA, 2016b. *Znieff continentales : liste des espèces de faune remarquable en région PACA.* Direction régionale de l'environnement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille, 36 p.
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/znieff_faune_remarquable_2016.pdf

FRAPA Pierre, 2012. Insectes patrimoniaux pour la réserve de biosphère Luberon-Lure. *Courrier scientifique du Parc naturel régional du Luberon et de la Réserve de biosphère Luberon-Lure*, n° 11, pp. 78-110.

INPN, 2017. *Inventaire national du patrimoine naturel* - Base de données naturalistes nationale, associée au Muséum national d'histoire naturelle - <https://inpn.mnhn.fr/accueil/index>

LESEIGNEUR Lucien, CHARLAT Sylvain & ALLEMAND Roland, 2010. Réhabilitation de *Athous puncticollis* Kiesenwetter, 1858, espèce distincte de *A. vittatus* Fabricius, 1792 (Coleoptera, Elateridae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, T. 115, Fasc. 3, pp. 381-385.

LUPOLI Roland & DUSOULIER François, 2015. *Les punaises Pentatomoidea de France.* Ed. Ancyrosoma, Fontenay-sous-Bois, 149 p.

MASSELOT Gérard & BRULIN Michel, 2000. Les éphémères d'intérêt patrimonial pour la France. 1 : Première liste : espèces éteintes et espèces en situation critique [Ephemeroptera]. *Ephemera*, T. 2, Fasc. 1, pp. 59-65.

PNR FAUNE, 2017. *Système d'information territorial des Parcs naturels régionaux du Luberon, du Verdon, du Queyras, de la Camargue V2* - Base de données naturalistes des PNR de la région PACA - <http://faune.pnrpaca.org>

RIEGER Christian, 2011. What is *Eurygaster austriaca seabrai* China, 1938 (Hemiptera: Heteroptera: Scutelleridae) ? *Heteropterus Revista de Entomologia*. T. 11, Fasc. 2, pp. 339-343.

SILENE FAUNE, 2017. Système d'information et de localisation des espèces natives et envahissantes - Faune V3 - Base de données faunistiques pour le région PACA - www.silene.eu

TRONQUET Marc (Ed.), 2014. Catalogue des coléoptères de France. Association roussillonnaise d'entomologie, Perpignan, 1 052 p.

ANNEXE (PAGES 104 À 126)
Proposition d'une liste d'espèces patrimoniales pour le territoire de la
Réserve de biosphère Luberon-Lure et ses abords.

SLa nomenclature retenue est celle du référentiel taxonomique du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) TAXREF, dans sa version 10.0 (novembre 2016). Lorsqu'elle diffère de celle de la liste source, le nom utilisé dans celle-ci figure à la suite entre crochets.

Prot. = Protection nationale: Espèces figurant dans les arrêtés de 1979, 1993 et 2007, notées « X ».

DH = Directive Habitats: Espèces figurant dans les annexes 2 et/ou 4 de la Directive européenne.

LR-R = Liste Rouge Régionale.

LR-N = Liste Rouge Nationale.

LR-E = Liste Rouge Européenne.

LR-M = Liste Rouge Mondiale: pour la signification des indications relatives aux différentes Listes Rouges figurant au tableau, se reporter au texte de l'article initial (Frapa, 2012).

PACA = Espèces figurant sur la liste des espèces déterminantes (« D ») ou remarquables (« R ») pour les ZNIEFF de la région PACA (DREAL-PACA, 2016a et 2016b).

Autres: Br1, Br2, Br3, Br4: Coléoptères respectivement notés Ips1, Ips2, Ips3, Ips4 par BRUSTEL (2007).

SD: Orthoptères figurant dans la liste de Sardet & Defaut (2004); le premier chiffre indique la priorité dans le domaine subméditerranéen et le second dans le domaine méditerranéen.

MB: Ephéméroptère figurant dans la liste de Masselot & Brulin (2000).

Présent: La dernière colonne du tableau permet d'évaluer la présence connue du taxon sur le territoire:

- 1 pour ceux dont au moins une donnée a pu être trouvée dans le périmètre de la Réserve de biosphère.
- 2 pour ceux dont la littérature et les différentes bases de données consultées montrent que ce périmètre est incontestablement inclus dans l'aire de répartition du taxon, sa présence est donc fortement potentielle.
- 3 pour ceux dont l'aire de répartition est généralement très large et disjointe, avec des populations localisées ou en situation de limite d'aire, la probabilité de présence effective est donc plus faible.
- 0 pour ceux dont la répartition est mal connue (ces taxons figuraient dans la version précédente sur fond grisé).

Ordre	Famille	Taxon final						Present	
		Pro.	DH	LR-R	LR-N	LR-E	LR-M	PACA	Autre
	Anthicidae	<i>Anthicus catalanus</i> Bonadona, 1953					R		3
		<i>Dissoleucas niveirostris</i> (Fabricius, 1798)						Br.2	2
		<i>Platyphorus resinosis</i> (Scopoli, 1763)						Br.2	1
	Anthribiidae	<i>Pseudoperitus sepiola</i> (Fabricius, 1792) [= <i>Eneadreytes sepiola</i> (Fabricius, 1792)]						Br.2	2
		<i>Tropidurus albirostris</i> (Schaller, 1783)						Br.2	2
	Biphyllidae	<i>Biphyllus lunatus</i> (Fabricius, 1787)						Br.2	3
		<i>Eneadromus trispinosus</i> (Olivier, 1795)					R		2
	Bostrichidae	<i>Lichenophanes varius</i> (Illiger, 1801)			NFT			Br.2	2
		<i>Micrapate xyloperthoides</i> (Jacquelin du Val, 1859)				R			2
		<i>Anommatus distinctus</i> Dodero, 1900				R			3
		<i>Anommatus planicollis</i> Fairmaire, 1869					R		1
	Bothridiidae	<i>Ogmodes angusticollis</i> (C. Brisout de Barneville, 1861)						Br.3	2
		<i>Oxylaemus cylindrinus</i> (Creutzer, 1796)						Br.2	1
		<i>Teredus cylindricus</i> (Olivier, 1790)						Br.3	2
	Brentidae	<i>Amorphocephala coronata</i> (Germar, 1817) {note 1, p. 126}						(Br.)	1
		<i>Arnaedera degener</i> (Scopoli, 1763)						Br.2	1
	Coleoptera	<i>Agrius ater</i> (Linnaeus, 1767)						Br.2	1
		<i>Agrius curvulus</i> Mulsant & Rey, 1863						Br.3	1
		<i>Agrius grandiceps</i> Kiesenwetter, 1857						Br.3	1
		<i>Agrius guerinii</i> Lacombe, 1835						Br.3	1
		<i>Anthaxia senicula senicula</i> (Schrank, 1789) [= <i>Anthaxia decurvata</i> (Gmelin, 1790)]					D		1
	Buprestidae	<i>Anthaxia thalassophila</i> Abeille de Perrin, 1900					R		2
		<i>Buprestis octoguttata</i> Linnaeus, 1758						Br.2	1
		<i>Buprestis rustica</i> Linnaeus, 1758						Br.2	1
		<i>Chalcoephora mariana</i> (Linnaeus, 1758)						Br.2	1
		<i>Conobius undatus</i> (Fabricius, 1787)						Br.2	1
		<i>Dicerca aenea</i> (Linnaeus, 1760)						Br.2	1
		<i>Dicerca ahni</i> (Fischer von Waldheim, 1824)						Br.2	1
		<i>Dicerca berolinensis</i> (Herbst, 1779)						Br.3	1
		<i>Eurythyrea micans</i> (Fabricius, 1792)						Br.2	1

		<i>Eurythyrea querus</i> (Herbst, 1780)					Br.3	3
		<i>Kisanthobia ariasi</i> (Robert, 1858)					Br.3	1
	Buprestidae	<i>Lamprodila decipiens decipiens</i> (Gebler, 1847) [= <i>Ovalisia dives</i> (Guillebeau, 1889)]					Br.3	1
		<i>Latipalpis plana</i> (Olivier, 1790)					Br.2	1
		<i>Melanophila cuspidata</i> (Klug, 1829)				R	1	
		<i>Phaenops formaneki</i> Jakobson, 1913				Br.3	1	
	Byrrhidae	<i>Trichobryrrhulus stictini</i> (Des Gozis, 1882)			D		D	2
		<i>Macrocerus tunicatus</i> (Kiesenwetter, 1863)			D		D	1
		<i>Malthinus devillei</i> Abeille de Perrin, 1898			D		D	1
		<i>Malthodes discicollis</i> Baudi di Selve, 1859			D		D	2
		<i>Malthodes facetus</i> Kiesenwetter, 1863			D		D	3
		<i>Malthodes procerulus</i> Kiesenwetter, 1852			D		D	1
		<i>Malthodes trifurcatus</i> Kiesenwetter, 1852			D		D	2
		<i>Acriopius megacephalus</i> (P. Rossi, 1794)			D		D	3
		<i>Bembidion andreae</i> (Fabricius, 1787) [= <i>Ocydromus andreae</i> (Fabricius, 1787)]			D		D	1
		<i>Bembidion decorum decorum</i> (Zentner, 1801) [= <i>Ocydromus decorus</i> (Zenker in Panzer, 1801) = <i>O. decorus trinense</i> (Meyer, 1936)]			D		D	2
		<i>Bembidion grisvardi</i> (Dewailly, 1949) [= <i>Ocydromus grisvardi</i> (Dewailly, 1949)]			D		R	2
		<i>Bembidion italicum</i> de Monte, 1943 [= <i>Ocydromus italicus</i> (de Monte, 1943)]			R		R	1
		<i>Bembidion milleri</i> Jacquelin du Val, 1852 [= <i>Ocydromus milleri</i> (Jacquelin du Val, 1851)]			D		D	3
		<i>Bembidion praestans</i> Dejean, 1831 [= <i>Ocydromus praestans</i> (Dejean, 1831)]			D		D	2
		<i>Carabus abyssanus</i> Illiger, 1798			D		D	1
		<i>Carabus auratus honoratus</i> Dejean, 1825	X		R		R	1
		<i>Carabus monilis atlanticus</i> Bellier, 1880			R		R	3
		<i>Carabus nubans</i> Olivier 1795			D		D	1
		<i>Chlaeniuss circumscriptus</i> (Dufschmid, 1812) [= <i>Epomis circumscriptus</i> (Dufschmid, 1812)]			D		D	3
		<i>Cylindra annaria</i> (Huesslins, 1775)			D		D	1
		<i>Cymindis abeillei</i> Jeannel, 1942			D		D	3
		<i>Dolichus halensis</i> (Schaller, 1783)			R		R	1
		<i>Duvalius muriaui</i> Jeannel, 1957			D		D	1
		<i>Hypotyphlus aubei</i> (Saulcy, 1863) [= <i>Microtyphlus aubei</i> (Saulcy, 1863)]			D		D	1
		<i>Laemostenus alpinus</i> (Dejean, 1828)			R		R	2

Ordre	Famille	Taxon final	Pro.	DH	LR-R	LR-N	LR-E	LR-M	PACA	Autre	Present
		<i>Licinus planicollis</i> Fauvel, 1888						R			1
		<i>Licinus silphoides</i> (P. Rossi, 1790)						R			1
		<i>Lionychus albomotatus</i> (Dejean, 1825)						R			3
		<i>Larophorops gaudini</i> (Jeannel, 1952) [= <i>Trichophacnops gaudini</i> (Jeannel, 1952)]						D			1
		<i>Maoreus wettbergii</i> (Gyllenhal, 1813)						R			3
		<i>Mesadomius myrmidon</i> (Fairmaire, 1859)						D			1
		<i>Odacantha melanura</i> (Linnaeus, 1767)						R			3
		<i>Pangus scariatus</i> (Sturm, 1818)						R			3
		<i>Panzaphium chevrolatii</i> (Laporte de Castelnau, 1833) [= <i>Zuphium chevrolatii</i> (L. de C., de C., 1833)]						R			3
		<i>Penetrus rufipennis</i> (Dejean, 1828)						R			2
		<i>Polistictus fasciolatus</i> (P. Rossi, 1790)						D			3
		<i>Pseudomasoreus canigoulensis</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1854)						D			1
		<i>Pterostichus gracilis</i> (Dejean, 1828) [= <i>Melanarius gracilis</i> (Dejean, 1828)]						D			1
		<i>Pterostichus lasserrei</i> (Dejean, 1828)						D			1
		<i>Serodiporus faginezi</i> Jeannel, 1937						D			1
		<i>Tachys brevicornis</i> Chaudoir, 1846						D			3
		<i>Trechus austriacus</i> Dejean, 1831						R			1
		<i>Trechus delarouzei</i> Pandelle, 1867						D			1
		<i>Acanthocinus reticulatus</i> (Razoumowsky, 1789)						Br.3			3
		<i>Acmaeops pratensis</i> (Laicharting, 1784)						Br.2			3
		<i>Agonomorphus clavigipes</i> (Schrank, 1781)						Br.2			1
		<i>Agosoma scabriorne</i> (Scopoli, 1763)						Br.2			1
		<i>Agapanthia kirbyi</i> (Gyllenhal, 1817)						R			1
		<i>Anaglyptus mysticus</i> (Linnaeus, 1758)						Br.2			1
		<i>Anastrangalia reyi</i> (Heyden, 1889)						Br.3			3
		<i>Anisognathus quercus</i> (Götz, 1783)						Br.3			1
		<i>Anoploderia rufipes</i> (Schaller, 1783)						Br.2			1
		<i>Anoploderia sexguttata</i> (Fabricius, 1775)						Br.2			1
		<i>Arhopalus syriacus</i> (Reitter, 1895)						Br.3			1
		<i>Callimius abdominalis</i> (Olivier, 1795) [= <i>Callimellum abdominalis</i> (Olivier, 1795)]						Br.3			2
Cerambycidae											

	<i>Callinicus angulatus</i> (Schrank, 1789) C [= <i>Callinellum angulatum</i> (Schrank, 1789)]	X	2 & 4						Br.2	1
	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758			NT					Br.1	1
	<i>Cerambyx miles</i> Bonelli, 1812			NT					Br.2	1
	<i>Cerambyx weleensis</i> (Küster, 1845)			NT	R				Br.2	1
	<i>Chlorophorus glabromaculatus</i> (Goeze, 1777)								Br.2	1
	<i>Chlorophorus ruficornis</i> (Olivier, 1790)			D				D		1
	<i>Chrys tropicus</i> (Panzer, 1795)							Br.3		1
	<i>Dero phila genet</i> (Aragona, 1830)							Br.3		1
	<i>Drymochares truquii</i> Mulsant, 1847				D			Br.4		2
	<i>Ergates faber</i> (Linnaeus, 1760)							Br.2		1
	<i>Icosium tomentosum</i> Lucas, 1854			D				D		2
	<i>Lamia textor</i> (Linnaeus, 1758)							Br.3		2
	<i>Mesosa curviflanoidea</i> (Linnaeus, 1760)							Br.2		1
	<i>Morimus asper</i> (Salzer, 1776)							Br.2		1
	<i>Necydalis major</i> Linnaeus, 1758							Br.3		3
	<i>Necydalis ubri</i> Chevrolat, 1838							Br.3		1
	<i>Oxymirus cursor</i> Linnaeus, 1758							Br.2		1
	<i>Oxypleurus nodifer</i> Mulsant, 1839							Br.3		1
	<i>Pedostrangalia revestita</i> (Linnaeus, 1767)							Br.3		1
	<i>Phytoecia vulneris</i> Aurivillius, 1923				D			D		1
	<i>Poecilium pusillum</i> (Fabricius, 1787)							Br.2		1
	<i>Pogonocherus caroli</i> Mulsant, 1862							Br.3		1
	<i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758)							Br.2		1
	<i>Pseudophenges cinerea</i> (Apporte de Castelnau & Gory, 1836)							Br.3		1
	<i>Purpuricenus globulicollis</i> Déjean, 1839						R	Br.3		1
	<i>Purpuricenus kaehleri</i> (Linnaeus, 1758)							Br.2		1
	<i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775)							Br.2		1
	<i>Rhagium sycephalum</i> (Schrank, 1781)							Br.2		1
	<i>Rhamnusium bicolor</i> (Schrank, 1781)							Br.3		1
	<i>Ropalopus femoratus</i> (Linnaeus, 1758)							Br.3		1
	<i>Ropalopus insubricus</i> (Germar, 1824)					NT	NT	D	Br.3	3
	<i>Ropalopus varini</i> (Bedel, 1870)								Br.3	1

Ordre	Famille	Taxon final						Present	
		Pro.	DH	LR-R	LR-N	LR-E	LR-M	PACA	Autre
Cerambycidae	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	X	2 & 4				R	Br.2	1
	<i>Saperda octopunctata</i> (Scopoli, 1772)							Br.2	1
	<i>Saperda punctata</i> (Linnaeus, 1767)				NT			Br.2	1
	<i>Senocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1758)							Br.3	1
	<i>Stictoleptura erythroptera</i> (Hagenbach, 1822) [= <i>Aredolpona erythroptera</i> (Hagenbach, 1822)]							Br.3	1
	<i>Stictoleptura fontenayi</i> (Mulsant, 1839) [= <i>Corymbia fontenayi</i> (Mulsant, 1839) = <i>Aredolpona fontenayi</i> (Mulsant, 1839)]						R	Br.3	1
	<i>Stictoleptura scutellata</i> (Fabricius, 1781) [= <i>Aredolpona scutellata</i> (Fabricius, 1781)]							Br.2	1
	<i>Stictoleptura trisignata</i> (Fairmaire, 1852) [= <i>Aredolpona trisignata</i> (Fairmaire, 1852)]							Br.3	1
	<i>Trichofērus holosericus</i> (Rossi, 1790)							Br.3	1
	<i>Trichofērus pallidus</i> (Olivier, 1790)							Br.2	1
Coleoptera	<i>Xylotrechus amitlope</i> (Schönherr, 1817)							Br.2	1
	<i>Altica carinthiaca</i> Weise, 1888						R		0
	<i>Altica palustris</i> (Weise, 1888)						R		3
	<i>Aphthona abdominalis</i> (Dufischmid, 1825)						R		2
	<i>Aphthona aencomiana</i> Allard, 1875						R		2
	<i>Aphthona carbonaria</i> Rosenhauer, 1856						D		2
	<i>Aphthona ovata</i> Foudras, 1861						R		3
	<i>Aphthona punctiventris</i> Mulsant & Rey, 1874						D		3
	<i>Aphthona semicyanea</i> Allard, 1859						R		0
	<i>Aphthona violacea</i> (Koch, 1803)						D		0
Chrysomelidae	<i>Chaeorhena chlorophana</i> (Dufischmid, 1825)						R		1
	<i>Chaeorhena major</i> (Jacquelin du Val, 1852)						R		2
	<i>Chaeorhena procera</i> (Rosenhauer, 1856)						R		2
	<i>Chrysolinia diluta</i> (Germar, 1824)						R		1
	<i>Chrysolinia lepida</i> (Olivier, 1807)						R		1
	<i>Chrysolinia obscurella</i> (Suffrian, 1851)						D		1
	<i>Chrysolinia platypoda</i> (Bechyné, 1950)						D		1
	<i>Chrysolinia mosca</i> (Illiger, 1802)						R		3
	<i>Cryptaccephalus marginatus</i> Fabricius, 1781						R		1
	<i>Cryptaccephalus saliceti</i> Zebe, 1855						R		3

	<i>Entomoscelis adonidis</i> (Pallas, 1771)				R		1
	<i>Labidostomis cyanicornis</i> (Germar, 1822)				R		1
	<i>Labidostomis pallidipennis</i> (Gebler, 1830)				R		1
	<i>Lachnaiia italica italica</i> Weise, 1881				R		3
	<i>Longitarsus abyntii</i> Kurschera, 1862				D		3
	<i>Longitarsus apicalis</i> (Beck, 1817)				D		3
	<i>Longitarsus celticus</i> Leonardi, 1975				D		2
	<i>Longitarsus fulgens</i> (Foudras, 1860)				R		3
	<i>Longitarsus nanus</i> (Foudras, 1860)				D		2
Chrysomelidae	<i>Macrolenes dentipes</i> (G.A. Olivier, 1808)				R		1
	<i>Neocrepidodera crassicornis</i> (Faldernmann, 1837)				R		3
	<i>Pachybrachis assietiae</i> Burlini, 1968 [= <i>P. fimbriolatus danieli</i> Burlini, 1968]				R		2
	<i>Phyllotreta corrugata</i> Reiche & Saulcy, 1858				R		1
	<i>Phyllotreta crassicornis</i> Allard, 1866				R		2
	<i>Phyllotreta ganglbaueri</i> Heikertinger, 1909				R		0
	<i>Prasocaris phellandrii</i> (Linnaeus, 1758)				R		1
	<i>Pyrrhocodes schwarzii</i> Weise, 1900				R		0
	<i>Alloryx quadrimaculatus</i> (Schaller, 1783)				Br.3		1
	<i>Dermestoides sanguinicollis</i> (Fabricius, 1787)				Br.4		2
Coleoptera	<i>Korynetes geniculatus</i> Klug, 1842				R		1
	<i>Necrobia ruficollis</i> (Fabricius, 1775)				R		1
	<i>Opilo abillei</i> Körge, 1960				R		1
	<i>Opilo mollis</i> (Linnaeus, 1758)				Br.2		1
	<i>Opilo pallidus</i> (Olivier, 1795)				Br.2		1
	<i>Thamnismus femoralis</i> (Zetterstedt, 1828)				Br.2		1
	<i>Tillus elongatus</i> (Linnaeus, 1758)				Br.2		1
	<i>Diomus rubidus</i> (Motschulsky, 1837)				R		1
	<i>Scymnus flagellisiphonatus</i> (Fürsch, 1970) [= <i>Pullus flagellisiphonatus</i> (Fürsch, 1970)]				R		3
	<i>Scymnus fulvicollis</i> Mulsant, 1846 [= <i>Pullus fulvicollis</i> Mulsant, 1846]				R		1
Coccinellidae	<i>Scymnus mediterraneus</i> lablokoff-Khnzorian, 1972 [= <i>Pullus mediterraneus</i> lablokoff-Khnzorian, 1972]				R		0
	<i>Baroniainima micans</i> (Seidlitz, 1868) [= <i>Omiamima micans</i> (Seidlitz, 1868)]				D		2
Curculionidae							

Ordre	Famille	Taxon final	Pro.	DH	LR-R	LR-N	LR-E	LR-M	PACA	Autre	Present
		<i>Campiorhinus statua</i> (Rossi, 1790) {nore I, p. 126}								(Br.)	1
		<i>Cathormiocerus avenionensis</i> Hustache, 1924						D			1
		<i>Dichotarachelus venturiensis</i> Hustache, 1929					D				2
		<i>Entomoderus impressicollis</i> (Bohemian, 1834) [= <i>Pseudorhinus impressicollis</i> (Bohemian, 1834)]				D					1
		<i>Meira faginezi</i> Desbrochers des Loges, 1908				D					1
		<i>Meira morguezi</i> Pierotti & Rouault, 2010				D					1
		<i>Meira nauchisiana</i> Desbrochers des Loges, 1898				R					1
		<i>Melanubaris eryzimi</i> Chobaut, 1917) [= <i>Baris eryzimi</i> (Chobaut, 1917)]				D					2
		<i>Microplontus falcozi</i> Hustache, 1914) [= <i>Ceutorhynchus falcozi</i> Hustache, 1914]				D					2
		<i>Otiorhynchus chobauti</i> Hustache, 1920				D					2
		<i>Otiorhynchus faginezi</i> Ruter, 1945				D					1
		<i>Otiorhynchus procerus</i> Sierlin, 1875				R					1
		<i>Otiorhynchus putoni</i> Sierlin, 1891				D					1
		<i>Otiorhynchus nitellus</i> Gyllenhal, 1834				R					1
		<i>Pachycerus segnis</i> (Germar, 1824) [= <i>P. maritimus</i> Hustache, 1926]				D					1
		<i>Pelenomus hygrophilus</i> (Hustache, 1923)				R					3
		<i>Phloeophagoidea humilis</i> Abeille de Perrin, 1895				R					0
		<i>Pleurodirinus aquisextanus</i> (Abeille de Perrin, 1905)				D					1
		<i>Pleurodirinus obesus</i> (Guillebeau, 1897)				R					1
		<i>Polydrusus alchemillae</i> Hustache, 1929				D					3
		<i>Polydrusus griseomaculatus</i> Desbrochers des Loges, 1869				D					2
		<i>Polydrusus manteroi</i> (A. Solari & F. Solari, 1904) [= <i>Metadrosus manteroi</i> (Solari & Solari, 1903)]				R					2
		<i>Sitona waterhousei schaefferi</i> Ruter, 1945				R					1
		<i>Thamnugus delphinii</i> (Rosenhauer, 1856)				R					1
		<i>Trachyphloeus gallicus</i> Borovec, 1989				D					2
		<i>Trachyphloeus mergalii</i> Borovec, 1989				D					3
		<i>Tychius brisouti</i> Tournier, 1874 [= <i>T. galloprovincialis</i> Hustache, 1924]				R					1
	Dytiscidae	<i>Ereets griseus</i> (Fabricius, 1781) [= <i>E. sticticus</i> (Linnaeus, 1767)]				R					3
	Elateridae	<i>Agriotes brevis</i> Candèze, 1863				D					2
		<i>Agriotes litigiosus</i> (Rossi, 1792)				D					1

	<i>Ampedus balteatus</i> (Linnaeus, 1758)							Br.3	2
	<i>Ampedus brunnicornis</i> Germar, 1844			VU	VU	R	Br.3	3	
	<i>Ampedus cardinalis</i> (Schiøde, 1865)			NT	NT		Br.3	1	
	<i>Ampedus cimicarius</i> (Eschscholtz, 1839)					Br.2	2		
	<i>Ampedus corsicus</i> (Reitter, 1918)		NT					1	
	<i>Ampedus elegans</i> (Schönher, 1817)					Br.3	1		
	<i>Ampedus elongatus</i> (Fabricius, 1787)		NT			Br.2	2		
	<i>Ampedus erythrogomus</i> (PWJ. Müller, 1821)					Br.3	2		
	<i>Ampedus melanurus</i> Mulsant & Guillebeau, 1855				R	Br.3	1		
	<i>Ampedus nigerinus</i> (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835)	NT				Br.2	2		
	<i>Ampedus nigroflavus</i> (Goeze, 1777)					Br.3	1		
	<i>Ampedus pomona</i> (Stephens, 1830)					Br.3	1		
	<i>Ampedus ponorum</i> (Herbst, 1784)					Br.2	2		
	<i>Ampedus praecustus</i> (Fabricius, 1792)					Br.3	1		
	<i>Ampedus rufipennis</i> (Stephens, 1830)					Br.2	1		
	<i>Ampedus sanguinolentus</i> (Schrank, 1776)					Br.2	2		
	<i>Ampedus serofa</i> (Germar, 1844) [= <i>A. aethiops</i> (Lacordaire, 1835)]					Br.2	3		
	<i>Anostirus gabilloti</i> (Pic, 1907)			D				2	
	<i>Athous ffigidus</i> Mulsant & Guillebeau, 1855				D			1	
	<i>Athous olbiensis</i> Mulsant & Guillebeau, 1856				D			1	
	<i>Athous puncticollis</i> Kiesenwetter, 1858 {note 2, p. 126}			D				1	
	<i>Athous tomentosus</i> Mulsant & Guillebeau, 1855				R			1	
	<i>Berminionius hyperboreus</i> (Gyllenhal, 1827)				R			1	
	<i>Brachygnathus bouyonii</i> (Chassain, 1992)			NT	NT	R	Br.3	1	
	<i>Brachygnathus campadellii</i> Platia & Giudenz, 2000				R			1	
	<i>Brachygnathus dubius</i> (Platia & Care, 1990)				R		Br.3	3	
	<i>Brachygnathus megerlei</i> (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835)	NT				Br.2	1		
	<i>Brachygnathus ruficeps</i> (Mulsant & Guillebeau, 1855) [= <i>Ampedus ruficeps</i> Mulsant & Guillebeau, 1855]	NT				Br.3	1		
	<i>Calambus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767) [= <i>Seletsonomus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)]					Br.3	1		
	<i>Cardiophorus anticus</i> Erichson, 1840					Br.2	1		
	<i>Cardiophorus gramineus</i> (Scopoli, 1763)			NT		Br.2	1		
	<i>Denticillus rubens</i> Piller & Mitterpacher, 1783					Br.2	3		

Ordre	Famille	Taxon final	Pré.	DH	LR-N	LR-R	LR-E	LR-M	PACA	Autre	Présent
Elateridae	<i>Dicronychus versicolor</i> (Mulsant & Guillebeau, 1856) [= <i>D. incanus</i> (Erichson, 1840)]							NT	R	Br.4	1
	<i>Ectamogonus montandoni</i> (Buysson, 1889)							NT		Br.2	1
	<i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758										
	<i>Hypognathus imanicus</i> (Lacordaire, 1835)								R		1
	<i>Ischnocnemis sanguinicollis</i> (Panzer, 1793)							VU	R	Br.3	1
	<i>Lacon quercus</i> (Herbst, 1784)								R		1
	<i>Limoniscus violaceus</i> (P.W.J. Müller, 1821)	2									
	<i>Megapenthes lugens</i> (W. Redtenbacher, 1842)							EN	EN	Br.4	2
	<i>Melanotus sulcicollis</i> (Mulsant & Guillebeau, 1855) [= <i>Spheniscosomus sulcicollis</i> (Mulsant & Guillebeau, 1855)]							NT	R	Br.3	2
	<i>Proterus tibialis</i> (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835)										
Coleoptera	<i>Senagastus rhombaeus</i> (Olivier, 1790)									Br.2	1
	<i>Senagastus rufus</i> (De Geer, 1774)								R	Br.2	3
	<i>Zorachros atysidorus</i> (Kiesenwetter, 1858)								D		1
	<i>Cholovocera formicaria</i> (Motschulsky, 1838)									R	2
	<i>Cholovocera punctata</i> Märkel, 1845								R		2
	<i>Meropphytia cicula</i> Kiesenwetter, 1872								R		1
	<i>Leucochromatium arundinaceum</i> Forskål, 1775								R		
	<i>Setariola sericea</i> (Mulsant & Rey, 1863)								R		1
	<i>Triplax aenea</i> (Schaller, 1783)									Br.3	3
	<i>Triplax scutellaris</i> Chapentier, 1825									Br.2	2
Erotylidae	<i>Eucnemis capactina</i> Ahrens, 1812									Br.3	1
	<i>Farys dubius</i> (Piller & Mitterbacher, 1783)										
	<i>Hylis olexai</i> (Palm, 1955)										
	<i>Hylis simonae</i> (Olexa, 1970)										
	<i>Micromyces empi</i> (Rouget, 1856) [= <i>Diphagus empi</i> (Rouget, 1856)]										
Eucnemidae	<i>Micromyces pygmaeus</i> (Fabricius, 1792) [= <i>Dirhagus pygmaeus</i> (Fabricius, 1792)]										
	<i>Trypocopris vernalis</i> Bedel, 1911 [= <i>T. fauneli</i> <i>obscurus</i> (Mulsant, 1842)]								R		1
	<i>Helophorus asturiensis</i> Kawert, 1885								R		3
	<i>Aeletes atomarius</i> (Aubé, 1843)									Br.3	3
Histeridae	<i>Hister bipunctatus</i> Paykull, 1811									R	0

				R	0
				R	1
				R	3
				R	3
				R	1
				Br.2	1
				Br.2	3
				Br.2	3
				Br.2	3
				D	3
				D	1
				R	2
				R	2
				R	3
				R	3
				R	3
				R	3
				R	3
				R	3
				NT	
				(Br.)	1
				Br.2	1
				Br.2	1
				R	3
				Br.3	1
				Br.3	1
				Br.2	1
				Br.2	1
				Br.2	3

- Hypoacculus ferreri* Yélamos, 1990
- Hypoacculus crassipes* (Erichson, 1834)
- Hypoacculus speculum* (Schmidt, 1884)
- Merobstier ariasi* (Marseul, 1864)
- Microasperinus gonyi* (M. Secq & B. Secq, 1995)
- Plegaderus caesus* (Herbst, 1791)
- Plegaderus discisus* Erichson, 1839
- Plegaderus dissectus* Erichson, 1839
- Plegaderus vulneratus* (Panzer, 1797)
- Saprinus chalcites* (Illiger, 1807)
- Saprinus maculatus* (Rossi, 1792)
- Hygrobia hermanni* (Fabricius, 1775)
- Corticaria cucujiformis* Reitter, 1881
- Corticaria pectzi* Johnson, 2007
- Dienerella pilifera* (Reitter, 1875)
- Dienerella schueppeli* (Reitter, 1880)
- Latridioides amplius* Johnson, 1977
- Metaphthahus nivicollis* (Jacquin du Val, 1859)
- Migenecoxia crassistyla* (Aubé, 1850)
- Bathysciola champsauri* (Peyerimhoff, 1904)
- Bathysciola foveicollis foveicollis* (Peyerimhoff, 1904)
- Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)
- Lucanus pontibrenti* (Mulsant, 1839) (note 1, p. 126)
- Platycerus caprea* (Der Geer, 1774)
- Platycerus caraboides* (Linnaeus, 1758)
- Sinodendron cylindricum* (Linnaeus, 1758)
- Ebaeus abietinus* Abeille de Perrin, 1869
- Diraea australis* Fairmaire, 1857
- Dolotarsus lividus* (C.R. Sahlberg, 1833)
- Melanotya cardinoides* (Linnaeus, 1760)
- Orchesia micans* (Panzer, 1793)
- Phloeotrya tenuis* (Hampe, 1850) [= *P. vaudouieri* Mulsant, 1856]

Ordre	Famille	Taxon final						Present
		DH	LR-N	LR-R	LR-E	LR-M	PACA	
Melandryidae	<i>Zilora obscura</i> (Fabricius, 1794) [= <i>Z. sericea</i> J. Sturm, 1807]					R	Br.3	3
Meloidae	<i>Actenodia bilbbergii</i> (Gyllenhal, 1817)					R	1	
Zonitis fernanastroi Pardo Alcaide, 1950					R			3
Monotomidae	<i>Monatomma quadrifoveolata</i> Aubé, 1837				R			3
Mycetophagidae	<i>Mycetophagus picus</i> (Fabricius, 1777)						Br.2	2
	<i>Triphyllus bicolor</i> (Fabricius, 1777)						Br.2	3
	<i>Ischnomera caerulea</i> (Linnaeus, 1758)						Br.2	1
Oedemeridae	<i>Ischnomera cinerascens</i> (Pandelle in Grénier, 1867)						Br.3	1
	<i>Ischnomera cyanea</i> (Fabricius, 1792)						Br.2	1
	<i>Ischnomera sanguinicollis</i> (Fabricius, 1787)				R		Br.2	1
Prostomidae	<i>Pristomis mandibularis</i> (Fabricius, 1801)		NT		R	Br.3		3
	<i>Dorcatoma amboinensis</i> Baranowski, 1985				R			1
	<i>Ernolius juniperi</i> Chautbaut, 1899				R			3
Prinidae	<i>Ernolius mulsanti</i> Kiesenwetter, 1877				R			3
	<i>Lasioderma kiesenwetteri</i> Schilsky, 1899				R			1
	<i>Ochinalatrellii</i> (Bonelli, 1812)				R			1
Coleoptera	<i>Amadotrogus vicinus</i> (Mulsant, 1842) [= <i>Rhizotrogus vicinus</i> Mulsant, 1842]				R			2
	<i>Amidorus immaturus</i> (Mulsant, 1842) [= <i>Aphodius immaturus</i> (Mulsant, 1842)]				R			1
	<i>Amphimallon pini</i> (Olivier, 1789)				R			3
	<i>Amphimallon pygiale</i> Mulsant, 1846				R			2
	<i>Anisoplia renata</i> Reitter, 1889				R			1
	<i>Anomala ausonia</i> Erichson, 1847				R			1
	<i>Anoxia australis</i> (Gyllenhal, 1817)				R			3
Scarabaeidae	<i>Cetonichema speciosissima</i> (Scopoli, 1786) [= <i>C. aenigina</i> (Linnaeus, 1767) = <i>Protaetia aenigina</i> (L., 1767)]	NT		R	Br.2	1		
	<i>Chilothonax cervorum</i> (Fairmaire, 1871)				R			3
	<i>Copris umbilicatus</i> Abeille de Perrin, 1901				R			1
	<i>Eubuphanicus villosus</i> (Gyllenhal, 1808)				R			3
	<i>Euanisophagus gibbosus</i> (Scriba, 1790)				R			1
	<i>Gnorimus variabilis</i> (Linnaeus, 1758)		NT		Br.2	1		
	<i>Gymnophleurus flagellatus</i> (Fabricius, 1787)				R			1

	<i>Gymnopleurus geoffroyi</i> (Fuessly, 1775)					R		1
	<i>Liovolva marmorata</i> (Fabricius, 1792) [= <i>L. lugubris</i> (Herbst, 1786) = <i>Protactia lugubris</i> (Herbst, 1786)]					Br.3	3	
	<i>Lomphodius suarius</i> (Faldermann, 1835)					R		1
	<i>Omaloplia hericia</i> (Chobaut, 1907) [= <i>Homaloplia hericius</i> Chobaut, 1907]					R		1
	<i>Omaloplia nicolasi</i> Barraud, 1965 [= <i>Homaloplia nicolasi</i> Barraud, 1965]					R		1
	<i>Osmodesarma eremita</i> (Scopoli, 1763)	X	2 & 4		NT	NT	D	Br.3
	<i>Pleurophorus mediterranicus</i> Pittino & Mariani, 1986					R		3
	<i>Potosia febri</i> (Kraatz, 1880)		NT				Br.3	1
	<i>Ptymmadlus pierottii</i> Pittino, 1979					R		3
	<i>Rhyssenus limbularius</i> Petrovitz, 1963					R		3
	<i>Scarabaeus laticollis</i> Linnaeus, 1767					R		1
	<i>Triodontella bucculenta</i> (Barraud, 1962) [= <i>Triodontia bucculenta</i> Barraud, 1962]					R		1
	<i>Ahemus chloroperus</i> (Panzer, 1796)					R		2
	<i>Bryaxis lorenensis</i> Besuchet, 2002					D		1
	<i>Bryaxis nigriceps</i> (Leach, 1826)					D		3
	<i>Entomocaulia dispersa</i> Coiffait, 1955					D		3
	<i>Geostiba ventosa</i> Pace, 1996					D		3
	<i>Leptusa lurenonis</i> Pace, 1999					D		1
	<i>Leptusa lurenensis</i> Pace, 1989					D		1
	<i>Leptusa ventosenis</i> Pace, 1996					D		3
	<i>Paranatropis faginezi</i> (Sainte-Claire Deville, 1928)					D		3
	<i>Pella excepta</i> (Mulsant & Rey, 1861)					R		3
	<i>Quedius pseudasecula</i> Coiffait, 1963					R		3
	<i>Tychohydrius xambeui</i> (Guillebeau, 1888)					D		2
	<i>Allecula morio</i> (Fabricius, 1787)						Br.2	1
	<i>Blaps hispanica</i> Herbst, 1799					R		1
	<i>Bolitophagus reticulatus</i> (Linnaeus, 1767)						Br.2	1
	<i>Clamoris crenata</i> (Mulsant, 1854)						Br.2	1
	<i>Corticarius fasciatus</i> (Fabricius, 1790)						Br.3	1
	<i>Corticarius longulus</i> (Gyllenhal, 1827)						Br.4	1
	<i>Cryphaeus cornutus</i> (Fischer von Waldheim, 1823)						R	1

Coleoptera

Staphylinidae

Ordre	Famille	Taxon final	Prot.	DH	LR-R	LR-N	LR-E	LR-M	PACA	Autre	Present
Tenebrionidae		<i>Eledonoprius armatus</i> (Panzer, 1799)							R		3
		<i>Helops rosii</i> Germar, 1817							R		3
		<i>Hymenorus doublieri</i> (Mulsant, 1851) [= <i>Hymenophorus doublieri</i> (Mulsant, 1851)]							Br.2	1	
		<i>Lyphia tetraphylla</i> (Fairmaire, 1857)							R		1
		<i>Nalassus harpaloides</i> (Küster, 1850)							R		1
		<i>Neatus picipes</i> (Herbst, 1797)							R	Br.4	1
		<i>Neomida haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1787)							R	Br.3	1
		<i>Pharydema europaea</i> Laporte de Castelnau & Brullé, 1831							Br.2	1	
		<i>Platydemia violacea</i> (Fabricius, 1790)							Br.2	1	
		<i>Prionychus ater</i> (Fabricius, 1775)							Br.2	1	
Coleoptera		<i>Pseudostela ceramboides</i> (Linnaeus, 1758)							Br.2	1	
		<i>Tenebrio opacus</i> Dufschmid, 1812							R		1
		<i>Tetraclita desmarestii</i> Latreille, 1807							Br.4	3	
		<i>Tetraclita fangorum</i> Fabricius, 1790							Br.2	1	
		<i>Tricranius minutus</i> Rey, 1891							R		1
		<i>Tritoma fuscicornis</i> Fabricius, 1790							Br.4	3	
		<i>Peltis grossa</i> (Linnaeus, 1758)							Br.2	1	
		<i>Tennochila caerulea</i> Olivier, 1790							Br.2	1	
		<i>Thymalus limbatus</i> (Fabricius, 1787)							Br.2	1	
		<i>Vesperus luridus</i> (Rossi, 1794)							R		1
Zopheridae		<i>Aulonium ruficorne</i> (Olivier, 1790)							Br.2	1	
		<i>Aulonium trisulatum</i> (Goffroy, 1785)							Br.3	2	
		<i>Cobocitus hirtus</i> (Rossi, 1790) [= <i>C. marginatus</i> (Latreille, 1807)]							Br.2	1	
		<i>Orthocerus clavicornis</i> (Linnaeus, 1758)							D	2	
		<i>Pycnomerus terebrans</i> (Olivier, 1790)							Br.3	3	
		<i>Perlantus alliberii</i> Guérin-Meneville, 1843							R		1
		<i>Ectobiidae</i>	<i>Ectobius niceensis</i> (Brisout de Barneville, 1852)						R		1
		<i>Mantidae</i>	<i>Geomantis larvoides</i> Pantel, 1896						R		1
		<i>Asilidae</i>	<i>Crobiolacrus auriger</i> Musso, 1973						D		1
		<i>Diptera</i>	<i>Chelifer precabunda</i> Collin, 1961						D		3
		<i>Empididae</i>	<i>Dolichocephala ocellata</i> (Costa, 1824)						R		3
			<i>Hemerodromia baetica</i> Collin, 1927						D		3

	Empididae	<i>Kouvarzia bipunctata</i> (Haliday, 1833) [= <i>Clinocera bipunctata</i> (Haliday, 1833)]				D	3
		<i>Wiedemannia bispinosa</i> (Curtis, 1834)			R	3	
	Psychodidae	<i>Pericoma modesta</i> Tonnoir, 1922			D	2	
		<i>Pericoma vestita</i> Vaillant & Withers, 1993			D	3	
Diptera		<i>Saniella crypta</i> (Vaillant, 1955)			D	0	
		<i>Prosimilium tonsorvarji</i> (Enderlein, 1921)			D	3	
	Simuliidae	<i>Simulium galloprovinciale</i> Giudicelli, 1963			D	1	
		<i>Baetis pravidus</i> Grandi, 1949			R	2	
	Baetidae	<i>Baetis pennaphleboes</i> Ujhelyi, 1966			D	3	
Ephemeroptera	Leptophlebiidae	<i>Habrophlebia eldiae</i> Jacob & Sartori, 1984			D	3	
		<i>Tinamus bellus</i> Eaton, 1881		MB	3		
	Prospicromatidae	<i>Prospicromia pennigerum</i> (Müller, 1785) [= <i>P. foliacum</i> (Fourcroy, 1785)]	CR		D	3	
	Alydidae	<i>Microlytra fossularum</i> (Rossi, 1790)			D	3	
		<i>Anthocoris amphicollis</i> Horváth, 1893			D	1	
		<i>Anthocoris minkki</i> Dohrn, 1860			R	2	
		<i>Anthocoris visci</i> Douglas, 1889			D	1	
	Anthocoridae	<i>Buchananiella continua</i> (Buchanan-White, 1879)			D	2	
		<i>Cardiacthebus nazarenus</i> Reuter, 1884			D	2	
		<i>Elatophilus stigmatellus</i> (Zetterstedt, 1858)			R	2	
		<i>Orius palidicornis</i> (Reuter, 1884)			R	2	
		<i>Xylacoris formicetorum</i> (Bohemian, 1844)			R	3	
Hemiptera	Aradidae	<i>Aradus horvathi</i> Vásárhelyi, 1984			D	1	
		<i>Aradus obrectus</i> Vásárhelyi, 1988			D	1	
		<i>Berytinus crassipes</i> (Herich-Schäffer, 1835)			D	1	
	Berytidae	<i>Berytinus striola</i> (Ferrari, 1874)			D	1	
		<i>Metacanthus maghrebinus</i> Péricart, 1977			R	1	
		<i>Metacanthus meridionalis</i> (A. Costa, 1843)			R	2	
	Cicadidae	<i>Tettigeta argenteata</i> (Olivier, 1790) [= <i>Tettigeta argentata</i> (Olivier, 1790)]			R	1	
		<i>Anoplocnemis elevatus</i> Fieber, 1861			D	1	
	Coreidae	<i>Phyllaphya laciniata</i> (Villers, 1789) [= <i>Phyllomorpha laciniata</i> (Villers, 1789)]			D	1	
		<i>Prionoylus brevicornis</i> (Mulsant & Rey, 1852)			D	1	
	Cydnidae	<i>Aethus pilosus</i> (Herich-Schäffer, 1834)			D	1	

Ordre	Famille	Taxon final						Present
		Pro.	DH	LR-R	LR-N	LR-E	LR-M	PACA
Cydnidae	<i>Geotomus brunneipennis</i> Wagner, 1923						D	3
Dipsocoridae	<i>Cryptostemma medium</i> Rey, 1888						D	3
Kermesidae	<i>Kermes vermilio</i> (Planchon, 1864)						D	2
Leptopodidae	<i>Erianothus lanosus</i> (Dufour, 1834)						D	1
Membracidae	<i>Leptopus hispanius</i> Rambur, 1840						D	1
Microphysidae	<i>Centrotus chloroticus</i> Fairmaire, 1851						D	2
Nabidae	<i>Loricula bedeli</i> (Montandon, 1887)						D	2
Piesmatidae	<i>Allaeoclyynchus putoni</i> Kirkaldy, 1901						D	1
Hemiptera	<i>Himacerus boops</i> (Schiodte, 1870) [= <i>Staliella boops</i> (Schiodte, 1870)]						D	3
Reduviidae	<i>Nabis brevis</i> Scholtz, 1847						D	2
Rhopalidae	<i>Nabis capsiformis</i> Germar, 1838						R	2
Scutelleridae	<i>Nabis mediterraneus</i> Remane, 1962						D	1
Tingidae	<i>Nabis persimilis</i> Reuter, 1890						D	3
Psylidae	<i>Psyllobora bicolor</i> Rambur, 1839						D	3
Psylloidae	<i>Parapsyllus variabilis</i> (Fieber, 1844) [= <i>Piesma variabile</i> (Fieber, 1844)]						D	3
Conuridae	<i>Conurus pericarti</i> P.V. Purshkov, 1994						D	1
Polystictidae	<i>Polytes sanguineus</i> (A. Costa, 1842)						R	1
Scutelleridae (note 3, p. 126)	<i>Marcenethus errans caucasicus</i> (Kolenati, 1845) [= <i>M. caucasicus</i> (Kolenati, 1845)]						D	2
Salidae	<i>Charoxista geminata</i> (A. Costa, 1853)						D	1
	<i>Salduula melanocela</i> (Fieber, 1859)						D	1
	<i>Salduula xanthochila</i> (Fieber, 1859)						D	2
	<i>Pzacasta granulata</i> (A. Costa, 1847) [= <i>P. conspersa</i> Germar, 1839]						D	1
	<i>Pzacasta tuberculata</i> (Fabricius, 1781)						D	1
	<i>Acahypha hellenica</i> Reuter, 1888						D	1
	<i>Agamanna ruficornis</i> (Germar, 1835)						D	2
	<i>Derephysia sinuatoculis</i> Puton, 1879						D	1
	<i>Hyadachiton colpochilus</i> (Horváth, 1897)						D	1
	<i>Hydachiton komarovii</i> (Jakovlev, 1880)						R	1
	<i>Lastiacantha histricalia</i> (Puton, 1878)						D	1
	<i>Phaenotropis parvula</i> (Signoret, 1865)						R	1

		<i>Physatocheila harwoodi</i> China, 1936				D	3
Hemiptera	Tingidae	<i>Tingis albovenis</i> Péricart, 1979				D	1
		<i>Tingis grisea</i> Germar, 1835				D	2
		<i>Tingis griseola</i> (Puton, 1879)				D	1
		<i>Urenius thobauti</i> Horváth, 1907				D	3
		<i>Andrena allopunctata</i> (Rossi, 1792) [= <i>Andrena allopunctata</i> melona Warncke, 1967]				D	2
		<i>Andrena brumancis</i> Friese, 1899 [= <i>A. chyprata</i> Brullé, 1832]			R	0	
		<i>Andrena fuscosa</i> Erichson, 1835 [= <i>A. atrocervina</i> Giraud, 1863]			R	2	
		<i>Andrena pellucens</i> Pérez, 1895			R	1	
		<i>Andrena sardoa</i> Lepetier, 1841			R	2	
		<i>Campylococcus nasutum</i> (Spinola, 1838)			R	2	
		<i>Anthophora atriceps</i> Pérez, 1879			R	1	
		<i>Anthophora dufouri</i> Lepetier, 1841			R	3	
		<i>Anthophora filodromidiata</i> Dours, 1869			D	3	
		<i>Anthophora punctilabris</i> Pérez, 1879			D	3	
		<i>Bombus argillaceus</i> (Scopoli, 1763)			R	1	
		<i>Bombus mocayri</i> Krichbaum, 1877 [= <i>B. laetus mocayri</i> Krichbaum, 1877]			R	3	
		<i>Habropoda tarsata</i> (Spinola, 1838)			R	3	
		<i>Xylocopa cantabrita</i> Lepetier, 1841			R	3	
		<i>Lasiochalcidia agilis</i> (Klug, 1834)			D	0	
		<i>Lasiochalcidia pubescens</i> (Klug, 1834)			D	0	
		<i>Pigaster pilosator</i> (Aubert, 1958)			D	0	
		<i>Megachile feroni</i> Pérez, 1895			D	2	
		<i>Megachile lefeuvrei</i> Lepetier, 1841 [= <i>Chalicodoma lefeuvrei</i> (Lepetier, 1841)]			D	0	
		<i>Megachile opacifrons</i> Pérez, 1897			D	1	
		<i>Mutilla quinquenotata</i> Cyrillo, 1787			D	3	
		<i>Ceropales pygmaea</i> Kohl, 1880			D	3	
		<i>Priacnemis massaliensis</i> Soyer, 1945			D	3	
		<i>Priacnemis provencalis</i> Wolf, 1962			R	1	
		<i>Sygia australis</i> Latreille, 1803			D	3	
		<i>Amata mariana</i> (Stauder, 1913) [= <i>A. kruegeri</i> (Ragusa, 1904)]			R	1	
Lepidoptera	Erebidae	<i>Anaplecteron cephaea</i> (Hamson, 1914)			D	0	

Ordre	Famille	Taxon final										Present
		Pro.	DH	LR-R	LR-N	LR-E	LR-M	PACA	Other			
Erebidae	<i>Arcia festiva</i> (Hufnagel, 1766)							D		1		
	<i>Calymna communimaculata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)							D		1		
	<i>Elatohnis luctifera</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) [= <i>E. caesarea</i> Goeze, 1781 = <i>Phragmatobia luctifera</i> (D. & S., 1775)]	X						R		1		
	<i>Eublemma scitula</i> (Rambur, 1833)							R		3		
	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Podà, 1761) [note 4, p. 126]	2						R		1		
	<i>Macrochilo cibrinialis</i> (Hübner, 1793)							R		1		
	<i>Ophiusa tirhaca</i> (Cramer, 1773)							R		3		
	<i>Orectis massiliensis</i> (Millière, 1864)							D		2		
	<i>Orgyia trigotephra</i> Boisduval, 1828							D		2		
	<i>Thamatha senex</i> (Hübner, 1808)							R		2		
Lepidoptera	<i>Characiapilates formosaria</i> (Eversmann, 1837)							D		0		
	<i>Cleta flaccaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)							R		3		
	<i>Eupithecia spissilineata</i> (Metzner, 1846)							R		3		
	<i>Eupithecia variostrigata</i> Alphéryky, 1876							D		3		
	<i>Idaea carnulhoi</i> Herbulot, 1979							D		3		
	<i>Idaea exilaria</i> (Guenée, 1858)							D		2		
	<i>Idaea imadcaria</i> (Chrétien, 1913)							R		3		
	<i>Idaea janniniata</i> (Ronberg, 1911)							R		3		
	<i>Idaea libycata</i> (Barret, 1906)							R		3		
	<i>Idaea predotaria</i> (Hartig, 1952)							R		0		
Geometridae	<i>Idaea sardoniata</i> (Horberg, 1912)							D		3		
	<i>Idaea spissimbaria</i> (Mabille, 1888)							D		3		
	<i>Parborarmia vicentii</i> (Bohatsch, 1883)							R		1		
	<i>Prionophoe corollaria</i> (Herrich-Schäffer, 1848)							R		3		
	<i>Scopula emularia</i> (Herrich-Schäffer, 1809)							R		2		
	<i>Carcharodus baticus</i> (Rambur, 1839)							VU	VU	D	1	
	<i>Carcharodus flaccifer</i> (Zeller, 1847)							NT	NT	1		
Hesperiidae	<i>Carcharodus lavatherae</i> (Esper, 1783)							NT	NT	1		
	<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)							NT	VU	R	1	

	Hesperiidae	<i>Pyrgus sidiae</i> (Esper, 1784)					D	2
		<i>Shoeria proto</i> (Ochsenheimer, 1808)		NT			R	1
		<i>Thymelicus acteon</i> (Rottensburg, 1775)			NT			1
		<i>Eriogaster catarax</i> (Linnaeus, 1758)	X	2 & 4			R	1
	Laciocampidae	<i>Pachypasa limosa</i> (Sertes, 1826)					R	1
		<i>Phyllodesma ilicifolium</i> (Linnaeus, 1758)				VU		2
		<i>Glauoppsyche iolais</i> (Ochsenheimer, 1816) [= <i>Iolana iolais</i> (Ochsenheimer, 1816)]		NT	NT		R	1
		<i>Laenospis roboris</i> (Esper, 1789) [= <i>L. evippus</i> (Hübner, 1793)]					R	2
		<i>Lycaena alciphron alciphron</i> (Rottensburg, 1775)	NT					1
		<i>Maculinea alcion</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) [= <i>M. reble</i> (Hirschke, 1904)]					R	1
		<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	X	4		EN	R	1
		<i>Polyommatus damon</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) [= <i>Agrodiaetus damon</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)]		NT				1
	Lycenidae	<i>Polyommatus dolus</i> (Hübner, 1823)				D		1
		<i>Polyommatus dorylas</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)			NT	NT		1
		<i>Polyommatus eros</i> (Ochsenheimer, 1808)			NT			1
		<i>Polyommatus ripartii</i> (Freyer, 1830) [= <i>Agrodiaetus ripartii</i> (Freyer, 1830)]				D	1	
		<i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)					R	3
		<i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782)					R	1
		<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)					R	1
		<i>Tomares ballus</i> (Fabricius, 1787)		VU	VU		D	1
		<i>Abraxas agrionista</i> Dufay, 1956					R	1
		<i>Arctobia praecox</i> (Linnaeus, 1758)					D	1
		<i>Agrotis turutii</i> Strandfuß, 1888					R	1
	Noctuidae	<i>Apamea albigena</i> (Boisduval, 1837)					R	3
		<i>Apamea aquila</i> Donzel, 1837					R	1
		<i>Archana neurica</i> (Hübner, 1808)					D	1
		<i>Caucilia cemenensis</i> Boursin, 1923					R	1
		<i>Eucarta amethystina</i> (Hübner, 1803)					R	2
		<i>Eucoptacremis optabilis</i> (Boisduval, 1837) [= <i>Cladocerotis optabilis</i> (Boisduval, 1834)]					R	3
		<i>Gortyna borealis</i> Pierret, 1837		2 & 4			D	3
		<i>Hecatera cappa</i> (Hübner, 1809)					R	2

Ordre	Famille	Taxon final						Present
		DH	LR-N	LR-E	LR-M	PACA	Autre	Present
Noctuidae						R		2
	<i>Lenisa geminipuncta</i> (Haworth, 1809) [= <i>Archana geminipuncta</i> (Haworth, 1809)]					R		3
	<i>Metopoceras felicina</i> (Donzel, 1844)					R		1
	<i>Parasitithis suspecta</i> (Hübner, 1817)				D	D		1
	<i>Pseudoluperina pozzi</i> (Curé, 1883)				D	D		1
	<i>Ulochlaenia hirta</i> (Hübner, 1813)				D	D		1
	<i>Nola dresnayi</i> (Warnecke, 1946)				D	D		1
	<i>Rhegmatophila alpina</i> (Bellier, 1881)				D	D		1
	<i>Argynnis niobe</i> (Linnaeus, 1758)	NT						1
	<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	EN	VU	NT	R			1
Nolidae	<i>Erebia epistygone</i> (Hübner, 1819)		VU	NT	NT	D		1
	<i>Erebia scipio</i> Boisduval, 1833		NT	NT	R	R		1
	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	X	2					1
	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)				NT			1
	<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)				NT			1
	<i>Hyponomeute lupilina</i> (O. Costa, 1836)		EN	NT	R	R		1
	<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)			NT		R		3
	<i>Melanargia russiae</i> (Esper, 1783)				R			1
	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)		VU					1
	<i>Polygonia egea</i> (Cramer, 1775)		EN	EN	D	D		1
Lepidoptera	<i>Satyrus actaea</i> (Esper, 1781)			NT				1
	<i>Papilio alexander</i> Esper, 1800	X	4			D		1
	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	X	4		NT	NT	R	1
	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	X	4		NT	NT	D	1
	<i>Zerynthia polyxena</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	X	4			R		1
	<i>Zerynthia rumina</i> (Linnaeus, 1758)	X				R		1
	<i>Euchloe simphonias</i> (Freyer, 1829) [= <i>E. simphonias</i> (Boisduval, 1832)]					R		3
	<i>Iberochloe tagis</i> (Hübner, 1804)		NT	NT	D	D		1
	<i>Crombrugghia laeta</i> (Zeller, 1847)				D	D		3
	<i>Hyles hippophaes</i> (Esper, 1789)		X	4	D	D		1
Sphingidae	<i>Hyles nicea</i> (Prunner, 1798)				D	D		2
	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	X	4					1

		<i>Jordanita hispanica</i> (Alberti, 1937)			R	1
		<i>Thereminia ampollophaga</i> (Bayle-Barelle, 1808)			R	2
		<i>Zygaea brizae vesubiana</i> Le Charles, 1933	X	NT	D	1
	Zygaeidae	<i>Zygaea bilialis</i> Ochsenheimer, 1808			R	1
Lepidoptera		<i>Zygaea nevadensis gallica</i> Oberthür, 1898			R	1
		<i>Zygaea osterodensis</i> Reiss, 1921	NT			1
		<i>Zygaea rhadamantius</i> (Esper, 1789)	X		D	1
		<i>Zygaea trifolii</i> (Esper, 1783)	VU			1
		<i>Delproctophylla dusmetti</i> Navás, 1914			D	1
		<i>Libelloloides ictericus</i> (Charpentier, 1825) [= <i>Aiscalaphus ictericus</i> Charpentier, 1825]			R	1
		<i>Puer maculatus</i> (Olivier, 1789)			D	1
Neuroptera	Chrysopidae	<i>Hypocharysa elegans</i> (Burmeister, 1839) [= <i>Hippochrysodes elegans</i> (Burmeister, 1839)]			R	3
	Mantispidae	<i>Nothochrysa fulviceps</i> (Stephens, 1836)			R	1
	Myrmeleontidae	<i>Manispa aphareus</i> U. Aspöck & H. Aspöck, 1994			D	1
		<i>Palparas libelluloides</i> (Linnaeus, 1764)			R	1
		<i>Aeshna isoetales</i> (O.F. Müller, 1767)		VU		1
	Aeshnidae	<i>Aeshna jancea</i> (Linnaeus, 1758)		NT		1
		<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)		NT	R	3
		<i>Hemicnax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)		NT		1
	Calopterygidae	<i>Calopteryx xanthostoma</i> (Charpentier, 1825)			R	1
		<i>Coenagrion caeruleans</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838)		EN	NT	1
	Coenagrionidae	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)		2	NT	1
Odonata		<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)		VU	NT	1
		<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)		NT	NT	1
		<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)		NT		1
	Cordulegastridae	<i>Cordulegaster bidentata</i> Selys, 1843		EN	NT	1
	Corduliidae	<i>Oxyagrion curtissii</i> (Dale, 1834)	X	2 & 4	NT	1
		<i>Somatophora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)		VU	NT	3
	Gomphidae	<i>Gomphus flavipes</i> (Charpentier, 1825)			R	1
		<i>Gomphus gracilis</i> Rambur, 1842			R	1
		<i>Gomphus similimus</i> Selys, 1840		NT	NT	1
		<i>Gomphus vulgarisimus</i> (Linnaeus, 1758)		NT	NT	1

Ordre	Famille	Taxon final						Present	
		Pro.	DH	LR-N	LR-R	LR-E	LR-M	PACA	Autre
Odonata	Gomphidae	<i>Omychogomphus uncatus</i> (Charpentier, 1840)		NT	NT				1
		<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)		NT	NT				1
	Lestidae	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890		NT	NT		R		1
		<i>Lestes macrostigma</i> (Eversmann, 1836)		EN	EN	VU	D		3
	Libellulidae	<i>Lestes viridis</i> (Charpentier, 1825)		NT					1
		<i>Sympetrum depressirostre</i> (Selys, 1841)		EN	EN	VU	D		1
	Platycnemididae	<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)		VU					1
		<i>Sympetrum pedemontanum</i> (O.F. Müller in Allioni, 1766)		NT	VU		R		1
	Platycnemididae	<i>Sympetrum vulgaratum</i> (Linnaeus, 1758)		EN	NT		R		1
		<i>Tribenis annulata</i> (Palisot de Beauvois, 1807)		NT					1
Orthoptera	Acrididae	<i>Platynemis acutipennis</i> Selys, 1841		NT					1
		<i>Platynemis latipes</i> Rambur, 1842		NT					1
		<i>Acrida ungariaca mediterranea</i> Dirsch, 1949						SD1/4	1
		<i>Anacridium aegyptium</i> (Linnaeus, 1764)						SD3/4	1
		<i>Arcyptera kheili</i> Azam, 1900 [= <i>Arcyptera micropetra kheili</i> Azam, 1900]					R	SD3/3	1
		<i>Calephorus compressicornis</i> (Latreille, 1804)					D	SD-1/2	3
		<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)					R	SD2/1	2
		<i>Chorthippus binotatus binotatus</i> (Charpentier, 1825)					R	SD2/1	1
		<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)						SD4/3	1
		<i>Chorthippus jacundus</i> (Fischer, 1853)					D	SD1/2	1
Orthoptera	Acrididae	<i>Locusta genei</i> (Ocskay, 1832)						SD1/4	1
		<i>Locusta jagoi</i> Soltani, 1978					D	SD3/1	3
		<i>Euchorthippus chopandi</i> Descamps, 1968						SD2/4	1
		<i>Mecostethus pantaleon</i> (Hagenbach, 1822) [= <i>M. alliacetus</i> (Germar, 1817)]						SD4/2	1
		<i>Oedipoda charpentieri</i> Fieber, 1853					R	SD2/2	1
		<i>Omocerus raymondi</i> (Yersin, 1863) [= <i>O. raymondi raymondi</i> (Yersin, 1863)]						SD3/4	1
		<i>Paracimena tricolor bisignata</i> (Chapman, 1825)					R	SD1/2	1
		<i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) [= <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)]						SD4/3	1
		<i>Poecilimon stridulus</i> (Linnaeus, 1758)					R	SD4/3	1

		<i>Senobathrus festivus</i> Bolívar, 1887				R	SD3/2	1
		<i>Senobathrus fischeri</i> glaucescens Bolívar, 1897				R	SD3/1	1
	Acriidae	<i>Senobathrus grammicus</i> Cazurro y Ruiz, 1888				D	SD2/1	1
		<i>Senobathrus nigromaculatus</i> Herrich-Schäffer, 1840				SD4/1	1	
		<i>Stenophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)				R	SD3/-	2
		<i>Eugryllodes pipiens</i> (Dufour, 1820) [= <i>E. pipiens provincialis</i> (Azam, 1901)]				R	SD3/3	1
		<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804)				SD3/4	1	
	Gryllidae	<i>Gryllomorpha uclensis</i> Pantel, 1890				SD3/3	1	
		<i>Gryllus bimaculatus</i> De Geer, 1773				SD3/4	1	
		<i>Melanogryllus desertus</i> (Pallas, 1771)				SD-3	1	
		<i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853)				SD4/2	1	
		<i>Pteronemobius lineolatus</i> (Brullé, 1835)				R	SD-2	1
		<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)				R	SD4/3	1
		<i>Gryllotalpa septendecimchromosomica</i> Ortiz, 1958				D	SD-2	2
	Gryllotalpidae	<i>Gryllotalpa vineae</i> Bennett-Clark, 1970				R	SD-1	2
	Mogoplistidae	<i>Mogoplistes brunneus</i> Serville, 1838			X		SD3/4	1
	Myrmecophilidae	<i>Myrmecophilus acquisipina</i> (Chopard, 1923)					SD3/3	2
		<i>Myrmecophilus myrmecophilus</i> (Saví, 1819)					SD3/3	2
	Pamphagidae	<i>Prionopteris azami</i> Uvarov, 1923 [= <i>P. hystric azami</i> Uvarov, 1923]				D	SD2/2	3
	Pyrgomorphidae	<i>Pyrgomorpha conica</i> (Olivier, 1791)					SD2/4	1
	Raphidophoridae	<i>Dolichopoda azami</i> Saulcy, 1893				R	SD3/3	1
	Tetrigidae	<i>Tetrix bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)					SD3/1	3
		<i>Tetrix boliviari</i> Saulcy in Azam, 1901					SD2/2	1
		<i>Tetrix tuerki</i> Krauss, 1876				R	SD3/2	1
		<i>Barbitistes obtusus</i> Targioni-Tozzetti, 1881					SD2/-	1
		<i>Barbitistes serricauda</i> (Fabricius, 1794)					SD3/2	1
		<i>Bicolorana bicolor</i> (Philippi, 1830)					SD4/1	1
	Tettigoniidae	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)				D	SD2/2	2
		<i>Decimus verrucatorius</i> verrucatorius (Linnaeus, 1758)					SD4/1	1
		<i>Ephippiger provincialis</i> (Yersin, 1854)				R	SD-2	1
		<i>Ephippiger terrestris</i> (Yersin, 1854)					SD3/2	1
		<i>Eupholidoptera chabrieri</i> (Charpentier, 1825)					SD3/3	1

Ordre	Famille	Taxon final						Present
		DH	LR-N	LR-R	LR-E	LR-M	PACA	
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Gampsocleis glabra</i> (Herbst, 1786)					SD4/1	3
		<i>Leptophyes laticauda</i> (Frivaldszky, 1867)				R	SD2/3	1
		<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)					SD4/3	1
		<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)					SD4/3	1
		<i>Platycleis falcata</i> Brunner von Wattenwy, 1882				R	SD-1/2	3
		<i>Platycleis sabulosa</i> Azam, 1901					SD2/3	1
		<i>Polyserus denticaudatus</i> (Charpentier, 1825)					SD3/-	1
		<i>Polyserus scutatus</i> (Brunner von Wattenwy, 1882)				D		3
		<i>Rhaecocleis pondii</i> (Harz & Voisin, 1987)					SD-1/2	1
		<i>Roeseliana azami</i> (Finot, 1892) [= <i>Merrioptera falschenkoi azami</i> (Finot, 1892)]				R	SD-1/2	1
		<i>Sagitta pedo</i> (Pallas, 1771)	X	4			SD2/3	1
		<i>Xylo variegata</i> Latreille, 1809					D	SD3/3
Plecoptera	Leuctridae	<i>Leuctra occitana</i> Despax, 1930					D	3
		<i>Leuctra zuwicki</i> Ravizza & Vinçon, 1991					D	2
		<i>Nemoura confusa</i> Zwick, 1970					R	3
		<i>Besdolus ravizzarum</i> Zwick & Weinzierl, 1995					D	2
		<i>Agapetus cravenis</i> Giudicelli, 1973					D	1
		<i>Cheumatopsyche lepida</i> (Picter, 1834)					D	2
		<i>Hydroptila vichtaspa</i> Schmid, 1959					R	3
		<i>Tinodes maculatlanii</i> Kimmings, 1966					D	2
		<i>Rhyacophilidae</i> dorsalis persimilis McLachlan, 1879					R	1
		<i>Rhyacophilidae</i> vallisclausiae Giudicelli & Botosaneanu, 1999					D	1
		<i>Sericostomatidae</i> galateum Rambur, 1842					D	1

(1) Selon L. Valladares (comm. pers.), Amorphocephala coronata (Clemmar, 1817), Camptorhinus statua (Rossi, 1790) et Lucanus pontibrenti (Mulsant, 1839) mériteraient (parmi d'autres taxons) de figurer dans une actualisation de la liste des coléoptères bioindicateurs de la valeur biologique des forêts, négligées pour différents raisons, ces espèces ont été ajoutées à la liste.

(2) Parmi les Coléoptères Elateridae de la liste des espèces déterminantes pour les ZnIeff, figure A. vittatus (Gmelin, 1790), un imbruglio nomencaturaliste existe autour de ce nom. En effet, il est utilisé comme synonyme de A. vittatus (Fabricius, 1792), considéré comme étant le nom valide. Ce taxon a longtemps été confondu avec A. puncticollis Kiesenwetter, 1868. Leseigneur et al. (2010) ont établi la différence entre les deux et montré que le premier est une espèce très bonale dans la majorité partie de la France, alors que le second est commun dans le sud-est et en Corse, mais sa répartition est limitée à ce secteur géographique. Il apparaît donc que c'est certainement par erreur que A. vittatus a été placé dans cette liste, en lieu et place de A. puncticollis. J'ai corrigé la liste en ce sens.

(3) Parmi les Héméplières, la sous-espèce de Scutellérinide Eungaster austriaca seabrai Chirca, 1938 a été conservée dans la liste des espèces déterminantes pour les ZnIeff alors qu'elle a été reconnue comme une simple variation de l'espèce type (Rieger, 2011), largement reportée dans l'ouest-polaïarchique (Lipoli & Dusselier, 2015). Elle n'a donc pas été retenue ici.

(4) Le lépidoptère Erebidae Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) figurait dans la liste de 2004 comme espèce remarquable, elle figure également, sans doute à la suite d'une erreur matérielle en annexe 2 de la Directive européenne « Habitats ». Elle a disparu à juste titre de la liste ZNIEFF actualisée, mais elle a été conservée ici par principe, les listes de la Directive étant peu susceptibles d'évolution.