

COMMUNICATIONS

Acariose à *Cheyletiella Sp.*

B. DUVIVIER

note présentée par M. GROULADE

Depuis avril 1973 nous avons observé dix cas d'une dermatose prurigineuse due à un acarien trombidiforme, *Cheyletiella Sp.* (1).

Ce parasite, connu dans les pays anglo-saxons, a été identifié pour la première fois en France chez le chien par J. GUILHON et A. MARCHAND en 1970 et décrit en 1972 (2).

Nous avons constaté l'affection sur des chiots de 2 à 3 mois (caniches nains et yorkshire) importés de plusieurs chenils belges. Elle se traduit par un prurit intense généralisé, avec un abondant furpur.

Le parasite de très faible taille (femelle ovigère 420 à 450 μ de longueur sur 280 à 300 μ de largeur) est visible à l'œil nu ; de couleur blanchâtre il se déplace avec vélocité entre les poils. L'examen microscopique d'un frottis de squames permet le diagnostic en évitant une confusion avec la gale sarcoptique ou un eczéma.

(1) L'identification a été faite par M. le professeur JOLIVET, que nous assurons de notre gratitude.

(2) J. GUILHON et A. MARCHAND, « Une nouvelle espèce d'acarien trombidiforme en France. » *C. R. Acad. Sc.*, 274, 66-69, 1972.
