

ВЕГЕТАТИВНА І ПСИХОСОМАТИЧНА ДИСФУНКЦІЇ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯМ І ВИСОКИМ КАРДІОВАСКУЛЯРНИМ РИЗИКОМ

AUTONOMIC, PSYCHOSOMATIC DYSFUNCTIONS AND QUALITY OF LIFE IN OVERWEIGHT AND OBESITY PATIENTS WITH HIGH LEVEL OF CARDIOVASCULAR RISK

Voropai T.V., Bilokobyl's'ka I.G., Prof. Katerenchuk I.P., M.D.

**ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
Кафедра внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами**

Актуальність проблеми. Ожиріння є важливим фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань і обумовлює 23% випадків ішемічної хвороби серця. Вегетативна і психосоматична дисфункція та ожиріння і ІХС є коморбідними станами, їх поєднання зустрічається від 14% до 47% випадків.

Мета роботи. Визначити вплив вегетативної та психосоматичної дисфункції на якість життя пацієнтів з ожирінням та високим кардіоваскулярним ризиком.

Методи та результати досліджень. Проведено обстеження 55 пацієнтів з ожирінням та високим кардіоваскулярним ризиком. Оцінку вегетативного балансу проводили, використовуючи метод фазаграфії. Оцінку психосоматичних порушень та якість життя визначали за допомогою спеціальних опитувальників (PHQ-SADS, Мінесотський опитувальник якості життя).

Встановлено, що у пацієнтів з ожирінням та високим кардіоваскулярним ризиком наявні вегетативні і психосоматичні порушення, які корелюють з індексом маси тіла та негативно позначаються на клінічному перебігу ішемічної хвороби серця.

Висновок. Наявні вегетативні та психосоматичні порушення у пацієнтів з ожирінням та високим кардіоваскулярним ризиком, погіршуючи якість життя, обумовлюють зростання кардіоваскулярного ризику, що визначає необхідність проведення немедикаментозної та медикаментозної корекції виявлених змін.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ «ПРОТЕФЛАЗІД» У ПАЦІЄНТОК З ДИСПЛАЗІЄЮ CIN I ТА ЕРОЗІЯМИ ШИЙКИ МАТКИ НА ФОНІ ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE DRUG "PROTEFLAZIDUM" IN PATIENTS WITH DYSPLASIA CIN I AND CERVICAL EROSION ON THE BACKGROUND OF HPV INFECTION

Brazhnyk O.S., Mukovos O.E., Prof. Bashtan W.P.

**ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною**

Широкої актуальності в наш час набувають такі проблеми як дисплазія епітелію та ерозії шийки матки, що в майбутньому може призвести до розвитку раку шийки матки (РШМ). Найбільш важливим етіологічним чинником у розвитку (РШМ) є вірус папіломи людини (ВПЛ), особливо його 16 та 18 типи.

Метою дослідження є доведення ефективності використання препарату «Протефлазід» у вирішенні даних проблем.

Досліджено 30 пацієнток у віці від 20 до 40 років з діагностованими ерозіями шийки матки та дисплазіями епітелію легкого ступеня (CIN I). Алгоритмом обстеження було: кольпоскопічне дослідження, цитологічний скринінг (ПАП-тест), гістологічне дослідження біоптату шийки матки, полімеразна ланцюгова реакція на виявлення ДНК папіломавірусної інфекції 16,18 типів, імуноферментний аналіз для виявлення TORCH-інфекції. У обстежених жінок ВПЛ виявлена у 23 пацієнток. TORCH-інфекції знайдені в 12 жінок, 10 з яких мають ВПЛ 16 або 18 типу. Для ефективного спостереження хворих було розділено на 2 групи. I групу склали хворі, які мають TORCH-інфекції (23%). Їм були призначені краплі «Протефлазід» перорально за такою схемою: I т.- 5кр 1 р/день, II-III т.-8кр 3р/день, IV т.-10 кр 3 р/день. Другу групу склали жінки з ВПЛ, 23 жінки (77%), яким до даної терапії додано вагінальні супозиторії по 1 шт в міжменструальний період. Результати оцінювали через 1 місяць за допомогою кольпоскопічного та цитологічного дослідження.

Через 1 місяць у I групі жінок настав регрес у 7 випадках, у 5 жінок дисплазія легкого ступеня залишилася без змін. У II групі регрес настав у 17 випадках, у однієї жінки кольпоскопічно дисплазії не виявлено, у 5 жінок діагноз залишився без змін. Таким чином регрес захворювань у I групі склав 58% випадків, у II групі – 74 %.

Отже, застосування препарату «Протефлазід» для лікування дисплазій епітелію шийки матки легкого ступеня та ерозій шийки матки є ефективним. Доведено, що одночасне застосування пероральної та вагінальної форм препарату підвищує ефективність терапії.