


C

4/17



TOLEDO

Biblioteca Arzobispal.

*9a-21-8.*

4

---

5026

4-5026(1)

R-371810

Tit 137356

C 1178562

4-5026(2)

R. 371785

Tit 137360

C. 1178567

4-5026(3)

R 372260

Tit 137363

C 1178569



# ELVCI DATIO 3

FABRICAE VSVSQUE

Astrolabii, Ioanne Stoflerino Iustingen-  
genfi authore:

*Cui multa & diligens accessit recognitio, vnà cum  
schematum negotio accommodatorum,  
exactissima expressione.*

Adiectus est index rerum & ver-  
borum copiosissimus.



LVTETIAE,

*Apud Gulielmum Cauellat, in pingui gallina,  
ex aduerso Collegij Cameracensis. 140*

1553.

Cum Priuilegio Regis.

## Extrait du Priuilege du Roy.

**P**Ar grace & priuilege du Roy, est permis à Guillaume Cauellat libraire iuré en l'vniuersité de Paris, d'imprimer ou faire imprimer vn liure intitulé, *Astrolabium ioan. Stoflerini*. Et faict defence par ledit seigneur, à tous autres libraires, imprimeurs & autres personnes quelconques, de non imprimer ne faire imprimer, vèdre ne distribuer en ses pais, terres & seigneuries, autres que ceux qu'aura fait imprimer ledict Cauellat, tât en Latin qu'en François, sur les peines contenues esdictes lettres: & ce iusques au temps & terme de six ans finiz & acompliz, à compter du iour & date qu'ilz seront paracheués d'imprimer: comme plus à plain est contenu par les lettres patétes, sur ce données à Paris le dernier iour de Septembre 1552. & de nostre regne le sixiesme.



*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



**GV LIELMVS CAVEL-**  
lat lectori candido S. & fi-  
nem veritatis assequi.



VVM nullum sit in hac  
vita maius operæ præciū,  
quàm nobilissimam ho-  
minis partem siue in seip-  
so, siue in alio excolere,  
nulla autem re possit ma-  
gis quàm veritate excoli,  
nulla verò ipsius veritatis  
pars in hoc mundo infe-  
riori probando & demōstrando magis excitet, ex-  
colat aut cōfirmet, quàm ipsa Mathesis in suos po-  
tissimum fines deducta: fategī in hāc vsque diem,  
quoad fieri potuit, etiam nō sine rei familiaris de-  
trimento & iactura, vt illæ quæ ad mathemata per-  
tinent disciplinæ, ex nostra prodirent officina, cum  
summo & professorū & auditorū compendio.  
Quid verò hac in re hæctenus præstiterimus, nullū  
illius doctrinæ genus intactū relinquendo, præter-  
quā q̄ volumus magis Reipublicæ quàm nostrū in  
ipsa Dei in nos agētis gratia dispēfanda, iudiciū æ-  
stimari, facile hoc probabit, in hāc vsq; diem Pari-  
suis ignotum Sacrosanctioris Arithmeticæ genus,

quod nos, Vnitatis secretioris nomine, Arabes vocabulo Algebræ vocāt, ausi sumus in lucē primi e-  
dere, vt Schubelii epistola gratulatoria ad nos ea de  
re missa testatur. Hic enim vir vt est summo acutis-  
simóq; ingenio, nobis ea de re maximè gratiã ha-  
beri voluit, quod nos, sine vlla præsentē spe lucri,  
eius opus, nō tamē sine suasu D. Io. Magnēnii Me-  
dici, qui primus in eo publicè profiteri est ausus, vo-  
luerimus edere. Quum autem sit finis mathematũ,  
ipse dimensionis vsus, qui in Astrolabio contine-  
tur, voluimus etiam magnis quod ad nostras facul-  
tates attinet sumptibus, ex ampliori illa forma qua  
Ioan. Stoflerinus primarius ipsius author edi cu-  
rauerat, in hanc portatilem enchiridii instar dedu-  
cere, vsi hac in re industria, consilio & arte (quibus  
ex æquo valet) D. Gulielmi Bordei iuuenis vt in  
his rebus delineandis, & ex maiuscula in minus-  
culã formã, aut cōtrà transferendis quibusuis figu-  
ris summi, ita solidi iudicii acrimonia commenda-  
bilis. Illius industriam laude, nostram diligentiam  
& tenuitatem suo sine fraudatum non iri sperans,  
te volui, candide lector, de his rebus admonitum,  
vt ex hac inferiori veritatis ratione, in summam &  
æternam contendens, & non tantũ per causam, sed  
multo maximè propter causam primam cogno-  
scens, æternam ex temporanea fœlicitatem asse-  
quare. Hic est mei & epistolij & instituti finis.

Vale. ad Cal. Octob.

Anno 1552.



# INDEX EORVM,

QVAE HOC LIBRO IOANNIS Stoflerini visa sunt notatu digniora: in quo animaduertes, a, priorem, b, verò posteriorem pagellæ faciem notare.



A

Equationes foliis nō vbiq̄ue sunt æquales. 145.a

A Equinoctialis circulus.

4.a

A Equinoctialis hora. 53.b

A Equinoctialiū horarū reductio. 90.b

A Estius æquinoctius. 22.a

Agrippina. 100.b

Alanthica. 57.a.60.a

Albertus Magnus. 21.b

Albion seu Anglia. 107.b

Albumasar. 20.a.137.a

Alchitot. 56.a.65.a

Aldebaran. 97.b.85.b

Alexandria. 100.b

Algoniza. 60.a

Alhabos. 57.a.60.a

Alhancabuth. 24.b.62.b

Alhidada. 55.b.64.b

Alexandrinæ colūnæ. 100.a

Alioth stella. 99.b

Aliquot inutiles astrologis propositiones. 112.b

Almagestum. 132.a

Almaitech. 61.b

Almicanterath. 5.b.61.b

Almagrip. 61.b

Almuri. 42.a.63.b

Alphantia. 57.a.60.a

Alpheratz. 56.a.65.a

Alphrabijs. 152.b

Alphraganus. 20.a

Alti & profundi eadem est mensurandi ratio. 170.b

Altimetria quid. 153.a

Altitudinum circuli. 10.b

Altitudo solis. 68.a

Altitudo solis aut lunæ.

157.b

Altitudo tenet locū lineæ.

154.b

Amisia. 102.b

I N D E X.

Ameristus geometra.	153.a	Astronomorum horę.	83.b
Anaxagoras Claromenius.		Austrina declinatio.	96.b
153.a		Austroaphricus.	118. b.23.a
Andromeda.	37.a	Authores qui de aspecti-	
Anguli cœli quot.	94.b	bus tractarunt,	137.b
Anguli terrę quot.	21.b.95.a	Aux solis.	47.b
Annus communis.	65.b	Azimuth quid.	10.b
Aquilonia declinatio.	96.b	B	
Aquilonis incómoda.	119.b	<b>B</b> Abyloniorum opinio.	
Aranea.	62.b	92.b	
Aranea astrolabii.	24.b	Bathina vrbs.	100.b
Arcus æquatoris.	88.a	Bethen astrologus insignis.	
Arcus diurnus solis.	77.a	92.b	
Arcus horæ diurnæ.	88.b	Borealia signa.	63.b
Arcus horarius.	13.b.14.a	Boreas.	22.b.119.b
Arcus horarum.	51.52.a.b	Bilimbatú quadrans.	148.b
Arcus horarú ięqualiú.	50.a	Bipartia astrolabia.	7.a
Arcus nocturnus.	88.b	Bis in anno inæquales sunt	
Arcus nocturnus solis.	77.a	horæ.	71.a
Argentina.	100.b	Bissextilis annus.	65.b
Argestes ventus.	119.a	Bizantium.	100.b.101.a
Arithmetices origo.	152.b	Brumalis æquinoctius.	22.a
Armilla suspensoria.	57.a.	C	
60.a		<b>C</b> Aballus.	65.a
Ascemat.	67.b	<b>C</b> Cadentes anguli,	133.a
Ascensio quid.	121.a	Calculator.	63.b
Ascensionis arcus	131.a	Cancri circulus.	4.a
Aspectus planetarum.	136.b	Canis firi <sup>9</sup> q & maior.	34.b
Astrolabii descriptio.	59.a	Cardines terræ quot.	21.b
Astrolabii inuentor.	59.a	Cardinales venti.	23.a
Astronomicus ortus quid.		Cardines cœli.	95.a
120.b		Cathalzevvi.	61.b

I N D E X.

Cœlestia domicilia quot.	132.a	Clauus.	65.a
Cœli anguli.	94.b	Cracouia.	102.b
Collaterales venti.	23.a	Crepusculi vespertini duratio.	78.b
Collocatio stellarum in rete.	35.b	Crepusculinæ lineæ.	62.b
Clauus vel axis.	56.a	Cubitus.	153.b
Cleomedes.	63.a	Cuiuslibet signi diuisio.	29.b
Climata septem.	20.a	Cuneus.	65.a
Cognitio horarũ inæqualium.	87.a	Curta buda.	108.a
Cognitio meridiei vnde.	73.a	Cuspides domorum cœli.	132.a
Cõiunctio planetarũ, quid	137.a	<b>D</b>	
Cõputatio horarum æqualium.	80.a	<b>D</b> AEdalicum instrumentum.	57.b
Cõfectio almicãtarath.	7.b	Declinatio graduũ zodiaci.	95.b
Constructio retis.	24.b	Declinatio quid.	96.b
Contracti notatu digna sententia.	93.b	Declinatio stellæ.	31.a
Corona quid.	62.a	Definitio astrolabii	59.a
Corus ventus.	119.a	Descensio quid.	121.a
Corrodunum.	102.b	Descriptiones vmbrarum.	156.a
Circius.	22.b.119.b	Denticulus.	19.a
Circuli concentrici & eccentrici.	44.b	Differẽtię stellarũ quot.	31.b
Circulus capricorni.	4.a	Differẽtiæ vmbrarum.	156.a
Circuli altitudinis.	42.b	Dies artificiales.	68.a
Circuli azimuth.	10.b	Digitus.	153.b
Circuli progressionum.	5.b	Digitus, duodecima pars.	155.b
Circuli ventorum.	62.b	Distinctio climatum.	20.a

I N D E X.

Diuisio horizontis per azi-  
 muth. 10.b  
 Diuisio limbi. 2.b.3.a  
 Diuisio mensium. 47.a  
 Diuisio rete. 25.a  
 Diuisio zodiaci. 25.b.28.a  
 95.b  
 Diurnus arcus solis. 77.a  
 Domicilia cœlestia. 15.b  
 Domorum arcus. 62.b  
 Domus cœli. 132.a  
 Dorsum astrolabii. 2.b  
 & 63.b  
 Duodecim signa. 64.a  
 Duodecim venti. 21.b  
 Duratio crepusculi matuti-  
 ni. 78.b  

E

**E** Clypsis lunaris. 101.a  
**E** Clypticæ arcus quid.  
 127.a  
 Ecliptica linea. 63.a  
 Effectus ventorū varii. 118.a  
 Electio Maximiliani in regē  
 Romanorum. 144.a  
 Eleuatio polaris. 5.b  
 Eleuatiōes meridianæ. 54.b  
 Eleuationum tabula. 147.b  
 Erraticæ stellæ. 85.b  
 Euroauster. 118.a  
 Euronotus. 23.a  
 Eurus. 22.a

Euclides Megarensis. 153.a

F

**F** Acies astrolabii. 2.a  
**F** Fabrica horarii bilimba-  
 ti. 151.a  
 Fabrica zodiaci. 51.a  
 Facies antica et postica. 60.a  
 Fauonius ventus. 119.a  
 Figura & locus vētorū. 24.a  
 Figura horarii bilibati. 150.b  
 Figura reuolutionis electio-  
 nis Maximiliani. 144.b  
 Fiduciæ linea. 42.a.64.a  
 Finiens obliquus. 61.b  
 Finis crepusculi matutini.  
 78.b  
 Fixarum stellarum ortus &  
 occasus. 84.b  
 Fixarū stellarū tabula. 32.b  
 Fixæ stellæ diurnū tempus.  
 86.a

Fixarum stellarum declina-  
 tio. 95.b  
 Fluens hora. 89.b  
 Fœlix radiatio quæ. 137.b  
 Fortunatæ insulæ. 100.a  
 Fundamentum iudiciorum  
 quod. 136.b

G

**G** Ades Herculis. 100.a  
**G** Geometria quid. 152.a  
 Geometriæ inuētores. 152.a

INDEX.

- |                                  |       |                             |       |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Geometriæ species.               | 153.a | Horologia officio astrola-  |       |
| Georgius Purbachius.             | 135.a | bij posse cõponi.           | 146.a |
| Gnomon.                          | 154.b | Horologium solare.          | 93.b  |
| Gradus eclipticæ.                | III.a | I                           |       |
| Gradus æquatoris.                | 88.a  | Iacobus Alkindus.           | 136.b |
| Gradus polares.                  | 5.b   | Impositio stellarum.        | 31.b  |
| Graduum ascensio & de-           |       | Impositio stellarum in ara- |       |
| scensio.                         | 122.b | neam.                       | 35.a  |
| Gubernamenti planetarum          |       | In septimo climate, rei vm- |       |
| tabella.                         | 93.a  | bra nunquam est æqualis.    |       |
| H                                |       | 157.a                       |       |
| Haly aben ragel.                 | 20.a  | In siene quando nulla vm-   |       |
| Haly habē rodan.                 | 59.a  | bra.                        | 94.a  |
| Hemisphærij circulus.            | 6.b   | Inæqualis diei temporalis   |       |
| Hermannus Cõtract <sup>o</sup> . | 20.a  | hora.                       | 87.a  |
| Hespericus sinus.                | 100.a | Inæquales horæ.             | 13.b  |
| Herculis Gades.                  | 100.a | Incertæ mensurationes.      |       |
| Hexagonus aspectus.              | 137.a | 169.b                       |       |
| Hibernus æquinoctius.            | 22.a  | Incompleta hora.            | 89.b  |
| Hippocrates Cous.                | 153.a | Initium crepusculi matuti-  |       |
| Hora æquinoctialis.              | 69.b  | ni.                         | 78.b  |
| Hora inæqualis nocturna.         |       | Initium crepusculi vesper-  |       |
| 87.b                             |       | tini.                       | 78.b  |
| Horæ temporales.                 | 13.b  | Inscriptio azimuth.         | 10.b  |
| Horaria fabrilia.                | 80.b. | Inscriptio circuloꝝ anni.   |       |
| Horariæ lineæ.                   | 150.a | 46.b                        |       |
| Horarij constitutio.             | 50.a  | Inscriptio linearum hora-   |       |
| Horarū æqualiū arcus.            | 51.a  | riarum.                     | 149.a |
| Horarum inscriptio.              | 3.a   | Inscriptio signorum zodia-  |       |
| Horarum reductio.                | 83.a  | ci.                         | 26.b  |
| Horizon obliquus.                | 6.b   | Inuentor astrolabij.        | 59.a  |
| Horizō spheræ rectæ.             | 123.a | Inuentio                    |       |

INDEX.

Inuentio centri trium pun- ctorum.	14.a	Linea fiducia.	42.a 65.a
Inuentio nadair solis.	67.b	Linea horarum.	149.b
Inuentio poli zodiaci.	28.a	Linea meridiei.	64.a
Inuentio zenith.	6.b	Locus solis nō semper qua- drat cum loco radice.	
Inuētores geometriæ.	152.a	145.a	
Ioannes Eligerus.	132.a	Longitudo diei artificialis.	
Io. de mōte regio.	16.a 132.a	78.a	
Iudex vel ostensor.	63.b	Longitudo spatij plani.	
Iulius Firmicus.	20.a	168.b	
<b>L</b>		Longitudo stellæ.	31. a. 35.b
<b>L</b> Ab inuentor astrolabij		Longitudo regionū.	100.a
59.a		Lunæ aspectus.	138.a
Latera quadrantis.	156.a	<b>M</b>	
Latera umbrarum.	49.a	<b>M</b> Agnitudo stellæ.	31. b
Latio solis, quid.	70.b	35.b	
Latitudo planetarum.	138.b	Maior vel minor portio æ- quatoris.	121.a
Latitudo plani quo pacto mensuranda sit.	169.b	Marcpurgium.	102.b
Latitudo regionis quid.		Margilabrum.	60.b
98.a		Margo astrolabij.	2.b
Latitudo stellæ.	35.b	Mathematicæ artes certissi- mæ.	112.a
Laus geometriæ.	153.a	Mater astrolabij.	2.b. 60.b
Libonotus.	23.a 118.a	Materia astrolabij quæ.	2.a
Libia arens.	126.a	Matutinū crepusculū.	17.b
Libs vel aphricus.	119.a	Martianus.	21.a
Limbus astrolabij.	2.b	Matutini crepusculi initiū.	
Lincon astrologus.	137.a	78.b	
Limbus seu arcus.	148.b	Maxima solis declinatio.	
Linea crepusculina.	17.b	4.a	
Linea eclipctica.	25.a		

Mecha

INDEX.

- Mechanica horologia. 82.a  
 Media umbra. 155.b  
 Medium cœli. 95.a  
 Mediclinium. 64.b  
 Mensium circuli. 45.a  
 Mensurandorum inaccessibilium ratio. 164.a  
 Mensurarum partes eadem habent principia. 154.a  
 Mensuratio plani in longū. 167.b  
 Meridianarū horarum reductio. 83.a  
 Meridionalia signa. 63.b  
 Meridionalis polus zodiaci. 29.a  
 Messohala 45.a 59.a  
 Minutum quid. 71.a  
 Mirach. 37.a 63.a  
 Modi cognoscendi meridiem. 73.a  
 Modi inscribendi lineā crepusculinam. 18.a  
 Modi inuestigandarum latitudinum. 98.b  
 Modi tabulis non innitentes. 28.a  
 Modus conficiendi horologii. 146.b  
 Modus inuentionis horæ æqualis. 71.a  
 Modus rationalis. 135.a  
 Modus varius altitudines mensurandi. 156.a  
 Motus solis cognitio perutilis. 65.b  
 Mundi plagæ. 115.a
- N
- N Adair. 43.a  
 Naturæ vëtorum. 118.a  
 Naturalis dies. 69.b  
 Naturalium dierum differentia. 70.a  
 Neapolis oppidum Italiæ. 108.a  
 Negligendę propositiones. 112.a  
 Nicephorus. 93.b 98.a  
 Nilus ægyptius. 152.b  
 Noctis mediæ linea. 64.a  
 Nocturna fixarum stellarū tempora. 86.a  
 Nocturnarum horarum cognitio. 76.a  
 Nocturnarū horarum reductio. 83.a  
 Nocturnū tēpus stellæ. 86.a  
 Nocturnus solis arcus. 77.a  
 Nomina dierum. 92.a  
 Nomina latina stellarū fixarum cū arabicis. 38.39.40.  
 Nomina stellarū fixarū. 32.b

INDEX.

Nomina ventorum. 118.a.b  
 Nomina 12. signorum 26.b.  
 63.a  
 Nonnunquam horæ temporales æquinoctiales excedunt. 89.a  
 Nostrarum ad astronomicas & contra astronomicarum ad horas nostras reductio. 83.b  
 Norimbergium. 81.a  
 Notus. 23.a  
 Nototalgab. 62.a  
 Nox pars diei. 70.a  
 Numeri graduum signorū. 64.a  
 Numerus quotiens. 158.a  
 Numerus ventorum. 21.b

O

**O**bliqua sphaera. 121.a.b.  
 130.a  
 Obliquum planum metiri. 169.b  
 Obliquus circulus. 63.a  
 Obliquus ortus. 120.b  
 Occasus astronomicus. 120.b  
 Occasus solis quotuplex. 22.a  
 Occasus Solis tempus. 76.b  
 Octauus orbis. 116.b  
 Officio stellæ horam inuenire. 80.b

Oppositus aspectus. 137.b  
 Oppidorum Europæ tabula. 9.a  
 Orbis signorum. 64.a  
 Orbis signorū diuisio. 43.b  
 Ordines stellarū quot. 31.b  
 Origo geometriæ. 152.b  
 Ortus & occasus signorum in sphaera recta. 125.a  
 Ortus solis tempus. 76.b  
 Ortus solis triplex. 22.a  
 Ortus stellarū fixarū. 84.b  
 Ostēforis compositio. 42.a

P

**P**almus. 153.b  
 Parrhisium. 100.b  
 Passium oppidum. 106.b  
 Passus. 153.b  
 Peronticū oppidū Thraciæ 106.b  
 Perpetua stellarum apparitio. 85.a  
 Pertica aut radius. 153.b  
 Phæludianus Ptolemæus. 59.a  
 Pinnulæ. 55.b  
 Plage terræ, quot. 21.b  
 Plagæ mundi quatuor. 4.a  
 Planetæ dominatus. 92.a  
 Planetæ hora. 70.b  
 Planetarum aspectus. 136.b  
 Planities



- Planimetria quid. 153.a  
 Planities longitudo. 168.a.b.  
 Plures modi noscendi meridiam. 73.a  
 Poli mundi. 22.b  
 Polus arcticus. 22.b  
 Polus borealis. 127.b  
 Polus mundi. 99.b  
 Pomeridiana altitudo solis. 69.a  
 Positio ventorum. 21.b  
 Ptolemæus Alexandrinus. 58.b  
 Præful Imbriopolensis. 21.b  
 Principiū diei quando. 70.a  
 Profunditatis mensuratio. 170.b  
 Prouinciarum Europæ tabula. 9.a  
 Puncta umbræ versæ. 168.b  
 Punctorum reductio. 163. 166.a  
 Punctum verticale. 6.b. 62.a  
**Q**uadrata latera. 156.a  
**Q**uæ stellæ appareāt semper. 85.a  
 Quando fiat ortus stellæ. 84.b  
 Quando umbra, rei respon-  
 det. 157.b  
 Quare dictus dies artificialis. 70.a  
 Quantitas diei artificialis. 78.a  
 Quatuor mundi plagæ. 4.a  
 Quid altitudo. 166.a  
 Quid planimetria. 167.b  
 Quid sit Astrolabium. 59.a  
 Quinpartia astrolabia. 7.a  
 Quo tempore inuentum astrolabium. 59.a  
 Quot azimuth in astrolabio. 10.b  
 Quot anguli cœli. 94.b  
 Quot arcus horarum inæq. 62.a  
 Quot climata sunt. 20.a  
 Quot matris circuli. 5.b  
 Quot modis diuidatur rete. 25.a  
 Quot mundi plagæ. 115.a  
 Quot plagæ ventorum. 22.a  
 Quot sint modi inuestigandarum latitudinum. 98.b  
 Quot sunt aspectus. 137.a  
 Quot venti numero. 21.b  
 Quotuplex aspectus. 138.a  
 Quotuplex declinatio. 96.b  
 Quotuplex hora. 70.b  
 Quotuplex ortus solis. 22.a  
 Quotu-

Quotuplex sit ortus aut occasus astronomicus. 120.b  
 Quotuplex umbra. 156.a  
 Quotuplicia astrolabia. 7.a  
 Quotupliciter imaginetur diuisio zodiaci. 95.b.96.a

## R

**R** Adiatio vel aspectus. 137.a  
 Radius. 65.a  
 Radix quadrata. 105.b  
 Ratio horologiorum cur iusta vel iniusta reddi potest. 148.b  
 Ratio omnem naturæ viam perlustrat. 166.a  
 Rationalis modus fabricandarum cœlestium domorum. 15.b  
 Recta ascensio quid. 122.a  
 Recta sphaera. 121.a  
 Rectè orientia signa. 129.b  
 Rectificatio plani. 170.a  
 Rectitudinum circuli. 10.b  
 Rectus ortus. 120.b  
 Reductio horarum variarum. 81.a  
 Reductio punctorum umbræ versæ. 163.a  
 Regis Achas horologium. 94.a  
 Regionum longitudo. 100.a

Regionum europe tabula. 9.a  
 Regula algorithmi. 105.b  
 Regula ascensionis & descensionis æquatoris. 122.b  
 Regula seu index. 42.b  
 Regionum miliaria variant. 102.a

Rete astrolabij. 24.b.62.b  
 Rete diuisio. 25.a  
 Reuolutio anni quid. 139.a  
 Roma. 100.b  
 Romanus annus, vulgaris. 45.b

## S

**S** Arapa oppidum. 100.a  
 Sarracenorum mos. 15.b  
 Schema azimuth. 13.a  
 Seminocturnum tempus stellæ. 86.b  
 Scala umbræ rectæ. 155.a  
 Scalæ altimetræ. 42.b.64.b  
 Secundum & tertium quid. 71.a  
 Septem climata. 20.a  
 Septentrio ventus. 119.b  
 Septentrionalia signa. 63.b  
 Septimanæ dies nomen habent à planetis. 92.a  
 Sextilis aspectus. 137.a  
 Signa obliquè orientia. 129.b  
 Signa zodiaci. 26.b  
 Signorum 12. diuisio. 28.a  
 29.b

Simiophoros	63.a	Tép' initij crepusculi	79.b
Solipartia astrolabia.	7.a	Tempus ortus solis.	76.b
Solaris annus.	65.b	Téporales horæ.	13.b.53.b
Solipartia astrolabia.	72.a	Temporalium horarũ ini-	
Spica virginis.	37.b	tium.	88.a
Sphæra quotuplex.	121.a	Terræ angulus.	95.a
Sphæra solida quid.	58.b	Teu vazalzene.	61.a
Stadium.	154.a	Thales Milesius.	153.a
Stereometria quid.	153.a	Theodor' Cyreneus.	153.a
Stella aldebaran.	34.b	Thiene metropolis.	100.a
Stellæ declinatio quid.	31.a	Toletum oppidum.	100.a
Stellæ occasus quando fiat.		Tripartia astrolabia.	7.a
84.b		Tres circuli matris.	5.b
Stellarũ fixarũ occas'.	84.b	Triangulus rectilineus or-	
Stellarũ fixarũ tépora.	86.a	thogonius.	154.b
Stricta foramina tabellarũ		Triplicé solis ortum.	22.a
debent esse.	165.b	Tubingense gymnasiũ.	5.b
Subsolanus.	22.a 118.a	Tubingense oppidum.	99.a
Subtractio quotiétũ.	164.b	Tympana.	60.b
Suspensorium astrolabij.	57.a	Tympana astrolabij.	19.a
Syene ciuitas.	93.b		
		V	
<b>T</b>		<b>V</b> Ariarũ horarum redu-	
<b>T</b> Abula ascensionum re-		ctio.	81.b
ctarum.	26.a	Vectis teres.	65.a
Tabula astrolabij.	2.a	Ventorum cardines.	22.a
Tabula climatum.	20.b	Ventorum circuli.	62.b
Tabula miliarium.	103.b	Ventorum plagæ quot.	22.a
104.a		Ventorũ varij effectus.	118.a
Tabula stellarũ fixarũ.	32.b	Verus motus stellæ.	35.b
Tabula veri mot' solis.	66.b	Vespertini crepusculi finis.	
Taprobana insula.	105.b	78.b	

**V**espertinū crepusculū. 17.b  
**V**ia solis. 25.a 63.a  
**V**icinitas auroræ 79.a  
**V**irgæ mensoriæ altitudo.  
 169.a  
**V**isio intus causatur. 154.a  
**V**mbilic<sup>9</sup> Andromedæ. 37.a  
**V**mbra recta & versa. 49.a  
**V**nde cognoscatur verus  
 motus solis. 145.a  
**V**nde dicta stereometria.  
 153.b  
**V**oluellum. 24.b 62.b  
**V**rfa maior. 99.b  
**V**sus horarij bilimbati. 151.a  
**V**tilitates geometriæ. 152.b  
**V**ulturnus. 22.a 118.a  
**V**valzagora. 59.b

## Z

**Z**enith. 62.a  
**Z**enith à Sole distantia.  
 110.a  
**Z**enith ortus & occasus so-  
 lis. 112.b  
**Z**enith regionis. 6.b. 90.b  
**Z**enith solis quid. 113.a.b  
**Z**enith stellarum fixarum  
 quid. 113.b  
**Z**ephyrus. 22.a 119.a  
**Z**odiacus. 63.a  
**Z**odiaci polus. 22.b  
**Z**odiaci diuisio. 25.b. 28. a  
 95.b  
**Z**ona torrida sub nullo cli-  
 mate. 109.a

FINIS.



# DE COMPOSITIONE AUT FABRICA

*Astrolabij, eiusdemq; usu, multifarijsque  
utilitatibus, Ioanne Stoflerino Iustin-  
gensi Authore.*

VNIVERSIS BONARVM  
Artium studiosis Ioannes Stoflerinus Iu-  
stingensis S. D.



*QVVM sint in Mathema-  
ticip, Lectores optimi, organa  
multa perpulchra & mira-  
tu dignissima, pluribus ac  
eximiis authoribus explica-  
ta demonstrataque volumi-  
nibus longe omniu pulcher-  
rima de Planisphaerio aut Astrolabio traditio est.  
Quam his qui iam pede calcante terrenis imperare  
videntur, vultu vero erecto atque sublimi coelesti-  
bus fruuntur delitiis, destinandam esse censuimus.*

*A*

*meæ profectò erga eos beneuolentiæ pignus immor-  
 tale. Quod pergratum & iucundum fore minimè  
 ambigimus: tum quia Mathematicarum disci-  
 plinarum studiosis Enchiridion est, tum ob com-  
 moditatum vsuúmque fermè innumerorum no-  
 bilissimam altissimámque indaginem. Taceo quòd  
 eius organi constructio & vsus, ab insignibus Phi-  
 losophis, Hipparcho, Ptolemæo, Ammonio, Proclo,  
 Philopono, Nicephoro, Hermanno Contracto A-  
 lemãno, Ioãne Eligero, Henrico Bate eximiis lau-  
 dibus comprobantur. His patronis ducibúsq; præ-  
 sentissimis, quæ ad fabricam, quæque ad vsum ten-  
 dant dicere exordiemur. Valete sydere foelici Le-  
 ctōres candidi. Tubingæ Anno salutis Sesqui-  
 millesimo decimo.*

TRA-

# TRACTATVM

## DE ASTROLABIO, IN

*duas partes distinximus. In prima enim parte fabricam aut compositionem ipsius docebimus. In secunda multiplicem eius vsum explanabimus.*

### PRIMA PARS DE FABRI-

*ca Astrolabij, omnes circulorum, arcuum, linearum, graduum & partium inscriptiones exactissimè absoluit.*

*MATERIAM PRO ASTRO-*  
*labij constructione præparare.*

Propositio  
prima.



*X Metallo, puta cupro aut aurichalco, vel ex ligno duro, solido ac fir-*  
*mo fabricetur tabula plana, quæ ar-*  
*te tornandi rotundetur. Ita tamen,*  
*quòd vna eius superficies concave-*

*tur, hoc pacto quòd limbus, margo aut pars exterior*  
*sit aliquantulum eleuatiore parte interiori. Quæ*  
*quidem superficies sic concavata, dicitur facies A-*  
*strolabij. Reliqua autem superficies quæ omni-*

Facies A-  
strolabii.

A ij

Dorsum  
Astrolabii.  
Limbus.  
Mater.

**A.** no plana est, dorsum Astrolabij appellatur. Pars igitur faciei extima (vt iam exposuimus) limbus aut margo. Interior autem pars mater, haud iniuria nominatur. Concauatur autem vna superficies Astrolabij, vt plurimarum tabularum diuersis regionibus & climatibus seruientium sit capax.

Propo. 2.

**LIMBVM AVT MARGINEM**  
in suas partes congruas distribuere.

**I**N facie tabulae preparatae quære centrum quod vocetur. e. Super quo officio circini, describe in limbo secundum tabulae capacitatem circulum maiorem, ita tamen quod extremitatem tabulae non omnino tangat. Deinde circino constricto ex eodem centro. e. produc alium circulum minorem, tantum distantem à primo, quòd inter ipsos possit scribi numerus horarum diei naturalis.

Iterum restringe circinum, & protrahe tertium circulum tantum solummodo distantem à secundo, quòd inter ipsos possint cadere singulares graduum diuisiones. Rursus iterum comprime circinum & depinge in eodem centro quartum circulum, tantum distantem à tertio, vt inter ipsos possit describi numerus graduum æquinoctialis, distinctorum per 5. & 5. Hi circuli quatuor sic ritè descripti, constituunt limbum aut marginem Astrolabij



labij vbiq̄ue terrarum vniiformiter se habentem.


Præterea quadrabis limbum per centrum. e, duabus diametris signando puncta extremitatū his literis, a, b, c, d. Locando a. in superiori parte, b. versus dextram, c. in oppposito a, & d. in opposito b. Secat igitur linea a c. lineā b, d. ad angulos rectos, & erūt hæ lineæ aut diametri communes limbo & matri.

Deinde circulum secundum aut tertiū limbi di- De diuisione  
ne limbi.  
uide in 360, partes aut gradus, hoc modo: quamlibet quartam circuli iam dicti partire primū in tres partes æquas, & iterum quamlibet partem in duas: & habes in toto circulo. 24. partes. Quibus & cetro. e. applica regulam, & pinge aut trahere lineas per omnes quatuor circulos, & sunt hæ lineæ horarum diei naturalis. Postea quālibet. 24. partium diuide in 3. partes: & his & centro. e. iunge & regulam, & duc lineas à secundo circulo vsque in quartum.

Demum quamlibet partem distribue in 5. particulas æquales. Quibus & cetro apta regulam, & duc lineas minutas à secundo circulo in tertium. et ita partitus est circulus optatus in 360. partes aut gradus. Numerum horarum diei scribe in intercapedine primi et secundi circuli, inchoando in linea post a versus dextrā: primæ igitur lineæ adscribe. 1. Secundæ. 2. Tertiæ. 3. & sic deinceps vsque in 12. quæ horam conticinij aut mediæ noctis indicāt: & ponuntur circa literam. c. Et post noctis mediū

## DE FABRICA

iterum incipe scribere ad lineas. 1.2.3. &c. continuando vsque in 12, quæ horam meridiei pandunt & literæ a. iunguntur. In spatio verò tertij & quarti circuli, signabis (iuxta d. incipiendo siue in oriente scribendo versus a. vel meridiem) in primo spatio. 5. in secundo 10. in tertio. 15. & sic de aliis numeris, per quinarium ascendendo vsque ad 360. quæ circa d. in oriente sedē sibi vendicabunt. Hactenus de compositione limbi. Cuius hanc summe figuram.



TRES CIRCULOS CA- Proposit. 3.  
 pricorni AEquinoctialis & Cancrī in  
 matre Astrolabij artificiose describere.

**M**atris descriptionem, communium astrolabiorum, quæ præter unicam superficiem intra limbum contentã, nullas recipiunt tabulas aut tympana vnius latitudinis aut elevationis polaris astrolabia appellata, in hac & quinque sequentibus propositionibus ingeniosè patefaciemus.

Principiò omniũ tres circulos Capricorni, AEquinoctialis et Cãcri inuenire debemus. Super Centro igitur e, et sub limbo, ducito circulũ Capricorni tantũ distantẽ à superficie interiori limbi, vt in tali spatio quatuor plagæ mundi inscribi possint, scilicet Quatuor plagæ mundi inscribuntur.  
 sub a meridies: sub b occidens: sub c septentrio: & sub d. oriens. Obsignabisque iam ductum Capricorni circulũ quatuor literis. f. g. h. i. in suis quartis aut diametris (diametri enim prius in diuisione limbi facti partiuntur ipsum in quatuor quartas) ponendo f, sub a, limbi, g, sub. b. h. sub. c. & i. sub. d.

Deinde supputa ab a, à meridie, versus orientem, in gradibus limbi, maximam solis declinationem: quæ hac nostra tempestate 23. gradus & 30, minuta non excedit: & ad finem eius imprime notam: cui & centro e, applica regulam, & trahе lineam occultam & subtilem à circulo Capricorni


Usque ad centrum e. Deinceps iunge vnam partem  
regule intersectioni circuli Capricorni & lineæ  
occultæ: & aliam partem regulæ literæ g, pūcto oc-  
cidentis, scilicet vbi circulus Capricorni & diame-  
ter. b. d. sese absecant. Et vbi regula diametrum a c,  
vel f h, quod idem est, absecat, ibi fac notam. Post  
hæc pone vnum pedem circini immobilem in cen-  
trum e, & alium vagantem extende in notam in  
diametro a c, vel f h iamiam factã, & circino sic  
manente, circina circulum AEquinoctialis vel  
Arietis & libræ. Quæ his literis k L m n notabis,  
ponendo. k. sub. f. L. sub. g. m. sub. h. & n. sub. i.

AEquino-  
ctialem pri-  
mo descri-  
be occultū,  
quia diuisio-  
nibus affi-  
cietur.

Quo factō apta regulam intersectioni æquino-  
ctialis & lineæ occultæ & pūcto L. occidentis in  
æquinoctiali: & iterum signa intersectionem dia-  
metri a c, & regulæ: & mitte vnum pedem circini  
in e centrum, & reliquum pedem vagum in signa-  
turam diametri: & scribe circulum tropicum Can-  
cri. Tandem clarioris cognitionis gratia ipsis circu-  
lis nomina adiunge: puta circulo Capricorni ascri-  
batur tropicus Capricorni, vel tropicus hyemalis,  
aut brumalis. AEquinoctiali, Aequator vel circu-  
lus æquinoctius. Cancro, tropicus Cancri, aut tro-  
picus æstiuus.

HUIUS PROPOSITIONIS

sequens fumatur schema.



CIRCULOS PROGRESSIO-  
num aut almicantarath studiose elaborare.

**E**XPEDITI de tribus circulis Matris pri-  
mariis, nunc ad descriptionem circulorum pro-  
gressionū, quos Arabes almicantarath nominant,  
faustè properabimus. Affigatur igitur tabula  
in assere plano, ita ut facile moueri non possit, &  
circa literam, a, ipsius limbi, annecte tabulæ lignū  
planum & rectum, longitudinis duorum ferè pe-  
dum, & eiusdem spissitudinis cum tabula astrola-  
labij. Quibus sic dispositis, applica regulam dia-  
metro a, c, & prolōga ipsam ultra a, in ligno conne-  
xo ad longitudinem pene duorum pedum.

Præterea pro confectiōe prædictorum circulo-  
rum opus erit prænoscere eleuationem poli aquilo-  
nij aut arctici super horizōtem optatæ habitationis:  
ad quam fabricam astrolabij instituisti. Hanc  
autem etsi ex opere geographiæ Claudij Ptolemæi  
elicere potes, per tabulam tamen inferius exponen-  
dam, ad sedem propositæ habitationis aut vicini-  
ris gradus polares, quos more vulgato eleuationem  
poli arctici nuncupamus, facilimè patebūt. De quæ  
& eius inuentione, officio tamen instrumenti, &  
item de latitudine oppidorum, alibi abunde tracta-  
re decreuimus. Descripturus igitur circulos pro-  
gressionum pro oppido & almo gymnasio Tubin-  
genfi

gensi (vt exemplo certior reddaris) ex tabula nominata elicias eius eleuationem polarem: quæ 48. gradibus & 40. ferè minutis absoluitur. Hanc diligenter numera in gradibus limbi à d versus c, hoc est, ab oriente versus septentrionem: & in termino graduum & minutorum eleuationis polaris fac signaturam in limbo, ad quam & centrum e, apta regulam, & cum punctorio fac notam subtilem in æquinoctiali, in ea parte vbi ipsa regula æquinoctialem tangit, & vocetur. o. Consimiliter cõputa eandem eleuationem poli à b, versus a. hoc est, ab occidente versus meridiem, iterum signando æquinoctialem cum signatura acuta (vt iam in parte opposita docuimus) quæ dicatur. p. Et quia hæ signaturæ o & p, per medium circuli distare debent, sequitur, si ipsis regulam adieceris, hanc per centrum e transire necessum sit. Si secus corrige errorem.

Quibus peractis siste vnã partẽ regulæ in punctum. L. occidentis in æquinoctiali: & aliam partem regulæ applica ad signaturam o, in æquinoctiali: & vbi regula lineam a c, hoc est diametrum à meridie in septentrionem transeuntem interfecerit, illic imprime notam q, quæ communiter cadit vltra centrum e, versus septentrionẽ. Et regula manente in puncto L, occidentis, promoue eius partem vagam in signaturam p, & contactum regulæ & diametri a c, prolongatæ signa nota quæ vocetur. r.

& hæc plerumq; cadit extra limbum. Postea que-  
 re centrum inter has duas notas q & r, in diametro  
 a c, super quo describe arcum vel circulum imper-  
 fectum manifestum: tamẽ inchoando à tropico ca-  
 pricorni in occidente, transeundo per puncta L q n,  
 vsque in tropicum Capricorni in oriente. Quod si  
 ritè operatus fueris, videbis arcum istum per puncta  
 æquinoctialis L & n, in vnguẽ vergere. Si aliter cõ-  
 tigerit scito te errasse: quare denuo reitera opus &  
 corrige errorem. Arcus iste iam descriptus Ho-  
 rizo obliquus aut circulus hemisphærij habitatio-  
 nis oblata rectè appellatur. Qui primũ & extimũ  
 almicantarath representabit. ANTE QVAM  
 ad descriptionem aliorũ almicantarath descẽdatur:  
 præambula quædam audire consilium est.

Horizon o  
 bliquus.

Zenith re-  
 gionis quid  
 sit, & de ei<sup>9</sup>  
 inuentione.

Habet vnaquæque regio, oppidum, aut habita-  
 tio punctum in coelo verticale: quaquaversum ab  
 horizonte æquidistans, quod Arabes Zenith vo-  
 cant. Cuius inuentione in fabrica nostri astrolabij  
 fit in hunc modum. Supputa in gradibus limbi a b  
 c, versus d. hoc est à meridie versus orientem, ele-  
 uationẽ poli habitationis propositæ, & fini suppu-  
 tationis adiunge notam. Cui & centro e, admoue  
 regulam, & fac pũctum in sectionem ipsius æqui-  
 noctialis & regulæ, huic puncto æquinoctialis &  
 puncto L. occidentis eiusdem adice regulam, &  
 vbi ipsa secat diametruũ a c, ibi fac signum notabi-  
 le



le, quod dicitur Zenith regionis oppidi aut habitationis. Cuius vtilitatem cum de vſu aſtrolabij tractabimus, abunde accipies. Præterea in maximis & perfectis aſtrolabiis inſcribuntur. 90. almicantarath, tot enim ſunt circuli à quouis horizonte corporis ſphærici in Zenith. Et in his aſtrolabiis vnumquodque almicantarath valet gradum vnum, & hæc appellantur ſolipartia. Porrò in aſtrolabiis maioribus, quæ bipartia nuncupamus, 45. almicantarath inſeruntur. In quibus vnum almicantarath duobus reſpondet gradibus. In nonnullis aſtrolabiis, vocatis mediocria & tripartia, 30. protrahuntur almicantarath, vbi vnum almicantarath 3. gradibus accommodatur. Et tandem in aſtrolabiis minimis quinpartiis. 18. tantum inſeruntur almicantarath. In quibus vni almicantarath 5. gradus ſeruiunt. Animaduerte igitur, quòd ſi aſtrolabiis maximis ſolipartiis 90. almicantarath inſcribere decreueris: ſemicirculus æquinoctialis à pũcto p, ſupra explorato, per meridiem tranſeundo vſque in punctum o ſupra inuentum, in 180. partes vulgata diuiſione partiendus eſt: vtpote primo in ſex partes, ſecundo iterum quælibet pars in ſex, & tertio quælibet in 5. & habes 180 partes.

Si autem (vt communiter cõſueuimus) in aſtrolabiis maioribus bipartiis. 45. almicantarath pingere propoſueris, iam dictum æquinoctialis ſemicir-

Quadruplicia Astro-  
labia.  
Solipartia.  
Bipartia.  
Tripartia.  
Quinpartia.

culum in 90, partes seca, primitus in 3 partes, secundo quamlibet in 6, & tertio iterum quamlibet in 5, & colliges 90. Quod si in astrolabiis mediocribus tripartitis, 30 almicantarath habere volueris, expositum æquinoctialis semicirculum, partes in 60. partire. primo in 3. deinde quamlibet in 4. & rursus quamlibet in 5. & habes 60. partes. Tandem pro astrolabiis minimis, quinpartitis, si eorundem 18. almicantarath formare desideraueris, sæpius nominatum semicirculum diuide in 36. partes. primo in 3. postea quamlibet in 4. & demum quamlibet in 3. & videbis 36. partes. Hæc profecto sunt dignæ notatu, sed nec id silentio prætereundum est, has semiequinoctiales diuisiones iam expositas subtiliter valde imprimendas, vt facile deleri possint, propter alias ipsius partitiones figendas. His præmissis ad confectionem almicantarath hac lege properabis. Et gratia exempli, accipe astrolabium minime quantitatis, quia forsitan minima te forma delectat, Quod quinque partium fore adoptas: huius semiequinoctialem vt supra admonuimus in 36, partes distribue, initiando à puncto p, poli arctici, in æquinoctiali inter occidentem & meridiem reperto, transeundo per meridiem vsque in punctum o, poli arctici, in æquinoctiali inter orientem & septentrionem impressum. Postea pone vnã partem regulæ ad punctum l, occidentis in æquatore, & aliã partẽ applica


Cautela.

Descriptio  
siue confe-  
ctio almicã  
tarath inci-  
pit.

applica ad singulas diuisiones in æquinoctiali fa-  
 ctas, semper notando interseccionem lineæ aut dia-  
 metri a c, cum regula. Inchoando negotium in pri-  
 ma diuisione per punctum p, eundo per meridiem  
 versus orientem, & ultra versus septentrionem cum  
 regula continuò retrocedendo per omnia puncta in  
 æquinoctiali signata, signãdo interseccionem lineæ  
 aut diametri prædictæ a c, vsque in punctum o, ele-  
 uationis polaris, in æquinoctiali inter orientem &  
 septentrionem notatum. His interseccionibus in  
 diametro a c, signatis: quære centrum inter duas di-  
 stantias interseccionum maximarum in diametro a  
 c, post q & r, prout supra de primo almicantarath  
 præcepimus. Quo inuẽto inscribe circulum imper-  
 fectum pro secundo almicantarath, vtrisque tropi-  
 cum capricorni non excedentem. Deinde mino-  
 rato circino inuestigia centrum duarum maiorũ in-  
 terseccionũ sequentiũ in diametro a c, post q, & r.  
 & circina aliũ circulũ imperfectũ pro tertio almi-  
 cantarath: & hoc pacto continua operationem pro  
 aliis almicantarath inscribendis. Figurabis autẽ cir-  
 culos imperfectos: donec aliquis circulorum almicã-  
 tarath sub tropico Capricorni ceciderit, tunc & cõ-  
 sequenter vsque in finem inscriptionis omnium al-  
 micantarath, circulos perfectos conficies. Vltimi ve-  
 rò almicantarath centrũ est Zenith regionis aut op-  
 pidi, ad quod almicantarath instituisti.

DE FABRICA

Demum numeros ipsis ascribe incipiendo inter meridiem & orientem, scribendo in primo spatio 5, in secundo 10, in tertio 15, & sic deinceps vsque in 90. quæ in Zenith capitis sedem habebunt: & hoc intellige si astrolabium fuerit quinque partium, cuius almicatarath per 5, distat gradus: quia in aliis secundum exigentiam diuisionis numeri sunt aptandi. Huius propositionis sequens sumatur figura.



9

TABVLA REGIONVM,  
Prouinciarum, & oppidorum infi-  
gniorum Europæ.

Nomina Prouinciarum & Oppidorum.	Gradus.	Minuta.
<i>Hybernia Insula</i>	59	
<i>Scotia</i>	59	
<i>Oxonium</i>	53	
<i>Compostellum</i>	45	
<i>Lysibonum</i>	51	
<i>Toletum</i>	41	
<i>Corduba</i>	38	
<i>Cæsar Augusta</i>	41	
<i>Rotthomagus</i>	50	
<i>Parisi</i>	48	
<i>Lugdunum</i>	45	
<i>Burdigala</i>	45	
<i>Auini</i>	44	
<i>Tholosa</i>	43	
<i>Vienna Prouintia</i>	44	
<i>Massilia</i>	43	
<i>Prugis</i>	53	
<i>Gandaunum</i>	53	
<i>Traiectum</i>	53	
<i>Colonia Agrippina</i>	52	

Nomina Prouinciarum & Oppidorum.	Gradus.	Minuta.
<i>Machilinia</i>	53	
<i>Mogontia</i>	50	
<i>Herbipolis</i>	50	
<i>Argentina</i>	49	
<i>Basilea</i>	48	
<i>Constantia</i>	47	35
<i>Tubingum</i>	48	40
<i>Augusta Vindelicorum</i>	47	
<i>Dacia</i>	58	
<i>Suetia</i>	63	
<i>Lubecum</i>	56	
<i>Dantiscum</i>	56	
<i>Prunsviga</i>	53	
<i>Madeburgum</i>	54	
<i>Erfordia</i>	51	
<i>Lypsia</i>	51	
<i>Ingoldstadium</i>	48	
<i>Norinberga</i>	49	27
<i>Ratisbona</i>	48	
<i>Vlma</i>	48	24
<i>Praga</i>	50	
<i>Vratislauia</i>	51	
<i>Cracouia</i>	51	
<i>Casconia</i>	50	

Nomina Prouinciarum	Gradus.	Minuta.
& Oppidorum.		
<i>Buda</i>	47	
<i>Segnia</i>	45	
<i>Vienna Pannoniæ</i>	48	
<i>Patauia</i>	48	
<i>Saltzburgum</i>	47	
<i>Iudenburgum</i>	47	
<i>Villacum</i>	46	
<i>Brixina</i>	45	
<i>Venetia</i>	45	
<i>Ferraria</i>	44	
<i>Ancona</i>	44	
<i>Roma</i>	42	
<i>Tarentum</i>	40	
<i>Brundusium</i>	39	
<i>Neapolis</i>	41	
<i>Florentia</i>	43	
<i>Mediolanum</i>	44	
<i>Taurinum</i>	43	
<i>Genua</i>	43	
<i>Sardinia</i>	38	
<i>Sicilia</i>	37	

B ij

## CIRCULOS VERTICALES,

Propositio

5.

quos Arabes azimuth appellant, via  
geometrica lucubrare.

Circuli Azi-  
muth.  
Verticales.

**AZIMUTH** sunt circuli imperfecti aut ar-  
cus circulorum quos latini circulos verticales  
vocant, eo quod omnes per verticem, id est per ze-  
nith capitis transeunt. Et quia hi circuli per zenith  
capitis quod in sphaera omnium punctorum est al-  
tissimum tendunt, plures eosdem circulos altitudinum  
nominant. Dicuntur hi etiam circuli rectitudi-  
num, quia per ipsos scimus in directo cuius partis  
mundi sydus aut stella oriatur atque occidat. Hi  
etiam circuli quamlibet quartam in 90. secant gra-  
dus: puta quartam inter orientem & meridiem in  
90. & similiter quartam inter occidentem & me-  
ridiem in 90. Idem iudicium de quarta ab oriente  
in septentrionem, & ab occidente in septentrionem.  
Quare liquet, si omnes circuli azimuth astrolabio  
inscriberentur, essent numero 180, & horizontem  
si totus astrolabio insertus esset, in 360 gradus di-  
viderent, & eundem secarent ad angulos rectos  
sphaerales, prout facile in sphaera solida manifesta-  
ri potest, non autem in plani sphaerio.

Altitudinum  
Rectitudi-  
num.

180. Azi-  
muth.

Inscriptio  
circulorum  
Azimuth.

Horum autem Azimuth inscriptio fit in hunc  
ferè modum.

Affigatur tabula astrolabij super asserem val-  
de



de longum cum pice, cera, aut clavis, taliter quod litera d, limbi situetur secundum longitudinem asseris sinistrorsum, & b secundum longitudinem eiusdem asseris dextrorsum. Et circa literam c, id est in parte septentrionali astrolabij, adaptetur tabula una eiusdem spissitudinis cum astrolabio competentis quantitatis: ut in ea circulus pro divisione azimuth possit produci.

Quibus dispositis prolonga diametrum a c, a parte septentrionis ultra limbum in tabula annexa. Deinde numeram elevationem poli in limbo a c, versus d, id est, a septentrione in orientem, & in fine numeri fac notam in limbo. Cui & centro e, apta regulam, & ad contactum ipsius cum equinoctiali pingere notam que vocetur s. Præterea puncto n, equinoctialis in oriente & notæ s, iam signatæ, iunge regulam, & tactum regulæ diametrique prolongatæ signabis nota t, que indicat nadair Zenith, id est punctum oppositum puncto verticali. Erit igitur linea inter t, & Zenith capitis diameter circuli inscribendi. In ea igitur quære centrum u, vocatum. Cui immitte unum pedem circini, & aliud in Zenith aut in t: distende, & duc circumferentiam occultam, que necessario transibit per puncta n. & L equinoctialis: & ubi hoc fallit, est error operis merito corrigendus: taliter, ut circinus extendatur aut comprimatur donec præcise puncta præ-

DE FABRICA

dicta  $n$  &  $L$ , & Zenith capitis tangat. Et hæc circumferentia à puncto  $n$ , per Zenith in  $L$ , erit manifesta & bene apparens, & primum representabit azimuth. Sed à puncto  $L$ , per  $t$ , in  $n$ , erit aliquantulum occulta, ut descriptis azimuth facile possit deleri. Postea medietatem huius circumferentiæ à Zenith versus dextram in  $t$ , diuide per medium in puncto  $x$ . Itidem fac de medietate leua in puncto  $y$ , & protrahe diametrum occultam per  $x$ , &  $y$ . quæ (si ritè operatus es) per  $u$ , centrum huius circumferentiæ transibit. Quam prolonga ex vtraque parte ultra tabulã astrolabij, in regulis longis spissitudinem astrolabij habentibus affixis quanto longius poteris. In qua centrum omnium aliorum Azimuth inuenies. Si igitur cupis habere Azimuth ad 360 gradus, diuide semicircumferentiam à Zenith dextrorsum per  $x$ , in  $t$ , transeundo in 90 partes, aut eandem circumferentiam in 45 partes distribue, si azimuth ad duos gradus instituere decreueris, ut in maximis Astrolabiis obseruandum esset: vel in 30. si ad tres gradus Azimuth secernere petieris. vel in 18. si ad 5. ut in maioribus oportunum esset: vel in 15. ad 6. ut in mediocribus: vel in 9. ad 10 gradus, ut in minimis astrolabiis fieri consuevit. Ita tamen ut vnaquæq; quarta, ut supra meminimus, habeat in se numerum 90. graduum completorum.


Et ad

Et ad præsens pro exemplo sufficiet, quòd spatium inter duo Azimuth valeat. 10. gradus. Exemplum  
cõficiendo  
rum Azi-  
muth. Di-  
uide igitur prædictam semicircumferentiam in 9,  
partes æquales, quo factò pone regulam ex vna  
parte super Zenith, & ex alia parte super primam  
diuisionem aut punctum diuisionis immediatè se-  
quentem Zenith, & vbi regula interfecat dia-  
metrum occultam prius factam, scilicet, x, y, u, ibi  
fac punctum A. qui erit centrum secundi Azi-  
muth, quod est longissimæ distantie à prædicto  
circulo. Deinde iterum applica regulam ad Ze-  
nith & super secundam diuisionem à Zenith, &  
iterum vbi regula absecat diametrum occultam, ibi  
fac punctum B, qui erit centrum tertij Azimuth.  
Et sic consequenter procede per omnes diuisiones  
semicirculi, faciendo pñcta in diametro occulta, &  
adiungendo literas, C, D, E, F, G, H. Vt autem  
pñcta diametri occultæ versus sinistram habeas,  
id traducendo facilè absolues, hoc pacto. Mitte pe-  
dem vnum circini in centrum circuli u, & pe-  
dem vagum extende in proximum punctum dia-  
metri occultæ versus dextram. Et circino sic ma-  
nente & pede fixo in u, stante, fac punctum in dia-  
metro versus sinistram. Itidem age de omnibus a-  
liis punctis diametri versus dextram hoc modo, tra-  
ducendo ipsa in partem diametri sinistram.

Cautela.

Præterea siste unum pedem circini in punctum *A*. diametri remotissimum, & alium extende in punctum Zenith capitis, & duc arcum ab una parte horizontis per Zenith, usque in aliam partem ei oppositam (nullum enim Azimuth debet excedere primum Almicantharath, id est horizontem) qui erit secundum Azimuth. Et circino non variato transfer ipsum in punctum ei æquivalentem aut correlativum in latere sinistro, & fac etiam Azimuth ex illo latere. Rursus pone pedem circini in punctum *B* proximum remotissimo, & alium in Zenith capitis: & iterum produc azimuth quod est tertium, & etiam ex latere alio ut prius. Et sic continua donec omnia Azimuth compleveris. Quibus ritè completis, adscribe numeros initium sumendo post punctum *n* æquinoctialis, progrediendo versus meridiem circa primum azimuth scribendo 10. circa secundum 20. circa tertium, 30. continuando usque in 90. quæ circa *A*, aut meridiem sedem tenebunt. Idem fac ab *n* in septentrionem. Item à *b*. in meridiem, & à *b* in septentrionem procedendo. Hætenus de confectiōe & inscriptione circulorum Azimuth.

ID MANIFESTVM EST  
sequenti schemate.



Proposit. 6. **A R C V S H O R A R V M I N A E -**  
 qualiū artificialiter planisphærio inscribere.

Descriptio  
 horarū tem-  
 poraliū siue  
 inæqualium

**P**ER propositionem secundam huius, didicimus  
 confectionem horarum æquinoctialiū, quas vul-  
 go æquales nominamus. Iam nūc ad descriptionem  
 arcuū horariorū temporalibus horis, quas hodie in-  
 æquales nuncupamus, commodorum accedam hoc  
 pacto. Portiones duorum tropicorum, Cancrī &  
 Capricorni sub horizonte in parte Aquilonia ca-  
 dentes, in duodenas partes æquas dispartire, simili-  
 ter semicirculum A Equatoris sub horizonte con-  
 tentum, in totidem partes distribue, punctis (vt as-  
 solet) adiectis. Quo factō accede primitus ad tria  
 puncta horizonti occidentali viciniora: quorū pri-  
 mum est in tropico Capricorni, secundum in æqui-  
 noctiali, tertium in tropico Cancrī: & eorundem  
 officio circini cētrum inuestiga, & describe arcum  
 hæc tria puncta tangentem, incipiēdo à puncto Ca-  
 pricorni, eundo per punctum æquinoctialis, termi-  
 nando in puncto tropici Cancrī, et hic arcus erit fi-  
 nis horæ primæ inæqualis, & principium secundæ.  
 Et circino non variato quære centrum trium pun-  
 ctorum proximorum in alio latere horizontis oriē-  
 talis, & duc arcum qui erit finis horæ II inæqualis,  
 & initium horæ 12. Vnde constat operationem hæc  
 faciliorem & breuiorem reddi ex eo, quòd cogni-

to centro vnius arcus horarij in vna mediate, habe-  
bitur in eadē distantia centrū alterius arcus horarij  
alia mediate. Porro inquire centrum ad alia tria  
puncta immediate post arcum horæ primæ in occi-  
dente sequentia, & produc arcum seruientem exi-  
tui horæ secundæ inæqualis, & exordio tertiæ. Et  
in alia parte puta orientali, circino sic stante, pinge  
arcum pro fine horæ 10. Et ita operationem conti-  
nuabis donec omnes arcus horarios cōpleueris. Tan-  
dem adscribe numerum horarum, scilicet arcui pri-  
mo vt iam admonuimus 1. Secundo dextram ver-  
sus 2. Tertio 3. & parti septentrionali: diametri. a. c.  
circa. c. 6. post arcui sequenti. 7. stabuntque 12, in  
parte horizontis orientali. Gratia autem lucidio-  
ris intelligentiæ animaduertendum. Si artificiose  
& breuiter trium punctorum propositorum, non  
in linea recta positorum, centrum inuenire cupie-  
ris, siste pedem circini in vno horum trium pun-  
ctorum, & alio aliquo extenso duc partem cir-  
cumferentiæ occultè. Deinde pone eundem pe-  
dem circini sub eadem extensione in secundo pun-  
cto, & iterum duc partem circumferentiæ oc-  
cultè intersecantem priorem in duobus punctis, &  
traha lineam rectā occultam per ambas intersec-  
tiones in continuū & directum, versus hanc partem  
vbi existimas fore centrum trium punctorum.


De artificio  
sa inuentione  
centri trium  
punctorum  
proposito-  
rum &c.

Eodem

DE FABRICA

Eodem modo fac duas intersecciones per circinum in tertio puncto nondum tacto, & alio sibi proximo, siue hoc possit fieri sub eadem extensione sicut prius, siue sub alia maiore, siue minore. Quia circinus semper hoc pacto debet extēdi, quòd possit cau-

Ecce schema.




sare duas intersecciones, siue inter duo puncta, siue in distantia ab eis qualitercūque hoc fiat. Habitis igitur talibus interseccionibus per secundum & tertium punctum repertis, duc per easdem lineam rectam subtilem in continuum et directū, quousque secet primam lineam rectam. Et ubi hæ lineæ sese intersecāt, illic est cētrum trium punctorum propositorum.

HVIVS



HUIUS PROPOSITIONIS hanc sequentem cape figurationem.



## ARCUS DVODECIM DOMORUM COELI RATIONABILITER CONSTRUERE.

De fabrica  
duodecim  
coelestium  
domicilio-  
rum.

**H**ACTENVS inscriptionibus circulorum Almicantarath, Azimuth & horarum inæqualium ipsius matris operam dedimus, impræsentiarum autem astrorum indicibus more gerere cupientes, fabricam arcuum duodecim coelestium domiciliorum docuimus. Cum autem in planitie matris penè nil vacui remanserit, ne per confusam arcuum & circulorum positionem deturpetur quod prius decenter est figuratum, quicquid de cætero describetur leniter imprimatur: deinde punctetur subtiliter sicut punctant Sarraceni horas suas in instrumentis horariis. Faciunt autem sic, ut lineæ horarum punctis duntaxat notatæ inter alios arcus appareant absque vlla cõfusione de formi. Vel si manifestos arcus domorum inscribere decreueris alio colore, puta saphirio aut coelestino, eosdè pin-ge ut ab aliis facile & distinctè cognosci possint.

Plurifarios autem fabricandarum coelestium domorum accepimus modos, quos omnes, præter hunc quem rationalem nominare consueuimus, missos facimus: eorundem enim imbecillitatem & fragilitatem ostendere sine longa digressione nequimus. Et ne disputare potius videamur, quàm Astrolabij cõpositionem aut fabricam explanare, quod profecto principaliter intendimus, silentio transimus.

Rectè


Rectè igitur philosophantes, propter Variam cœ-  
 li ad faciem terræ habitudinem, domorum proprie-  
 tates distinxerunt, & easdem ab horizonte trunca-  
 ri tanquàm rem necessariam concluderunt, asseren-  
 tes sex domos totas supra horizontem, & sex sub eo  
 constitui. Modus autem quem Ioannes de Regio Modus ra-  
tionalis Ioã  
nis de mon-  
te Regio  
Germani. monte Germanus rationalē appellat, eo quòd pluri-  
 bus validis & prope inuincēdis mūnimētis & ra-  
 tionibus sit fulcitus, diuidit ī spherico corpore qua-  
 tuor quadrantes æquatoris, meridiano & horizonti  
 obliquo interceptos, in trinas æquales portiones, &  
 per cuncta sectionū ducit quatuor circulos magnos,  
 meridiano & horizontē cōcurrentes in duabus eorū  
 sectionibus, tales igitur sex circuli, coassumptis me-  
 ridiano & horizonte, totum cœlum in 12. spacia  
 partiuntur, quæ domus nuncupantur. Hunc mo-  
 dum in planispherio hoc pacto vtiliter & exactè  
 describemus. Aequinoctialem circulum à puncto  
 oriētis inchoādo in 12. æquales partes distribue, pun-  
 ctis (vt fit) assignatis. Item interfectionē horizon-  
 tis obliqui, & lineæ a c, quam meridianā lineā iustè  
 appellamus, tanquàm cōmune punctū omnium ar-  
 cuū inscribendorū diligēter animaduerte. Post hæc  
 inquire centrū trium punctorū. Quorum primū est  
 in æquinoctiali proximū post n, versus m intēdēdo.  
 Secundū est cōmune punctū, scilicet ipsius horizontis  
 et lineæ meridiei versus partem septētrionalem.

Tertium est proximū post L in æquinoctiali versus K transeundo. Per hæc centro inuento circina arcū ab vna parte tropici Capricorni ad aliam, & huius arcus pars orientalis fini primæ domus, & principio secundæ adaptabitur, pars verò eiusdem arcus occidentis termino septimæ, et initio octauæ domus seruiet. Et circino inuariato inuestiga centrum aliorum trium punctorum. Quorum vnum est in æquinoctiali ab n versus k gradiendo, secundū commune, & tertium immediatè sub L versus m in æquatore: & iterum duc arcum, vt iam suprà monuimus, haud aliter de reliquis punctis agendum est.

Postremò, arcubus domorum descriptis, numeros adiace, hoc modo. Arcui horisontis orientali, qui initio primæ domus dedicatus est, ascribe 1. Arcui secundo sub horisonte orientali 2. Tertio 3. & in parte septentrionis in linea a c, circa Capricornum 4. & iterum in sequenti arcu 5. & sic deinceps vsque in 12.

**HVIVS**

HVIC PROPOSITIONI  
ni hæc accommodabitur  
figuratio.



C

LINEAM CREPUSCVLI-  
nam Astrolabio inscribere.

**T**AMETSI superuacaneū fere censeo crepusculum vespertinum & matutinum per inscriptionem propriæ lineæ designare, cum per 18. Almicantarath cuiusuis Astrolabij id facile doceri possit: eiusdē tamen lineæ positio pro matris complemento duplici via breuiter absoluitur.

Quarum prima procreat lineam arcualem sub horizonte obliquo: eidē per 18. gradus æquidistantem, hoc modo. Elevationi polari 18. gradus addit, & id quod facta additione prouenit (vt in nostra compositione 66. gradus, & 40. minuta) supputat in limbo à puncto, d. orientis versus, c. punctum septentrionis, & fini adijcit notam, cui & centro, e, iungit regulam, & facit punctum in æquinoctiali vocatum 3. applicatāque regula ad punctum, l, æquinoctialis, & ad punctum 3. lineam, a, c, ad regulæ contactum signat puncto, 7. Rursus à puncto, a, meridiei versus, b, in limbo consimiliter, idem scilicet 66. gradus, & 40. minuta numerat: & eius termino ac cetro, e, iuncta regula notat æquinoctialem ad tactum eius puncto con. & iterum adijcit, regulam puncto, l, & puncto con. et signat diametrū prolongatam versus meridiem puncto. t. & inter puncta. 7. experitur centrum in linea, a, c, & tra-


hit

hit lineam arcualem ab vna parte Capricorni in aliam, quam crepusculinam nominat.

Secunda via inscriptionem eiusdem lineæ per rete aut voluellum ( de quo & eius fabrica in sequentibus dicemus) indicat taliter, caput Cancrī Secundus modus inscribendi lineam crepusculinā. decimo octauo almīcantarath occidentali applicat, & locum capitis Capricorni signi oppositi in parte orientali nota afficit subtili. Item principium Arietis eiusdem decimo octauo almīcantarath iungit: & initium Libræ in oriente notat. Itidem facit de capite Piscium, notando signum Virginis in oriente constitutum. Harum trium notarum centrum adiumento circini inuestigat, & ducit semicrepusculinam lineam orientalem à circulo Capricorni vsque in lineam, a, c. Haud secus ac iam exposuimus agit hæc via ad 18. almīcantarath orientale: pingendo notas ad signorum oppositorum initia in parte occidentali, & reperto centro earūdem notarum producit semicrepusculinam occidentalem.

Et tandem iunctis duabus semilineis tota crepusculina emerget, cui si libuerit titulum talem, Linea crepusculina, adijcere potes.

PRIMA VIA SEQVENS  
proponit schema.





ASTROLABII FABRICAM Proposit. 9.

*quandam generalem patefacere.*

**S**EX Propositionibus antecedentibus exposuimus, quo pacto matris descriptio communium Astrolabiorum (quæ intra concavitatem limbi nullas recipiunt tabulas aut tympana: dicta astrolabia vnius tantum elevationis polaris) absolui debeat: restat nunc vt generalem quandam afferamus doctrinam vtilem admodum astrolabiis cōtinentibus intra matrem plures tabulas: diuersis Climatibus, Regionibus aut polaribus elevationibus aptandas.

In primis ex aurichalco aut cupro aut alia materia durabili præparētur tabulæ valde planæ, politæ, & eiusdem spissitudinis secundum quantitatem concavitatis ipsius matris, taliter in centrum cuiusvis tabulæ siste pedem circini fixum, & cum alio distento partes exteriorē tabulæ abscinde: præter portiunculam modicam, quam veteres denticulum dixerunt. Ita tamen, quod resectis aut abscissis partibus exterioribus aut circumferentialibus, tabula ex amussim intret matrem, & ab ea capiatur: & portiuncula aut denticulus ritè subintret foramen in limbo infra literam a, fabrefactū. Et commodum est, matris concavitatem in parte inferiore in modico latiore esse quàm in superiori, vt tabulæ quæ sunt vnius quantitatis ibidem facile inclu-

dantur & extrahantur præterquam in superiori parte concavitatis limbi, ubi tabula ita debet iungi limbo, quod intrado & exũdo vndique illi adhæreat: neque vagetur huc vel illuc.

Generalis  
doctrina ad  
omnes re-  
giones astro-  
labia fabri-  
care.

Dispositis & aptatis tabulis, in singulis earundem superficiebus duc diametros duas sese ad angulos rectos secantes: & diametris limbi in vnguem respondentes. Et hoc fit facile imponendo omnes tabulas in concavitatem matris, positâque regula ad puncta limbi, a, c, ducatur linea recta in superficie tabulæ supremæ per centrum eiusdem. Et iterum iungatur regula literis limbi, b, d, trahatur alia linea recta, hæ erunt diametri huius superficiei stantes ad angulos rectos, respondentes diametris limbi. Itidem fac de reliquis tabularum superficiebus. Quam enim superficiem diametris distinguere cupieris, hanc fac supremam.

Deinceps per propositionem tertiam vni superficiei tabulæ quæ suprema constituitur, inscribe tres circulos, scilicet Capricorni, Aequinoctialis et Cancrini, quos (quia in omni regione aut climate sunt similes aut æqualis quantitatis) officio circini traduc ad omnes superficies aliarum tabularum, assignatis literis, f, g, h, i, &c. secundum doctrinam præfatæ propositionis tertie. Item centro cuiusvis tabulæ, e, litera apponatur.

Præterea

Præterea cuilibet superficiæ vniuscuiusque tabulæ elige vnam elevationem polarem: quam etiã in loco competenti insculpes, puta ad principium, medium aut finem climatis electi, secundum quam compones *Almicantarath*, *Azimuth*, lineas horarias inæquales: Duodecim domus cæli, et lineam crepusculinã, per omnia vt in propositionibus quarta, quinta, sexta, septima & octaua docuimus. Et ne quid fabricæ nostræ desit, cõsulto adiecimus hîc in dorso huius folij tabulam climatum.


**P**TOLEMÆVS libro cõpositionis maioris *Quadripartiti & Geographiæ*: *Iulius Firmicus Siculus*, *Albumasar*, *Alphraganus*, *Hali aben rangel*, *Hermannus Contractus*, & communis prope modum turba philosophorum, septem tantum enumerant climata: Quorũ distinctio quantum ad gradus polares, hæc est quæ sequitur.

C iiij

DE FABRICA  
 TABVLA SEPTEM CLIMA-  
 tum secundum Ioannem de Sacro bosco.  
 Elevationo Poli.

		<i>Gradus Minuta</i>	
<i>Primi Climatis per Meroem</i>	<i>Principium.</i>	12	45
	<i>Medium.</i>	16	40
	<i>Finis.</i>	20	30
<i>Secundi Climatis per Sienem.</i>	<i>Principium.</i>	20	30
	<i>Medium.</i>	24	15
	<i>Finis.</i>	27	30
<i>Tertij Climatis per Alexandriam.</i>	<i>Principium.</i>	27	30
	<i>Medium.</i>	30	45
	<i>Finis.</i>	33	40
<i>Quarti Climatis per Rhodum.</i>	<i>Principium.</i>	33	40
	<i>Medium.</i>	36	24
	<i>Finis.</i>	39	0
<i>Quinti Climatis per Romam.</i>	<i>Principium.</i>	39	0
	<i>Medium.</i>	41	20
	<i>Finis.</i>	43	30
<i>Sexti Climatis per Boristhenem.</i>	<i>Principium.</i>	43	30
	<i>Medium.</i>	45	24
	<i>Finis.</i>	47	15
<i>Septimi Climatis per Ripheos mōtes.</i>	<i>Principium.</i>	47	15
	<i>Medium.</i>	48	40
	<i>Finis.</i>	50	30
<i>Octavi Climatis vl- tra Meotides palu- des,</i>	<i>Principium.</i>	50	30
	<i>Medium.</i>	54	0
	<i>Finis.</i>	56	0

MARTIANVS DE BONIS  
 artibus, libro septimo versus finem, adiungit  
 octauum Clima, quod secundum ipsum  
 ultra Paludes Meotides & Ripheos  
 montes protenditur, cuius  
 determinatio ferè  
 hæc est.



Propositi. 10. **D**VODECIM VENTOS VTI-  
liter dignoscere, & eisdem Astro-  
labio inscribere.

Arist. de vē-  
tis. 2. Mete.  
ca. 8.

**N**EMINEM latere arbitramur, vētos in di-  
uersis mūdi plagis & tractibus surgere, & ob  
eorum discordiā ipsum laniare, variasq; gerere cōdi-  
ditiones, præcipuè mutare aërem quantū ad imbres,  
nebulas, tempestates, humiditates, siccitates, calidita-  
tes, frigiditates & alias ipsius impressiones. Quare  
non ab re eorundem numerū, nomina, & à qua coeli  
plaga spirent nostræ constructioni adiungere decre-  
uimus. Nolumus tamē impresentiarū quorundā di-  
uersas opiniones recitare, discrepantium non solū in  
nominibus, verumetiam positione & numero. For-  
san harum rerum causa fuit tanta discordia fratrū.  
Sed nos amore natalis soli allecti nomina, locatio-  
nes, & ventorum duodenarium numerum pro as-  
sertione Alberti Magni præsulis Imbripolēsis, splē-  
doris Sueuorum vnā affirmabimus.

Albert<sup>9</sup> Ma-  
gn<sup>9</sup> splēdor  
Sueuorū. ;.  
Mete. trac. 1.

Contuendum igitur orbis terræ quatuor esse pla-  
gas, cardines, angulos, aut regiones. Quod non tantū  
à Philosophis & Poëtis, verumetiam ex diuinis di-  
dicimus eloquiis. Inquit enim Lucanus primo  
Pharsal.

Heu quantum terræ potuit pelagique parari  
Hoc quem ciuiles hauserunt sanguine dextræ.

Vnde

Vnde venit Titan, & nox quæ sydera condit,

Quâq; dies medius flagrantibus æstuat horis.

Et qua bruma rigens, ac nescia vere remitti.

Astringit Scythicum glaciali frigore pontum.

Et Davidico Psalmo 106, legimus: De Regionibus congregavit eos. A solis ortu & occasu, ab aquilone & mari. Et saluatoris voce dicitur: Emittet angelos suos cum tuba & voce magna, & congregabunt electos eius à quatuor \* angulis terræ. Sunt igitur, vt ad propositum nostrum redeam, quatuor ventorum plage aut cardines, scilicet orientalis, meridianus, occidentus, & septentrionalis. Orientalis enim plaga ab exortu solis dicitur. Soli autem propter signiferi obliquitatem triplex assignatur ortus. Aequinoctius, cum sol Arietem aut Libram ingreditur. Aestiuus cum Cancris sydus aut eius circulum, quem æstiuum tropicum dicimus, adit. Et hybernus aut brumalis, quando cum Capricorno cõgreditur, & eius circulum quem tropicum Capricorni appellamus, accedit. Ventus itaque ab æquinoctiali spirans ortu, & à cardine potiore Romana lingua Subsolanus nominatur, ab æstiuo ortu, Vulturnus, ab Hyberno, Eurus.

Psal. 106.

Matth. 24.

Marci. 13.

\*. aliàs, ventis cœli.

Quatuor ventorum cardines.

Triplex ortus Solis.

Aequinoctius

Aestiuus.

Hybernus.

Subsolanus.

Vulturnus.

Eurus

Occasus Solis triplex.

Fauonius.

Zephyrus.

Aphricus.

Haud dissimiliter triplex est occasus solis Aequinoctialis principalis, æstiuus & hybernus. Ab occiduo æquinoctiali euentat cardinalis ventus Fauonius aut Zephyrus. Ab hyberno Aphricus aut

**Libs, Corus.** *Libs, Ab æstivo, Corus.* Præterea septentrionali plagæ tres etiam assignantur partes, una principalis & potissimè cardinalis, à polo mundi stabili determinata. Duas alias vendicat sibi partes, à polo Zodiaci septentrionali mobili, describente circum- lum paruum, polo mundi secundum maximam Zo- diaci declinationem ab æquinoctiali equidistante, quem vsitato nomine arcticum circulum appella-



mus. Harum partium, imaginare hominis figuram in polo arctico faciem in meridiem dirigentis, & facile capies quæ pars dicatur dextra & quæ sinistra. Idem de polo antarctico. dextra occidentem: sinistra orientem respicit. A polo itaque mundi arcti-

Boreas.  
Aquilo.  
Circius.

co, Septentrio efflat: à circulo arctico levorsum Boreas aut Aquilo: ab eodem dextrorsum Circius. Nō aliter plagam meridianam tripartimur. Et à polo mundi antarctico & maximè cardinali eiusdem plagæ



plagæ *Austrum* aut *Notum* euentare perhibemus: à parte dextra circuli antarctici *Euroaustum* aut *Euronotum*: à sinistra *Austrophricum* aut *Libonotum*.

*Auster.*  
*Notus.*  
*Euroauster.*  
*Euronotus.*  
*Austro-*  
*phricus.*  
*Libonotus.*

His cognitis duodecim venti planisphærio hac lege inseruntur. Pedem circini vnum mitte in centrum e, & alium extende vltra supremum circumulum limbi ad certam distantiam pro libito duc circumulum qui per diametros limbi in quatuor partes secatur, quatuor mundi cardines principales ostendentes, scilicet Orientem & occidentem æquinoctialis, & vtrosque mundi polos. Lineæ igitur d, b, horizonti recto dicatæ circa d, id est, orientem, & spatio inter duos supremos circulos incluso inscribe *Subsolanum*: circa b, id est, occidentem, *Fauonium* aut *Zephyrum*. Item lineæ a c, representanti circumulum transeuntem per vtrosque polos mundi circa a, id est, meridiem, iunge *Austrum* aut *Notum*: circa c, *Septentrionem*. Et sic imposuisti quatuor ventos maximè cardinales. Collaterales autem his taliter aptabis: à litera d, orientis, numera in limbo maximam solis declinationem ( quæ ferè est 24. graduum ) versus a, id est, meridiem, & in termino numeri fac notam. Cui adscribe *Eurum* flantem ab ortu solis hyberno. Item à litera d, versus c, id est, septentrionem, eandem numera declinationem, & eius fini adde *Vulturum*, qui ab ortu æstiuo efflat.


De ventorum inscriptione primo Cardinalium.

Secundo collateralium.

Rursum à litera b, occidentis, versus a, id est, meridiem consimiliter supputa dictam declinationem, & ubi finitur facto signo scribe Aphricum aut Libs euentantem ab occiduo brumali: & iterum facta computatione à b, versus c, id est, septentrionem, scribe Corum efflantem ab occiduo æstiuo: & huiusmodi numeratione facta ab, a, versus, d, scribatur Euroauster aut Euronotus: & ab, a, versus b, Austroaphricus aut Libonotus. Item, a, c, versus, b, inscribatur Circius: & tandem à, c, versus, d, Boreas vel Aquilo.

*Harum*

HARVM RERVM HANC  
fume imaginem sequentem.



DE FABRICA  
RETE ARANEAM  
astrolabij artificiose  
componere.

**D**E circulis matris & tabularum astrolabij quid sibi velint, aut quo pacto describantur, hæcenus dictum. His igitur incubans Rete, Aranea, siue Voluellum, quod Arabes alhancabuth nominant, crebra excisione perforatum, signiferum, & quasdam hæretes cœlo stellas continet fulgentiores, hoc modo erit metiendum ac construendum.

De cõstru-  
tione Al-  
hancabuth.

Disponatur tabula valde plana, talis quòd infra limbum poterit contineri: volubilis tamen in cõcavitate aut conceptaculo corporis astrolabij. Et in centro e, (secundum doctrinam propositionis tertie) describe tres circulos cõcentricos matri, æqualis proportionis siue magnitudinis, vt in matre, scilicet tropicum Capricorni, Aequinoctialem, & tropicum Cancrì. quos quadrabis per duas lineas orthogonales, additis literis, f. g. h. i. k. l. m. n. vt in matre.

Deinde in linea f. h. quære centrum correspondens puncto f. tropici Capricorni, & intersectioni tropici Cancrì cum linea f. h. ultra centrum e. versus h transeundo, super quo describe circulum contingentem tropicum Capricorni in puncto f, & ex alia parte versus h, tropicum Cancrì. Quem per puncta n, orientis, & l, occidentis æquinoctialis, id est,

per duas interfectiones æquinoctialis & lineæ i, g, transire necesse est. Si enim per has interfectiones non transuerit, errasti: reiterna igitur opus, donec verificetur. Et hic circulus representabit nobis viam solis, aut lineam eclipticam, quæ in orbe signorum, id est, in signifero aut zodiaco, medium semper obtinet locum. Et est hic circulus in vnguem & examussum inscribendus: quia in eo (vt inquit Hermannus Contractus) tota huius artis consistit efficacia. Qui etiam per lineam i, g, in bina hemisphæria, sed inæqualiter partitur: & in n, principium arietis, in l, verò libræ constituitur. Deinceps circino modicum constricto super centro zodiaci describe secundum circulum pro gradibus singularibus zodiaci. Et iterum circino restricto, duc tertium pro numero graduum. & tandem quartum pro nominibus duodecim signorum inscribendis: & hæc de circulis zodiaci.

Cautela.

Linea ecliptica seu via solis.

Diuisio autem ipsius non est æqualis. Modi diuidendi sunt ferè quinque, quorum duo supponunt tabulas: alij tres, nullas. Modorum supponentium tabulas vnus procedit adiumento tabulæ ascensionum re-  
 Etarum, alius auxilio tabulæ declinationis solis. Cũ primo, quia certior & facilior est, hoc modo operare: Principio omnium circulo æquinoctialis retis aut Araneæ subcircinabis duos circulos, vnum pro gradibus, & alium pro numero graduum. Post hæc

Quinq; modi diuidendi rete.

Primus certior &amp; facilior modus.

æquatorem in instrumentis magnis, in trecentos sexaginta gradus: in paruis, in centrum octoginta distribue, inchoando circa, *n*, id est, orientem vel initium arietis, transeundo versus, *m*. Quo ritè distributo, intercapedini secundi & tertij circuli inscribe numeros de quinque in quinque, vel de, *x*, in decem. Ita in primo spatio post, *n*, versus, *m*, gradiendo, scribe quinque: in secundo, decem: in tertio, *xv*. & sic deinceps vsque in *ccclx*. Aut si instrumentum propter paruitatem omnes gradus capere nequiverit, scribe in primo spatio decem, in secundo viginti, in tertio triginta, continuando vsque in *ccclx*.

De diuisione  
zodiaci.

Diuiso æquatore, vt iam præcepimus, zodiacus per eundem primùm in duodecim signa partendus est, hoc pacto: Ingredere tabellam hic annexam cum integro signo arietis, hoc est, cum triginta gradibus eiusdem, & in directo offendes vigintiseptem gradus, *liij*. minuta, ascensionem totius arietis rectam. Hanc supputa in æquinoctiali ab, *n*, à principio arietis & etiam æquinoctialis, versus, *m*, & fini & centro, *e*, iungito regulam rectam, quæ abscindet zodiacum in duobus locis oppositis. Quorum vnus sequens immediatè, *n*, erit finis arietis & initium Tauri: & alius signi libræ è regione constituti, finis, & principium scorpj. Loca autem abscissionis zodiaci, vtrinque lineis manifestis per quatuor ipsius circulos tractis notato.

Tabula

TABVLA ASCENSIONVM

rectarum.

Numerus Numerus Numerus  
 Grad. Gr. M. Grad. Gr. M. Grad. Gr. M.

♈			♉			♊		
5	10	15	5	10	15	5	10	15
4	9	13	127	132	137	243	248	253
35	11	48	22	27	29	3	21	43
18	27	27	25	25	25	7	7	7
23	9	9	147	147	147	33	33	33
27	54	54	6	6	6	0	0	0
♋			♌			♍		
5	10	15	5	10	15	5	10	15
32	37	42	156	161	166	175	280	286
42	35	35	51	33	12	27	53	17
47	33	33	49	49	49	39	39	39
52	38	38	25	25	25	57	57	57
57	48	48	0	0	0	12	12	12
♎			♏			♐		
5	10	15	5	10	15	5	10	15
63	68	73	184	189	193	307	312	317
3	21	43	35	11	48	22	27	29
79	7	7	27	27	27	25	25	25
84	33	33	9	9	9	18	18	18
90	0	0	55	55	55	6	6	6
♑			♒			♓		
5	10	15	5	10	15	5	10	15
95	100	106	212	217	222	336	341	346
27	53	17	42	35	31	51	33	12
111	39	39	33	33	33	49	49	49
116	57	57	38	38	38	28	28	28
122	12	12	48	48	48			

D ij

Consimiliter ex eadem tabella sume ascensionem rectam ad 30 gradus: Tauri scilicet 57, gradus, 48, minuta: quã, vt iam iam docuimus, ab n, versus m, numerator & termino & centro e, applicata regula, abscisiones zodiaci duabus lineis patentibus ornato. Quarum prima post n, versus m, fini Tauri, & initio Geminorum, opposita verò termino Scorpij, & principio sagittarij alligabitur.

Haud secus ac iam præcepimus, adiumento tabulæ alia signa zodiaci inscribes. Posteaquam autem in tabella ad signũ Libræ peruentum fuerit, signiferum in 12, signa distribuisti, quare quiescendum erit. Si forsan omnimoda te delectaret præcisio: poteris institutam operationem cum Libræ & sequentibus signis, continuare.

De inscribē  
dis nomini  
nibus. 12. si-  
gnorum.

Zodiaco igitur in 12, signa aut spatia, non tamen equalia distributo, signorum nomina inscribes: initiando à puncto n, eundo versus m, hoc est, transeundo à dextra versus læuam, contra motum mundi, id est primi & supremi mobilis. In primo igitur spatio duodenario post n, & in interstitio tertij et quarti circuli zodiaci, scribe Aries, in secundo Taurus, in tertio Gemini, in quarto Cancer, & sic deinceps, vsque in Pisces.

Præterea quodlibet signum zodiaci in sex partes diuidendum est, quod profecto officio nostræ tabellæ, dicto citius exequeris.




GRATIA exempli, 5 gradibus Arietis in circulo recto respondent 4 gradus, & 35 minuta: hos gradus & minuta numerabis, vt antea in equatore ab n, versus m, & fini numerationis ac centro e, iungas regulam: & resectiones zodiaci, quas regula vtrunque causat, signabis lineis ductis à primo circulo signiferi, quem supra viam Solis aut lineam eclipticam nominauimus, vsque in tertiam lineam. Prima igitur linea post n, quintum gradum Arietis terminat, & alia in obiectu quintum Libræ.

Consequenter ex eadem tabella accipe ascensionem rectam 10 gradibus Arietis respondentem, scilicet 9 gradus, & 11 minuta: & operare cum his, vt iam diximus: & hac lege continua tuam operationem vsque in principium Libræ, & videbis quodlibet signum in 6 partes, etsi inæquales diuisum, Quibus in spatio secundi & tertij circuli numeros quinaros adiace. In primo circa n 5, in secundo 10, in tertio 15, & sic cõtinuando vsque in 30, & complementum Arietis. Itidem fac in Tauro & aliis signis, & hoc in astrolabiis magnis, secus in paruis quemadmodum supra annotauimus. Postremò quamlibet 6 partium lineæ eclipticæ cum circino in 5, æquales partes seca: & his & centro e, aptata regula, duc lineas à primo circulo vsque in secundum, & prodibit zodiacus tuus diuisus in 360 gradus in magnis, aut in 180, in paruis Astro-

DE FABRICA

labiis. Huiusmodi tabulae hoc sumito schema, in quo aequator & Zodiacus propter instrumenti angustiam, in 180. partes sunt divisi, ubi unū spaciolum duos valet gradus.

HARVM RERVM HANC  
sume imaginem sequentem.



## CERTIOR MODVS EX

non innitentibus Tabulis.

**M**ODI non innitētes Tabulis in signiferi partitione sunt plures. Ex quibus vnum certiorē & vtiliorem delegimus, bimembrem tamen, quia iam per lineas rectas, iam per circulares aut arcuales, negotium partitionis absoluit. Diuisio igitur zodiaci per lineas rectas, fit in hunc modum: Dispositis Aequatore, zodiaco & aliis circulis, vt prædiximus, primum polum zodiaci septentrionalis, tanquam fundamentum huius operationis inuestigabimus, hoc pacto: à pūcto n, Aequatoris & principij Arietis, versus k. supputetur maxima solis declinatio, & fini adiiciatur nota o, deinde iungatur o, cum l, pūcto Aequatoris, & initio Libræ per lineam rectā, & scindet diametrū zodiaci in pūcto p: erit igitur p, polus vnus zodiaci in plano. Polo igitur zodiaci p, reperto, addatur vna pars regulæ iustæ, & alia ad singulas Aequatoris diuisiones, incipiendo ab n, & transeundo versus m, & vbi regula interfecat lineam eclipticam, fiant notæ subtiles & occultæ: & per hunc modum ecliptica diuiditur in omnes gradus facillimè: & potest primo diuidi (vt assolet) in 12 signa, & postea quodlibet signum in 6, partes: & tandē quælibet pars in 5. Post hæc iungatur regula centro e, & notis occultis:

Primus modus nō innitens tabulis.

De diuisione Zodiaci.


Inuētio poli Zodiaci.

Diuisio 12 signorum.

DE FABRICA

eclipticæ, & ducantur lineæ manifestè pro integris signis, partibus signorum & gradibus singularibus, quemadmodum supra in primo modo monuimus, & patebit zodiacus diuisus secundum omnẽ præcisionem, quod fuit optatum.

HARVM RERVM HANC  
sume imaginem.



## DE DIVISIONE

secunda.

**N**E aliquid in Zodiaci nostri diuisione omittamus, addam secundum modum non innitentē tabulis, vtilem valde, pro Stellarum fixarum impositione ad Araneam diuidentem ipsum signiferum per circulos magnos, aut lineas arcuales.

Secundus  
modus non  
innitens ta-  
bulis.

Didicimus supra inuentionem vnius poli Zodiaci, quem in corpore retis contineri ambigit nemo: Secundi autem, scilicet meridonalis poli huic oppositi, extra tabulam ipsius retis sedem habentis, talis est inuentio. Diametrum retis  $f h$  circa  $h$  prolongam directum in assere plano, cui tabula retis adherere & complanari debet: deinde maximam solis declinationem computa ab  $l$ . puncto  $A$  Equinoctialis & principij Libræ versus  $m$ , & fini punctū  $q$  ascribito: punctis  $l$  &  $q$  applica regulam. & vbi diametrum prolongatam secuerit, fac punctum  $r$ . erit igitur,  $r$ , polus Zodiaci secundus oppositus primo. Lineam  $p r$  inter vtrosque polos interceptam, diuide per medium in puncto aut centro  $s$ . Circino ergo extēso à centro,  $s$ , in  $p$ , vel  $r$ , produc circulum occultum, transeuntem per hos polos & per puncta  $A$  Equinoctialis,  $l$  &  $n$ , si saltem rite operatus fueris. Ex centro  $s$  procrea alium diametrum orthogonalem diametro  $p r$ , quæ voçetur  $t u$ , quam diligen-

Inuentio po-  
li zodiaci  
meridiani.  
\* In his di-  
uisionibus  
loquitur de  
circulo arcu-  
būque de-  
scribendis  
occultis, &  
tamē eisdē  
figuratio ha-  
bet manife-  
stos, calcho-  
graphicè oc-  
cultos haud  
admittente.


De diuisione  
ne zodaici.

ter protrahe, & in longum continua vtrunque in  
 asse plano: in hac enim centra omnium circularum  
 inscribendorum constituentur. His dispositis, Zo-  
 diacum primo (vt fit) in 12. signa distribuemus, hac  
 lege: semicirculum occultum a, p, versus r, dextror-  
 sum eundo in tres equales partes diuide, diuisioni-  
 bus adscribe puncta, x, y. Deinde, apta vnam par-  
 tem regulae polo, p, & aliam puncto proximo, x, &  
 considera, vbi regula scindat diametrum, t, u, prolo-  
 gatam, & ibi fac punctum, z, & regula durante in  
 polo, p, promoue ipsam in punctum, y, & punctum  
 sectionis diametri signato puncto, & hac duo pun-  
 cta traduc in aliam partem huius diametri sinistra  
 versus: posito igitur vno pede circini in puncto, z,  
 & alio extenso in polum, p, duc arcum magnum et  
 occultum per totum rete: aut lineam eclipticam dua-  
 bus duntaxat affice notis in partibus oppositis. Cir-  
 cino inuariato, siste vnum pedem in punctum cor-  
 relatiuum ipsius, z, & iterum duc arcum occultum  
 per polum, p, & totam retis superficiem, aut eclipti-  
 cam, duobus punctis e regione positus signabis.  
 Non aliter operare cum puncto, &. & suo correla-  
 tiuo. Per hos ergo quatuor arcus, coassumptis dua-  
 bus diametris retis, videbis zodiacum partitum in  
 12. signa. Præterea quodlibet signum in sex par-  
 tes diuidatur, taliter: Quamlibet portionem semi-  
 circuli occulti in 6, equas partes distribue: & ad-  
 iecta


De diuisione  
ne signorum.

iecta regula polo, p, & diuisionibus iã factis, signa-  
 bis puncta, vt prædiximus, in diametro prolongata,  
 quæ etiam transfer in partem oppositam huius dia-  
 metri: & singulis punctis immitte vnum pedem  
 circini, & alium disiunge in polum, p, & pinge ar-  
 cus aut puncta, vt iam exposuimus: & binos arcus  
 semper vna circini extensione perficies. Potes e-  
 tiam tali ingenio, quanquam laboriosum est, quam-  
 libet partem in 5 gradus singulares diuidere, quod  
 tamen non consulo: cum per simplicem partitio-  
 nem etiam æqualem, nullus error sensibilis ac-  
 cidat.

**INSPICE FIGVRAM**  
**sequentem.**



*Putger Correlativus*





DE FABRICA ASTROLABII. 31  
STELLAS FIXAS RETI Proposit. 12.  
via Geometrica imponere.

**C**UM rerum coelestium peritum oporteat non solum interdum horas inspiciere ad solem prospicere, sed etiam ad stellas noctu: operæpretium existimamus, doctrinam aliquam inveniendam, qua facile & sine errore id obtineamus: in reti stellas quas velimus describendo: non certè plurimas, sed fulgentiores & clariores fixas, aut cœlo hærentes, ne earundem pluralitas subiectos circulos matris aut tabulatũ astrolabij occultet. Doctrina autem descriptionis, impositionis, locationisve stellarum bimembris traditur. Prima tutissima et facillima, quæ imponit stellas per notitiam declinationis ipsarum ab orbe recto, id est ab æquatore, & secundum hanc quatuor præcognoscere oportet: longitudinem, & declinationem stellæ: partem declinationis, & eius magnitudinem. Longitudinẽ stellæ (secundũ hanc doctrinã) determinat gradus orbis signorum, id est Zodiaci, cum quo stella venit ad medium cœli, hoc est ad circulum meridianum: quã vsitatò vocamus cœli mediationem. Arcus autem de circulo meridiano interceptus inter æquatorem & centrũ stellæ erit eius declinatio. Quia stellæ declinatio nihil aliud est, quàm distantia ipsius ab æquinoctiali, partẽ autem declinationis hinc intelligimus si fuerit ex parte se-

Gemina doctrina impositionis stellarum.

Longitudo stellæ.

Declinatio stellæ.  
Pars declinationis.

Magnitudo  
stellæ.

Declaratio  
tabulæ se-  
quentis.

ptentrionis aut meridiei ab æquatore. Si enim stella ab æquatore in septentrionem vergit, eius declinatio septentrionalis aut aquilonia appellatur: si in meridiem, meridiana aut Austrina vocatur. Magnitudinem stellæ à radijs et splendore doctissimi astrologi con- cluserunt. Sex enim stellarum ordines aut differentias posuerunt: quarum quedam clarissimæ, maximi splendoris & luminis ad primam retulerunt magnitudinem: modici et mediocris splendoris, ad secundam: & iterum minoris ad tertiam (et sic deinceps) posuerunt magnitudinem. Secundum hanc doctrinam subadnexam ordinavimus tabulam: in qua primo stellarum nomina Latina & Arabica apparent: Secundo signa zodiaci, gradus & minuta, cum quibus stellæ cælum mediant (largiori vocabulo longitudes stellarum dictæ) nominibus alligantur: Tertio earundem declinationes ad- sunt, quæ uniuersaliter ab æquatore supputantur: Quarto partes declinationis sequuntur. S. partem septentrionalem. M. meridianam designant. Tandem stellarum magnitudines adiunguntur. Inscriptimus etiam tabulæ nostræ propemodum ubique stellas splendensciores, quas Hermannus clarissimas nominavit.

Huius doctrinæ impositio est huiusmodi: Ex tabula subscripta optate stellæ disce longitudinem, declinationem, & eius partem atque magnitudinem. Longitudinem stellæ in gradibus & minutis computa ab initio signi Zodiaci, in quo est stella: secun-  
dum

De imposi-  
tione stel-  
larum.

dum hanc longitudinem, & super eius finem pone  
 regulam ex vna parte, & ex alia super centrum, e,  
 & duc lineam occultam per totam faciem retis vs-  
 que ad centrum, e. Postea si stellæ declinatio fuerit  
 septentrionalis, tunc supputa ipsam in æquinoctialia  
 k, versus, n, & vbi terminatur, fige notam, cui &  
 puncto, l, occidentis æquinoctialis applica regulam:  
 & vbi abscindit diametrum, f, h, fac signaturam, et  
 locato pede fixo in centrum, e, & alio extenso in  
 iam dictam signaturam diametri circūgira pedem  
 circini volubilem in lineam occultam prius du-  
 ctam: & vbi eandem tangit, ibi est cacumen aut  
 centrum stellæ optatæ, cui ascribe nomen Latinum  
 aut Arabicum, et eius magnitudinem. Si autē stel-  
 la declinationem tenuerit meridianam, tunc nu-  
 mera ipsam in A Equatore à, k, versus, l, et fini ad-  
 da notam in A Equatore, et iterum regulam adijce  
 puncto, l, et notæ A Equatoris: et vbi regula tangit  
 diametrum, f, h, pinge punctum, et emitte pedem vnum  
 circini, alio in centro, e, stante, in hoc punctum, et  
 circino non variato, verte pedem mobilem in lineam  
 occultam, et imprime notam, quæ proposita stellæ  
 centrum aut cacumen manifestat: quam nomine et  
 magnitudine exornabis. Consimiliter age cum alijs  
 stellis tabulæ, imponendo cuilibet signo duas aut  
 plures stellas.

TABVLA STELLARVM FIXARVM, CON-  
tinens earum longitudinem, secundum coeli mediationem,  
declinationes, partes & magnitudines earundem.

DE FABRICA						
						Magnitudo.
						Pars declinatiōis.
						Declinatio.
						Cœli mediatio.
						Signa Zodiaci.
Nomina Latina stellarū fixarū.	No. Arabica.	G	M	G	M	
<i>Stella polaris.</i>	<i>Alrukaba.</i>	γ	1	15	85	51
<i>Pectus Cassiopeiæ.</i>	<i>Scheder.</i>	γ	3	0	53	45
<i>Vmbilicus Andromedæ.</i>	<i>Mirach.</i>	γ	10	43	34	13
<i>Venter Ceti.</i>	<i>Bata kaytos.</i>	γ	23	2	12	39

*Cauda Ceti.*  
*Dextrum latus Persæi.*  
*Caput Algol.*  
*Pleiades.*  
*Naris Ceti.*  
*Hircus.*  
*Oculus Tauri.*  
*Dexter humerus Orionis.*  
*Sinister pes Orionis.*  
*Caput Gemini antecedentis.*  
*Caput Gemini sequentis.*  
*Canis maior.*  
*Canis minor.*  
*Cor Leonis et dicitur Rex.*  
*Cervix Leonis.*  
*Lucida Hydræ.*

*Deneb Kaytos.*  
*Algenib.*  
*Ras Algol.*  
*Athoraye.*  
*Mencnar.*  
*Alhaiot.*  
*Aldebaran.*  
*Bed algenze.*  
*Rigel Algenze.*  
*Ras algenze.*  
*Alhabor.*  
*Algomeisa.*  
*Kalb eleded.*  
*Alphard.*

γ	4	31	20	26	M 3
δ	14	5	47	42	S 2
ε	11	20	39	32	S 2
ζ	20	33	22	36	S 5
η	20	54	21	54	S 5
θ	11	23	2	18	S 3
ι	11	21	44	56	S 1
κ	3	18	15	55	S 1
λ	22	37	6	16	S 1
μ	13	48	9	14	M 1
ν	14	0	32	28	S 2
ξ	16	49	28	43	S 2
ο	5	33	15	49	M 1
π	16	43	6	9	S 1
ρ	22	11	14	19	S 1
σ	24	49	22	19	S 2
τ	13	14	4	32	M 2

Magnitudo.

Pars declinatiōis.

Declinatio.

Cœli mediatio.

Signa Zodiaci.

Nomina Latina stellarū fixarum.	No. Arabica.	G	M	G	M			
Dorsum Vrse maioris.	Dubhe.	♄	5	19	62	36	S	2
Cauda Leonis.	Deneb eleced.	♄	19	16	17	9	S	1
Dorsum Leonis.		♄	9	30	22	51	S	2
Principium caudæ Vrse maioris.	Aliot.	♄	7	17	58	7	S	2
Medium caudæ Vrse maioris.		♄	15	30	57	24	S	2
Extremum caudæ Vrse maioris.	Benenatz.	♄	22	57	51	42	S	2
Vociferans vel Lanceator.	Alramech.	♄	29	21	21	45	S	1
Spica Virginis.	Azimech.	♄	15	13	8	16	M	1
Sinister humerus Bootis,	Ceginus.	♄	4	0	40	32	S	3

<i>Corona septentrionalis.</i>	II	28	51	S	2
<i>Palma sinistra Serpentarij.</i>	II	0	1	58	M
<i>Luminosior lancis meridionalis libræ.</i>	II	7	51	29	M
<i>Luminosior lancis septentrionalis libræ.</i>	II	14	28	7	18
<i>Caput draconis.</i>	II	26	1	52	II
<i>Caput Herculis.</i>	II	11	46	15	27
<i>Caput Serpentarij.</i>	II	18	10	13	II
<i>Cor Scorpij.</i>	II	1	27	24	36
<i>Vultur cadens.</i>	II	3	51	38	36
<i>Aquila aut Vultur volans.</i>	II	18	57	7	19
<i>Dextrum adiutorium Cephæi.</i>	II	14	10	60	40
<i>Cauda Cygni eut gallinæ.</i>	II	3	55	43	43
<i>Muscida Pegasi aut equi maioris.</i>	II	17	41	7	5
<i>Cauda Capricorni.</i>	II	15	8	18	46
<i>Crus Pegasi aut equi maioris.</i>	II	7	47	25	3
<i>Humerus equi maioris.</i>	II	8	0	12	41
<i>Crus Aquarij.</i>	II	4	15	18	0

*Alpheta vel mumin.* M 20 II 28 51 S 2  
*Yed.* M 29 0 1 58 M 3


*Ras aben.* M 14 28 7 18 M 2  
*Ras Algethi.* F 26 1 52 II S 3  
*Ras Alangue.* F 11 46 15 27 S 3  
*Calb alatrab.* F 18 10 13 II S 2  
*Vuega.* P 3 51 38 36 S 1  
*Alkayr.* P 18 57 7 19 S 2  
*Alderaimim.* M 14 10 60 40 S 3  
*Deneb adigege.* M 3 55 43 43 S 2  
*Enif alpheratz.* M 17 41 7 5 S 3  
*Deneb Algedi.* M 15 8 18 46 M 3  
*Scheat alphanatz.* X 7 47 25 3 S 2  
*Markab alpheratz.* X 8 0 12 41 S 2  
*Scheat.* X 4 15 18 0 M 3

Exempli gratia: Iubeor schemati inferius expo-  
 sito imponere stellam aldebaran, quam Romano ser-  
 mone oculum Tauri dicimus: supputo eius longitu-  
 dinem, id est, cœli mediationem à principio Arie-  
 tis in tertium gradum, & decimum octauum minu-  
 tum Geminorum: & à fine duco lineam occultam  
 in cœtrum, e, quam, o, e, vocabo. Item declinationem  
 eiusdē, s. quindecim gradus, & quinquagintaquin-  
 que minuta, septētrionalē, numero à, k, versus, n, in  
 A Equatore, et regula pūcto, l, occidentis, et fini nu-  
 merationis declinationis adiecta, signabo diametrū,  
 f, h, in puncto, p, ex centro, e. in punctum, p, ex pādo  
 circinū, et signo lineam, o, e, puncto, q, erit igitur, q,  
 cacumen stellæ aldebaran, cui nomē et magnitudi-  
 nem primā ascribo, et habeo quod fuit propositum.

Præterea præcipior inscribere stellam Alhabor,  
 quā Latini Canem maiorē aut Sirium appellant: à  
 termino igitur longitudinis, s. quinque gradus, &  
 xxxiij. minut. Cancrī, traho lineam occultā ad cen-  
 trum, e, dictā, e, r. Declinationē verò, scilicet quin-  
 decim gradus, quadragintanovem minuta, compu-  
 to in A Equatore à, k, versus, l, & linea recta pro-  
 tracta ab, l, per finem computatæ declinationis scin-  
 dit diametrum, f, h, in puncto, s. Circino autē emisso  
 ex, e, in, s, signo lineā, r, e, pūcto, t, erit igitur, t, cacu-  
 men aut centrum stellæ Alhabor, quam nomine et  
 prima quantitate orno, & habeo cupitum.



SIMILIS OPERATIO RE-  
liquis stellis tabulæ imponendis aptatur.



**S**ECUNDA doctrina imponendi stellas in  
Araneam per notitiam earum ab orbe signorū,  
hoc est, ab ecliptica linea procedit. Et secūdum hāc  
doctrinam, oportet etiam quatuor præcognoscere, vi-  
delicet longitudinem, latitudinem, latitudinis par-  
tem, & magnitudinem stelle.

Longitudo  
stellæ & ve-  
rus motus  
stellæ.

Longitudo stellæ est distantia ipsius à principio Arietis secundum signorum successionem computando: & dicitur alio nomine verus motus stellæ: et determinatur per circulum transeuntem per polos zodiaci & centrum stellæ. Talis enim circulus sic ductus, ostendit ipsius stellæ gradum & minutum in orbe signorum, & ex consequente ipsius distantiam à principio Arietis: quam stellæ longitudinem propriè nominamus. Arcus autem isto circulo interceptus inter lineam eclipticam et stellam, est eius latitudo. Partem autem latitudinis hîc intelligimus, si fuerit ex parte septentrionis aut meridiei aut ecliptica. Magnitudo à radijs, vt prædiximus concluditur. Secundum hanc doctrinam ordinata est tabula sequens: in qua primitus stellarum nomina Latina & Arabica occurrunt: Secundo signa, gradus, & minuta verarum longitudinum vel verorum motuum earundem adsunt. Tertio adherent latitudines, quæ vniuersaliter à linea ecliptica numerantur, per literam, S, septentrionales, per M, verò meridianæ exprimentur, & demum earum magnitudines accedunt. Si igitur secundum hanc doctrinam propositam stellam in rete collocare volueris, signabis solis maximam declinationem in quartam, k, l. æquatoris à, k, versus l, transeundo: et sit, k, q, Similiter signabis eandem in quarta æquatoris, m, n, versus, n, & sit, m, r. Deinde per propositionem

Latitudo  
stellæ.

Magnitudo

Declaratio  
tabulæ se-  
quentis.

De colloca-  
tione stella-  
rum in rete.

sitionem

sitionem II. huius, sub titulo modorum tabulis non innitentium, ubi habetur initio. Modi nō innitentes, &c. Inuenies polum zodiaci, & sit, p.

Postea propositæ stellæ in tabula positæ considera gradum & minutum in longitudine, & per ipsum & suum oppositum &, p, polum zodiaci, fac transire arcum circuli occultum, qui sit gratia exempli, s, p, t, in quo erit stella ex parte suæ longitudinis. Præterea animaduerte eius latitudinem, quæ si fuerit septentrionalis, à linea ecliptica numerabis eam in æquatore à duobus terminis declinationis, q, & r, versus, n, punctum orientis: & à finibus huius numerationis, ducatur duæ lineæ occultæ, concurrentes in, l, puncto occidentis, quæ scindent diametrum, f, h, in duobus locis. Quod ergo cōtinetur de ipsa infra loca sectionum, diuide per medium, et ibi posito pede circini immobili, & altero extenso secundum quantitatem sectionum, circumuolue circinum donec scindat arcum, s, p, t, denominantem longitudinem ex parte sui gradus & minutorum ipsius stellæ in puncto, u: erit igitur, u, stella de qua agitur. Si autem stella fuerit meridiana, ab ecliptica sume vt iam docuimus signum, gradum & minutum eius in lōgitudine, et per ipsum et eius oppositum, et, p, polum zodiaci duc arcum occultum in facie retis, qui sit, x, p, z, & in eo locabitur stella ex parte signi, gradus et minuti.

Deinde considera eius latitudinem, quam numerabis in *A* Equatore à duobus finibus declinationis solis, *q*, & *r*, versus, *l*. punctum occidentis: & à terminis huius numerationis trahantur duæ lineæ occultæ in, *l*, punctum occidentis, quæ secabunt diametrum, *f*, *h*, & quod continetur infra sectiones illas, de eadem diametro, partire in duo æqualia, & ad quantitatem vnius partis extendes circinum describendo circulum, qui secabit arcum, *x*, *p*, *z*, nominantem longitudinem stellæ ex parte signi, gradus & minuti, in puncto, *q*, erit ergo, *q*, stella quaesita. Ut autem stellas secundum hanc doctrinam reti imponere valeas, & ne arcum denotantium earum longitudinem vagando centra inquiras, resume vltimam siue secundam Zodiaci diuisionem propositionis vndecimæ incipientem: Ne aliquid, &c. Et scito, quòd omnia centra graduum Zodiaci in diametro longa memoratæ diuisionis continentur. Cognito igitur gradu stellæ per tabulam, si fuerit in aliquo minuto gradus, eius centrum perscrutaberis per eandem artem, per quam centrum graduum inuestigasti. Quo inuento, posito ibi pede circini immobili, & alio extenso vsque in, *p*, polum Zodiaci, describes arcum denotantem longitudinem stellæ. Deinde per eius latitudinem inuenies locum stellæ, in eodem arcu omnino, sicut iam supra docuimus.

*Aduerte*

Aduerte igitur quòd ista stellarum impositio cò-  
cordat cum vltima diuisione Zodiaci: quare labor  
vnus. Vides nãque, quod circuli diuidentes zodia-  
cum, illo modo, sunt arcus notantes longitudes, in  
quibus sunt stellæ. Si igitur diuidendo zodiacum  
frequenter habueris occultum ad tabulam stella-  
rum fixarum, cùm veneris ad gradum stellæ, si-  
gnare poteris arcũ denotantem longitudinẽ, & sta-  
tim imponere eam per eius latitudinem.

Et habet hæc stellarum impositio magnam cer-  
titudinem: quam duobus exemplis manifestiorem  
reddam.

Offertur mihi stella imaginis Androme-  
dæ in eius vmbilico posita: quam Arabes Mi-  
rach vocant, reti inscribenda: capio ex tabula eius  
longitudinem, scilicet 23, gradus, & 28, minuta  
Arietis. Per vndecimam autem propositionem hu-  
ius, & eius vltimam partem, diuisus est zodiacus  
per circulos magnos: Primo in 12, signa, secundo si-  
gnum quodlibet in maioribus astrolabiis in 6,  
partes, in minoribus in 3. In maioribus quodlibet  
spatium valet 5, gradus zodiaci, in minoribus 10.  
His partitionibus habitis, si (vt communiter fit)  
ad singulares graduum diuisiones non fuerit pro-  
cessum, per doctrinam memoratæ propositionis in-  
uestigo ad nostrum propositum centrum pro 23, gra-  
du, & 28, minutis Arietis: quo habito, pono ibi

Exemplum  
de stella  
Androme-  
dæ.

Vnum pedem circini, & alium extendo in, p, polum zodiaci, & describo arcum occultum transeuntem per 13, gradum & 28, minutum Arietis, & per, p, polum zodiaci: quem gratia differentiae voco, s, p, t.

Præterea eius latitudinem, scilicet 27, gradus, & 20, minuta, quia septentrionalis est: computo in æquatore à terminis declinationis solis, q, & r, versus, n, punctum orientis: & à finibus computationis duco duas lineas occultas in, l, punctum occidentis: scindentes diametrum, f, h, in duobus locis: & quod de diametro continetur, infra loca sectionum partior per medium: & ibi infigo vnum pedem circini, & emitto alium secundum quantitatem sectionum: & pingo notam in arcu, s, p, t, longitudinis, quæ acumen stellæ denotabit. Cui nomen Umbilicus Andromedæ, aut Mirach ascribo.

Exemplum  
de stella  
Spicæ vir-  
ginis.

Secundò proponitur mihi stella asterismi Virginis, Spica aut Azimech dicta, per tabulam certior reddor, eandem in longitudine 16, gradum, & 18, minutum Libræ possidere. Quæro igitur per sepius memoratam propositionem 11, centrum pro 16, gradu, & 18, minuto Libræ: cui pedem circini immitto, & reliquum in, p, polum zodiaci expando: & tracto arcum occulto per Libram, & p, polum eundem literis, x, p, z, signo, latitudinem verò eiusdem stellæ meridianam 2, graduum, & 0, minuti numero, à, q, & r, ve

*r, versus, l, & à terminis binas in, l, duco lineas, secantes diametrum, f, h, in duobus locis: & quod de diametro his sectionibus intercipitur, diuido per medium, & ibi constituto vno pede circini, aliū secundum sectionum distantiam extendo, & facio punctum in arcu, x, p, z, quod, &, voco: cacumen dictæ stellæ signans, cui nomen & primam magnitudinem addo, & habeo propositum. Simile sumo iudicium de omnibus aliis stellis imponendis.*

## ET NE HVIC SECVNDÆ

doctrinæ aliquid desit, sequens capiatur schema.

TABVLA STELLARVM FIXARVM, FVL-

gentiorum, continens earum veras Longitudines, Latitudi-  
nes, Partes ac magnitudines, rectificata per Ioannem

Stoherinum Iustingensem: Anno Christi

Optimi Maximi 1500. currente.

DE FABRICA

Magnitudo.

Pars latitudinis.

Latitudo.

Longitudo.

Characte. signo.

Nomina latina stellarum fixarum.	No. Arabica.	G	M	G	M
<i>Dextrum adiutorium Cephei.</i>	<i>Alderaimim.</i>	γ	6	18	69 0 3
<i>Umbilicus Andromedæ.</i>	<i>Mirach.</i>	γ	23	28	27 20 3
<i>Venter Ceti.</i>	<i>Bata kaytos.</i>	γ	14	38	20 0 M 3



<i>Pectus Cassiopeiæ.</i>	♄	0	28	46	45	S	3
<i>Dextrum latus Persæi.</i>	♄	24	28	30	0	S	2
<i>Caput Algol.</i>	♄	19	18	23	0	S	2
<i>Pleiades.</i>	♄	21	48	4	30	S	5
	♄	22	18	5	5	S	5
<i>Naris Ceti.</i>	♄	7	18	12	20	M	3
<i>Stella Polaris.</i>	♄	19	48	66	0	S	3
<i>Hircus vel Caper.</i>	♄	14	38	22	30	S	1
<i>Oculus Tauri.</i>	♄	2	18	5	10	M	1
<i>Dexter humerus Orionis.</i>	♄	21	38	17	0	M	1
<i>Sinister pes Orionis.</i>	♄	9	28	31	30	M	1
<i>Caput Gemini antecedentis.</i>	♄	12	58	9	40	S	2
<i>Caput Gemini sequentis.</i>	♄	16	18	6	15	S	2
<i>Canis maior.</i>	♄	7	18	39	10	M	1
<i>Canis minor.</i>	♄	18	48	16	10	M	1

DE FABRICA

Magnitudo.  
 Pars latitudinis.  
 Latitudo.  
 Longitudo.  
 Characte. signo.

Nomina latina stellarum fixarum.	No. Arabica.	G M G M			S
		G	M	G	
Dorsum Vrsæ maioris.	Dubhe veledub.	9	18	48	2
Cor Leonis & dicitur Rex.	Kalbeled.	22	8	0	1
Cervix Leonis.		21	48	8	2
Lucida Hydræ.	Alphard.	19	38	20	2
Principium caudæ Vrsæ maioris.	Alioth.	1	48	53	2
Medium caudæ Vrsæ maioris.		7	38	55	2
Extremum caudæ Vrsæ maioris.	Benenatꝛ.	19	28	54	2
Cauda Leonis.	Deneb eleced.	14	8	11	1

<i>Dorsum Leonis.</i>		♍	3	48	13	40	S	2
<i>Sinister humerus Bootis.</i>	<i>Ceginus.</i>	♌	9	18	49	0	S	3
<i>Vociferans aut Lanceator.</i>	<i>Alramech.</i>	♌	16	38	31	30	S	1
<i>Spica virginis.</i>	<i>Azimech.</i>	♌	16	18	2	0	M	1
<i>Corona septentrionalis.</i>	<i>Alphera vel mumir.</i>	♍	4	18	44	30	S	2
<i>Palma sinistra Serpentarij.</i>	<i>Yed.</i>	♍	24	38	17	30	S	3
<i>Luminosior Lancis meridionalis librae.</i>		♍	7	38	0	40	S	2
<i>Luminosior Lăcis septentrionalis librae.</i>		♍	11	48	8	30	S	2
<i>Caput draconis.</i>	<i>Ras aben.</i>	♎	19	18	75	30	S	3
<i>Caput Herculis.</i>	<i>Ras algethi</i>	♎	7	18	37	30	S	3
<i>Caput Serpentarij.</i>	<i>Ras alangue.</i>	♎	14	28	36	0	S	2
<i>Cor Scorpij.</i>	<i>Calb alatrab.</i>	♎	2	18	4	0	M	2
<i>Cauda Scorpij.</i>		♎	17	8	13	20	M	3
<i>Vultur cadens.</i>	<i>Mega.</i>	♏	6	58	62	0	S	140


DE FABRICA

Magnitudo.  
 Pars latitudinis.  
 Latitudo.  
 Longitudo.  
 Characte. signo.

Nomina latina stellarum fixarum.	No. Arabica.	G M G M						
		23	28	29	10			
<i>Aquila aut Vultur volans.</i>	Alkayr.	☽	23	28	29	10	S	2
<i>Cauda Cygni vel gallinae.</i>	Deneb adigege.	≈	28	48	60	0	S	2
<i>Muscida equi maioris.</i>	Enifalpheratꝫ.	≈	24	58	21	30	S	3
<i>Crus equi maioris.</i>	Scheat alpheratꝫ.	)	21	48	31	0	S	2
<i>Humerus equi maioris.</i>	Markab alpheratꝫ.	)	16	18	19	40	S	2
<i>Crus Aquarij.</i>	Scheat ≈.	)	1	18	7	30	M	3
<i>Cauda Ceti.</i>	Deneb Kaytos.	)	25	18	20	20	M	3


**P**OSTEA QUAM de Fabrica & descri-  
 ptione retis, quantū ad circulos necessarios stella-  
 rūq; in eodē locationes, expeditus es: totū cū perfora-  
 torio & limis vbicunq; vacat, diligenter perforabis,  
 tantū zodiaco, Aequinoctiali, Tropico Capricorni:  
 duabus diametris, f, h, & g, i, & Denticulis aut Cu-  
 spidibus stellis fixis passim aptatis, saluis & illæsis.  
 Vide igitur ne laboriose inuenta, indiligenti perfo-  
 ratione aut excisione à suis locis moueātur: aut inu-  
 tilia reddātur, præcipuè lineā eclipticæ zodiaci in-  
 tegram ad vnguē seruabis, & quoad fieri potest,  
 fac vt zodiaci gradus eclipticā partientes liberè  
 videri possint. Quapropter circa Sagittariū & Ca-  
 pricornū nonnullæ portiones Tropici Capricorni sunt  
 ressecandæ. Quanto enim minores sunt remanentiæ  
 circa lineam eclipticā & gradus ipsius, tanto cer-  
 tior erit inuentio earum rerum, quæ per eandē lineā  
 & gradus habētur: sicuti per eius vsum scire volen-  
 tibus facile manifestabitur. Dimittatur etiam  
 circa cētrum retis paruus circulus ad portandū cor-  
 pus ipsius, ne circūuoluēdo (vt crebrò fit) à sua re-  
 ctitudine moueatur. Nonnulli denticulos, stellas  
 per eorū acumina designantes, vel in modū folij vel  
 rostri auis, vel alterius rei cōuenientis nomini stellæ  
 protrahunt, subtile enim ingenium in huiusmodi  
 figurationibus admodum prodesse potest.

HAEC DE RETI, EIVS FA-  
 brica, & excisione sufficient.



**Punctus Correlatus.**

S      10      20      30      ☿  
 Centrū de cetero / Centrū / Centrū / Centrū ultimi  
 cini g. Arii p 16 / g. Tauri p 23 / gradus Arie-  
 etis & Libræ / 18. m. / 20. g. / g. Tauri & Libræ  
 Libræ Arietis / 28. m.  
 & Libræ Arietis



## DE CONSTRUCTIONE Proposi. 13.

Ostensoris in facie Astrolabij currētis pau-  
cula quædam subiungere.

**O**STENSOR, regula, Index aut Almuri  
Arabico sermone, in astrolabij anteriori parte  
currens, hoc pacto componitur. Accipe tabulam de  
materia solida, habentem latitudinem ferè duorum  
digitorum, longitudinem verò secundū quātitatem  
Instrumenti, quā ex vtraque parte optimè planabis.

Deinde in medio latitudinis eiusdē, protrahe li-  
neam rectam, quæ sit,  $a, b$ , quam in medio secabis in  
puncto,  $e$ , super,  $e$ , tanquā centro describe circulum  
paruum secundū latitudinem regulæ vel ostensoris.  
Quo factō, abscinde partes regulæ ex vna parte vsq;  
ad lineā mediā,  $a, b$ , & vsque ad circūferētiam par-  
ui circuli: & ex alia parte resecato partem opposi-  
tam, ita tamen quòd circumferentia parui circuli,  
vbique integra maneat: & linea per centrum,  $e$ ,  
& puncta,  $a, b$ , transiens, illæsa custodiatur: & po-  
teris hoc opus subtiliare proprio ingenio, ita quòd in  
linea,  $a, e, b$ , non accidat error.

Huius propositionis hanc accipe figurationem.



## DE FABRICA ITAQUE RE

gulae aut ostensoris pauca quaedam recensere, ac structurae faciei Astrolabij finem imponere libuit. Restat Posticae modo dorsi Astrolabij Descriptio, in qua circuli altitudinis Horizontis, orbis signorum, mensium & dierum anni, Solare horarium, & scala Altimetra accuratissima figuratione manifestabuntur.

Proposi. 14.

CIRCULOS ALTITVDINIS  
& orbis signorum artificiose elaborare.

**P**RINCIPIO omnium in dorso astrolabij quare praecisius quo poteris, centrum correspondens centro matris aut limbi faciei: quod vocabis, e, nam si in hoc defeceris, error non parvus in operatione & usu praecipue acceptionis altitudinum orientur. Super centro igitur, e, describe circulum unum extremitatem tabulae fere contingentem, postea restricto circino super idem centrum protrahe alium & secundum, tantum a primo distantem, quod inter ipsos commodè possit scribi numerus graduum altitudinum per 5, & 5, distinctorum. Iterum restringe circinum, minus tamen quam primò, & super il

lud




Iud idem centrum circinabis tertium circulum, tan-  
 tum solummodo distantem à secundo, quòd inter ip-  
 sos cadere possint singulares graduum distinctio-  
 nes. Rursus comprime circinum, & super idem cen-  
 trum lineabis quartum, tantum à tertio separatum,  
 vt numerus graduum signorum per 5, & 5, inscri-  
 bi possit. Tandem iterum constringe circinum, &  
 ex eodem centro describe circulum quintum, tan-  
 tum à quarto abeuntem, quòd inter ipsos, nomi-  
 na 12. signorum zodiaci exarari possint. Hos quin-  
 que circulos concentricos, limbum dorsi præ se fe-  
 rentes, quadrabis duabus diametris constitutis è di-  
 recto diametrorum matris: ita quòd ipsis præcise cor-  
 respondeant, & easdem signabis literis, a, b, c, d, lo-  
 cando, a, in superiori parte astrolabij, vbi suspen-  
 dicularis circulus incathenari debet, b, in parte  
 diametri, dextram versus, c, in opposito, a, & d, in  
 opposito, b, erit igitur, a, punctus meridiei, c, suum  
 Nadair siue punctus mediæ noctis, d, verò pun-  
 ctus orientis, & b, punctus occidentis. Sic erit, a,  
 b, quarta meridiei occidentalis, & a, d, quarta me-  
 ridiei orientalis, b, c, quarta occidentalis mediæ no-  
 ctis, & d, c, quarta orientalis mediæ noctis. Quæ-  
 libet autem quarta continere debet 90, gradus: &  
 ex sequela totus circulus, 360. sibi vendicabit.  
 Ad distribuendum autem generaliter quemcunque

circulum in tot gradus, distribuatur gratia exempli secundus circulus descriptus, primitus diuisus in quartas, vt dictum est, scilicet per duas diametros orthogonales. Deinde quamlibet quartam secerne in tres æquas partes: & regula posita in centro, e, protrahe per diuisiones in circulo factas, lineas paruas transeuntes per omnia quatuor spatia circulorum pro signis zodiaci inscribendis. Postea quamlibet partem diuide in sex æquales, & iterum regula centro & his partibus iuncta, duc lineolas per 3, spatia exteriora, quinariis numeris seruientes. Demum vnãquãque partem diuide in 5, pro gradibus singularibus, & imprime (vt iam exposuimus) lineolas à secundo circulo in tertium transeuntes: & hac lege diuisus est orbis signorum 360, gradus. Quibus absolutis in exteriori interuallo, a, b, puncto occidentis versus, a, punctum meridiei, ascendendo spatiolis (lineis nunc protractis) interceptis, adscribe numeros altitudinis, vt gradus facilius numerari possint. In primo quidem 5, in secundo 10, in tertio 15, & sic semper augendo per 5, donec ad 90, perueneris, quæ ad punctum, a, meridiei locabuntur. Eodem pacto procedes à puncto, d, orientis, in, a, punctum meridiei, ascendendo in 90, gradus. Non aliter operaberis in aliis duabus quartis, incipiendo in puncto, b, occidentali, simili progres-

Facilius sic, quamlibet partem diuide in 3 & postea quamlibet 2, &c.

sione numerum augendo vsque ad 90, descendendo in c, punctum medice noctis: & à puncto, d, in, c, similiter descendendo. Deinceps in 3, spatio unicuique signo sexies quinos gradus deputabis, sic 5, 10, 15, vsque in 30, & non ultra continuando: initio vt prælibauimus, à puncto, b, occidentis sumendo, & versus punctum, a, meridiei progrediendo. In quarto verò interuallo signorum vocabula inscribuntur: à puncto, b, occidentali dextro, vsque ad summum australem, a, contra mundum Aries, Taurus, Gemini. Ab hinc vsque ad orientalem punctum, d, sinistrum Cancer, Leo, Virgo. Inde vsque ad, c, punctumimum septentrionalè Libra, Scorpius, Sagittarius, & dehinc ad occidentalem redeundo Capricornus, Aquarius, Pisces. Animaduertendum est, circulum graduum esse communem circulo altitudinis & circulo signorum.

DE FABRICA  
 ECCE FIGURA.



Proposi. 15. **CIRCVLOS MENSIVM ET**  
 dierum anni, pro vero motu solis in-  
 uestigando, vtiliter describere.

**D**VOS inscribendorum circulorum anni acce-  
 pimus modos, quorum primus per circulos con-  
 centricos, secundus verò per eccentricos inscriptio-  
 nis

nis operationem absoluit. Primi modi Messahalla quidem speculationem quandam exposuit, verum quo pacto executioni mandaretur, silentio præterijt: quem impræsentiarum hac lege breuiter absoluemus. Super cetro, e, & sub ultimo circulo limbi dorsi, describe quatuor circulos distantes, qui tria habebunt interualla aut spatia: Supremum de his diebus anni: secundum numero dierum mensium: & tertium nominibus Latinis mensium anni accommodabitur. Quibus descriptis, applicabis regulam centro, e, & 20. gradui Capricorni in orbe signorum, & trahere lineam per tria horum circulorum interualla, quæ principio Ianuarij alligabitur.

Postea ingredi tabulam veri motus Solis hic expositam, cum 5. diebus: & è directo inuenies verum motum solis, scilicet 25. gradus, & 7. minuta Capricorni: quos gradus & minuta supputa in orbe signorum à linea principij Ianuarij sinistrorsum, et secundum signorum consequentiam: & fini iunge regulam, & centro, e, & produc lineolam à supremo circulo vsque in secundum: spatium igitur inter hanc, et lineam principij Ianuarij interceptum, primis 5. diebus eiusdem mensis seruiet. Consimiliter ex eadem tabula sume motum solis decimo diei Ianuarij respōdentem, scilicet nullum gradum, & 13. minuta Aquarij: quibus in orbe signorum à principio Aquarij numeratis, regulam adiunges: & fac

DE FABRICA ASTROLABI


iterum lineolam in circulis iam iam expositis, inter-  
 capedo igitur inter hanc & precedentē, alijs quin-  
 que diebus sequētibus accommodabitur. Haud se-  
 cus ac iam docuimus, adiumento tabulæ de quina-  
 rio in quinarium procedēdo, memoratos circulos di-  
 stribues. Deinceps vnumquodque spatium in 5. &  
 quales seca particulas, & habebis 365. dies: annum  
 Romanum vulgarem constituentes. Consequenter  
 computa à principio Ianuarij quinque dies versus  
 sinistram: & iuncta regula, prolonga lineolam vs-  
 que in tertium circulum, & adscribe 5, & iterum  
 recense 5, dies, & prolongata lineola, adscribe 10, i-  
 tidem fac pro 15, 20, 25, diebus. Postea computa 6,  
 dies, et termino applica regulam, & trahe lineam  
 per omnia tria intervalla: quæ finem Ianuario 31,  
 dies habenti imponit: & hac norma procede con-  
 tinuando supputationem de 5, in 5, pro alijs mensi-  
 bus, dādo cuilibet debitum numerum dierum: puta  
 Februario 28, dies, Martio 31. Aprili 30. Maio 31.  
 Iunio 30. Iulio 31. Augusto 31. Septēbri 30. Octo-  
 bri 31. Nouembri 30. Decembri 31.

Demum nomina mensium secundum ordinem  
 iam dictum in tertio intervalla exarabis: initium su-  
 mēdo à linea principij Ianuarij sinistrorsum eundo.

T A B V L A



DE FABRICA



SECUNDVS MODVS IN-  
scriptionis circuloꝝ anni.

**H**IS itaque determinatis, consequens est de-  
monstrare, qualiter circuli anni per eccentrici-  
cos figurentur. Augem igitur solis ad tempus fa-  
bricæ tui Astrolabij ex tabulis Alphonsinis, aut  
aliis




aliis extrahere. Quæ gratia exempli, Anno Christi Optimi Maximi decimo, supra millesimum quingentesimum currente in 1. gradu, & 16. ferè minuto Cancræ exacto calculo reperta est. Hæc ab initio Arietis orbis signorum supra descripti supputabis. Terminat autem se solaris aut annorum Christi memoratorum pene in 16, minuto, secundi gradus Cancræ. Intermino igitur eiusdem fac punctum, f, quæ cū centro, e, per lineam rectam leniter impressam continuabis, quam ab, e, vsque ad interiorem circulum orbis signorum in 32. partes æquas dispartire. Primo in quatuor, deinde quamlibet in duas, et iterum quamlibet in quatuor, & habes 32, partes. Super primam partem ab, e, versus, f, numerando (quæ centrum circulorum eccentricorum nominatur) pone pedem circini immobilem: & alium extende vsque ad interiorem circulum orbis signorum, & depinge quatuor circulos: quorum duo primi diebus anni, secundus & tertius numeris dierum, & tertius & quartus nominibus mensium adaptabuntur. Diuisiones igitur mensium et dierum anni hoc pacto institues: A diçe regulam centro, e, & 20. gradui Capricorni: & duc lineam per omnes circulos eccentricos, principium Ianuarij ostendentem: quæ vocabis, g, à qua cōtra signorum successionem, id est retrogradè, numera in orbe signorum 5. gradus & 20. quasi minuta: & fini ac centro, e, addita regula, fac

line-

lineolam à primo circulo eccentrico vsque in secun-  
 dum quæ vocetur, h. Totum arcū residuum secluso  
 arcu, g, h, diuide in 360. partes æquales: scilicet pri-  
 mo in 6. secundo quālibet in 2. tertio iterū quālibet  
 in 6. et tādē quālibet in 5. Arculū verò, g, h, seca  
 in 5. partes, et quartā vnius si omnimoda te delectat  
 præcisio: et habebis in toto circulo 365. partes, repræ-  
 sentantes dies anni Romani, et quartā vnius diei, id  
 est, sex horas. Diuisiones autē mensiū & inscriptio-  
 nes reliquarū linearū ac numerorū, dierum mensiū,  
 quia facillimæ sunt, & ex primo modo elici possūt,  
 missas facio. Hic non displicebit intelligere lineā  
 Augis Solis prædictā, e, f, secūdum motū Augis So-  
 lis variari. Motū autem huiusmodi Augis & eius  
 variationem ex tabulis astrorum, & præcipuè Al-  
 phonsi, facile deprehendemus. Futuris igitur tem-  
 poribus, postquam Aux solis sensibiliter est mutata,  
 in constructione Astrolabij expositam lineam, e, f,  
 (vt pro centro eccentricorum inueniendo) ad termi-  
 num Augis semper copulabis. Præterea instru-  
 mentis magnis plures inserunt Calēdarium in hunc  
 modum: Descripto primo circulo anni, restringunt  
 circinum, et describunt secūdum pro numeris dierū  
 mensium: & postea tertiū pro literis septimanæ: &  
 quartum pro festis Sanctorum, & quintum pro no-  
 minibus mensium: sed quia hæc fabrica nullam ha-  
 bet difficultatem, ideo breuitati studens, transeo.

HVIVS-

HVIVSMODI INSCRIPTIO-  
nis, vide figuram sequentem.



SCALAS ALTIMETRAS  
facile componere.

Proposi. 16,

**I**N parte inferiori dorsi astrolabij, duos quadra-  
tos orthogonios, aut scalas altimetras tali modo


describes: Reuertaris ad centrum, e, orbis signorum,  
 in quo pones pedem circini immobilem, & cum a-  
 lio, sub vltimo circulo mensum anni describe circu-  
 lum, cuius circumferentia per diametros dorsi, a, c,  
 & b, d, in quatuor pares secatur quartas. Quarum  
 quartam, d, c, ab oriente in medium noctis, in pun-  
 cto, k, diuides, taliter: Pone regulam super centrū, e,  
 & quadragesimum quintū gradum altitudinis, d, c,  
 & duc lineam à circumferentia circuli interioris  
 iam descripta, ad centrum, e, & vbi linea tangit cir-  
 cumferentiam, ibi fac pūctum, i. Cōsimiliter fac in  
 alia quarta altitudinis, b, c, occidentali, & adscribe  
 punctum, k, deinde à puncto, i, in, k, porrige lineam  
 rectam, quæ diametrū, a, c, secabit in puncto, l. Qui-  
 bus dispositis, emitte circinum ex centro, e, in pun-  
 ctum, l, & circino inuariato, cum pede vago, fac in  
 diametro, d, b, duo puncta: vnum versus, d, pūctum  
 orientis, & vocetur, m, & aliud versus, b, punctum  
 occidentis, & vocetur, n, ab, m, in, i, & ab, n, in, k,  
 dirige duas rectas, & constituiisti duo quadrata cer-  
 tissima orthogonia æquilatera: vnum orientale, m, i,  
 e, l, & aliud occidentale, n, k, e, l, duabus scalis al-  
 timetris hoc modo aptanda: Lineæ quadrati orien-  
 talis, m, i, produc tres lineas æquidistantes, & hoc ab  
 intra, id est versus centrum, e, vnam pro punctis aut  
 digitis scalæ, aliam pro numeris punctorum, & ter-  
 tiam pro vmbri punctorum inscribendis. Itidē fac  
 cum

cum linea, n, k, quadrati occidentalis, producendo tres  
 æquidistates. Nō aliter procede cū linea, i, l, k. Ex-  
 teriores verò lineas quadratorū partire secundū nu-  
 merum punctorum vmbre, isto modo: Lineā, m, i, in  
 duodecim æquales partes seca, et, i, l, in duodecim, et  
 n, k, in duodecim, & k, l, in duodecim, & tūc pone  
 regulam super centrū, e, ex vna parte, & ex alia su-  
 per singulas diuisiones iam factas, & protrahe li-  
 neolas à prædictis diuisionibus, vsque ad secundam  
 lineam interiorem, et semper à tertia diuisione, duc  
 lineolam vsque ad tertiam lineam interiorem ver-  
 sus, e, centrum. quibus factis, inscribe numeros de 3.  
 in 3. in spatio secūdo omniū linearum prædictarum.  
 In primo igitur spatio circa, m, scribe tria, in se-  
 cundo sex, in tertio nouē, & in quarto circa, i, duo-  
 decim. Simili forma inscribendo procede ab, n,  
 in, k, & ab, l, in, i, & ab, l, in, k. Demum in tertio li-  
 nearū intervallo, ab, m, in, i, exarabis: Vmbra ver-  
 sa vel latus vmbre versæ. Consimiliter ab, n, in, k,  
 ab, i, verò in, l, vmbra recta, vel latus vmbre re-  
 ctæ, & l, in, k, vmbra recta. Obseruandum tamē,  
 cum quodlibet punctum scalæ contineat sexagin-  
 ta minuta, si fuerit scala magna, potest subdiuidi in  
 duas partes, & quælibet continebit triginta minuta:  
 aut in tres, et vnaquæque viginti minuta possidebit:  
 aut in quatuor, & vnaquæque quindecim minuta  
 vendicabit. Vel aliquo alio modo cōsimili secūdum

DE FABRICA

capacitatē instrumenti. Quòd si huiuscemodi minu-  
torum inscriptio te forsan delectat, præpara primò  
spatium, in quo signetur divisio minorū: secūdò a-  
liud, in quo pūcta signentur: tertio aliud pro numeris  
punctorum: & quartum pro umbris inscribendis.

HAEC DE FABRICA SCALA-  
rum altimetrarum, adiecto schemate opti-  
mè descripto, dixisse sufficiat.



HORARIUM AEQUALI-  
bus & inæqualibus horis vtile ar-  
tificiosè constituere.

Propos. 17.

**SUPEREST** vt manifestemus, quo pacto in  
superiori parte dorsi Astrolabij procreetur non-  
nulli arcus, tum æqualibus, tum inæqualibus horis  
accommodandi. Quartam igitur circumferentiæ vl-  
timi circuli (super, e, centro orbis signorum descri-  
pti) interceptam inter, b, punctum occidentis, & a,  
meridiei, in senas partes æquas distribue: & hoc fa-  
cillimè absolues per gradus altitudinis eiusdè quar-  
tæ, b, a, locando regulam super centrum, e, & super  
15. gradum altitudinis, imprimendo notam in quar-  
ta præmemoratæ circumferentiæ. Post super 30, 45,  
60, 75, in quarta ascendendo, et ad regulæ tactū no-  
tas pingēdo in quarta circūferentiæ. Deinde diame-  
trum, a, c, ultra, a, prolongabis, in qua cētra omnium  
arcuum horarum inæqualium inscribendorum in-  
uenies, ita pede vno circini in diametro, a, c, stante,  
applica pedem reliquum mobilem (circino aut com-  
presso vel extenso) vt per centrum, e, orbis signorū,  
& per primam notam circumferentiæ quartæ cir-  
culi circa, b, punctum occidentis, in vnguem tran-  
seat: & describe arcum ab, e, centro, in eandem  
notam, qui fini horæ primæ, inæquali ante, & vn-  
decimæ pomeridianæ accommodabitur. Consimi-

liter agendum est de aliis notis omnibus ipsius memoratae circumferentiae, & conficies 6, arcus horarios, sex horis inaequalibus, quae sunt ab exortu solis vsque in meridiem, aptandos: & per eandem viam redeundo, alijs sex horis vsque ad solis occiduum emergentibus, ita, vt iam diximus, arcus primus fini horae primae antemeridianae, & vndecimae pomeridianae dedicabitur: secundus verò arcus horis secundae & decimae, tertius tertiae & nonae, quartus quartae & octauae, quintus quinta & septimae, sextus tandem horae meridianae & sextae alligabitur.

Absolutis arcubus horarum inaequalium, restat vt his inseramus arcus horarum equalium: tali prope modum ingenio. Primitus fabricetur Zodiacus eleuationibus meridianis pro initijs & decanis 12. signorum seruiens, taliter: semidiametro occidentali, b, e, ab extra iuge duas lineas equidistantes: vnã pro principijs & decanis, id est, 10. gradibus signorum, & aliam pro nominibus aut signorum characteribus inscribendis. Postea ex tabella prima eleuationum signorum &c. inferius exposita folio 54. accipe eleuationem meridianam initiij Cancrì, pro tua habitatione, scilicet 46. gradus, & 50. minuta: eandem eleuationem numera in quarta altitudinis occidentali a, b, versus, a, & fini numerationis ac centro, e, adijce regulam, & vbi secuerit arcum horae sextae inaequalis, fac punctum qui sit, o, & immitte pedem



pedem vnum circini in centrū, e, & reliquum ex-  
pende in punctum, o, & ab eo duc arcum vsque in  
semidiametrum, b, e, et vltra in lineam vltimam æ-  
quidistantem, qui eleuationi meridianæ pro princi-  
pio Cæcri, aut solari, cum sol motu proprio id adierit,  
aptabitur. Deinde ex eadem tabella sume eleuatio-  
nem meridianā principij Arietis aut Libræ, scili-  
cet 41. gradus, et 20. minuta, quam vt iam disserui-  
mus, supputa in quarta altitudinis: et termino, et, e,  
cetro apposita regula, fac iterū punctū in arcu horæ  
sextæ, qui sit, p, et officio circini produc arcū ab eo-  
dem pūcto vsque in vltimā lineā æquidistantē post  
semidiametrū, b, e, hic arcus eleuationibus initiorū  
Arietis et Libræ accōmodabitur. Nō aliter operare  
pro arcu Capricorni inscribēdo, per suā eleuationem  
scilicet 17 gradus, et 50 minuta, ad eius initium ex  
tabella sumptam, et sit punctus horæ sextæ adie-  
ctus, q. Consimili forma officio tabellæ arcus pro  
principijs et decanis reliquorum signorum inscri-  
bes: præterquam quòd arcus pro initio duntaxat du-  
cendi sunt à semidiametro, b, e, vsque ad vltimā li-  
neam æquidistantem, pro decanis autem vsque ad  
secundam tantum. Hæc de fabrica Zodiaci.

Arcus autem horarum æqualium hac lege im-  
pones. Prænotandum tamen, arcum horæ sextæ in-  
æqualis, generaliter horæ 12. æquali alligari: pro re-  
liquis verò arcubus tabellam secundam, folio 55.

subiunctam ingredi, & primum cum hora 1. post, aut 12. antemeridiana: & elevationem ad Cancrī principium ibidem repertam, scilicet 52. gradus, & 19. minuta, cōputa, à b, versus, a, & termino ac centro, e, iunge regulam: & fac notam subtilem in arcu Cancrī ad sectionem regulæ. Consimiliter operare pro reliquis horis: per elevationes Cancrī secundum tabulæ expressionem: continuo signando notas in arcu Cancrī.

Deinde in tabella descende ad elevationes Capricorni (& ipsis vt iam docuimus), a, b, in, a, numeratis, fac notas in arcu Capricorni.

Quibus expeditis, cum circino quære centrum respondens notis horæ primæ in arcubus Cancrī & Capricorni, & intersectioni arcus Arietis cum arcu horæ quintæ aut septimæ inæqualis: & duc arcualem lineam ab arcu Cancrī per Arietem, vsque in arcum Capricorni, seruientem horæ primæ æquali pomeridiane: aut vndecimæ antemeridiane. Consimili forma inuestiga centrum respondens notis horæ secundæ, & intersectioni arcus Arietis cum lineæ horæ quartæ aut octauæ inæqualis: & produc arcum horæ secundæ post, & decimæ ante meridiem adscribendum. Non aliter operando procede pro arcubus tertie & quartæ horarum.

Arcus verò horæ quintæ finit se penè in Zodiaco ad quintum gradum Scorpī, pro cuius inscriptione


ptione arcum pro initio Scorpj aut Piscium protra-  
 Etum prolonga aliquantulum (occultè tamen) ver-  
 sus sinistram & per tabellam secundam, quam iti-  
 dem folio 53. positam offendes: sume eleuationem  
 Scorpj, pro quinta hora scilicet vnum gradum, &  
 decem ferè minuta: quam numera vt supra, a, b, in, a,  
 & fac notam in arcu occulto pro hora quinta: quæ-  
 re igitur centrum conueniens huic notæ, & notæ  
 horæ quintæ in arcu Cancrj, & interseccioni arcus  
 Arietis cum linea horæ primæ vel vndecimæ inæ-  
 qualis, & procrea arcum pro hora quinta equali  
 pomeridiana, aut septima antemeridiana.

Arcus præterea horæ sextæ terminat se in arcu  
 principij Arietis aut Libræ ad contactum eiusdem  
 cum semidiametro, b, e, pro cuius impositione pro-  
 longabis principium arcus Virginis aut Tauri, se-  
 cundum modum iam iam expositum: & ex tabella  
 recipe eleuationem Virginis pro eadem hora, scili-  
 cet 8, gradus, & 15, quasi minuta: quam computa  
 vt supra: & pinge notam in arcu prolongato, & pro  
 eadem nota, & ea quæ in arcu Cancrj pro 6. horæ  
 impressa est, & contactu principij Arietis, cum se-  
 midiametro, b, e, inuestiga centrum: & duc arcum  
 horæ sextæ equali ante & post meridiem aptan-  
 dum. Postremò arcus horæ septimæ ad 25. gra-  
 dū penè Leonis finitur, pro cuius inscriptione pro-  
 longa arcum principij Leonis: & ex tabella cape

elevationem Leonis memoratæ horæ scilicet 5. gradus, et 25. minuta, quam supputa ut antea: et imprimere notam horæ septimæ Cancrī vsque in 25. gradum Leonis, duc arculum horæ septimæ equali post, et quintæ ante meridiem applicandum.

Arcubus absolutis numeros horarum ipsis, ut prædiximus, adscribito: et videbis horarium equalibus et inæqualibus horis aptissimum, quod fuit dudum optatum.

**ECCE SEQVENTEM FIGURAM, PROPOSITIONIS HUIUS DECIMÆ SEPTIMÆ CUM SUI TABELLIS, MOX POST DECIMAM OCTAVAM PROPOSITIONEM PROXIMAM, POSITIS.**



PER HORARIUM DORSO

Proposi. 18.

Astrolabij inscriptum, horas æqua-  
les & inæquales dicto citius  
cognoscere.

**N**E igitur quidpiam instrumenti huius horarij  
omittamus, néve pars aliqua nostri Astrola-  
bij usu & utilitate priuetur, utq; propositionē, quæ

sexagesimasexta ac vltima editionis primæ, huius operis extitit, suum in locum ordinemque redigamus, libuit paucula adhuc quædam de instrumento horario in dorso astrolabij supra scalam altimetram fabricato, & eius commoditate, subiungere. Nec id ab re nobis factum quispiam suspicetur: quandoquidem de tempore eiusdemque partibus, præcipuè horariis (quod equidem longè vtilissimum arbitramur) breuiter determinare decreuimus. Tempus enim quod horis & momentis fugit labiturque, omnium ferè subcœlestium rerum mensura est, teste sapientissimo Salomone, cum inquit: Omnia tempus habent, & suis spatiis transeunt vniuersa sub cœlo. Et idem: Omni in negotio tempus est & oportunitas. Et poëta:

Tempora labuntur, tacitisque senescimus annis:  
Et fugiunt freno non remorante dies.

Hora æquinoctialis siue æqualis.  
Hora temporalis.

De observatione igitur temporis, quantum ad eius fractiones horarias, aduertendum est, horam esse duplicem, æquinoctialem scilicet & temporalem. Hora æquinoctialis, quæ & æqualis dicitur, est vigesimaquarta pars diei naturalis, scilicet tempus in quo de æquinoctiali quindecim gradus peroriuntur. Hora temporalis, quæ inæqualis nūcupatur, est vndecima pars diei artificialis, similiter & noctis: de his satis in propositione sexta huius disputauimus, quare lectorem ad eandem remittimus. Præterea obseruan-

observandum, quod in nostro instrumento horario  
 duplices sunt arcus horarum, quidam cifris annota-  
 ti, qui horis æqualibus & vsitatis accommodantur:  
 quidam verò numero literarum designati, horis in-  
 æqualibus aut temporalibus seruietes, & vtrisque  
 adiiciuntur numeri horarum, prout facile patet in-  
 tuenti. *Vsus huius est talis: Per septimam huius,*  
 & per paragraphum tertium aut quartum, accipe  
 ad diem oblatum altitudinem solis meridianam in  
 gradibus & minutis, quam supputa in quarta alti-  
 tudinis dorsi Astrolabij, & fini eius iunge lineam  
 fiduciæ ipsius alhidada, qua immobiliter stante, vi-  
 de in qua parte linea fiduciæ tangat aut absecet ar-  
 cum horæ duodecimæ, & illis fac notam cum cera  
 aut atramento, aut cum cursore, si alhidada eundem  
 haberet: quam etiam in biduo vel triduo nõ varia-  
 bis: Sole igitur radiante, suspende astrolabium, &  
 paulatim subleua aut deprime alhidadam soli ob-  
 iectam, donec videris eius radiũ per foramina pin-  
 nularum incidere: & cum hoc videris, nota lineæ  
 fiduciæ iam supra inscripta, in arcubus cifris inscri-  
 ptis, horam æqualem: & numero literarum depi-  
 ctis, inæqualem tibi in promptu indicabit. Hæc  
 igitur brevis & utilis de horarum inuentione in-  
 stitutio sufficiat.

Vsus hora-  
 rij in dorso.  
 Astrolabij  
 descripti.

DE FABRICA  
**TABELLA PRIMA ELEVATIONUM**  
 meridianarū ad principia & decanos signorum, pro polo arctico  
 quadraginta octo graduum,  
 quadraginta minorum.

<i>Sig.</i>	<i>Gra.</i>	<i>G.</i>	<i>M.</i>		<i>Sig.</i>	<i>Gra.</i>	<i>G.</i>	<i>M.</i>
♄	0	64	50		♄	0	17	50
♄	10	64	27		♄	10	18	13
♄	20	63	20		♄	20	19	22
♅	0	61	32		♅	0	21	8
♅	10	9	7		♅	10	23	33
♅	20	56	11		♅	20	26	29
♆	0	52	50		♆	0	29	50
♆	10	9	10		♆	10	33	30
♆	20	45	18		♆	20	37	22
♇	0	41	20		♇	0	41	20
♇	10	37	22		♇	10	45	18
♇	20	33	30		♇	20	49	10
♈	0	29	50		♈	0	52	50
♈	10	26	29		♈	10	56	11
♈	20	23	33		♈	20	59	7
♉	0	21	8		♉	0	61	32
♉	10	19	20		♉	10	63	20
♉	20	18	13		♉	20	64	27



TABELLA SECVNDA ELEVA-  
tionum ad principia signorum Cancrī & Ca-  
pricorni, præcipuè pro diuersis horis  
diei artificialis.


	I	2	3	4	5	6	7
<i>Horæ pomeridianæ</i>							
<i>Horæ antemeridianæ</i>		10	9	8	7	6	5
	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
Cancer	62 19	55 34	46 43	37 1	27 17	19 8	3 25
Gemini							
Taurus					8	15	
Aries					0	0	
Pisces					1	10	
Sagittarius							
Capricornus	16 55	13 18	7 39	0 23			

ALHIDADAM, HOC EST  
regulam dorsum Astrolabij percur-  
rentem breuiter construere.

**F**ABREFA C tabulam, cuius latitudo duos  
ferè digitos, longitudo quantitatem instru-  
menti contineat: per medium huius secundum lon-  
gitudinem, dirige lineam rectissimam, quæ sit, b, d,  
quam per medium sectam puncto, e, centrali obsi-  
gnabis. Vocabitur autem linea, b, e, d, linea Fidu-  
ciæ: nam ei in capiendis altitudinibus ac aliis rebus  
astrologicis & geometricis exercendis fidem ha-  
bemus. Deinde super medio Alhidada puncto  
scilicet, e, & secundum eius latitudinem describe  
circulum paruum, quo factò, subtiliter abscinde  
Alhidada partem vnã, vsque ad lineam mediã,  
b, e, & circulum paruum: & ex alia parte lineæ  
mediæ, d, e, abscindas partem oppositam, ita tamen,  
quòd linea media aut fiduciæ scilicet, b, e, d, & cir-  
culus paruus maneant integri & illæsi.

Præterea fabrica duas tabellas, quas pinnas aut  
pinnulas vocitamus, omnino æquales in longitudi-  
ne & latitudine, ita quòd longitudo earum adæ-  
quetur circulo paruo ex centro Alhidada descri-  
pto, & protractis lineis in medio ipsarum, in quali-  
bet fac duo foramina equaliter à radice tabellarum  
distantia, duo quidem maiora, & duo minora: mi-  
nora

nora pro radiis solaribus interdiu accipiendis: Ma-  
iora verò pro stellis vagis & firmis noctu obseruan-  
dis. Has tabellas iunge aut innecte Alhidadae for-  
titer, ita quòd centro ipsius æquidistantes in extre-  
mitatibus Alhidadae ferè ponantur, & quòd li-  
neæ tabellarum per media foraminum transeuntes,  
cadant perpendiculariter & rectissimè super lineam  
mediam ipsius Alhidadae, vt præsentì figura facilè  
edoceri poteris.



CLAVVVM AVT AXEM, ARA- Proposi. 20.  
bicè Alchitot, & tabellam cuneatam,  
Alpheratz dictam, facilè  
componere.

VT ALHIDADAM, tabulas regionũ  
si quas fabrefeceris, Rete & ostensorem faciei  
cum corpore matris astrolabij in medio perforato  
constringere queas, fac clauum teretem, decenter  
compositum, habentem capitellum & foramen, quẽ  
Arabes Alchitot, Romani clauum, Axem aut ve-  
tẽm rotundum nominant: componesque tabellam

in modum cunei, aut equi, siue cuiusuis alterius figure, quam Arabes *Alpheratz*, id est, equum aut caballum vocant: quia antiquitus ex consuetudine in modum equi figurabatur. Sit autem hæc tabella taliter formata, quòd clauis foramen subintrare possit. Quibus ritè compositis perforentur omnia centra (si antea non fuerint perforata) subtiliter & equaliter, scilicet *Alhidada*, matris tabularum regionum, *Retis* & *ostensoris faciei*: & imponantur tabula regionum in concauitatem matris, ita vt tabula regionis sit suprema, super quam *Rete* & *ostensor faciei* ponantur, *Alhidada* autem dorso iungatur. Tunc immitte clauum iam supra compositum, ita quòd transeat per omnia centra, & quòd capitellum ipsius sit in dorso, & foramen sit compressè super ostensorem faciei, per quod intret tabula parua cuneata, quæ omnia supra memorata teneat & constringat, ne facile à suis sedibus decidant.

## ECCE FIGURAE.



DE SUSPENSORIO ASTROLABII paucula quædam differere. Proposit. 22

**P**RÆDICTIS omnibus faustè completis, tandem suspensorium, hoc est, instrumentū per quod astrolabium pro usu ipsius suspenditur fabricabis. Si ergo in eare vetustos astronomos instrumentorum artifices egregios imitari volueris, fabricato primū armillam (vt verbis eorū vtar) ad similitudinem anuli aut circuli valde perfectā & rotundā, quæ armilla suspensoria, Arabicè Alanthica vel Alphantia aut Abalhantica nuncupatur. Armilla suspensoria. Secūdo fac armillā in similitudinē ansæ, quā reflexā aut recuruam vocāt, Arabicè Alhabos. Cōponitur autē ex ferro aut aurichalco rotundo aut terete, superius habente curuaturā ad modum circuli, à qua emergit virgula quasi recta in base habente foramen aut capitellum. Tertiò fabrica armillam fixam ex lamina, habentem in medio foramen valde rotundum. Primam igitur armillam incatenabis secundæ reflexæ, & secundā tertiæ cū clauo aut capitello ita, quòd in foramine fixæ facillimè moueatur: postremò armillā fixam affigas tabulæ astrolabij cū clauiculis, in parte superiori circa literam, a, diametri, a, c, quæ linea meridiei appellatur. Potes autem modo faciliori pro acumine ingenij tui suspensoriū aliter construere: sed quia hæc omnia visu potius

quàm verborum pluralitate deprehendi possunt,  
breuitate persuasus, transeo.

**S**VSPENSORIO fa-  
brefacto & affixo, su-  
spēde astrolabium ita, quod  
libere pendeat, & perpen-  
dicularitatem lineæ meri-  
dianæ & mediæ noctis, hoc  
est diametri, a, c, ipsius dor-



si, Dædalico instrumento, quod perpendiculum vo-  
citamus, diligentissimè examina hoc pacto: Astro-  
labio libere pendente, dictæ lineæ meridianæ circa  
a, partem superiorem apponito filum valde subtile:  
& eius parti inferiori alliga nodum aut globulum  
competentis grauitatis: si igitur filum dependens ce-  
ciderit secundum rectitudinem memoratæ lineæ  
meridianæ, suspensorium iustè est affixum, & pon-  
dus astrolabij est æquale: bene igitur res se habet. Si  
verò filum à lineâ meridianâ deuiare videris, corri-  
ge deuiationem, suspensorium huc vel illuc mouen-  
do, variando aut inclinando, vsque adeo quòd lineâ  
meridiana perpendiculi filo in vnguem subdatur  
vniaturque.

**HIS ITAQUE PERFECTIS**  
lætaberis profectò, lector candide totam fa-  
bricam instrumenti foelici sydere esse com-  
pletam. Vale.



# SECVNDA

PARS PRINCIPALIS

*Tractatus de Astrolabio diuersorū terminorum interpretationes, definitiones & declarationes, necnon vsus multiplices Astrolabij lucidissimè explanat.*

VOCABVLA ASTROLABICI Propositio prima.  
negotij propriè, dilucidè & breuiter enunciare.

**O**MMVNIS est ferè omnium Philosophorum, præcipuè tamen Peripateticorū sententia, quid nominis in omni scientia præsupponi. Nominis enim interpretatio necnon definitio (vt diuo placuit Hieronymo) diligenter est aduertenda, qua sprete facile decipimur ac deludimur: ad stipulante Tullio primo offi. cum inquit: Omnis quæ à ratione suscipitur de aliqua re institu-

H ij

tio, debet à definitione proficisci, vt intelligatur quid sit id de quo disputetur. Terminos igitur quibus vtemur (paucis præambulis accommodatis) intellexisse consilium est.

Licet ad stellarum cœlo hærentium obseruationes secundum diuersas ad Solem & Lunam reliquasque stellas erraticas, item secundum varias ad Horizontem & inter se, habitudines vtile, Ptolemæus Alexandrinus procudi docuerit in octauo magnæ constructionis mathematicæ libro instrumentum, Sphæra solida, aut Astrolabium sphericum appellatum, Astrologicæ scientiæ profecto organum excellentius & præ cæteris nobilius, tum quia instar firmamenti est compositum, tum quia syderibus, id est cœlestibus imaginibus & stellis firmis accommodatius: quia tamen propter eius magnitudinem, & ob magnam impensam ad id conficiendum, non datur facilè copia ipsius, idcirco ne studiosi syderalis scientiæ suo omnino priuarentur vsu, loco ipsius astrolabium aut plani sphericum accipere persuasi sunt quàm commodissimè. Id enim inter cætera antiquorum astronomica artificia propter subtilitatem constructionis, utilitatum multitudinem, & vsus facilitatem peritorum iudicio haud iniuriâ pluribus nobilitate antefertur. Nos verò qui eius fabricam quàm apertissimè fieri potuit tradidimus, in præsentiarum ad terminorum (vt præmi-

simus



simus) expositiones, & post hac ad utilitates felicibus astris properabimus.

Astrolabium igitur, instrumentum planum est, figure circularis, multiplicibus circulis & lineis descriptum, utile ad Astronomiæ & Geometriæ operationes multifarias. De quo Messahalla in exordio tractatus de astrolabio sic inquit: Scito quod astrolabium est nomen Græcum, cuius interpretatio est acceptio stellarum: eo quod accipiatur ex eo veritas earum rerum, quarum scientia queritur ex locis stellarum. hæc ille. Sed Hali haben rodan, aliam nobis astrolabij inducit interpretationem: scribens enim in capitulum secundum tertij tractatus quadripartiti Ptolemæi Phæludiani, ita dicit: Prima res, in qua debemus considerare, est gradus ascendens, hora exitus creature. Iam dicit & hinc aperte, quia principium ipsius veridicum est in homine, & in eo in quo debemus confidere: & propterea dixit: & potest scire horam exitus creature pro certo, quia aspicit per astrolabium: & hoc est instrumentum cognitum, & dicitur, quod primus eius inuentor fuerit Abraham, & dicitur, quod fuerit inuentum tempore Regis Salomonis filij David, vel ante eum. Et dicitur, quod quidam qui vocabatur Lab, inuenit ipsum, & astor vel astro vult dicere linea, unde vocatum est Astrolabium, id est linea Lab. hæc ille & plura alia utilia.

Definitio  
Astrolabij.

Inuentio  
Astrolabij.

Alij interpretatur Astrolabiũ, à nomine Græco ἄστρον, id est, σύσμιμα τῶν ἀστέρων, congregatio stellarum, siue signum stellis coactum, ἔλαβή, quod est ansa, capulus, siue manubrium, quasi dicas, siderum ansa. Est enim instrumentum ansam habens, per quam suspensum, astrorum motus & plura notatu dignissima colligimus.

VValzago-  
ra.

Hoc præterea instrumentum Hermannus Cōtractus vocat VValzagoram. Inquit enim libro secundo: Quicumque astronomicæ, peritiã disciplinæ, & cœlestium sphaerarum, geometricaliũque mensurarum, altiorẽmque scientiam diligenti veritatis inquisitione altius rimari conatur, & certissimas horologiorum quorumlibet climatum rationes, & quælibet ad hæc pertinẽtia industrius discriminare nititur, hanc VValzagoram, id est planam sphaeram Ptolemæi, siue à Astrolapsu solerti indagatione perquirat & discat, & perquisitam tenaci memoriæ firmiter cõmendet, &c. VValzagora igitur Arabicè sonat plana sphaera, vel planisphaerium, aut astrolapsus Latine.

Astrolapf<sup>9</sup>.

Ptolemæus appellat astrolabium planam sphaeram aut planisphaerium, ex eo, quòd sit quasi sphaera extensa in plano. Astrolapsus quasi astrorũ occasus vel lapsus. Per astrolabium enim non solũ ortum signorum & stellarum dignoscimus, verum-  
etiam

etiam occasum. Simile apud Ovidiũ primo fastorũ.

Tempora cum caufis Latium digefta per annum,  
Lapſaque ſub terras, ortaque ſigna canam.

Deſcripto aſtrolabio, vt perfectiũs & abſolutiũs eius habeatur operatio, nomina partium eiusdem ( ſunt quidem plures ) ſecundum ordinem deſcribemus.

Prima igitur pars dicitur armilla ſuſpenſoria, & eſt illud inſtrumentum, per quod aſtrolabium ſuſpenditur, ad capiendum altitudinem Solis de die, vel ſtellarum de nocte, & dicitur Arabicè Alanthica vel Alphantia, aut Abalhantica. Secunda pars vocatur Arabicè Alhabos, id eſt anſa, vel clauus, qui coniungit Armillam cum aſtrolabio. Volũt quidam, quod ſit foramen concauum factum in aliquibus aſtrolabiis, in quo armilla mouetur: de his ſuprà propoſitione vigefima prima abundè diximus. Superficies plana in qua eſt mater, à veteribus antica, à noſtris facies nominatur: alia verò poſtica & dorſum, in extremitate faciei per circuitum eſt limbus. In aliquibus inſtrumentis eleuatus, in aliquibus non, Arabicè Alnogiza dictus. Sicut enim ( vt quidam putant ) limbum eſſe faſciam, quæ ambit partem veſtis extremam: ſic limbum noſtri inſtrumenti reliquas partes circundare ambigit nemo. Hic in 360, partes adiunctis numeris diuiditur. Inferiores numeri gradibus Aequinoctialis,

Armilla ſuſpenſoria.

Facies Antica. Poſtica Dorſum, Limbus.

superiores horis æqualibus alligantur: quare hæ partes ad numeros Aequatoris relatæ, gradus, quorum quivis 60, minuta complectitur, appellantur: ad superiores verò relatæ 15, partes vnam horam, & pars vna quatuor minuta temporis representant. Vnde liquidū est, memoratas partes duplicia habere officia. Plures vocant limbum Margilabrum, quasi labrum marginis.

Mater.

Intra limbum continetur mater, quæ plerunque concavata est, vt plures regionum tabulas capere possit. Nam quemadmodum naturalis mater pluralitate liberorum gaudet: ita mater nostri instrumenti multitudine tabellarum. Loquor de astrolabio ad plures regiones constructo.

Tabulæ regionum.

Tabulæ regionum à recentioribus astronomis Tympana nūcupantur. Vocantur autem tabulæ regionum, quia ad diuersas regiones, climata & poli arctici varias elevationes sunt cōpositæ. Pro locorū enim & climatum variatione dies & noctes, ascensiones & descensiones, ortus & occasus signorum & stellarum, & alia plura variantur: de qua varietate certa ratio dabitur suo loco. Dicuntur & tabulæ regionum Tympana, ob similitudinem quā habent cum superiori parte plana Tympani. Tympanum quippe instrumentum est ex vna parte valde planum, membrana clausum, intus vacuum.

Tympana.

In tabulis regionū, aut in superficie plana matris,  
si in-

si instrumentum tabulis caret, sunt primitus tres cir- Tres circuli  
 culi super centris earundem descripti: quorum mi-  
 nimus dicitur circulus Cæcri vel tropicus æstiuus,  
 Græcè Σεεινὸς τροπικὸς, ideo quòd cùm sol motu suo  
 ad eum peruenerit, æstatem efficit eis qui in Aequi-  
 lonis finibus sunt, hyemem autem eis quos Austri  
 flatibus oppositos dicimus: præterea quod ultra eum  
 circulum Sol non transit, sed statim reuertitur, tro-  
 picus est appellatus. Medius, AEquinoctialis si-  
 ue circulus Arietis aut Libræ à Græcis ἰσημερινὸς  
 nominatus: ideo quòd Sol cùm ad eum orbem perue-  
 nerit, æquinoctiũ conficit: ibi enim pari cõpensatio-  
 ne lucis noctisque spatia dimetiuntur. Maior verò  
 circulus Capricorni aut tropicus hyemalis siue bru-  
 malis, Græcè Χιμερινὸς Τροπικὸς vocatur: ideo  
 quòd sol cùm ad eũ circulũ peruenerit, hyemẽ efficit  
 his qui ad Aquilonem spectant: æstatem autem his  
 qui in Austri partibus domicilia constituerunt.

Deinde sequuntur duæ lineæ rectæ intersecantes  
 se in cetro tabulæ aut matris ad angulos rectos: un- Diametri.  
 de diametri instrumenti sunt appellatæ. Quarũ pri-  
 ma descendit ab armilla per centrum ad oppositam  
 partem, et dicitur linea mediæ cœli, ita quod pars e-  
 ius superior quæ est supra horizontem, vocatur li-  
 nea mediæ diei: Arabicè Ten vazalzene, eo quòd  
 sol ascendendo, ipsa contacta, meridiem efficit: &  
 descendẽdo ad occasum vergere incipiat. Alia ve-

vò pars, scilicet inferior, quæ sub horizonte in septentrionem protenditur, dicitur angulus terræ, aut linea mediæ noctis, Arabicè Cathalze vvi, quâ cum Sol post occiduum adierit, mediam efficit noctem.

Secunda autem linea quæ interfecat lineam mediæ cœli orthogonaliter, est horizon aut finitor rectus: et est illorû qui habitant sub æquinoctiali: et hæc ducitur à sinistra, id est ab oriète in dextram, hoc est in occiduum: cuius pars sinistra, ab Arabibus Almastech, id est orientalis, ab ortu syderum & diei appellatur. Dextra autem pars Almagrip, id est occidentalis, ab occasu syderum et diei nominatur. Hæc linea horizontis recti causatur per primos radios exoriētis Solis aut gnomonis umbram, dum idem primum punctum Arietis aut Libræ adierit. Postea sequuntur Almicantarath, id est, circuli aut arcus progressionû, aut altitudinû & depressionû Solis, planetarû et stellarû: et sunt descripti in hemisphærio seu in medietate superiori versus armillam cõputando. Quorû quidam sunt perfecti, quidam imperfecti: et primus horum dicitur Horizon, finitor aut finies obliquus, hoc est terminator visus in sphaera obliqua: quia ipse diuidit & determinat hemisphærium superius ab hemisphærio inferiori, & quicquid est sub illo circulo, est sub Horizonte nobis occultatum: quicquid autem est supra, nobis apparet. Hi etiam circuli ob frequentem circuitionem & crebram retrorsionem, nunc

extra-

Almicantarath.

Finitor, finiens.

extractiores, nunc contractiores certa & necessaria exaratione, ad similitudinem penè coronæ inscripti, corona appellantur: in qua magna huius instrumenti consistit efficacia. Nec id est silentio prætereundum, centrum vltimi almicantarath esse Zenith regionis climatis, aut oppidi, ad quod tabula aut matris superficies descripta est: vnde non ab re polus horizontis dicitur. Zenith autem regionis, climatis aut oppidi punctus est in cœlo directè huic suprapositus. Latine punctus verticalis.

Almicantarath dicuntur Coronæ.

Zenith.

Post Almicantarath accedunt Azimuth: & sunt circuli imperfecti, quos Latini vocant circulos verticales, eo quod per punctum verticalem, id est Zenith, omnes transeant, & distinguunt horizontem in 360. partes, quos plures circulos rectitudinum nominant: ex eo quod per eos rectè scimus in qua parte mundi stella oriatur atque occidat.

Azimuth.

Sub Horizonte obliquo in inferiori parte astrolabij, sunt inscripti decem arcus horarum inæqualium: qui à tropico per æquatorē tendunt in aliū tropicum. Hos Arabes Nototalgab, id est, breues horarum lineas, vocant: qui linea mediæ noctis, & horizonte obliquo coassumptis, duodecim horas constituunt, et impressis numeris singulæ denotantur: quarum dextra lineatio interdiu antemeridianis horis, sinistra pomeridianis accommodatur: noctu dextra horis ante conticinium, sinistra post conticinium alligatur.

Arcus horarum inæqualium.

Lineæ cre-  
pusculinæ.

Inter arcus horarios aliqua astrolabia habent duas lineas crepusculinas descriptas, per quas initium diei & noctis secundum vulgus accipitur.

Arcus do-  
morum.

Præterea incerti sunt alij quatuor arcus vergentes ab vna parte circuli Capricorni, per intersectionem horizontis obliqui & lineæ mediæ cœli, in aliam partem eiusdem circuli Capricorni: qui vnâ cum horizonte & lineâ mediæ cœli, duodecim cœlestia domicilia constituunt, & mira quadam facilitate distinguunt: & vocantur cuspides aut lineæ initiales 12. domorū, de quibus posthac abundè dicemus. Supremo denique circulo limbi superaddimus peripheriam 12. ventorum, vt à qua cœli plaga quivis spiraret, sit cognitu facillimum.

Circuli ven-  
torum.

De circulis, arcubus, & lineis tabularum regionum, aut matris Astrolabij quid sibi velint hæcenus dictum. His igitur incubat Rete, Aranea siue Voluellum, Arabicè Alhancabuth, instrumentum quidem particulare Astrolabij mira quadam fabrica constructum, insculptum & terebratum: iccirco dictum Rete siue Aranea, ob similitudinem quam habet cum Reti aut tela Aranei: Voluellū quia manuali versatione ad demonstrandā cœlestis sphaeræ volubilitatem & administrationē horarum equalium & inequalium, & aliarum rerum Astrologicarum propemodum innumerarum voluitur. Et sunt in ipso quatuor circuli, Circulus

Rete.  
Aranea.  
Voluellum.  
Alhancabuth

Canceri,



Canceri, Capricorni, & Equinoctialis, & Zodiaci. De tribus primis supra abunde diximus: de Zodiaco hæc pauca notabimus. Arabicè hic circulus appellatur Mirach. Græcè Σημιοφόρος aut Zodiacus, Latine signifer, circulus obliquus vel inflexus.

zodiacus.  
Mirach.  
Simiopho-  
ros.

Est enim signifer (vt Cleomedes inquit) circulus obliquus per tropicos & equinoctialem proiectus, qui vtrunque tropicum in puncto cõtingit, sed equinoctialem diuiduo secat. Mirach enim Arabico sermone circulus signorum dicitur: σημιοφόρος Græcè, Latine signifer Zodiacus, circulus vitæ, vel animalium, signifer, quia fert signa. Obliquus aut inflexus circulus, quia cum horizonte nõquam angulum rectum constituit, nec regulariter ascendit vt equinoctialis, & à polis mundi non æquè distat. Hic in duodecim partes quas signa vocamus distribuitur: quorum nominatio & ordinatio sunt, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Pisces. Quodlibet signum trigenos gradus complectitur, vnde liquet totum Zodiacum 360 gradus possidere. Quiuis gradus (vt rem vulgatam percurramus) in 60 minuta distribuitur.

Signifer.  
Circulus  
obliquus.

Huius signiferi extremitas conuexa, aut circulus supremus, via Solis aut linea ecliptica appellatur. Sol enim motu suo annuo peripheriam, id est lineam circularem describens, sub qua semper mo-

Via solis.  
Linea ecly-  
ptica.

uetur & reuoluitur, ab ea nusquam deflectens sola-  
re iter instituit atque nominauit. Hæc præterea pe-  
ripheria, linea ecliptica dicitur, propter deliquia So-  
lis & Lunæ, quæ nonnunquam in eorum conuentio-  
ne aut diametrali oppositione sub eadē aut eius vi-  
cinia accidunt. Signa sex, scilicet Aries, Taurus,  
Gemini, Cancer, Leo, Virgo, quia intra A Equino-  
ctialem circulum & centrum astrolabij continen-  
tur, septentrionalia aut Borealia nuncupantur.

Signa septē-  
trionalia &  
meridiona-  
lia.

Vergunt enim ab æquinoctiali versus septen-  
trionem. Reliqua sex quia sunt extra æquatorem,  
versus circulum Capricorni, meridiana aut Au-  
strina dicuntur: declinant enim ab æquatore versus  
meridiem. Sunt etiam in reti passim acuti denti-  
culi, qui certis in locis collocati, stellas annotant fi-  
xas. Alia omnia quæ in eodem ponuntur, facta sunt  
aut ad decorem, aut pro tenaculo fixarum stellarum  
ibi positarum. Demum accidit regula percurrentis  
faciem totius instrumenti, hanc Arabes Almuri  
aut Almeri nominant: Latini Calculatorem, Osten-  
sorem, aut Indicem. Ostendit enim & supputat ho-  
ras, gradus æquinoctialis & Zodiaci, & alia com-  
plura, quæ eius subduntur officio.

Regula.

Almuri.  
Calculator.  
Ostenfor.  
Index.

**I**AM verò antica aut facie astrolabij descripta,  
ad posticam aut dorsum vertatur stylus, super cu-  
ius centro in exteriori tabulæ labro 5. circuli, qua-

tuor

suor continentes intervalla aut spatia sunt descripti.

Hi per duas diametrales lineas in quatuor quartas partiuntur: quarum ea quæ ab armilla per centrum astrolabij in partem oppositã vergit, linea meridiei & mediæ noctis aut septentrionis appellatur: quam plures ex eo, quòd cum horizontis superficie omnimodam perpendicularitatem observans, fidem, certitudinem, & perfectionem præstat instrumento: lineam Fidei aut fiducia nominant. Alia linea à sinistra in dextram, aut quod idem est ab oriẽte in occidentem porrecta horizontem generaliter signat.

Linea meridiei & mediæ noctis, aut Septentrionis.

Linea fidei aut fiducia.

Linea horizontis.

In supremo intervallo memoratorum circulorum ponuntur numeri graduum altitudinum, id est sublevationum Solis & stellarum supra horizontem, à quinque in quinque computando. Inchoando ab horizonte iam exposito, per transversum instrumenti eunte, tendendo versus lineã meridiei vsque in 90.

Numeri graduum altitudinum.

In sequenti intervallo circulorum apparent gradus singulares, qui ad numeros altitudinum relati, gradus altitudinũ dicuntur. In tertio intervallo ponuntur numeri graduum 12. signorum, de quinque in quinque scandendo vsque in 30, ad quos iam dicti gradus relati, gradus signorum nominantur. In ultimo verò intervallo 12. signorum nomina secundum eorum ordinem sunt inscripta. Hæc igitur tria intervalla & eorundem circuli pro cœlestibus signis figurati, orbem signorum exprimunt, quare eos vsi-

Numeri graduum Signorum.

Duodecim signa.

Orbis signorum.

Menses &  
dies Anni.

tato nomine vocamus orbem signorum. His circulis subduntur alij quatuor super centro astrolabij vt concentrici, aut quopiam alio tanquam eccentrici pro varia instrumenti fabrica descripti, mensibus & diebus anni Romani dedicati. Cauta quippe discretione singulis mensibus proprij annumerati sunt dies: vt certo & omnibus noto tempore, certus Solis motus in orbe signorum assignetur. Nam supremum interstitium diebus anni, sequens numeris, postremum nominibus mensium alligatur.

Arcus horarum æqualium.

In superiori parte versus armillam sunt inscripti mira quadam constructione arcus horarum æqualium & inæqualium, in inferiori parte contextæ sunt duæ scale Altimetræ, aut duo quadrati orthogonij, quorum latera in 12. partes æquales sunt diuisa, qui digiti aut puncta appellantur.

Scale altimetra.

Regula.

Adest etiam regula quæ extensa superponitur tabulae instrumenti, in cuius capitibus binæ erectæ sunt tabellæ aut pinnae, quæ ad accipiendas altitudines solis & stellarum, seu ad geometricalium mensurarum scientiam binæ habent foramina sibi re-

Pinna.

Alhidada.

Spondetia: hæc Arabicè vocatur Alhidada, id est

Verticulum

Verticulum, quia in superficie instrumenti vertitur

Dioptra.

& mouetur, eleuatur & deprimitur. Græcè Dioptra, id est speculatrix: qua res mathematicas scruta-

Mediclinium

tamur & exactè consideramus, quã alij vocant Mediclinium, quia in medio clinij, id est tabulae rotun-

dæ consistit, alij haud ineptè radium dici volunt, ob  
 id, quia distantijs locorum metiendis (quod Geo-  
 metrarum officium est) seruiat. Per huius medium  
 porrigitur linea recta, quæ non ab re linea fiducia  
 nominatur, de qua supra, propositione decimanona  
 primæ partis satis disseruimus.

Radius.

Linea fidu-  
ciæ.

Postremò accedit etiam Alchitot, id est clauus  
 aut vectis teres, qui astrolabio in medio perforato, ad  
 constringēdas partes ipsius infigitur, cui in forami-  
 ne in supremo eius factò, cuneus ex parte retis trās-  
 uersè inseritur, quem Alpheratz, id est caballum  
 dicunt, eo quòd instar caballi formatus sit, & iam  
 prout lucidius quiuimus, omnes partes astrolabij de-  
 scripsimus, declarauimus, & interpretati sumus.

Alchitot.  
Clauus.

Vectis teres

Cuneus.  
Alpheratz.  
Caballus.

## PROPOSITIONES DE

Astrolabij Fabrica, eiúsque diuersorū ter-  
 minorū interpretationes, definitiones &  
 declarationes, hîc finē consecutæ sunt. Et  
 sequuntur nunc canones, vsum utilita-  
 tésque ipsius lucidissimè declarantes.

## SOLIS VERVM LOCVM

Propositi.

facilè cognoscere.

**D**EFINITIS partibus astrolabij per pro-  
 positionem antecedentem, nunc ad eius utili-

tates accelerabimus. Quemadmodum autem cognitio veri motus solis plures nobis vsus manifestat, sic contrà ignorantia eosdem tollit & occultat.

Quapropter hanc propositionem alijs præmittendam decreuimus, per quam veram notitiam solis in orbe signorum nanciscemur. Si igitur verum motum solis, hoc est, locum solis in signifero habere cupieris, pone partem Alhidada secundum lineam fiducia super diem propositum, in circulis dierum & mensium anni, & mox in orbe signorum ad tactum lineæ fiducia, apparebit gradus, locus verus Solis appellatus, ad meridiem diei propositi, qui cuius signi sit, & quotus, signum, & numerus, in proximis subiectis linearum intervallis exarati, palam faciunt. Verum hinc quibusdam cautelis opus est: Nam in anno bissextili, quo Februarius 29. diebus completur, pro 29. die eiusdem ad primū Martij eundum est: & pro primo Martij ad secundum eiusdem, & sic deinceps vsque in finem anni.

Præterea (si te omnimoda delectat præcisio) nota quòd annus communis Romanus vulgaris, qui etiam annus ecclesie vocatur, minor est anno Solari ferè sex horis. Item ratio supplementi bissextilis, per additamentum vnius diei in anno quarto, qui intercalaris dicitur, nō rectè quadrat: quin quatuor anni ecclesie pauxillo quodam excedunt quatuor annos Solares. Ex his facile liquet verum lo-

cum

Nota caute.  
Iam in anno  
bissextili.



TABVLA VERI MOT-  
tus Solis.

<i>Anni Christi.</i>		<i>M</i>	<i>Anni Christi.</i>		<i>M</i>
1501	O	0	1521	A	9
1502	S	14	1522	S	5
1503	S	29	1523	S	20
<i>b</i> 1504	S	43	<i>b</i> 1524	S	34
1505	A	2	1525	A	11
1506	S	13	1526	S	4
1507	S	27	1527	S	18
<i>b</i> 1508	S	41	<i>b</i> 1528	S	32
1509	A	4	1529	A	12
1510	S	11	1530	S	2
1511	S	25	1531	S	16
<i>b</i> 1512	S	39	<i>b</i> 1532	S	31
1513	A	5	1533	A	14
1514	S	9	1534	S	0
1515	S	23	1535	S	15
<i>b</i> 1516	S	38	<i>b</i> 1536	S	29
1517	A	7	1537	A	16
1518	S	7	1538	A	2
1519	S	22	1539	S	13
<i>b</i> 1520	S	36	<i>b</i> 1540	S	27



<i>Anni Christi.</i>		<i>M</i>	<i>Anni Christi.</i>		<i>M</i>
1541	<i>A</i>	18	<i>b</i> 1560	<i>S</i>	18
1542	<i>A</i>	3	1561	<i>A</i>	26
1543	<i>S</i>	11	1562	<i>A</i>	12
<i>b</i> 1544	<i>S</i>	25	1563	<i>S</i>	2
1545	<i>A</i>	19	<i>b</i> 1564	<i>S</i>	17
1546	<i>A</i>	5	1565	<i>A</i>	28
1547	<i>S</i>	9	1566	<i>A</i>	14
<i>b</i> 1548	<i>S</i>	24	1567	<i>S</i>	0
1549	<i>A</i>	21	<i>b</i> 1568	<i>S</i>	15
1550	<i>A</i>	7	1569	<i>A</i>	30
1551	<i>S</i>	7	1570	<i>A</i>	16
<i>b</i> 1552	<i>S</i>	22	1571	<i>A</i>	1
1553	<i>A</i>	23	<i>b</i> 1572	<i>S</i>	13
1554	<i>A</i>	9	1573	<i>A</i>	32
1555	<i>S</i>	6	1574	<i>A</i>	18
<i>b</i> 1556	<i>S</i>	20	1575	<i>A</i>	2
1557	<i>A</i>	25	<i>b</i> 1576	<i>S</i>	11
1558	<i>A</i>	10	1577	<i>A</i>	34
1559	<i>S</i>	4	1578	<i>A</i>	20

D E V S V  
S E Q V I T V R E X E M P L V M .

Exemplum

*Exemplo facile capies. Offertur mihi 14. dies Februarij, anni Christi decimi labentis supra millesimum quingentesimum, ad cuius meridiem verum solis locum clicere iubeor. Sisto alhidada per linea fiducia ad die oblatum, & video eandem tangere ferè 40. minutum sexti gradus Pesciũ, proclamo igitur crasso quodam modo, Solem sextum gradum Pescium possidere. Pro maiori autem præcisione intro tabellam præexpositam, & ad sedem decimi anni capio 11, minuta: quæ propter literã S, subtractione signante, demo à 14. minutis supra inuentis, & remanent mihi 29. minuta. Dico igitur Solem secundum verum eius motum tenere Pisces quintum gradum, & 29 penè minutum: quod fuit oblatum & petatum.*

Corrige  
40

Proposi. 3.

N A D A I R S O L I S D I C T O  
citius inuenire.

**N**A D A I R ascemat, id est oppositum Solis (quod veteres horoscopon vocauerunt, eo quod per ipsius aspectum horas inæquales, præcipuè diurnas designari statuerunt) punctum est è regione Solis in ipso Zodiaco constitutum. Vnde liquidum est, in quocunque signo et gradu Sol inuentus fuerit, eius Nadair in signo & gradu diametraliter oppositis inueniri. Supputatis igitur septem signis à signo solis in-

clu-

clusiue, & tot gradibus quot sol à principio signi in quo est distat, in Nadair Solis deuenitur. **EXEMPLVM** breue repetatur propositionis antecedentis. Verus locus solis, in Piscibus 5. gradu & 29. minuto eorundem inuentus: scio signum Piscium diametraliter opponi signo Virginis, cōcludo igitur breuibus, Nadair Solis occupare 5. gradum & 29. minutum Virginis: ecce nostræ propositionis lucida declaratio. Duas has propositiones tenaci commenda memoriæ, nam cauta earū administratione, plures sequentes propositiones facile patebunt.

**ALTITVDINEM SOLIS PRO** Proposi. 4.  
qualibet hora diei vtiliter determinare.

**ALTITVDINEM** Solis vocamus cursum eius, per quem ipse ab exortiuo horizonte paulatim quasi per gradus impetum mundi trahente recedēs, ad altiora in lineam vsque meridianam ascendit: & hinc descendendo in opposito ortus sui ad inferiora decidit. Est igitur summam altitudo Solis eleuatio centri ipsius supra horizontem, sine ea certæ horæ diei sciri non possunt. Quota autem sit altitudo solis qualibet hora diei artificialis, diligenti adhibita inquisitione, sic inuenies. Altitudo solis est

Suspende astrolabium per suam armillam, aut suspensoriū ad pollicem manus dextræ aut sinistræ, vt liberè pendeat, et radianti Soli oppone latus eiusdē,

ita, quòd dorsum instrumenti ad te vertatur, & continuo paulatim subleua aut deprime Alhidadam soli obiectam, donec videris eius radium forinsecus introrsum ingredientem, supernæ tabulæ aut pinnulæ foramen minus, & è regione inferioris tabellæ aliud foramen oppositum subire: & cum hoc videris, tunc diligenter considera, per quot gradus eleuatur Alhidada, secundum lineam fiduciæ in quarta altitudinis, supputando à diametro transuersa, quàm supra horizontem vocauimus, hoc est à linea illa quæ transit per principia Arietis & Libræ & centrum astrolabij, & numerus illorum graduum erit altitudo Solis: ad instans tuæ considerationis. Propo-

**Exemplum** sito nostro breue accomodabitur exemplum, ad 14. diem mensis Februarij, in propositione secunda propositum: precipior Solis altitudinem obseruare. Accepto igitur astrolabio, & à manu liberè demisso, dirigo quartam altitudinis in 90. partes distributam versus solem, deinde Alhidada pedepressim circumago sursum deorsumque, quoad radius à sole veniens per foramen pinnulæ Alhidadæ ad solem conuersum in alterum mihi admotum incidere: quo viso ab orientali linea computo gradus quartæ altitudinis vsque ad summitatē Alhidadæ: & inuenio gratia exempli 24. dico igitur tempore huius obseruationis, solis altitudinem (hoc est eius supra horizontem eleuationem) 24. gradus continere: quod fuit propositum.

S O L I S

SOLIS ALTITUDO, AN AN- Proposit. 5.  
te aut pomeridiana sit perscrutari.

**N**ON NVNQV *A*M oritur dubium, an so-  
lis altitudo instrumento explorata sit ante aut  
post meridiem accepta. Vnde etiam in dubium ver-  
titur, an meridies transierit, an ve sit expectandus.  
Et hoc plerunq; accidit cū sol prope meridianū cir-  
culum constituitur. huius dubij hanc cape determi-  
nationem. Per propositionē antecedentē solis al- Exemplum  
titudinem observa: quā extra scribendo, vocabis pri-  
mam altitudinē: postea modico intervallo elapso, ca-  
pe sicut instruximus, astrolabium: sistēque ad solē,  
& rursus recipe altitudinē solis, quam primæ sub-  
scribendo, voca secundam. Tunc si secunda altitudo  
fuerit maior prima, scito altitudinem primā esse an-  
te meridianam, & nondum esse meridiem: quia sol  
ab horizonte exortiuo ascendēdo, raptu primi mo-  
bilis, nondum meridianum adiit. Si autem secunda  
altitudo fuerit minor prima, scito altitudinem esse  
pomeridianam, & meridiem transisse, quia tunc sol  
à meridiano incipit descendendo horisonti occiduo  
appropinquare, quota autem sit altitudo solis meri-  
diana, postea per propriam explicabimus proposi-  
tionem: per quam hæc præsens iustior & lucidior  
reddetur. Hic enim supponimus primam altitudi-  
nem inuentam meridianam non esse.

*Verbi gratia, repetatur altitudo solis 24, graduū, per propositionem antecedentem inuenta: quæritur vtrum ipsa sit ante aut pomeridiana, & sitne meridies præteritus futurusve. Memoratam igitur altitudinem 24, graduum seorsum scribo: & primam appello, postea expecto paululum, & iterum officio astrolabij solis altitudinem inuestigo: quam gratia exempli 25, gradus continere video: hanc priori subexaro, & secundam voco: quæ quia prima maior est, infero primam altitudinem solis fuisse antemeridianam, & tempore primæ observationis solem necdum meridiem procreasse.*

**Proposit. 6. H O R A M A E Q V I N O C T I A -**  
 lem diei artificialis, quam vulgò æqualem dicimus, & eius partem dignoscere.

**P R O** huius propositionis & sequentium intelligentia, scire operæ precium est, astronomos duplicem distinguere diem, naturalem scilicet & artificialem.

*Naturalis dies, tempus est quo semel reuoluitur totus æquinoctialis motu primi mobilis circa terram: cum tanta parte æquinoctialis, quanta correspondet arcui Zodiaci: quem sol interim motu proprio contra primum mobile perambulat. Tempus enim quod consumit sol cum fuerit eius centrum in cir-*  
*culo*

culo meridiano, donec iterum redeat ad eundem meridianum, propriè dicitur dies naturalis, & est spatium 24 horarum: & aggregat hic dies artificiale diem cum nocte tanquam partes eius. Nox enim, ut Servio placuit, pars est diei, intellige naturalis, & non à nocte, sed a parte potiore & meliori, scilicet à lumine dies nominatur, unde vsus obtinuit, ut sine noctis commemoratione dierum numerus explicetur.

Et est dictus naturalis, quia non diversificatur in diversis habitationibus, imò in omnibus partibus terræ habitabilis est sensibiliter æqualis, non autem dies artificialis, de qua iam dicetur.

Huius diei principium alij esse volunt à media nocte, ut Romani: alij ut Babylonij, à solis exortu: quidam ab eius occasu, ut Athenienses & Iudæi: alij ut astrologi & Arabes, à meridie. De differentia dierum naturalium, mediocrium & apparentium Ptolemæus libro 3. abundè disputat: ad illum ergo locum, breuitate consulti, lectoris diligentiam remittimus. Dies verò artificialis est latio solis supra horizontem: id est tempus mensurans lationem, id est motum Solis supra horizontem.

Dictus artificialis, quoniam diversus est in diversis partibus terræ habitabilis: sed quia habitatio est quoddam artificiale ab arte procedens & voluntate, est enim voluntarium quod habitetur talis vel

Dies naturalis dicitur

Diei principium.

Differentia dierum naturalium.

Dies artificialis est & dicitur.

*talis locus, quare &c. At latitudo solis sub horizontē te, id est tempus mensurans huiusmodi modum, dicitur nox. Sed quia dies tum naturalis tum artificialis, & nox usitata diuisione in horas partiuntur, contuendum horam esse duplicem, æquinoctialem scilicet & temporalem. Hora æquinoctialis, quam æqualem dicimus, est vigesima quarta pars diei naturalis, scilicet tempus in quo 15, gradus æquinoctialis oriuntur. Dicta hora æquinoctialis, quia per motum æquinoctialis causata.*

*Æqualis (secundum vulgi estimationem) propter regularitatem & æqualitatem motus ipsius æquinoctialis. Dixi secundum vulgi estimationem, quia propter motum quo sol primo motui contranititur, non nihil paucillum 15, gradibus addendum esset, sed quia id parui admodum momenti est, vulgus non reputat: hanc plures vocant solarem, quia per eius motum ipsam deprehendimus.*

*Hora autem temporalis, aut naturalis, inæqualis aut planetæ est 12, pars diei artificialis, similiter & noctis. Horæ temporales aut inæquales ipsius diei artificialis à solis exortu initium sumunt, noctis verò à solis occasu. Hæ sunt horæ quibus prisca utebantur, qui dies quoscunque & etiam noctes in duodenas horas distribuiebant. Et quia eas horas ex dominio & regimine planetarum quo hæc inferiora regere & disponere dixerunt, distinguebant,*

Nox.

Hora æquinoctialis est & dicitur.

Hora temporalis, naturalis, inæqualis aut planetæ est.



bant, ipsas naturales temporales & planetarum appellabant. Quas hodie inæquales dicimus: quoniam dies artificiales non semper adinuicem æquatur: immò quasi semper sunt inæquales adinuicem & cū noctibus: ideo sequitur quòd horæ vnius diei non æquantur horis alterius, neque horis noctis, immò diei longioris horæ sunt maiores, & breuioris breuiiores, & in alio loco maiores quàm in alio, cum pars determinata totius maioris maior sit, & minoris minor. Non igitur dicta est inæqualis huiusmodi hora comparata ad horas eiusdem diei, quia hæ omnes sunt æquales scilicet duodecima pars: sed respectu horarum alterius diei. &c. Bis autem in anno horæ inæquales & æquales sunt pares, aliàs nunquam: scilicet quando sol principiū Arietis & Libræ possidet. Præterea hora æqualis in 60, particulas frangitur, & vna dicitur minutum, & Minutum rursus minutū in 60, particulas diuiditur, & vna vocatur secundū: & vnum secundū in 60, partitur Secundum tertia. et sic in infinitum per sexagenariā diuisione Tertiū, &c. proceditur. His præambulis generalibus expositis, ad rem nostræ propositionis properemus. Ad diē Modus inuentionis horæ æqualis. oblatum, verū gradum solis per secundā huius addisce, quo in Zodiaco Retis explorato, ipsum aut nota materiali aut mentali signabis. Per quartam autem huius observa solis altitudinem: quam aut ante aut pomeridianam dici per quintā huius cognosces.

Eleua ergo gradum solis in reti signatum super tan-  
 tam altitudinem inter almicantarath, quanta est al-  
 titudo solis in dorso Astrolabij reperta. Et hoc ab-  
 solue in parte orientali Astrolabij, si altitudo est an-  
 temeridiana: aut in parte occidentali, si fuerit pome-  
 ridiana. Quo facto, reti stante inuariato, iunge Al-  
 muri per lineam fiduciae gradui solari, & summitas  
 eiusdem Almuri in circulis horariis limbi hora e-  
 qualem & eius partem si quam habuerit, tibi in-  
 promptu indicabit. quam antemeridianam pronun-  
 ciabis, si sumpta altitudo meridiem praecesserit: aut  
 pomeridianam, si altitudo Solis post meridiem rece-  
 pta fuerit. Quod si Almuri super lineam horariam  
 in Astrolabio descriptam praecise ceciderit, adie-  
 ctus numerus paret tibi horam, quam totam abiisse  
 & completam praedicabis, & sequentis horae instat  
 principium. Sin Almuri super spatium inter duas  
 lineas horarias contentum ceciderit, scito horam hanc  
 cuius spatium Almuri occupat, esse incompletam &  
 fluentem, certamque eius partem fluxisse. Et cum  
 scire optaueris quanta pars ipsius sit elapsa, supputa  
 gradus limbi a linea horae completae, & praeteritae  
 usque ad lineam fidei ipsius Almuri, & cuilibet gra-  
 duum supputato, da quatuor minuta temporis, & mox  
 cognosces, quanta pars currentis horae sit transacta.

Exemplum

EXEMPLVM huic propositioni tale subiungen-  
 dum est. Resumatur per secundam huius verus so-  
 lis lo-

lis locus in 5, gradu & 29, minuto Piscium reper-  
tus, quem in Zodiaco retis quæro, & facio notam  
in linea ecliptica post quintum gradum Piscium,  
ferè in medio sexti gradus. Repeto etiam per quar-  
tam huius altitudinem solis 24, graduum, quam per  
quintam antemeridianam esse didici. Computo igitur  
24, gradus altitudinis in parte orientali astrola-  
bij in ipsis almicantharath, inchoando à primo, &  
ascendendo versus meridiem vsque in 24, almican-  
tharath, in quo terminatur memorata altitudo. Quo  
diligenter considerato, eidem (scilicet 24, gradui  
almicantharath) iungo secundum omnem præcisio-  
nem, verum locum solis in reti notatum, & reti im-  
moto, Almuri gradui solis applico, & secundum  
contactum ipsius limbi video horam nonam an-  
temeridianam completam, & omnino transisse, ip-  
sumque almuri occupare decimam fluentem. Nume-  
ro præterea gradus limbi à linea horæ nonæ comple-  
tæ vsque ad contactum Almuri, & inuenio 8, gra-  
dus & pene mediū. Do cuilibet gradui quatuor mi-  
nuta temporis, quod multiplicando absoluo, & se-  
migradi 2. minuta: colligo 36, minuta, quæ de hora  
decima transierunt, scilicet horam mediam & sex  
minuta. Habeo igitur horam æquinoctialem aut æ-  
qualem & eius partem, quod fuit cupitum.

Hic tamen non est silentio prætereundum, quod  
in astrolabiis, quæ supra solipartia nominauimus,

Propositio-  
ne. 4. primæ  
partis.

in quibus omnia almicantarath scilicet 90, sunt in-  
 scripta, singulis gradibus altitudinum seruiencia,  
 nulla penitus est in locatione gradus solis vel stellæ  
 super suam altitudinem difficultas. Simile ferè in  
 astrolabiis bipartiis, vbi quodlibet spatium duobus  
 almicantarath interceptum, duobus seruit gradibus.  
 Ibi enim per solam æstimationem, cum nonnunquam  
 altitudo inter duo almicantarath ceciderit, eandem  
 facilè aptabis gradui solis aut stellæ. In tripartiis ve-  
 rò & quinqpartiiis maior est operationis difficultas,  
 si saltem omnimoda te delectat præcisio. Quando  
 enim (vt fit sepius) altitudo non cadit præcise su-  
 per Almicantarath, sed in spatium super medium,  
 & dubitas in quota parte spatij altitudo tua sit lo-  
 canda, tunc volue gradum solis ad principium præ-  
 cedentis almicantarath, & nota gradum contactus  
 Almuri in limbo: deinde promoue gradum solis su-  
 per sequens almicantarath, & iterum nota locum  
 almuri in limbo, & gradus limbi inter primam et  
 secundam notas contentos, multiplica per gradus al-  
 titudinis tibi dubios: & productum diuide per tot  
 gradus, quot valet spatium inter duo almicantarath  
 comprehensum: vt si valet tres, per tres: si quinque,  
 per quinque. & habes in quotiente gradus: & si fa-  
 cta diuisione aliquid fuerit residuum, illud multi-  
 plica per 60, & diuide per id, per quod prius diui-  
 sisti, & habes in quotiente minuta. Quo facto, vol-

ue Almuri à prima nota in limbo signata per tot gradus & minuta, quot exierunt in numero quotiente: & applicato gradu solis, stabit ipse præcise in sua altitudine.

**ALTITVDINEM SOLIS ME-** Proposit. 2  
ridianam, per quam meridiem cognoscimus, notam fieri.

**P**LVRES huius rei cognoscendæ modos accepimus. Quorum primus est generalis in hanc <sup>Primus modus.</sup> formam: duabus ferè horis ante meridiem Solis altitudinem per astrolabium observa: & eius scribe numerum, & post paululum rursus observa: crescentemque altitudinem scribe. & id crebro facito, quoad videris altitudinem pauxillo quopiam decrescere. Ex scriptis igitur altitudinibus, hæc elice quæ omnibus maior est: quam altitudinem meridianam solari gradui eiusdem diei congruentem rectè pronuntiabis.

Huius rei gratia sit sol proposito die, puta 5, <sup>Exemplum</sup> Martij in 24, gradus Piscium: Capió Solis altitudines: primò ante horam II, & inuenio 36, gradus: deinde post II, offendo 37, & postea 38, & rursus 39, demum 38, decrescentem: dico igitur 39, gradus esse altitudinem solarem meridianam pro-

posito gradui solis. Plerique altitudinē solis meridiana inītiū recessionis ipsius nominant, & haud absurdè: nam hoc epitomate solē pro eo gradu quem occupat, non altius Zenith capitis nostrī adire, verū iamiam declinare, & ab eo per altitudinis minoramentum & defectionem, in occidentem ferri significare volunt.

Secundus  
modus.

Secundus modus talis est. Inuenta lineā meridiana in plano ad æquidistantiam horizontis posito: infige stilum teretem orthogonaliter erectum, & cū vmbra stili lineā meridiana copulari videris, illico per instrumentum altitudinem solis observa, quæ rite numerata, eius meridiana altitudinem pro gradu signi, in quo sol optato die moratur indicat. Missam facimus hīc inventionem lineā meridiana, cū alibi de ea retractetur, & quidem abundè satis, ne ampliādi libri potius, quàm res vtilis tradendi gratiā calamum versasse videamur.

Tertius mo-  
dus.

Tertius dehinc modus hoc pacto absolvitur. Gradum solis diei oblato in reti notatum, pone super lineam meridiem in facie astrolabij, & altitudo à primo almīcantarath vsque in gradum solis supputata, altitudinem solis meridiana pandet. Et quandocunque inueneris hanc altitudinem in dorso astrolabij, tunc erit verus meridiem illius diei:

verūm

verum hic modus particularis est, seruiens duntaxat pro ea habitatione & poli elevatione, ad quam mater astrolabij aut tabula regionis fabricata est: quod si non vis falli, id sedulo notabis.

Quartus modus huiusmodi negotium officio <sup>Quartus mo-</sup> <sub>du.</sub> tabulae absoluit, hac lege. Cum vero motu solis diei propositi, tabulam altitudinum solis meridianarum ingredi, querendo signum solis aut in capite aut pede ipsius tabulae. Signo in capite inuen-  
to, gradum solis in linea numeri graduum prima lateris sinistri, a capite tabulae ad pedem ipsius descendendo investiga: & in communi angulo signi & gradus offendet altitudinem solis meridianam.

Quod si signum solis in pede tabulae repertum fuerit, gradum eius in vltima linea numeri graduum lateris dextri, a pede ad caput tabulae scandendo recipe: & in communi linearum concursu solis meridianae altitudo apparebit.

Quod si nonnunquam motui solis minuta quaequam adhaerint, duplici introitu agendum est: scilicet differentia elicienda, & pars proportionalis secundum proportionem minorum iuxta integros gradus ad 60, minuta sumenda, & tandem addenda vel reiicienda, prout hoc negotium postulat: & quemadmodum in aliis tabularum operibus fieri

solet. Quod qui prius non didicerit quam astrola-  
bij vsus aggreditur, ineptus doctrinae nostrae cense-  
bitur auditor.

**Exemplum**

Repeto gratia exempli verum motum solis iam  
suprà oblatum, scilicet 24, gradum Piscium, quero  
signum Piscium in capite tabulae, & 24, gradum  
in linea prima laterali sinistrorsum, & in commu-  
ni angulo signi & graduum inuenio 38, gradus,  
& 57, minuta, altitudinem solis meridianam præ-  
cisam, pro altitudine poli arctici in capite ipsius ta-  
bulae expressa.

TABVLA ALT.







TEMPORE NUBILO ALTI- Proposit. 3.  
tudinem solis prope verum determinare.

**N**ON NVNQVAM propter nubium densitatem, aut nebularum interpositionem, sol latet & obumbratur, corpore eius paulum apparente, ita tamē, quod perfectos & plenos radios nobis denegat. Quod si tunc solis altitudinem observare voveris: suspede astrolabium supra oculum, ita quod eius latus versus solem vergat, & Alhidadam soli obiectam vltro citroque circumagito, quod vnius oculi visus per maiora tabellarum foramina in medium aut centrum apparentis solis dirigatur: & contactus Alhidadae in quarta altitudinis solis elevationem supra horizontem aut altitudinem manifestabit, quam per quintam huius, ante aut pomeridianam esse addisces, cum qua non aliter operare, ac si radiantem solem habuisses. Nullo hinc exemplo opus esse reor, propter facilitatem propositionis, praecipue si antecedentium propositionum diligentem rationem accepisti.

NOCTVRNO TEMPOR E Proposit. 2.  
stellarum caelo haerentium altitudi-  
nes facile numerare.

**D**E DIVRNA altitudine aut sublimitate haetenus, de nocturna hinc dicere aggredie-

mur. Descriptæ sunt in reti nonnullæ stellæ cœlo hærentes clariiores & fulgentiores, quas vulgò firmas aut fixas nominamus. Expedi igitur altitudinem noctu capere, volenti inspicere vnam positarum stellarum in aranea, vt Aldebaran, id est oculum Tauri, cor Leonis, spicam, Cor Scorpij, aut aliam supra terram apparētem hoc modo. In sublime atolle instrumentum, ipsum supra tuum ponendo oculum, & latus ipsius ad perfectam stellam quàm maximè fieri potuerit dirige: deinde oculum inferiori pinnulæ Alhidada subiiciendo, ipsam sensim sursum deorsumque torqueas, quoad oculi radius per foramen maius inferioris pinnulæ immissus, foramini maiori superioris coaptetur, per vtrunque pariter foramen perspiciat, perspicendo igitur stellam, partē considera, in quam Alhidada linea fiduciæ decidit: quota sit ab horizonte (sicut supra de sole docuimus) & hanc nota, ac stellæ altitudinem vocato meridianam, aut ante, aut pomeridianā, vt supra de sole præcepimus. Hic sanè opus est diligentia, vt altero duntaxat oculo stellā spectes altero clauso: & vt apertum oculū maioribus tabellarū foraminibus aptes. Ob hanc causam in qualibet tabella duo ponuntur foramina, vnū maius propter stellas fixas, quæ radios fortes non habēt: & aliud minus propter Solē.

Propositio  
ne. 5.

Infra Pro-  
positiōe 43

De stellis fixis cognoscendis deinceps per propriam propositionem abunde dicemus.

Præterea

Præterea stellis erraticis aut planetis noctu supra horizontem apparentibus, nostra hæc propositio facilimè aptari potest. Exempla per temetipsum si nõ penitus habes es, facile potes constituere.

**HORAM AEQVALEM NO-** Proposi. 10.  
**ETURNO tempore artificiose cognoscere.**

**SICUT** per solarem altitudinem diurnæ inueniuntur horæ, sic per stellarum fixarum nocturnæ eliciuntur. Nocte igitur serena, notæ stellæ inerraticæ, in reti positæ altitudinem: & quam cœli partem possideant animaduerte: eandemque altitudinem inter almicantharath supputa in ea parte in qua rationem stellæ habuisti, hoc est in parte orientali, si stella ante lineam meridianam inuenta fuerit, aut occidentali, si post: aut in linea meridiana, si præcise meridiem tenuerit: & fini supputatæ altitudinis caput eiusdem stellæ superpone, hoc est, verte aut circumuolue rete donec acumẽ stellæ termino numeratæ altitudinis adamsim iunxeris: & reti immoto applica Almuri vero loco Solis, et mox summitas eius in gradibus marginis aut limbi horam æqualem nocturnam & eius partem indicat. Quam ante noctis medium aut intempestam pronunciabis: si solaris gradus ante angulum terræ inuentus fuerit, aut post medium no-

*Etis: si post angulum repertus fuerit.*

**Exemplum**

*Proposita propositioni breue hoc accommodabitur exemplum. Offertur mihi stella regia, quæ dicitur cor Leonis, quam nocturno tempore supra horizontem antemeridianam partem possidere cerno: capio eius altitudinem, quæ sit gratia exempli 48, graduum: qua ab horizonte exortiuo numerata, iungo per circumactionem retis acutiem memoratæ stellæ circulo almicantarath, qui numero 48, insignitur, & in quem numeratio altitudinis finitur: deinde suppono Solem 24, gradum Piscium possidere: adiicio ergo Almuri solari gradui in Reti notato, cuius summitas indicat mihi in limbo horam octauam æqualem, quæ noctis est, & currentis nonæ minuta quasi 2, transisse: ecce nostræ propositionis clarum exemplum. Haud dissimilis est operatio per stellas erraticas, id est, planetas: sumptis (pro oblato tempore) loco vero & latitudine alicuius planetæ ex ephemeride aut aliunde: quibus in Zodiaco retis signatis vices propemodum stellæ fixæ supplebit. Sed de eare alibi latius tractabitur.*

**TEMPVS, ORTVS, ET OCCASVS** Solis paucis absoluere.

**Proposit. II.**

**GRADVM** Solis in Reti notatum, diei oblato, pone super primum almicantarath ex parte orientis: & applicatum Almuri, ostendet tibi in  
limbo

limbo tempus ortus Solis, scilicet qua hora & quibus minutis perficiatur. Deinde circumactō Reti, gradum solis ad almicantarath extremum occidentale siste, et Almuri in contextu horarū equalium tempus occasus Solis manifestabit. Exemplum breue. Exemplum

Quinta die mensis Martij ponatur verus locus Solis in Piscibus, 24. gradu, apto 24, gradū Piscium ad primum Almicantarath orientale, hoc est ad Horizontem exortiuum, & adiectum Almuri, indicat in margine solem post horam sextam æqualem II, ferè minutis exoriri. Et voluto Reti, iūgo gradū solis primo Almicantarath in occiduo, hoc est Horizonti occidentali, et addito Almuri video in limbo solem occidere post horā quintā, minutis quasi 49.

Animaduerte tamen, quòd cognito ortu Solis per præsentem propositionem, si distantiam eius à meridie cõputaueris, ipsam occasum solis rite numerare.

Adiuumento huius propositionis (si celeriore computationem desideras) fac tabulam ortuum et occasuum Solis, tuæ habitationi propriam, inchoando ab initio signi Arietis, transeundo per omnia signa, & gradus eorundem.

### ARCVM DIURNVM ET

Proposit. 12.

nocturnum solis, quantitatem diei artificialis & noctis inquirere.

**N**OTANDVM quòd arcus diurnus Solis aut orbis diei, est arcus A Equinoctialis, peror-

Arcus diurnus.

Arcus nocturnus.

tus eo tempore, quo Sol motu primi mobilis mouetur ab initio ortus, vsque ad eius occasum. Arcus verò nocturnus vel orbis noctis, est arcus æquinoctialis per ortus eo tempore, quo Sol mouetur ab occasu vsque ad ipsius ortum. Quos hoc pacto inuenies. Superposito gradu Solis, primo Almicantarath in parte orientali, locum Almuri solari gradui iuncti in gradibus limbi diligenter signa, postea moue gradum Solis cum Reti per meridiem vsque ad postremum Almicantarath occidentale, & iuncto Almuri, iterum eius locum in limbo signo affice: quo facto, computa gradus limbi (impresentiarum officium A Equatoris tenentes) à prima signatura secundum motum Retis et gradus Solis in secundam, & habebis arcum Solis diurnum. Quem si à 360. gradibus subtraxeris, nocturnus arcus Solis restabit. Arcus enim diurnus & nocturnus aggregati, semper totum æquatorem, id est 360. gradus faciunt.

De quãtitate aut lógitudine diei artificialis.

His habitis, si quolibet die scire optaueris quantitatẽ aut longitudinem diei artificialis, id est, ex quot horis æquinoctialibus aut æqualibus et earundem fractionibus, huiusmodi constet dies, diuide arcum illius diei per 15. & in numero quotiente habebis numerum horarum æqualium: & si aliquid fuerit residuũ, multiplica per quatuor, et habebis minuta horæ, et sic colliges quantitatẽ diei artificialis. Similiter si libet procede cũ arcu noctis, diuidẽdo eũ

per



per 15. et videbis in quotiēte horas noctis, et cū residuo, fac vt prius. Aut subtrahere lōgitudinē diei à 24. horis, et prodibit quātitas noctis. Sēper enī horæ diurnæ et nocturnæ simul aggregatæ, 24. horas, id est diem naturalē constituunt. Longitudo tamen diei et noctis ex hoc nostro instrumēto aliter hoc modo colligetur. Stante gradu Solis, vt prædiximus, in Horizonte orientali, fac signaturam ad situm ipsius Almuri in circulis horarum æqualium limbi: reuolutoque gradu Solis ad Horizontem occidentalem, denuo signaturam in limbo iuxta Almuri pinge: numerato itaq; tēpore, quod his signaturis intercipitur, per meridiem gradiendo indubitata longitudo diei artificialis congregabis: qua à 24. horis dempta, noctis quantitas facile constabit.

Aut aliter et facilius longitudo diei addiscitur. Tempus occasus Solis propositi diei (quod à meridie numeratur) per præcedentē inuestiga, quod duplatum, longitudo eiusdem diei manifestat.

Resumantur gratia exempli 5. dies Martij, & lo Exemplum  
 cus Solis in 24. gradu Piscium. Pono 24. Piscium ad Horizontem exortiuum, & facio notam ad situm Almuri in gradibus limbi: postea voluo eundē gradum ad Horizontem occidentalē, et pingo notā in limbo: et numerato arcu à nota in notā per meridiē transeundo, inuenio 175. quasi gradus æquatoris, arcū diurnū solis propositi diei indicātes: quē si à 360.

gradibus subtraxero, elicio arcum nocturnum 185. graduum. Item si arcum diurnum per 15. diuisero, habeo in quotiente 11. horas, & in residuo sunt 10. ferè gradus, qui dant mihi 40. quasi minuta. Colligo igitur diem artificialem 11. horarũ 40. penè minutorum: et per subtractionem à 24. horis, cerno noctis quantitatem scilicet 12. horas et 20. minuta. Cætera omnia sunt facilime cõputationis, quare transeo.

Proposit. 13.

INITIVM, FINEM, ET DV-  
rationem crepusculi matutini & vesper-  
tini perscrutari.

**H**IVS negotij veritas duabus viis acquiritur. Quarũ prima, quæ certior apparet per 18. Almicantarath operatur, hoc modo: Nadair solis copulat quàm rectissime 18. Almicantarath ex parte occidentis, & emittit Almuri ex gradu Solis in limbum, quod in circulis horarum æqualium mox indicat principium crepusculi matutini, quod aurorã aut diluculum nuncupamus: quia tunc primũ aër propter solarium radiorum aduectionem splendescere incipit, & fit ante Solis ortum, & in eodẽ se terminat. Tempus enim quod his terminis scilicet initio & fini intercipitur, crepusculum matutinum vocatur. Crepusculum, quia tempus mediũ inter diem clarum & noctem obscurã, quasi crepera, id est du-  
bis

bia lux. Deinde hæc via iungit Nadair Solis 18. Almicantarath ex parte orientis, & Almuri à gradu Solis porrectū in margine finem crepusculi vespertini, id est defectum apparitionis Solarium radiorum, & perfectæ noctis præsentiam manifestat, cuius initiū à solis occiduo metitur. Quicquid igitur temporis initio & fini dicti crepusculi interponitur, haud ineptè crepusculū vespertinū appellatur.

Secūda via negotiū præsens per lineas crepusculinas astrolabio inscriptas, absoluit taliter. Gradū solis iungit lineæ crepusculinæ orientali, & applicat Almuri, quod in limbo principium crepusculi matutini pandit. Præterea eundem gradū adiungit crepusculinæ occidentali, & ostendit Almuri in limbo finem crepusculi vespertini: quorum initia, fines & durationes determinantur, quemadmodū in prima via expositum est. Vtrūque autem crepusculū secundum Astronomos adnumeratur nocti, secundum vulgū verò diei. Si scire volueris vicinitatē initij crepusculi matutini aut auroræ, accipe altitudinem alicuius stellæ in Reti descriptæ: & caput eiusdem stellæ superpone altitudini in ipsis Almicantarath numeratæ in plaga sua, & considera secundum primam viam ubi sit Nadair Solis: si enim in 18. Almicantarath ceciderit ex parte occidentis, ecce aurora aut initium crepusculi matutini: aut si gradus solis secundum secundam viam, lineam cre-

pusculinam orientalem adierit, iterum aurora. De cæteris simile sume iudicium de propinquitate finis crepusculi vespertini.

**Exemplum**

**PRIMAE** via hanc exemplarē sume computationem. Repeto quintum diem Martij, & verū locum solis, scilicet 24. gradum Piscium: pro eo die initiū crepusculi matutini aut auroræ hac lege determino. Nadair Solis, id est 24. gradum Virginis superpono 18. Almicantarath, in occidente: Almuri autem applico gradui solari scilicet 24. Piscium, quod in margine ostendit mihi principiū crepusculi matutini aut auroræ: mane post quartam horam 20. fere minutis. Tempus autem numeratum à principio huius crepusculi vsque in exortū solis (qui per vndecimā huius repertus, accidit horæ 6. minuto 11.) est 1. hora, 51. minuta, duratio crepusculi matutini. Item memoratum Nadair scilicet 24. gradum Virginis, iungo 18. Almicantarath in oriente: & Almuri per gradum solis transiens indicat mihi finem crepusculi vespertini post horā 7. minutis quasi 40. Tempus ab occasu Solis (qui per vndecimā supra: est post quintā horam 49. minutis) in finē huius crepusculi supputatum est 1. hora 51. minuta mensurās quātitatē crepusculi vespertini. Hic lector notabis, quod tēpus initij crepusculi matutini (quod semper à media nocte cōputatur) à tempore ortus Solis subtractū, durationē crepusculi matutini pādit. *Secundò*

cundò quòd tempus durationis crepusculi matutini æquale est tēpori durationis crepusculi vespertini, ergo vno habito, habetur et reliquum, nisi quid pauxilla diuersitatis variatio motus Solis ingerat. Tertiò quod quantũ distat principiũ crepusculi matutini à meridie, tantum distat vespertinũ post meridiẽ ab ipso meridiẽ. Exemplum secũdæ viæ per suprã expositũ facile liquere potest: ac cætera omnia sunt facilis computationis: quare omitto & supersedeo.

**HORAS AEQVALES AB OR-** Proposi. 14.  
**tu Solis interdiu, & ab occasu eiusdem**  
**noctu, breuiter computare.**

**SI QVQVIS** die artificiali scire optaueris quot horæ æquales ab ortu solis vsque ad horam tuæ considerationis transierũt, pone gradum in quo est sol, die oblato: super æqualem altitudinem inter *Almicatarath* ex parte orientis vel occidētis, qualem inuenisti in dorso *Astrolabij*: et signa locũ *Almuri* in gradibus limbi: deinde volue retro gradum Solis ad *Horizontem exortiuum*, et iterum nota locum *Almuri* in gradibus limbi: postea à prima nota in secundam, secundum motum *Almuri*, numera tempus in limbo, & colliges horas & minutas ab exortu Solis transactas. Haud dissimiliter operare pro horis noctis æqualibus ab occiduo Solis transactis dignoscendis: capiendo horam æqualem

per decimam huius: signādo locum *Almuri*, red-  
cendóque gradum Solis ad Horizontē occidenta-  
lem, & iterū signando locum *Almuri* in margine.

Numerato enim tēpore his notis in limbo inter-  
cepto, habebis horas & minuta ab occasu solis.

**Exemplum**

In exemplo facile intelliges, sit vt antea poneba-  
tur, Sol 5. die Martij in 24. gradu Piscium. Obseruo  
altitudinē solis post meridiē, et inuenio gratia exem-  
pli 26. gradus: quibus in *Almicatarath* numeratis,  
iungo 24. gradū Piscium, et ostendit mihi *Almuri*  
in limbo, tertiā horam pomeridianā. Facio ibidē no-  
tam, et regiro gradū solis ad horizontem orientalē, et  
iterum imprimo notā in limbo ad præsentiā ipsius  
*Almuri*, quod tāgit limbum post sextā 11. quasi mi-  
nutis. Supputo igitur tempus à prima nota in secur-  
dam, et reperio 8. horas, et 49. minuta: trāsierunt igitur  
ab ortu solari 8. horæ, & 49. minuta ipsius diei  
artificialis. Nō aliter exēplificabis de nocte per ho-  
ram equalē officio stellæ inuentā, et per occasum So-  
lis. Harum rerum certior et facilior est inuentio:  
præambulis nōnullis adhibitis. Per sextam nāque  
et decimā propositiones antecedētes, facile infertur,  
nos initium supputationis horarum equalium, aut à  
media nocte, aut à meridie fecisse. Inducti forsam  
cōsuetudine natalis soli, vbi horaria etiā fabрили ar-  
te confecta (dicta horaria media secundum cursum  
duodecim horarū) signāt horas, principiū numera-  
tionis,

tionis, aut à medio noctis, aut à meridie sumendo.

Præterea tempus ortus Solis per II. repertū à media nocte (vt fit) computatū, tempus seminocturnū dicitur, quia duplicatū, vniuersaliter tempus quantitatis noctis indicat. Tēpus verò occasus Solis per eandem elicitū, à meridie numeratū, tempus semidiurnum nominatur: quia duplatū, vt prædiximus, longitudinem diei artificialis constituit. Ceterum plura oppida etiam Germaniæ, præcipue Norinbergium, horas diurnas ab ortu Solis, & nocturnas ab occasu supputant. His expositis, horas diurnas, ab exortu Solis principium numerationis statuēdo, hoc modo cognosces. Per sextam huius addisce horā solarē, quæ apud Sueuos, vt in primo præābulo docuimus, à media nocte vel à meridie computatur. Per II, autem elicias tempus ortus Solis, quod per secundum præambulū iuste tempus seminocturnū appellatur. Subtrahere igitur tempus seminocturnū ab horis Solis diurnis à medio noctis numeratis: à meridie verò incipientium subtrahere idem tempus seminocturnū 12. superadditis horis: & habes tempus ab ortu Solis in horis & minutis transactum, secundum signaturam horologij Norinbergensis, vt in tertio præābulo notauimus. Nocturnas autem horas ab occasu Solis numeratas, sic absolues. Per decimam huius observa horā noctis, quæ aut à meridie, aut à media nocte calculatur, per vndecimā disce tēpus

Reductio  
horarum no-  
strarum ad  
horas No-  
rinbergen-  
sium.

semidiurnū, quod occasus Solis pandit. Dempto igitur tēpore semidiurno ab horis nocturnis à meridie supputatis, aut à medio noctis incipiētū cū additamento 12. horarū, prodibit tempus nocturnū in horis & minutis ab occasu Solis cōputatū, secundū indicationē horologij Norinbergensis: et hoc pacto horas nostras facile traduces in horas Norinbergēsū. Re-  
*empla* petatur verbi gratia quītus dies Martij, cuius ortus Solis fuit 6. hora, minuto 11. dictus, tempus seminocturnū: Occasus hora 5. minuta 49. nominatus tempus semidiurnū: proponitur per sextā huius, hora 11. diurna à media nocte numerata: subtrahō tēpus seminocturnū ab 11. horis, et remanēt 4. horæ 49. minuta, tēpus ab ortu Solis transactum: indicat igitur horariū Norinbergēse 4. horam diei artificialis esse completam, & de quinta hora 49. minuta fluxisse.

Pro nocturna hora hoc sūme exēplū. Sit hora secūda post noctis mediū nobis cognita, addo 12. et colligo 14. horas, à quibus surripio tempus semidiurnū supra repertum, & residuo 8. horas 11. minuta: tempus nocturnum ab occasu Solis lapsum, quod etiā horologium Norinbergēsū signat. Conuerso autem modo cognitīs horis diurnis ab ortu, aut nocturnis ab occasu Solis supputatis, si eas in horas nostras reducere cupis, horis ab ortu numeratis, adde tēpus seminocturnum: ab occasu semidiurnum: et facta additione, si numerus horarum, duodenarium excesserit,

De redu-  
 ctione ho-  
 rarum No-  
 rinbergen-  
 sium ad no-  
 stras.



vit, reijce duodecim, & residuum, horas tibi cognit-  
tas ostendet: diurnas post meridiem, nocturnas post  
medium noctis numerandas. Si autem facta addi-  
tione, horæ duodenarium non excesserint, diurnas à  
medio noctis, nocturnas à meridie computabis. Ex-  
empla sunt facilime computationis, quare transeo.

## HORAS A MEDIA NOCTE Proposit. 15.

aut meridie exordiētes, reducere in horas  
ab ortu Solis incipientes, & expansim in  
24. sese terminantes.

**P**lerisque mos est ab ortu Solis horas, ab vna si-  
ne numeri interruptione in 24. computare. Me-  
chanica etiā horologia huiuscemodi horas indican-  
tia (qualia sunt in Bohemia) horologia integra, aut  
decursu 24. horarum appellantur. Si igitur ad or-  
tum Solis horas redigere, & quota sit hora equalis  
secundum cursum horarij de 24. horis scire volueris,  
detrahe tempus seminocturnū ab horis à media no-  
cte incipientibus, cum supplemento 24. horarū, si a-  
lioqui detractio fieri non possit, à meridie verò ex-  
ordientibus, deme tempus seminocturnum 12. su-  
peradditis horis: sic enim relinquetur numerus ho-  
rarum ab ortu Solis numerandarum. In exemplis

**Exemplum**

resumatur tempus seminocturnum pro quinta die  
Martij, scilicet 6. horæ 11. minuta, & semidiur-  
num, scilicet 5. horæ 49. minuta. Obijcitur mihi

L ij

hora quarta cognita à medio nocte oblata diei numerata: iubeor inuenire horã ab ortu Solis cõputatã: sed quia tempus seminocturnũ scilicet 6, horas et 11. minuta à 4. horis detrabere nõ possũ, ideo adde eis 24. et colligo horas 28. detractõ igitur tẽpore seminocturno, habeo in residuo 21. horas, et 49. minuta: tempus ab ortu Solis diei præteriti in oblatũ vsque diem numerandum. Præterea offertur mihi hora quinta propositi diei à meridie cõputata, et præcipior elicere horã ab ortu, adiũgo 5. horis 12. et habeo 17. horas: à quibus reijcio tempus seminocturnũ: remanẽt 10. horæ 49. minuta, tẽpus ab exortu Solis supputatum.

Conuersa huius propositionis hæc est: horis ab ortu Solis oblatis, adde tẽpus seminocturnũ: quæ si ultra 24. horas creuerint, depone 24, et residuum indicabit tibi horas à medio noctis numerãdas. Si autem duntaxat 24. horas facta additione collegeris, etiam si adhæserint minuta, remoue 12, & habebis horam 12. mediæ noctis completam. Si verò post additionem tẽporis seminocturni, collectæ horæ 12, excesserint, deme 12. & reliquũ horas post meridiem pandet. Si præcise 12. collegeris horas, minuta non cura, si non constituunt horam: habebis horam duodecimam meridianam. Si tandem post factam additionem seminocturni temporis, horas 12. minores congregesseris, has à medio noctis supputabis: propter facilitatem non reor opus esse exemplis.

HORAS A MEDIA NOCTE Proposit. 16.

aut meridie exorsas, traducere in horas ab occiduo Solis initium computationis sumentes, & in 24. sese finientes.

**P**LVRES ab occasu Solis initiū supputationis horarum equaliū sumunt, et vsque in 24. numerationem terminant: quod facile horaria solaria & fabrilia ex metallo rotis dentatis cōposita, indicant.

Ad occasum igitur hoc modo rediges horas. Subtrahere tempus semidiurnū ex numero horarū à meridie incipientiū, superadditis 24. horis, si aliàs subtractio fieri nequeat. Si verò à media nocte fuerint cōputatæ, deme tempus semidiurnū 12. horis superadiunctis: sic enim relinquetur numerus horarū à principio noctis computandarū. **EXEMPLA** bre Exemplum

uia 5, Martij semidiurnū tempus est 5. horæ 49. minuta: offertur mihi hora 4. pomeridiana cōuertēda in tempus à Solis occiduo inchoatū: sed quia semidiurnum subtrahere à 4. nequeo, addo 24. horas, & colligo 28. à quibus subtraho tempus semidiurnū: et residuo 33. horas, 11. minuta: tempus ab occasu Solis diei præteritæ numerandum respondens horæ quartæ propositæ. Item obijcitur mihi hora cognita scilicet, 7. post mediū noctis, traducenda ad occasum, superaddo 12. & habeo 19. à quibus deme semidiurnum, & remanent 14. horæ 11. minuta, tempus à principio noctis numerandum: ecce reductionem.

*Possẽm huic propositioni adiungere conuersam: quam tamen propter facilitatem missam facio.*

**Propos. 17. HORAS ASTRONOMORVM**  
breui calculo in nostras & contrà redigere.

**C**onsequens reor demonstrare horarum computationẽ, qua astronomi in supputandis deliquijs, coniunctionibus, oppositionibus, planctarum aspectibus, & cæteris huiuscemodi rebus vtuntur. Numerant etenim astronomi horas suas à meridie exordientes, & easdem in 24. ad meridiem sequẽtis diei finientes. In horis igitur pomeridianis nostris vulgaribus, et astronomorum vsque in mediam noctẽ, nulla est numerandi diuersitas: quare nulla opus reductione. Horas autem nostras à medio noctis cæptas, in astronomicas hoc modo reduces. Propositis horis à media nocte numeratis, adde 12. et habes horas à meridie antecedẽti numerandas. Ab horis autem astronomicis propositis duodenarium excedentes, deme 12. & residuabis horas à media nocte computandas. In exemplo offertur genitura alicuius nati: anno Christi 1510. currentes 5. die Martij, mane hora 6. addit astronomus duodecim horas, & reducendo in suas, dicit hanc genituram factã quarta die Martij hora 18. In alio. Anno memorato, futura est oppositio Solis & Lune, 23. die Aprilis, hora 15. minuto 52. secundum astronomos,  
subtraho

**Exemplum**

subtraho 12. horas, et fiet hæc oppositio secundū vulgares 24. die Aprilis, mane post noctis medium hora 3. minuto 52.

**D**IES et noctes, ortus et occasus ipsius anni sibi Proposi. 18.  
 inuicē æquales concludere. Ex quo omnis dies artificialis anni habet aliū sibi in lōgitudine parem: item nox noctē æquabile: ortus ortū, & occasus occasum: quod ex æquali declinatione graduum Zodiaci haud difficiliter demōstrari potest. Si ergo horum æqualitatem scire desideras, recipe duos gradus signiferi æqualiter ab altero solstitiorum distantes, quos cum sol motu suo adierit, dies artificiales et noctes: itē ortus & occasus æquabiles proclamabis: relatiua tamē relatiuis cōparando. Huic propositioni tale exemplū subiungendum est. Exemplum  
 offertur mihi initium primi gradus Geminorū, cui adiumento astrolabij, & per 12. huius, determino quantitatem diei, 15. horarum & 12. minutorum, noctis 8. horarum, 48. minutorum. Per 11. verò offendo ortum Solis 4. hora 24. minuto, occasum 7. hora 36. minuto. His habitis, iubeor explorare gradum Zodiaci proposito gradui in quantitate diei & cæteris expositum respondentem atque parem, cerno primum gradum Geminorum propositum, quantū ad eius principium, distare à solstitio æstiuo, id est, à principio Cancrī 30. gradibus: & ab eodem principium Leonis pari distante trigenorum graduum abesse.

Concludo igitur principia primorum graduū signorum, Geminorum & Leonis æquales obtinere dies, noctes, ortus & occasus: & ex consequitione dies anni, quibus Sol his adierit gradibus in iam memoratis, æqualitatem seruare: quod fuit exponendum.

Proposi. 19.

## TEMPVS ORTVS ET OCCASVS stellarum fixarum paucis explorare.

Ortus stella

Occasus  
stella.

**A** Nimaduertendum erit, & si stellarum ortus et occasus est multifarius, Heliacus scilicet, Cosmicus, Chronicus & Astronomicus, de quibus alibi fusius tractatur. Hic autem Cosmicum à Chronico nō distinguemus. Quare de ortu & occasu largiori quodā modo dicendū erit. Ortus igitur stellæ fit, cū de inferiori hemisphærio ad superius ascendit: & is per diem naturalem semel accidet stellæ. Occasus verò cū à superiori hemisphærio descendit ad inferius. Præterea cū in hac nostra propositione, de tēpore ortus et occasus alicuius stellæ loquimur, hoc de tempore quod per Solē accipimus, lector intelligas: quare id ad horas & minuta Solis referendum est: ac propositio sonaret: Explorare horā aut partem horæ solaris, qua stellæ firmæ orientantur et occidant. Hoc etenim tempus ortus & occasus, admodum diuersum est secundum solis per signa Zodiaci mutationem. Est et alius ortus et occasus stellæ, non ad solem relatus, sed ad ipsam stellā:

sicut

sicut cū alias de hora stellæ, nō Solis mentionem facimus. Imaginare igitur Stellam vices gerere Solis. Tunc si eam Horizonti orientali iunxeris, & per ipsam Almuri duxeris: mox in margine ad situm Almuri stellæ ortum, & ex sequela tempus seminocturnum à media nocte numerandum addices: & si eam occidentali horizonti copulaueris, eius occasum & tempus semidiurnum à meridie computandum deprehendes. De hoc ortu & occasu parumper in sequenti propositione, & plenius ac vtilius in tabulis directionum tractatur.

Ceterum habitantes septentrionem, habent aliquas stellas omnino nunquam orientes & occidentes: quas in quavis hora apparere (nisi lumen solis obstet) necesse est: sicut sunt habitantibus septimum clima: omnes stellæ Arctos minoris & principales Arctos maioris: Draconis, Cephæi, Cassiopeiæ, nonnullis Cygni, Persæi & aurigæ. Omnes enim stellæ araneæ nostri instrumenti, quæ in eius ratione, Horizontem non tangunt, neque exoriuntur, neque occidunt, sed sunt perpetuæ apparitionis. Aliæ verò sunt stellæ orientes & occidentes, vt sunt stellæ signiferi, & aliæ plures. Quæcunque enim stellæ Araneæ sub Horizonte depriuntur, eas oriri & occidere rite concludimus.

Quibus hæc nostra propositio hoc pacto accommodabitur.

Exercitium.

Iunge propositam stellam in reti positam, pro oblato die, Horizonti exortiuo: & ducito Almuri per gradum solis oblato diei, ipsum in cōtactu limbi tempus ortus ipsius stellæ in horis & minutis palam faciet: qua ad horizontem occidentalem traiecta, Almuri solari gradui adhærens, occasum eius aperiet. An autem huiuscemodi ortus & occasus fiat interdiu vel noctu: quia id cognitu facillimū est (præcipuè si ea quæ circa ortum & occasum Solis, & horas diurnas & nocturnas inuestigandas iam dudum monuimus, rectè didicisti) consultò præterimus.

Simili ratione stellarum erraticarum, quando loca eorum æquata in longitudine & latitudine notaueris, tempus ortus atque occasus deprehendes.

Exemplum

In exemplo quinta die Martij habebat Sol 24. gradum Piscium. Volo inuenire ortum & occasum stellæ Aldebaran, quam oculum Tauri nominamus. Pono igitur cacumen stellæ super Horizontem orientalem, & addo Almuri gradui Solis: & dico eam oriri post horam nonam antemeridianam diurnam, minutis penè 12. Eandem etiam applico Horizonti occidentali, & Almuri per gradum Solis veniens, ostendit mihi eius occasum post meridiem, hora 11. nocturna, minuto ferè 33. Non aliter operandum est cum aliis stellis firmis & etiam erraticis.



TEMPVS DIVRNVN ET Propos. 20.

nocturnum stellarum fixarum  
perscrutari.

**T**EMPVS diurnum stelle impresentiarum Tempus di-  
urnum stel-  
lar.  
vocatur tempus, quo ipsa supra Horizontē mo-  
ratur, scilicet tempus quod stella consumit ab eius  
exortu vsque in occasum: siue Sol sit sub, siue supra  
Horizontem. Nocturnū verò dicitur tempus, quo  
stella sub Horizonte mouetur: & cōputatur ab eius  
occasu, in reditum ipsius in Horizontē exortiuum:  
& loquimur de stellis orientibus & labentibus.

Deinde vt in secundo notando præcedentis Tempus no-  
cturnū stel-  
lar.  
propositionis partim docuimus, tempus seminoctur-  
num stelle inuenitur per iunctionem ipsius cum  
Horizonte orientali, & transitum Almuri per ip-  
sam stellam: tempus enim à media nocte ad ta-  
ctum Almuri in limbo computatum, tempus se-  
minocturnum indicat: quod duplatum, quantita-  
tem noctis, id est, moram stelle sub Horizonte  
exponit. Semidiurnum verò tempus, reperitur per  
missionem stelle in Horizontem occiduum, &  
ductionem Almuri per eam: tempus enim à meri-  
die ad cōtactum Almuri in margine numeratum,  
tempus semidiurnum manifestat, quod duplica-  
tum, longitudinem diei, id est, moram ipsius stelle  
supra Horizontem exponit.

Exercitiū.

*His prenotatis, ad rem ipsam veniamus. Oblatam stellam iungito finitori exortiuo: per quam emitte Almuri, & eius tactum in limbo, puncto obsignabis. Post eandem reti voluto, siste in finitorem occidentalem, & iuncto Almuri, denuo limbum puncto signabis: à puncto in punctum per meridiem transeundo numera tempus, & congregabis tempus stellæ diurnum: quod à 24, horis demptum, nocturnum pandit tempus.*

*Idem aliter experieris, & multo vtilius. Elice (secundum doctrinam iamiam expositam) tempus stellæ seminocturnum: quod bis sumptum, tempus nocturnum relinquit. Elice præterea tempus semidiurnum, & id duplatum, tempus diurnum stellæ indicat.*

*Partis primæ exemplum per 12. huius facile addiscitur.*

Exemplū.

*Secundæ verò hoc sume exemplum. Repetatur stella Aldebaran, quam addo Horizonti orientali: & Almuri per ipsam ductum, ostendit mihi tempus seminocturnum, scilicet 4, horæ, & 49, minuta: quod duplicatum, tempus nocturnum ipsius exprimit, scilicet 9, horarum, & 38, minutorum. Item Aldebaran iungo Horizonti occidentali, & per eam Almuri emitto in limbum: quod mihi tempus semidiurnum manifestat, scilicet 7, horas, & 11, minuta, quo duplato, tempus diurnum*  
emerge

emergit 14, horas, & 22, minuta: quod fuit absolue-  
dum. De erraticis stellis simile sume iudicium.

## TEMPORALEM HORAM Proposi. 21.

diei, quam hodie inæqualem nuncu-  
pamus, facile indagare.

**D**E HORIS Aequinoctialibus aut Ae-  
qualibus, quo pacto diu noctuque inueniendæ  
sint, & ad quid eorum cognitio conducatur, satis tra-  
ctauimus. Consequitur, ut iam de horis naturali-  
bus, temporalibus aut inæqualibus dicamus. Nolu-  
mus hîc definire horam temporalem aut inæqua-  
lem: neque causas nominum exponere: cum de his  
rebus in propositione sexta diffusè tractatum sit:  
quare lectorem ad eandem remittimus.

Horam ergo inæqualem diei breui hac lege co-  
gnosces. Per sextam huius, horam æqualem & e-  
ius partem addisce, gradumque solis ipsius araneæ  
fac immobilem durare in hora æquali & eius par-  
te, per tertiam huius accipe nadair Solis: quo in re-  
ti notato, ipsum illico in lineis horarum inæqua-  
lium, horam temporalem diei indicabit: hanc nomi-  
nabis antemeridianam, primam, secundam, tertiam,  
quartam aut quintam. Si horam æqualem diurnam  
ante meridiem obseruasti, aut sextam: si sol in meri-  
die inuentus, duodecimam æqualem signauerit.

De cog-  
nitione hora-  
rum inæqua-  
lium diei.

Septimam verò dices aut octauam, nonam, decimam, undecimam, vel duodecimam: si æqualem diurnam post meridiem obseruasti. Quòd si nadair solis in lineam horariam præcisè ceciderit, completam horam secundum numeri adscriptionem dicit: & sequentem exordiri. Si verò nadair super intercapedinem duarum linearum ceciderit: linea præcedens horam completam & perfectam pandit, sequens autem fluentem & imperfectam.

Exemplum

Huius propositionis tale subiungitur exemplum, Sit Sol proposito die puta 31. Martij in 20. gradu Arietis: iubeor hora nona æquali antemeridiana per sextam supputata, explorare horam inæqualem, pono gradum Solis in reti inuentum, adiuumento ipsius Almuri, in directum propositæ horæ nonæ, & signo Nadair Solis, scilicet 20. gradum Libræ, quod cadit in spatio duarum linearum inæqualiũ horarum, scilicet inter tertiam & quartam. Dico igitur tertiam horam temporalem (quæ in hoc exemplo antemeridiana diurna est) transisse, & quartam fluere atque labi.

Propos. 22.

**H O R A M I N A E Q V A L E M**  
nocturnam breuiter cognoscere.

**P**ER decimam huius disce horam æqualem nocturnam, gradus itaque solis in limbo æqualem

lem horam indicans: idem in lineis horariis temporalibus, inæqualem ostendit, quæ dicitur nocturna prima. 2. 3. 4. aut 5, si æqualis ante medium noctis reperta fuerit: aut sexta, si sol lineam mediæ noctis, duodecimam nuncians accesserit. Septima verò. 8. 9. 10. 11. aut 12. si æqualis hora post noctem mediam observata fuerit.

In summa: horæ temporales diei incipiunt ab ortu solis, & finiunt se in occasum, & inuestigantur per nadair solis. Nocturnæ autem inchoant ab occasu solis, & terminant se in eius exortum, & inquiruntur per gradum solis. Sunt enim tam diei artificialis quàm noctis 12. horæ temporales, non plures nec pauciores.

In exemplo resumatur locus solis, scilicet 20. gradus Arietis, propositionis antecedentis, & offertur mihi hora 2. æqualis post medium noctis, præcipior numerare inæqualem respondentem æquali: iungo gradum Solis horæ æquali propositæ, & idem gradus statim indicat mihi horam octauam inæqualem completam, & nonam ininitiatam fluentemque.

Exemplum

ARCVM AEQUATORIS ET  
longitudinem horæ inæqualis de die & nocte artificialiter demetiri.

Proposit. 23.

GRADVS Aequatoris, qui in vna hora temporaliter peroriuntur, dicuntur arcus aut por-

tio horæ inæqualis, qui in tempus (vt assolet) re-  
 ducti longitudinem vnius horæ inæqualis mani-  
 festant. Si igitur ad certum diem oblatum arcum æ-  
 quinoctialis horæ inæquali diurnæ correspondentē  
 scire volueris: per duodecimam huius elice arcum  
 diei artificialis, quem per 12, partire, & in quotien-  
 te habebis numerum graduum horæ diurnæ tem-  
 poralis, & si aliquid manebit residuum, id multi-  
 plica per 60, & diuide per 12, vt prius, & colliges  
 in quotiente minuta gradus, id est fractiones arcus  
 horæ inæqualis vltra gradus integros. Hi igitur gra-  
 dus & minuta per huiusmodi diuisionem inuenta,  
 dicuntur portio aut arcus æquatoris horæ inæqualis  
 diurnæ, quem si à 30, gradibus subtraxeris, residua-  
 bis arcum horæ temporalis nocturnæ. Et est ratio  
 quare à 30, gradibus subtrahitur, quia arcus horæ  
 inæqualis diurnæ, cū arcu horæ inæqualis noctur-  
 næ, omni die faciunt 30, gradus, qui in 2, horas in-  
 æquales resoluuntur.

Inuenies etiam aliter arcum horæ inæqualis no-  
 cturnæ, secando arcum nocturnum per duodecimā  
 huius repertum, per 12, operando quemadmodū iam  
 de inuentione arcus horarij diurni docuimus.

Idem aliter & breuius, pro arcu horæ diurnæ  
 inæqualis extrahendo: pone nadair solis super lineā  
 horariam inæqualem quam volueris: et partem quā  
 denotauerit almuri in gradibus limbi signa puncto:

post

post admoue nadair sequenti lineæ horariæ, & adde notationem Almuri: iterum fac punctum in gradibus limbi, deinde numera gradus limbi his punctis interceptos, & habebis arcum æquatoris vnius horæ inæqualis diurnæ. Non aliter operare cū gradu solis, sicut fecisti cum nadair pro arcu horæ temporalis nocturnæ eliciendo.

Arcum præterea æquatoris horæ temporalis respondentem, siue sit diurnus siue nocturnus, conuerte in tempus hoc modo, da cuilibet gradui 4. minuta temporis: si summa minutorum in 60, vel ultra euaserit, pro 60. ablatis, scribe vnam horam, reliquis in suo loco dimissis: & colliges longitudinem vnius horæ inæqualis. Vel distribue quantitatem diei aut noctis per 12, & idem eueniet.

Ex his facile liquebit horas temporales nunquam æquinoctiales excedere: & quandoque illas his minores existere.

Omitto propter prolixitatem exemplum primæ partis huius propositionis. Secundæ autem hoc sume. Repetantur dies gradus solis, & eius nadair propositionis 21, volo elicere arcum æquatoris vnius horæ temporalis diurnæ. Pono nadair Solis, scilicet 20. gradum Libræ, super lineam horæ sextæ inæqualis ( & hoc gratia lucidioris intelligentiæ ) & ad situm Almuri pingo notam in gradibus limbi, & est directè in linea mediæ noctis. Deinde transf-

Exemplum  
secundæ par-  
tis.

fero nadair in lineam horæ 7, & iterum pingo notam in limbo ad situm almuri. Supputo gradus his notis interiectos, & habeo 16. gradus &  $\frac{1}{2}$ . id est, semigradū, ecce arcus æquatoris horæ inæqualis diurnæ, quæ à 30. demo, & residuo. 13. gradus, &  $\frac{1}{2}$ . arcum horæ nocturnæ. Conuerto arcum horæ diurnæ in tempus, & colligo 1. horam & 6. minuta: ecce longitudo horæ diurnæ temporalis maior hora æquinoctiali. Conuerto etiam arcum horæ nocturnæ in tempus, & colligo 54. minuta horæ æquinoctialis, scilicet longitudinem horæ nocturnæ inæqualis, minorem hora æquinoctiali.

Proposi. 24.

**QVOTA PARS HORAE**  
temporalis incompletè transi-  
uerit determinare.

**SÆP I V S** cū quæritur hora tēporalis: gradus solis aut eius nadair nō præcise cadit super lineã horariam temporalem in Astrolabio descriptã, sed in spatium inter duas lineas horarias contentū: tunc enim talis hora est fluens & incompleta. Et si scire volueris, quota pars ipsius sit elapsa, scilicet an medietas, tertia, quarta, quinta aut sexta pars: tunc non mouendo almuri, nota locum almuri in margine: deinde moue nadair solis si est in die, vel gradum solis, si est in nocte, ad initium illius horæ, & iterum signa almuri. Postea computa gradus in limbo



bo inter primam notam & secundam secundū motum almuri, & eos memoriæ commenda. Consequenter transfer almuri ab initio horæ vsque in finem ipsius: & iterum signa locum Almuri. Quo factō, vide quot gradus sint inter secundam & tertiam notam: quia ipsi sunt arcus vnius horæ inæqualis, & quo pacto se habet numerus graduū inter primam & secundam notam repertus, et memoriæ commendatus ad numerum totius horæ, sic se habet pars horæ transactæ ad totam horam.

Verbi gratia, resumatur exemplum 22. propositionis, vbi nadair solis horam temporalem indicans fuit repertum in interstitio tertiæ et quartæ linearū horariarū inæqualiū: admoueo ipsi Nadair, Almuri, et noto limbum. Deinde reduco Nadair et Almuri ad initium tertiæ lineæ, et iterum noto limbū ad denotationem Almuri. Numero gradus his notis interpositos, et habeo ferè 5. quos memoriæ commendo. Per vigesimam tertiam autem capio arcum vnius horæ inæqualis, scilicet 16 graduum et dimidij. Cōfero igitur 5. gradus ad 16. et sunt quasi pars tertiæ: et dico tertiam partē de hora quarta corrente penè elapsam: quæ in tempore 20. ferè minuta facit.

Exemplum

Potes totum negotium absoluere per tempus: resoluendo 5. gradus in 20 minuta horæ, et arcum horarium scilicet 16. gradus, et  $\frac{1}{2}$  in 66. minuta temporis: et in promptu videbis tertiam propemo-

M ij

dum partem horæ quartæ temporalis transisse, quod fuit determinandum.

Proposi. 25. HORAS AEQUINOCTIALES  
in temporales aut contrà reducere.

CONSIDERANDVM Merit, horas æquinoctiales siue æquales, hic per quartamdecimã huius ab ortu aut occasu Solis esse numerãdas. Nec ab re: nam & temporales siue inæquales aut à principio diei aut noctis supputantur.

Horas igitur æquales ab ortu aut occasu solis numeratas, multiplica per 15, & erunt gradus: & si cum illis fuerint minuta, pro quibuslibet quatuor minutis accipe gradum, & adde cum prioribus gradibus, & totum diuide per quantitatem, id est arcum vnus horæ inæqualis: & numerus quotiens ostendit tibi horas inæquales: & si aliquid fuerit residuum, id multiplica per 60, & diuide per idem vt prius, & habebis minuta horis inæqualibus iungēda.

Si verò horas inæquales cupis reducere ad æquales, tunc numerum horarum inæqualium multiplica per arcum vnus horæ inæqualis, & productum diuide per 15, & exhibunt horæ æquales. Residuum verò diuisionis si fuerit, multiplica per 60, & productum diuide per 15, vt prius, & prodibunt minuta, quæ debent iungi horis æqualibus.

Exemplum

*Exemplum breue. Proponatur hora 11. equalis* Exemplum  
*antemeridiana, & supponatur ortus solis hora 5. per*  
*propositionem decimam quintam, video 6. horas æ-*  
*quales ab ortu solis transisse, quas in temporales cõ-*  
*uertere iubeor, eas multiplico per 15. gradus, et exi-*  
*bunt 90. gradus. Supponatur consequenter, quòd ar-*  
*cus horæ temporalis diurnus sit 17. graduum: diui-*  
*do igitur 90. per 17, & habeo in quotiente 5. horas*  
*temporales, & remanent 5. gradus, quos multiplico*  
*per 60, & proueniunt 300, minuta, quæ similiter*  
*per 15. partior: & prodibunt in quotiente 17. minu-*  
*ta, quæ horis appono: & dico quintam horam tem-*  
*poralem diurnam transactam & completam: &*  
*de sexta incompleta, fluxisse 17. minuta. Exem-*  
*plum verò reductionis horarũ inæqualium in equi-*  
*noctiales, quia facile est, ideo transeo.*

**H O R A S A E Q U A L E S E T** Proposi. 26.  
*inæquales in dorso Astrolabij dicto*  
*citius indagare.*

**I**N dorso nostri instrumenti fabricauimus hora-  
 rium, per quod horas diurnas æquinoctiales &  
 temporales hoc pacto facile discernes. Ad diem  
 propositum per septimam huius addisce Solis alti-  
 tudinem meridianam: qua in quarta altitudinis dor-  
 si, à principio Arietis numerata, fini eius adde al-

hidadam: & ubi linea horæ 12. aut quod idem est, sextæ secat lineam fidei ipsius alhidada, ibi fac notam in alhidada cum atramento, cera aut alia re, & hanc notam si libuerit, seruabis ad biduum vel triduum, quia interea notabiliter non variatur. Deinde Sole radiante cape eius altitudinem, quam per quintam huius, ante aut pomeridianam cognosces. Et alhidada in altitudine inuenta durante, statim nota in horariis lineis horas indicabit: æquales quidem in lineis horarum æqualium, & inæquales in lineis temporalibus. quas pro altitudine Solis, ante aut pomeridianas proclamabis.

## Exemplum

In exemplo facilius forsitan accipies. Sit sol 31. die Martij in 20. gradu Arietis, per septimam elicio altitudinem meridianam 49. ferè graduum: qua in quarta altitudinis numerata, fini numerationis iungo Alhidadam: & pingo in ea notam in parte qua ipsa lineam duodecimam aut sextam intersecat. Postea quando placuerit, accipio altitudinem solis, quam gratia exempli reperio 26. graduum & antemeridianam: durante igitur alhidada in hac reperta altitudine, nota in lineis horariis æqualibus indicat mihi horam octauam antemeridianam completam, & nonam in re parua initium sumpsisse. Item eadem nota in lineis horarum inæqualium, ostendit mihi secundam temporalem perfectam: & de tertia currente tertiam

pro-

*propemodum partem abiice. Ecce breuem & facilem horarum inuentionem.*

**DE HORIS TEMPORALI-** Proposi. 27.  
bus nonnulla notatu digna subiungere.

**V**ETERES horarum temporalium præcipui obseruatores (vt testis est Hermes Trismegistus) fuerunt Babylonij: qui dominiũ planetarũ per horas cognitum, tanquã quoddam secretum paucis ostendebant. Diem enim quẽcunque ac etiam noctẽ in duodenas partes fregerunt, quas planetarum horas appellabant: & eorum gubernamento dicauerunt. Denominabant etiam dies septimanæ à planeta, qui prima huius diei hora dominatum habet, vt diem Sabbati à Saturno omnium summo, Dominicum à Sole, Secundam feriam à Luna, Tertiã à Marte, Quartam à Mercurio, Quintam à Ioue, et Sextam à Venere. Has septenorum dierum nominationes ex his metris facile addisces.

*Prima dies Phœbi sacrato nomine fulget.*

*Vendicat & lucens feriam sibi Luna secundam.*

*Inde dies rutilat iam tertia Martis honore.*

*Mercurius quartam splendẽtem possidet altam.*

*Iupiter ecce sequens quintam sibi iure dicauit.*

*Concordat Veneri magno cum nomine sexta.*

*Emicat alma dies Saturno septima summo.*

M iij

*Affirmabant præterea Babylonij, planetas successivè, & debito servato ordine per horas diurnas & nocturnas dominari, quorum ordinatio hæc est: Saturnus, Iupiter, Mars, Sol, Venus, Mercurius, Luna. Vnde metricè dicitur:*

*Post sim sum vltima Luna subest.*

*Babylonios secuti sunt plures astrologi viri doctissimi, & præcipuè Bethen, qui de horis planetarum proprium composuit tractatum, cuius principium est: Cum fuerit hora Saturni, &c.*

*Si igitur scire libet, cui planetæ debeatur quælibet hora proposita, scias in primis ex supra notatis, cuius planetæ sit dies præsens, quo cognito, addisce per astrolabium horam temporalem, deinde diem planetæ quære in capite tabellæ inferius expositæ: & horam diurnam temporalem in prima linea numeri laterali, nocturnam verò in eadem & sequenti linea per numerum, & in communi angulo diei & horæ, planetam horæ dominum inuenies.*

*Poteris etiam in articulis digitorum planetam propositæ horæ gubernatorem supputare: sed quia huiuscemodi res penè vulgata est, transeo.*

*Tabella*

# TABELLA GUBERNAMENTI Planetarum.

<i>Horæ Diei.</i>	<i>Horæ Noctis.</i>	<i>Dies Solis.</i>	<i>Dominicus.</i>	<i>Dies Lunæ.</i>	<i>Secunda Ferial.</i>	<i>Dies Martis.</i>	<i>Tertia Ferial.</i>	<i>Dies Mercurij.</i>	<i>Quarta Ferial.</i>	<i>Dies Iouis.</i>	<i>Quinta Ferial.</i>	<i>Dies Veneris.</i>	<i>Sexta Ferial.</i>	<i>Dies Saturni.</i>	<i>Sabbatum.</i>
1	3	☉	☾	♂	♀	♃	♀	♄	♀	♅	♀	♆	♀	♇	♄
2	4	♀	♃	☉	☾	♂	♀	♃	♀	♄	♀	♅	♀	♆	♃
3	5	♀	♄	♀	♃	☉	☾	♂	♀	♃	♀	♄	♀	♅	♂
4	6	☾	♂	♀	♄	♃	☉	☾	♂	♀	♃	♀	♄	♀	☉
5	7	♃	☉	☾	♂	♀	♄	♃	☉	☾	♂	♀	♃	♀	☉
6	8	♄	♀	♃	☉	☾	♂	♀	♄	♃	☉	☾	♂	♀	♀
7	9	♂	♄	♃	♀	♄	♀	♃	♀	♄	♃	☉	☾	♂	☾
8	10	☉	☾	♂	♀	♄	♃	☉	☾	♂	♀	♃	♀	♄	♃
9	11	♀	♃	☉	☾	♂	♀	♄	♃	☉	☾	♂	♀	♃	♄
10	12	♀	♄	♀	♃	☉	☾	♂	♀	♄	♃	☉	☾	♂	♂
11		☾	♂	♀	♄	♃	☉	☾	♂	♀	♃	♀	♄	♀	☉
12		♃	☉	☾	♂	♀	♄	♃	☉	☾	♂	♀	♃	♀	♀
I		♄	♀	♃	☉	☾	♂	♀	♄	♃	☉	☾	♂	♀	♄
2		♂	♀	♄	♃	☉	☾	♂	♀	♄	♃	☉	☾	♂	☾

Initiū  
hora-  
rū no-  
ctis.

Cæterum prisca insignes philosophi astrolabij  
 expositores: puta Nicephorus, Messahalla, Her-  
 mannus & alij complures, primarias institutiones  
 de inuentione horæ temporalis in eorum commen-  
 tarijs nobis reliquerunt. Qui etiam temporales ho-  
 ras negotijs eorum peragendis absoluendisque apta-  
 uerunt. Immo (vt Hermannus contractus testa-  
 tur) diuina officia temporalibus horis adaptata fue-  
 re. Idem enim tractatu secundo de vtilitate astro-  
 labij, in capitulo de concipienda Solis altitudi-  
 ne: postquam docuit inuenire horam temporalem  
 aut inæqualem per Nadair Solis: in calce capitu-  
 li ita inquit: Hoc quidem dignissimum ad diu-  
 num horarum celebrandum officium, & per ni-  
 mium ad scientiam vtile esse videtur, quanto gra-  
 tius & decentius cuncta procedunt, dum cum sum-  
 ma reuerentia debitis horis sub regula iusti iudicis,  
 qui in nullo vult falli, vicissitudinis obumbraculo  
 Dominica ministeria conuenienter peraguntur?

In lib. 2. de  
 somnio  
 Scip.  
 Syene.

Præterea horologia solaria veterum artificum  
 horas temporales & non æquinoctiales indicaue-  
 runt. Quod liquido constare poterit ex horario Sye-  
 nesi, de quo Macrobius ita loquitur: Ciuitas autem  
 Syene quæ prouinciæ Thebaidos post superiorum mon-  
 tium deserta principium est: sub ipso æstiuo tropico  
 constituta est, & eo die quo sol certam partem in-  
 greditur Cancris, hora diei sexta (quoniam tunc sol

super



super ipsum inuenitur verticem ciuitatis) nulla potest illic in terris de quolibet corpore vmbra iactari. Sed nec stylus hemisphærij monstrantis horas, quem gnomona vocant, tunc de se potest vmbra creare: & hoc est quod Lucanus dicere voluit, nec tamen plenè vt habetur absoluit. Dicendo enim:  
 —atque vmbra nunquam flectente Syene:

Pharal. 2.

Rem quidem attigit, sed turbauit verū, non enim nunquā flectit, sed vno tēpore. Ex verbis Macrobij facile liquet, horologium hoc pro horis inæqualibus mōstrandis fuisse cōfectū: quod breuibus ita inferatur. Sol existēs circa principium Cācri tempore meridiano, ciuitati Syeni verticalis est: & iam medietatem diei artificialis cōpleuit. Dies autē æstiuus, ob id quòd in principio Cancrī inuenitur, maximus est, scilicet 13. horarum, et 30. minutorum, cuius medietas est ferè 7. horarum *A* Equinoctialium. Sole ergo existente in meridie, & supputatis horis æqualibus ab exortu, vtique septima et non sexta esset numeranda: cuius contrarium dicit Macrobius. Sed ex quo hora sexta inæqualis semper meridiem tenet: & horologium eandem indicauit directè in meridie: consequens est, horarias lineas pro inæqualibus & minimè æqualibus inscriptas fuisse.

Non aliter videtur mihi sentiendum de horologio Achas regis Iuda, de quo quartus regum 20. & secundus Paralip. 32. & Esaias 38. memorant:

Horologiū  
Achas.

quod pro assertione doctissimorum mathematicorum ad horas inæquales elaboratum fuit. Quod latius exponere modo tempus non est, & ne temerarius alienæ messi falcem immittere videar.

Proposi. 28.

QUATVOR COELI AN-  
gulos vtiliter perscrutari.

**H**AEC propositio præambula & propemodum Isagogica est in duodenariam coelestium domiciliorum partitionem, de qua sequentibus propositionibus abundè dicemus: & nisi me veterum astrologorum authoritas compulisset, qui iam inter initiales penè institutiones de vsu astrolabij determinant, profectò ipsam impræsentiarum silentio præterissem. Observandū igitur, quòd coelum ocysimè motum ad circulos ei extrinsecos horizonem & meridianum elatum, pro omni instanti, secundum alias & alias eius partes, in quatuor distribuitur præcipales portiones: quas aut angulos, aut cardines appellamus, scilicet ortū, occasum, mediū coeli, et imū coeli. Ortus, gradus ascēdēs aut horoscopus, est pars illa Zodiaci, quæ in horizonte exortiuo primū emergit. Occasus aut gradus occidēs est pars illa coeli, quæ in horizonte occiduo demergitur: quæ semper (vt facilius intelligas) gradui ascēdenti diametraliter opponitur. In quocunque enim signo gradus ascen-

Ortus.

Occasus.

ascendens fuerit inuentus, in signo & gradu oppositis occasus constituitur. Medium coeli aut gradus medij coeli, pars est signiferi, quæ in linea meridiei aut in circulo meridiano supra terram locatur. Imū coeli aut gradus mediæ noctis aut angulus terræ, pars est Zodiaci in linea mediæ noctis, aut meridiano circulo sub terra inuenta, quæ etiam gradui medij coeli aduersa ac è regione subiicitur. Hæ partes sunt coeli quatuor anguli aut cardines: quos diligenti debemus ratione colligere, vt astrologica iudicia verissimis pronunciationibus explicemus.

Medium  
coeli.Angulus  
terræ.

Si igitur ad quodcunque tempus præsens, præteritum aut futurum oblatum, quatuor coeli cardines determinare volueris: ad idem quære gradum Solis per secundam huius. quo (vt fit) in Reti signato, numera tempus propositum per horas & minuta in margine Astrolabij, & fini adde Almuri & gradum Solis in Reti signatum, & gradus signi, qui cadit super primum Almicantarath ex parte orientis, id est super horizontem exortiuum, ille est horoscopus aut gradus ascendens ad tempus oblatum, & qui ex opposito cadit super primum Almicantarath ex parte occidentis, id est super Horizontem occiduum, est gradus occidens aut occasus, qui verò in linea meridiana constituitur, gradus est medij coeli, & ex aduerso in linea mediæ noctis reperiuntur: imum coeli aut angulus terræ nominatur.

De quatuor  
coeli cardi-  
nibus deter-  
minandis,

Exemplum

*Gratia exempli. Anno Christi 1510. currente, offertur mihi oppositio Solis et Lunæ, quæ cadit in 25. diem Martij post meridiem hora secunda, minuto 41. Iubeor ad tēpus oppositionis iamiam propositum inuestigare quatuor cœli angulos. Per secundam huius inuenio solem in 14. gradu Arietis: signo locum Solis in Reti, deinde supputo tempus oppositionis scilicet 2. horas 41. minuta post meridiē in limbo scilicet à 12. hora meridiei, et termino iungo Almuri & gradum Solis ipsius Retis, & in horizonte orientali video oriri signum Virginis cum quarto gradu, ecce horoscopus aut gradus ascendens. In horizonte occidentali, in opposito video labi 4. gradum Piscium: ecce occasus & gradus occidens. In linea meridiei cadit 26. gradus Tauri: ecce mediū cœli. Ex aduerso in lineā mediæ noctis intrat 26. gradus scorpj, ecce imū cœli aut angulus terre.*

Propo si 29.

**SOLIS, STELLARVM FIXARUM, & generaliter cuiuslibet gradus Zodiaci declinationem computare.**

**V**T facilior huius propositionis & sequentium habeatur intellectus, prænotandum nobis est, quòd Zodiacus dupliciter imaginatur diuidi. Primò secundum longitudinem in 12. partes æquales, quas signa appellamus, puta Aries, Taurus, Gemini,

ni,

ni, &c. Quodlibet signum in trigenas partes: vnde De diuisione  
zodiaci. conspicuum est, totum Zodiacum in 360. partes, quas gradus nominamus, distribui: secundum hanc partitionem ab initio Arietis supputamus motus Solis & planetarum & stellarum fixarum. Secundo intelligitur diuidi secundum latum: omnes enim celestis sphaerae circuli vt linea, solus Zodiacus vt superficies imaginatur: latitudinem habens 12. graduum, & secundum hanc sumitur latitudo stellarum erraticarum & inerraticarum: quae est distantia earum à via Solis, seu à linea ecliptica. Quam intelligimus diuidere totum Zodiacum secundum latum in duas pares portiones: ita quod ex vna parte relinquat 6. gradus, & ex alia parte totidem.

Secatur haec linea in duos semicirculos, quorum vnus est à principio Cæcri, vsque in principium Capricorni per Libram transeundo: alter ab exordio Capricorni in initium Cancris per Arietem computando. Sole enim Cancris principium ad eunte: his qui Aquilonem habitant, solstitium æstiuale maximumque dies constituitur: ex eo quod capitibus eorum propius non accedit: sed quasi stando incipit deflectere, & ab eis ad inferius hemisphaerium gradiendo sese conuertere. Item sol in principium Capricorni vergens, solstitium hyemale & diem breuissimum efficit: quia ab Aquilonaribus longissime abit: et iterum penè stans, mox ab eos redire incipit.

**Declinatio.** Præterea notabimus, quòd declinatio est distantia stellæ, planetæ aut gradus signiferi ab *A* Equinoctiali, & computatur in corpore spherico in circulo transeunte per polos mundi & per verum locum stellæ, planetæ aut gradus Zodiaci. Et est duplex, septentrionalis & meridionalis. Septentrionalis est ab *A* Equatore versus polū arcticum vel centrum Astrolabij. Meridionalis verò ab *A* Equatore versus polum antarcticum vel circulum Capricorni.

Sed quia *A* Equinoctialis secatur lineam eclipticam in principio Arietis & Libræ, facile infertur, Zodiacum in his principijs nullam habere declinationem, in alijs autem partibus ipsius maior aut minor accidit declinatio, secundum quod plus vel minus distant à principio Arietis aut Libræ.

Nulla etiã Zodiaci pars aut gradus maiorem habet declinationē, quam primus gradus Cæcri, et primus gradus Capricorni. Et talis hac nostra tēpestate est 23. graduum et 30. ferè minutorum. Et quacunque declinationem habet aliquis graduum Zodiaci, tantam habet sol in tali gradu existens.

Suprà pro-  
positione.  
18.

Nec id ignorandum est, quod omnes duo gradus equaliter distantes ab aliquo duorum solstitiorum memoratorum, æquales habent declinationes, aut Aquilonias aut Austrinas, et dies artificiales, eorū noctes, vmbre & altitudines meridianæ, Sole in ipsis existente, sunt æquales.

His

His prenotatis, ad operationem propositæ propositionis hoc pacto proceditur. Stellâ, Solem aut gradum Zodiaci, cuius declinationem scire adoptas, pone super lineam meridiei instrumenti, & vide per quot gradus eleuatur ab Horizonte inter Almicantarath, & numerum serua. Deinde pone primum gradum Arietis aut Libræ super eandem lineam meridiei, & consimiliter vide ipsius altitudinem ab Horizonte inter Almicantarath, & numerum serua: numerum minorem deme à maiori, & quod remanserit, erit declinatio propositæ stellæ Solis aut gradus Zodiaci. Septentrionalis quidem, si altitudo stellæ, aut Solis, aut Zodiaci, fuerit maior altitudine Arietis aut Libræ: Meridiana autem, si contrâ, scilicet altitudo Arietis aut Libræ, fuerit maior altitudine stellæ, aut Solis, aut Zodiaci.

Propositioni nostræ breue accommodabitur exemplum: Exemplum  
 Offertur mihi Sol, vigesimooctauum gradum Arietis occupans: iubeor Solis declinationem numerare. Pono igitur vigesimooctauum gradum Arietis super lineam meridiei, & video altitudinem meridianam quinquagintaduorû graduum, quam seruo. Item consimiliter pono principium Arietis super eandem lineam, & offendo altitudinem quadraginta vnus graduum, & ferè viginti minutorum, quam etiam seruo. Subtraho secundam altitudinem, quia minor à prima, & re-

manent mihi decem gradus, & quadraginta quasi minuta: declinatio Solis septentrionalis, ex eo quod altitudo Solis maior est altitudine Arietis.

Vel aliter et facilius: Siste cacumen stellæ, Solem, aut gradum Zodiaci, super lineam meridianā, & vide quot gradus de gradibus Almicantarath sunt inter circulum A Equinoctialem & cacumen stellæ aut Solem, siue gradum Zodiaci: et habes declinationem quæsitam, quæ cuius sit partis, septentrionalis aut meridiana, ex supradictis facile addiscitur. In exemplo proponitur mihi stella Aldebaran: sisto eius cacumen super lineam meridianam, et numero à cacumine stellæ sursum vsque in circulum A Equinoctialem, et inuenio sexdecim propemodum gradus declinationem septentrionalem propositæ stellæ.

Exemplum

Ex his (habito astrolabio ritè confecto) diligens supputator facile inferet distātiās trium orbium aut circulorum, æstiuū inquam tropici, æquinoctialis, et hyberni tropici. Est autem ab hyberno solstitio ad æstiuum vsque interuallum graduum quadraginta-septē, vt est ex Almicantarath inscriptione cognoscere. Distat nāque ad septentrionē ab æquinoctiali (vt etiā suprā notauimus) æstiuū solstitiū gradus 23. & triginta minuta, et ad austrū hybernum solstitiū tantūdem. Principium nāque sumēdo in quouis climate, et notando Almicantarath, quod Capricorni

ad



ad meridiem attingit principium: & rursus secundum, quod Arietis & Libræ attingit principia: et tertium, quod Cancræ attingit principium: annumerandóque interiecta Almicantarath, inuenies à Capricorno in Arietem vsque trigintaduos gradus & dimidium. Ab Ariete autem ad Cancrum, alios vigintitres & dimidium: vt sint à Capricorno in Cancrũ gradus quadragintasetem, quod intervalum signiferi continet obliquitas.

LATITVDINEM REGIONIS, climatis, oppidi, lociue cognoscere.

Proposi. 30.

**L**ATITUDO regionis, climatis aut loci, est distantia ipsius, hoc est, puncti verticalis ab æquatore circulo: quæ aut versus septentrionem, aut meridiem se extendit. Et est semper æqualis altitudini aut eleuationi poli septentrionalis supra Horizontẽ, aut depressioni poli oppositi sub Horizonte.

Latitudo regionis.

Nicephorus Græcus de latitudine climatum cognoscenda, doctrinam attulit particularem valde, (admiror) scilicet cùm Sol Arietem aut Librã ingredi incipit, quod solum bis in anno accidere latet neminem. Taceo Solem rarissimè tempore meridiano Arietẽ Librãve ingredi, quod tamen Nicephori traditio supponit. Ego autem huius rei generalem dabo modum, geographicis negotijs profectò vtilem, qui talis est. In dorso Astrolabij,

N ij

quemadmodum supra constituimus, altitudinem Solis meridianam addisce. Quòd si tempore meridiano principium Arietis aut Libræ adierit, (quod raro cõtingit) ipsa altitudo meridiana elevationem principij Arietis aut Libræ, & ex consequentione æquatoris circuli supra Horizontem indicat: quæ à 90. gradibus subtracta, latitudinem regionis, climatis, aut habitati loci relinquet.

Quòd si sol in septentrionali quopiam signo inuentus fuerit, declinationem eius septentrionalem per propositionem antecedentem cognosce: quam à Solis altitudine meridiana surripe: & patebit elevatio arietis aut libræ atque æquatoris: quæ vt iam iam monuimus, à nonaginta gradibus sublata, latitudinem regionis & generaliter vniuscuiusque loci, quem obseruationis tempore colis, pandet.

Quòd si sol per meridianum graditur signum, declinationem eius meridianam per præcedentem inuentã, altitudini meridianæ adde: et prodibit elevatio arietis aut libræ, et ex sequela æquatoris: quæ vt iam bis dictũ est, à nonaginta reiecta, latitudinẽ regionis & cæterorum expositorum manifestabit.

In summa igitur habes tres modos latitudinum inuestigandarum tempore diurno opportunos: scilicet cum sol principium arietis aut libræ, aut aquilonia siue austrina signa occupauerit. Non omniũ exempla subiungam, sed secundi dũtaxat, qui medius est

est (medio enim tutissimus ibo) tale accipe exemplum. Exemplum Supponatur quòd oppidum gymnasij Tubingensis, sit locus habitationis cognoscendæ latitudini propositus, repeto breuiter exemplum primum propositionis antecedentis, in quo ponebatur sol in vigesimo octauo gradu signi arietis, & altitudo Solis meridiana 52. graduum. Item Solis declinatio septentrionalis decem graduum, & 40. minutorum: subtraho igitur declinationem ab altitudine meridiana, & remanent mihi 41. gradus, et 20. minuta, eleuatio arietis: & ex sequela æquinoctialis oppidi Tubingensis, quam à nonaginta gradibus demo, & remanebit mihi latitudo oppidi prædicti, scilicet quadraginta octo gradus, & 40. minuta, quod fuit absoluendum.

Nocturno verò tempore hoc idem per aliquam stellam firmam, tibi cognitam, quæ exoritur & occidit, hoc modo absolues: Obserua eius altitudinem meridianã, necnon declinationem septentrionalem aut austrinam, prout negotium postulat: quibus habitis, operaberis quemadmodum iam supra de Sole expositum est:

Euidentiæ gratia, quæro altitudinem meridianam stellæ Aldebaran, & reperio quinquaginta septem gradus, & viginti penè minuta. Inuestigo etiam eius declinationem, quæ per antecedentem propositionem inuenta est quasi graduum 16. septen-

trionalis. subtrahō hāc ab illa, et habeo 41. gradus,  
 & viginti ferē minuta elevationē Arietis: quam à  
 90. minuo, et video latitudinem oppidi Tubingen-  
 sis supra elicitam, scilicet 48. gradus, 40. minuta.

Per stellam autem quæ nec oritur nec occidit,  
 sic operare: Noctē hyberna observa eius altitudi-  
 nem maximam & minimam. Bis enim meridia-  
 no coniungitur, scilicet in eius parte superiori, vbi  
 altitudine maxima afficitur: & inferiori, vbi mi-  
 nima. Has altitudines iūge simul, & totius aggre-  
 gati medietas est latitudo regionis aut loci observati.  
 Et hoc verum est de stellis fixis, quæ circa Polum  
 arcticum rotantur, & ultra Zenith regionis aut lo-  
 ci observati, non euagantur.

## Exemplum

In exemplo offertur stella Alioth, quæ est prin-  
 cipium caudæ Ursæ maioris: capio per Astrola-  
 bium eius altitudinem maximā, scilicet 80. ferē  
 graduum: capio etiam minimā, 17. quasi graduum:  
 has iungo, & colligo 97. gradus: quorum me-  
 dietas est 48. gradus & 30. ferē minuta, latitu-  
 do oppidi observati.

Hæc propositio perutilis est, pro instrumentis a-  
 stronomicis, ad diuersas habitationes conficiendis.  
 Nam cognita latitudine, cognoscitur quoque quot  
 gradibus polus mundi supra Horizontem cuiusuis  
 loci aut habitationis propositæ extollitur: sine quorū  
 cognitione instrumenta rite cōponi minime possunt.

## LONGITVDINES REGIO - Proposi. 31.

num, oppidorum locorumque notas fieri.

**EX QVO** in mentionem latitudinum regionum, climatum ac locorum incidimus, paucula quedam de eorundem longitudine non ab re differere decreuimus.

Aduertendum igitur, quòd *longitudo regionis*, <sup>Longitudo regionis.</sup> oppidi locique, est distantia meridiani circuli vnius à meridiano circulo alterius. Et computatur in terra, in circulo magno *A* Equatori directè supposito: præcipuè in ordine ad situm cuiusque regionis, oppidi aut loci distantis ab occidente. Numeratur autem ab occidente versus orientem: & vt nonnullis placuit, à Gadibus Herculis sitis in occidente, vsque ad columnas Alexandrinas sitas in oriente: que distantia est semicirculus continens 180. gradus. Claudius autè Ptolemæus omnium in geographia clarissimus, principium sumit in occidente ab insulis Fortunatis, sitis in mari occidentali, quod sinus Hespericus appellatur, & terminat in oriente in Sinarum regionem metropolim Thyene, aut oppidum Sarapa. De hac longitudine regionum, oppidorum & locorum, diffusè tractat memoratus Ptolemæus. Et sic dicimus, Nouium habere longitudinem 6. graduum & 10. minutorum: tantum enim distat ab occidente. Toletum habere longitudi-

nem 10. graduum. Parrhisiū 24. graduum 30. minutorum. Agrippinam 28. graduum 40. minutorum. Argentinam 28. graduum 50. minutorum. Gannodurum 29. graduum 30. minutorum. Romam 36. graduum 30. minutorum. Bizātiū 56. graduum. Alexandriam 60. graduum 30. minutorum. Bathinam & Corodnam 90. graduum: distantes ab occidente & oriente æqualiter.

Metiturus itaque oppidorum aut regionum distantiam secundum longitudinem, addisce per tabulas eclipsium oppidi alicuius notæ longitudinis, initium eclipseos Lunaris: & in alio oppido, cuius longitudo tibi ignota fuerit, observa per astrolabium principium eclipsis. Quòd si initium eclipsis ex tabulis oppidi noti supputatum, & principium eiusdem oppidi ignotæ longitudinis per astrolabium observatum, in horis & minutis concordauerint, concludas ambo oppida eandem habere longitudinem, & vnum meridianū: ita quod inter ipsa nulla est distantia longitudinis. Si autem initium deliquij Lunaris per astrolabium observatum fuerit, plus in horis & minutis quàm initium per tabulas computatum, aut contrà: infer ea oppida diuersos habere meridianos, et diuersam longitudinem: quam sic cognosces. Subtrahere numerum horarum et minutorum minorem à maiori: et id quod remanserit dicitur differentia temporis vnius oppidi ab alio.

Accipe igitur pro qualibet hora 15. gradus, & pro quibuslibet quatuor minutis temporis vnum gradum, & pro quolibet minuto 15. minuta gradus. Tandem adde gradus gradibus, & minuta minutis, & collectum longitudinem oppidorum propositorum indicabit. Cum autem nullas oppidorum tabulas habueris, tunc te in vno oppido, & socio tuo in alio existentibus, principia eiusdem eclipsis Lunaris per astrolabia debent obseruari, quibus habitis, operare vt prius.

Nec id silendum est, illud oppidum orientalius esse alio cuius principium eclipses in tempore maius est repertum: & generaliter longitudo maior oppidi vnius, respectu longitudinis minoris oppidi alterius, orientalitatem manifestat: vt in exemplo, Toletum habet in longitudine 10. gradus: Byzantium 56. dico Byzantium orientalius esse Toletum, quia eius longitudo maior est.

Iam propositioni nostræ exemplaris computatio subiicienda est. Anno Christi. 1504. curren- Exemplum  
te bissextili, 29. die mensis Februarij post meridiem, Luna deliquio vniuersali affecta est. Supputavi ex tabulis & radicibus Toletanis per Alphonsum verificatis, principium huius deliquij, quod inueni in Toletum post meridiem prædicti diei horis 10. minutis ferè 27. Obseruavi etiam per a-

*astrolabium idem deliquium in oppido Ulmensi, mihi quantum ad longitudinem incognito, & offendi eius initium post meridiem, hora 11. minuto quasi 49. Subtraxi tempus minus à maiori, & remansit mihi 1. hora 22. minuta, differentia temporis dictorum oppidorum. Dedi 1. horæ 15. gradus, & 20. minutis temporis 5. gradus: & 2. minutis 30. minuta, gradus: & collegi 20. gradus & 30. minuta, distantiam longitudinis inter Toletum & Ulmam. Sed quia Toletum, ut Ptolemæus testis est, distat ab occidente, aut insulis Fortunatis 10. gradibus, conclusi Ulmam ab eodem occidente versus orientem distare 30. gradibus & dimidio. Est igitur longitudo oppidi Ulmensis 30. graduum, & 30. minutorum, quod fuit optatum. Verum per Germaniam in opere Ptolemæi plures locorum latitudines & longitudes, debitos numeros minimè habere satis compertum est, stabimus tamen cum Ptolemæo usque dum emendatior Germaniæ prodibit descriptio. Nolo etiam optime lector, ut credas locorum longitudes, non aliter quàm per eclipses posse observari. Sunt enim & aliæ harum rerum sciendarum viæ: sed ut omnibus astrolabij nostri vsus multifarius appareret, eclipses easdem venari libuit.*



## MILIARIA INTER DVAS Proposi. 32.

regiones aut oppida diametri.

**C**ONTVENDVM, quòd regionum aut oppidorũ distantia, aut est in latitudine tantũ, aut lōgitudine: aut in latitudine et in lōgitudine simul.

Si igitur in latitudine solũmodo distant, & eorũ mensuram terrestrem nosse anhelas, subtrahere latitudinem vnius à latitudine alterius: & videbis gradus, quos differentiã latitudinum nominamus: hos multiplica per 60. miliaria Italica, aut Alemanica 15. communia, aut 12. Sueuica: quo factò, distãtia eorundem oppidorũ aut regionum in promptu erit.

In exemplo obseruatione Ptolemica: Roma & Exemplum  
Ancona in longitudine equantur, differunt tamen latitudine: quia Roma 42. ferè gradus, Ancona autem 44. obtinet. Demo latitudinem minorem à maiori, & habeo duos gradus differentiæ latitudinum, quos multiplico per 60. & colligo 120. miliaria Italica: aut per 15. & habeo 30. Alemanica cōmunia: aut per 12. & congrego 24. Sueuica. idem iudicium de aliis. Ex hoc infertur illud generale, quòd singulis gradibus latitudinum correspondent equalia miliaria in terra, siue sint Italica, Alemanica, Gallica aut cuiusuis alterius nationis.

Sinautem oppida sola longitudine differunt, iam exposita. forma terrestris mensuræ non satis-

facit, nisi sub circulo æquinoctiali, & ferè vsque in latitudinem 18. graduum vtrinque. Secus nusquam gentium veritatem habet: quanto enim magis ab æquinoctiali ad arctos gressum dirigimus, eo magis spatium terre vni gradui correspondens, minui compertum habemus secundum parallelorum & tractuum terre diminutionem, & propter meridianorum circulorum in polis mundi concursum. Quapropter oppidorum & locorum distantias tabulari computatione absolueri decreuimus, hoc modo. Oblatis duobus oppidis, longitudine duntaxat distantibus: latitudinem eorundem in tabula subiuncta in prima linea ( quæ incipit ab 1. & finitur in 80. ) sub titulo gradus latitudinum diligenter inuestiga, & è directo offendes miliaria aut Italica, aut Alemanica cõmunia, aut Sueuica, vni coelesti gradui prope verum secundum situm oppidorum respondentia: pro libito igitur tuo ea elige, quibus ad tuum propositum vti volueris. Deinde elice oppidorum differentiam in gradibus longitudinum, quam multiplica per miliaria electa vni gradui conuenientia, & habebis oppidorum distantiam pro eorum situ secundum longitudinem, & optato potieris.

**Exemplum** Sit pro clariore intellectu exemplum tale. Corrodunū, nunc Cracouia, & Amisia, nunc Marck-purgium, Ptolemæo asserente, eadem habent latitudinem, 51. quasi graduum: distantia solummodo longi-

longitudine: quia secundum eundem *Amisia*, id est, *Marckpurgium* continet 31. gradum, 30 minuta: *Corrodunum* autem, id est, *Cracouia* 42. gradus 40. minuta: subtraho longitudinem minorem à maiori, & habeo 11. penè gradus: differentiam longitudinum. Ingredior tabulam cum 51. gradibus latitudinis, et inuenio in miliaribus communibus (quæ impresentiarum eligo) 10. miliaria vni gradui pro huiusmodi situ respondentia: quæ multiplico in 11. gradus, differentiam longitudinum: & colligo 110. miliaria communia, distantiam mensuræ terrestris oppidorum propositorum.

	Longitudo.	Latitudo.
<i>Lubecum.</i>	35	56
<i>Dantiscum.</i>	45	56

SEQUITVR TABVLA  
Miliarium, longitudinum, regionum & oppidorum, secundum diuersos parallelos & terræ tractus.

## Alemanica

## Alemanica

Alemanica					Alemanica								
Grad. latitudinū.	Miliaria Italica	Miliaria communia	partes et sunt quar.	Miliar. Suenica.	totius sunt tot	Quarta.	Grad. latitudinū.	Miliaria Italica	Miliaria communia	partes et sunt quar.	Miliar. Suenica.	totius sunt tot	Quarta.
1	60	15	0	12	0		22	58	14	2	11	2	
2	60	15	0	12	0		23	57	14	1	11	1	
3	60	15	0	12	0		24	57	14	1	11	1	
4	60	15	0	12	0		25	57	14	1	11	1	
5	60	15	0	12	0		26	56	14	0	11	1	q̄si
6	60	15	0	12	0		27	56	14	0	11	1	q̄si
7	60	15	0	12	0		28	55	13	3	11	0	
8	60	15	0	12	0		29	55	13	3	10	0	
9	60	15	0	12	0		30	54	13	2	10	3	
10	60	16	0	12	0		31	54	13	2	10	3	
11	60	15	0	12	0		32	53	13	1	10	2	
12	59	14	3	12	0		33	53	13	1	10	2	
13	59	14	3	11	3		34	52	13	0	10	1	
14	59	14	3	11	3		35	52	13	0	10	1	
15	59	15	3	11	3		36	51	12	3	10	1	q̄si
16	59	14	3	11	3		37	50	12	2	10	0	
17	59	14	3	11	3		38	50	12	2	10	0	
18	59	14	3	11	3		39	49	12	1	9	3	
19	58	14	2	11	2		40	48	12	0	9	2	
20	58	14	2	11	2		41	47	11	3	9	1	
21	58	14	2	11	2		42	47	11	3	9	1	

<i>Alemanica</i>					<i>Alemanica</i>								
<i>Grad. Latitudinum.</i>	<i>Miliaria Italica.</i>	<i>Miliaria communia</i>	<i>partes et sunt quar.</i>	<i>Miliaria Suenica.</i>	<i>tot sunt tot</i>	<i>Partes &amp; sunt quar.</i>	<i>Miliaria Italica.</i>	<i>Miliaria communia</i>	<i>partes &amp; sunt quar.</i>	<i>Miliaria Suenica.</i>	<i>tot sunt tot</i>	<i>Partes &amp; sunt tot</i>	<i>Quarta.</i>
43	46	11	2	9	1	<i>q̄si</i>	62	29	7	1	5	3	
44	45	11	1	9	0		63	28	7	0	5	2	
45	44	11	0	8	3		64	27	6	3	5	1	
46	44	11	0	8	3		65	26	6	1	5	1	<i>q̄si</i>
47	43	10	3	8	2		66	25	6	1	5	0	
48	43	10	3	8	2		67	24	6	0	4	3	
49	42	10	2	8	1		68	23	5	3	4	2	
50	41	10	1	8	1		69	22	5	2	4	1	
51	40	10	0	8	0		70	21	5	1	4	1	<i>q̄si</i>
52	39	9	3	7	3		71	20	5	0	4	0	
53	38	9	2	7	2		72	19	4	3	3	3	
54	37	9	1	7	1		73	18	4	2	3	2	
55	36	9	0	7	1	<i>q̄si</i>	74	17	4	1	3	1	
56	35	8	3	7	0		75	16	4	0	3	1	<i>q̄si</i>
57	34	8	3	6	3		76	15	3	3	3	0	
58	33	8	1	6	2		77	14	3	2	2	3	
59	32	8	0	6	1		68	13	3	1	2	2	
60	31	7	3	6	1	<i>q̄si</i>	79	12	3	0	2	1	
61	30	7	2	6	0		80	11	2	3	2	1	<i>q̄si</i>

## HAEC TABVLA VERSATVR

circa prope verum, & accedit Ptol.  
geo. Idem accipe de tabu-  
lis sequentibus.

**Q**UOD si duarum regionum aut oppidorum  
longitudine & latitudine differentiū, spa-  
tium terræ interiacens geometrica mensura scire  
optaueris, latitudines eorum per propositionem 40.  
inuentas considera: & minorem à mediocri deme:  
residuūque, quod differentia latitudinis dicitur,  
seorsum serua. Longitudines eorum per proposi-  
tionem 31. repertas itidem animaduerte: & iterum  
per subtractionem minoris à maiori differentiam  
addisce: quæ differentia longitudinum appellatur.  
Vtrasque differentias tam latitudinis quàm longi-  
tudinis quadratè multiplica, id est, in se duc, vel  
multiplica: & multiplicatione procreata, simul ag-  
grega, id est, adde: & aggregati quære radicem qua-  
dratam: quā multiplica aut per miliaria Italica, sci-  
licet 60. aut Alemanica communia, 15. aut Sueui-  
ca 12. & productum, mensuram terrestrem in mi-  
liaribus duarum regionum aut oppidorum manife-  
stabit. Hæc veterum doctrina de diuersa regionum  
& oppidorum latitudine & longitudine loquens,  
facit computationem distantiarum secundum li-  
neam diagonalem, quæ aut quadrati aut quadran-  
guli

guli diameter nominatur: & nisi ritè accipiatur, in magnum nos abducit errorem. Cùm gradus longitudinum cum gradibus latitudinum solummodo sub æquatore aut eius vicinia, vt supra exposuimus, eandem seruent mensuram: aliàs gradibus longitudinum versus vtrunque polum vbiuis diminutionem patientibus.

Circa æquinoctialem igitur hæc doctrina vsque in latitudinem ferè 18. graduum satis quadrat, quare eandem exemplis lucidiorem reddam. Primum generale. Sit *A*, oppidum habens in longitudine 30. gradus, & in latitudine septentrionali 2. gradus, *B*, verò sit aliud oppidum habens in longitudine 38. gradus, & in latitudine septentrionali 8. gradus. Iubeor metiri eorum distantiam in terra, subtraho igitur longitudinem 30. graduum oppidi, *A*, à longitudine 38. graduum oppidi, *B*, et habeo 8. gradus differentiam longitudinum. Similiter subtraho latitudinem 2. graduum oppidi, *A*, à latitudine 8. graduum oppidi, *B*, & habeo 6. gradus, differentiam latitudinum. Deinde multiplico 8. gradus, differentiam longitudinum in se quadratè: & dico octies octo sunt 64. similiter 6. gradus, differentiam latitudinum duco in se: dicendo, sexies sex sunt 36. producta per multiplicationem aggrego simul, id est, addo, & colligo 100. Huius numeri sic collecti quero radicem qua-

dratam, secundum regulam algorithmi, de radicum quadratarum extractione, & inuenio 10. gradus pro radice quadrata: tot enim graduum est linea diagonalis constituta in quadrangulo, ubi duo latera habent 8. gradus, & alia duo sex. Hos decem gradus multiplico per 15. miliaria communia: & proueniunt 150. miliaria distantia terrestris inter A, & B. Secundum exemplum sumptum ex opere Ptolemæi Claudij lib. 7. cap. 4. est tale. Nuberta oppidum insulæ Taprobanae, habet in longitudine 122. penè gradus, in latitudine, 0, ex eo quòd sub æquatore situm est. Modotti emporium eiusdem insulæ habet in longitudine 128. gradus: in latitudine verò 12. gradus: differunt igitur hæc duo oppida longitudine & latitudine. Cupio scire eorundem distantiam. subtraho longitudinem 122. graduum oppidi Nubertæ à longitudine 128. graduum Modotti, & remanent 6. gradus, differentia longitudinis horum oppidorum. Differentia autem latitudinis est 12. graduum, multiplico 6. in se, & habeo 36. Similiter 12. & habeo 144. quæ simul iungo, & colligo 180. huius numeri radix quadrata est 13. graduum & ferè  $\frac{2}{3}$ , multiplico 13. gradus per 15. miliaria communia, & produco 195. miliaria: & pro dimidio gradu addo quasi 7. & colligo 202. miliaria: distantiam oppidorum propositorum.

Exemplum  
ex Ptole. li.  
6. ca 8. Sileū  
Lon. 77. La.  
17. Cōconati  
insulæ.  
Lon 3. Lati.  
83.9.

Quòd



Quòd si regiones aut oppida latitudine & lon-  
 gitudine differentia, Latitudines maiores 18. gra-  
 dibus habuerint, eorundem elice differentias tam  
 latitudinum quàm longitudinum secundum mo-  
 dum suprà traditum. Postea cum gradibus amba-  
 rum latitudinum ingredi tabulam præexpositã,  
 & ad sedes earum recipe numeros miliarium, præ-  
 cipuè Alemanicorum communium: & si numeri  
 miliarium non differunt, aut si differunt, id tamen  
 nullius est penè momenti, & vix notatu dignum.  
 Tunc si iustam oppidorum distantiam habere vo-  
 lueris, opus erit, vt differentiam graduum longitu-  
 dinum cõuertas in gradus æquinoctiales, quod pro-  
 pe verum tabulari officio in hunc modum absolues.  
 Latitudines oppidorum propositorum inuestiga in  
 primis numeris lateralibus tabellarum subiuncta-  
 rum, quibus repertis, vel ad minus vna, gradus diffe-  
 rentiæ longitudinũ quære in numeris sub titulo gra-  
 dus longitudinum: & in directo eorum sub titulo  
 gradus æquinoctialis, offendes gradus, & nonnun-  
 quam minuta his gradibus respondentia, quæ extra  
 scribe. Intra etiam tabellam ( vt assolet ) dupli-  
 ci introitu, si gradus differentiæ longitudinum  
 non præcise inueneris: & quod post huiusmodi  
 introitum extra scriptum fuerit, voca gradus æ-  
 quatoris: quos in se quadratè multiplica, & si-  
 militer gradus differentiæ latitudinum, & procede

Exemplum

secundum formulam supra expositam: elicienda ra-  
dicem quadratam: quam in miliaria Italica aut  
Alemanica conuertes: & habebis mensuram ter-  
restrem oppidorum propositorum. Verbi gratia: Pto-  
lemæo docente, Peronticum nunc Pera oppidum  
Thraciæ, habet in longitudine quasi 55. gradus, in  
latitudine autem 44. Passium oppidum Iasigis,  
Metanastis, nunc Septem castrorum, habet in lon-  
gitudine 45. gradus, in latitudine penè 47. diffe-  
rentia longitudinum est 10. gradus, latitudinum 3.  
Per latitudines dictorum oppidorum inuenio ex ta-  
bula supra exarata numeros miliarium communiū  
ferè æquales: ita, quòd vix est dabile medium, nisi  
quis res minimas plus subtiliter quàm vtiliter pro-  
sequi velit: quod impresentiarum minimè atten-  
tabo. Quocirca easdem latitudines quæro in lateri-  
bus tabellarum subannexarum, quas tabellæ quar-  
tæ annecti conspicio: per eandem igitur 10. gradus  
differentiæ longitudinum secundum situm tractus  
terre, & latitudines propositorum oppidorum con-  
uerte in gradus æquinoctiales, hac norma. In secun-  
da linea numeri memoratæ tabellæ reperio 10. gra-  
dus, differentiam longitudinum prædictorum oppi-  
dorum: in quorum directo habeo penè 7. gradus  
æquatoris his gradibus correspondentes. Concludo  
igitur, quòd 10. gradibus longitudinis in Parallelo la-  
titudini 45. 46. aut 47. graduū supputato, respōdent  
ferè

ferè 7. gradibus equatoris. Multiplico ergo hos 7. gradus equatoris quadratè, & habeo 49. Similiter 3. gradus differentiam latitudinum, & habeo 9. quæ aggrego simul, & colligo 58. quorum radix quadrata vicinior est 8. gradum. quos multiplico per 15. miliaria Alemanica communia, & habeo 120. miliaria, distantiam oppidorum oblatorum.

Demum si Regiones aut oppida longitudine & latitudine distantia: latitudines maiores (vt prædiximus) 18. gradibus habuerint: & per ingressum tabulæ præexaratæ cum latitudinibus videris miliaria notabiliter differre: eorundem distantias hoc pacto cognosces. Primum extrahere differentias latitudinum & longitudinum, quas seorsum serua. Deinde de differentia latitudinum accipe medietatem, quam aut latitudini minori vnius oppidi propositi adde: vel ( & est idem ) à latitudine maiori alterius oppidi subtrahere: & quod facta additione aut subtractione prodierit, serua: quia significat tibi latitudinem mediam inter latitudines duorum oppidorum propositorum contentam. Hanc igitur latitudinem mediam quære in primis numeris lateribus tabellarum subscriptarum: & circa quam tabellam eandem inueneris, per eam gradus differentie longitudinum supra seruatos, in gradus æquinoctialis conuerte: quos facta conuersione, quadratè multiplica, similiter gradus dif-

ferentia latitudinum: & procede prout supra institui-  
tuimus, & habebis optatum.

Exemplum  
Londinū.

Toletum.

Huius partis hæc sume exempla. Londinum, teste Ptolemæo, oppidum Albionis, modò Angliæ, tenet in longitudine 20. gradus: & in latitudine 54. Toletum verò oppidum Hispaniæ habet in longitudine 10. gradus, in latitudine autem 41. differentia longitudinum est 10. graduum, latitudinum 13. Cum latitudinibus intro tabulam præexpositam, & video miliaria admodum distare, quare medietatē differentia latitudinis, scilicet 6. quasi gradus recipio: quos latitudini Toleti minori scilicet 41. addo: & colligo 47. latitudinē propemodū mediam inter latitudines memoratorū oppidorū. Cum qua ingredior tabellas subiunctas, & eam offendo in latere quartæ tabellæ, per quā 10. gradus longitudinis reduco in gradus æquatoris, scilicet 6. gradus, 40. minuta: & loco 40. minutorum recipio gradum integrum, & habeo 7. quos in se duco, & proveniunt 49. consimiliter differentiam latitudinum, scilicet 13. gradus in se multiplico, & prodibunt 169. producta per multiplicationem aggrego, & habeo 218. cuius radix quadrata est ferè 15. gradus minus  $\frac{1}{3}$ : multiplico 15. gradus per 15. miliaria communia, & produco 225. miliaria. à quibus demō 5. propter tertiam, & habeo in summa 220. miliaria, distantiam oppidorum oblatorum.

Aliud

Aliud exemplum. Curta buda, nunc (ut fert Curta buda.  
 opinio) Ofen, regum Hungariæ sedes, Ptolemæo tra-  
 dente, habet in longitudine 42. gradus, in latitudi-  
 ne 47. Liciburgum verò, nunc Rostockium, oppi-  
 dum Germaniæ magnæ, modò ducatus Pomereæ-  
 ni, tenet in longitudine 39. gradus: in latitudine 56.  
 differentia longitudinum est 3. graduum, latitudi-  
 num 9. Latitudo media est ferè 51. graduū. Gradus  
 differentiæ longitudinum per quintam tabellam cō-  
 uersi in gradus æquinoctialis, faciunt penè 2. gra-  
 dus, qui in se multiplicati constituunt 4. Item gra-  
 dus differentiæ latitudinum multiplicati quadrate,  
 faciunt 81. producta per multiplicationem sunt 85.  
 Radix quadrata est 9. gradus  $\frac{3}{4}$ : quæ per miliaria  
 communia multiplicata dat 139. miliaria. ecce di-  
 stantia oppidorum propositorum.

Hactenus exemplificando integros gradus at-  
 tulimus, facilitate operationis persuasi: nunc unico  
 exemplo fractiones proponemus, finem nostræ pro-  
 positionis statuentes. Neapolis (ut Ptolemæus as-  
 serit) Italiæ oppidum in longitudine accepta 40.  
 gradus: in latitudine autem 41. Colonia verò A-  
 grippina, Germaniæ oppidum, obtinet in longitu-  
 dine 28. gradus, 40. minuta: & in latitudine 51.  
 gradus, 30. minuta: subtraho lōgitudinem minorem  
 à maiori: & residuo 11. gradus, 20. minuta: diffe-  
 rētiā longitudinum. Similiter demo latitudinem

Potius. 33.

minorem à maiori, & habeo 10. gradus, 30. minuta: differentiam latitudinum. Latitudo media est 46. penè graduum, quam in latere quartæ tabellæ offendo. Per eam igitur tabellam conuerto differentiam longitudinis in gradus & fractiones æquatoris, & colligo 7. gradus 30. minuta æquatoris. Et ex quo in differentia longitudinum reducta, & etiam in differentia latitudinum habeo fractiones, scilicet semigradus: resoluo gradus integros amborum differentiarum in consimilem denominationem, id est, semigradus, & procreo ex differentia longitudinum conuerse 15. semigradus: & ex differentia latitudinum 21. multiplico igitur 15. in se, & produco 225. similiter 21. duco in se, & produco 441. iungo producta, & habeo 666. huius numeri radix quadrata est ferè 26. semigradus, qui ad integra reducti, faciunt 13. gradus. quos tandem multiplico per 15. miliaria communia, & produco 195. miliaria distantiarum oppidorum in exemplo propositorum.

TABELLAE CONVER-

TABELLAE CONVERSIONVM GRA-  
duum longitudinum in gradus æquinoctialis.

Prima.			Tertia.			Quinta.			Septima.			Nonam.			Vndecima.		
<i>Latitudinis.</i>	<i>Longitudinis.</i>	<i>AEquinoctial.</i>	<i>Latitudinis.</i>	<i>Longitudinis.</i>	<i>AEquinoctial.</i>	<i>Latitudinis.</i>	<i>Longitudinis.</i>	<i>AEquinoctial.</i>	<i>Latitudinis.</i>	<i>Longitudinis.</i>	<i>AEquinoctial.</i>	<i>Latitudinis.</i>	<i>Longitudinis.</i>	<i>AEquinoctial.</i>	<i>Latitudinis.</i>	<i>Longitudinis.</i>	<i>AEquinoctial.</i>
G	G	GM	G	G	GM	G	G	GM	G	G	GM	G	G	GM	G	G	GM
19	1	0 55	37	1	0 45	49	1	0 35	57	1	0 25	65	1	0 15	73	1	0 5
20	2	1 50	38	2	1 30	50	2	1 10	58	2	0 50	66	2	30 30	74	2	0 10
21	3	2 45	39	3	2 15	51	3	1 45	59	3	1 15	67	3	0 45	75	3	0 15
22	4	3 40	40	4	3 0	52	4	2 20	60	4	1 40	68	4	1 0	76	4	0 20
23	5	4 35	41	5	3 45		5	2 55		5	2 5		5	1 15		5	0 25
24	6	5 30	42	6	4 30		6	3 30		6	2 30		6	1 30		6	0 30
25	7	6 25		7	5 15		7	4 5		7	2 55		7	1 45		7	0 35
26	8	7 20		8	6 0		8	4 40		8	3 20		8	2 0		8	0 40
27	9	8 15		9	6 45		9	5 15		9	3 45		9	2 15		9	0 45
28	10	9 10		10	7 30		10	5 50		10	4 10		10	2 30		10	0 50
29	20	18 20		20	15 0		20	11 40		20	8 20		20	5 0		20	1 40
	30	27 30		30	22 30		30	17 30		30	12 30		30	7 30		30	2 30
	40	36 40		40	30 0		40	23 20		40	16 40		40	10 0		40	3 20
	50	45 50		50	37 30		50	29 30		50	20 50		50	12 30		50	4 10
Secunda.			Quarta.			Sexta.			Octava.			Decima.			Duodecima.		
30		0 50	43	1	0 40	53	1	0 30	61	1	0 20	69	1	0 10	77	1	0 2
31	2	1 40	44	2	1 20	54	2	1 0	62	2	0 40	70	2	0 20	78	2	0 5
32	3	2 30	45	3	2 0	55	3	1 30	63	3	1 0	71	3	0 30	79	3	0 7
33	4	3 20	46	4	2 40	56	4	2 0	64	4	1 20	72	4	0 40	80	4	0 10
34	5	4 10	47	5	3 20		5	2 30		5	1 40		5	0 50		5	0 12
35	6	5 0	48	6	4 0		6	3 0		6	2 0		6	1 0		6	0 15
36	7	5 50		7	4 40		7	3 30		7	2 20		7	1 10		7	0 17
	8	6 40		8	5 20		8	4 0		8	2 40		8	1 20		8	0 20
	9	7 30		9	6 0		9	4 30		9	3 0		9	1 30		9	0 22
	10	8 20		10	6 40		10	5 0		10	3 20		10	1 40		10	0 25
	20	16 40		20	13 20		20	10 0		20	6 40		20	3 20		20	0 50
	30	25 0		30	20 0		30	15 0		30	10 0		30	5 0		30	1 15
	40	33 20		40	26 40		40	20 0		40	13 20		40	6 40		40	1 40
	50	41 40		50	33 20		50	25 0		50	16 40		50	8 20		50	2 5

Collocanda est hæc Tabula statim post fol. 108.

# MEMORANDUM

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	REMARKS
10/10/40	...	...	...	...	...
10/11/40	...	...	...	...	...
10/12/40	...	...	...	...	...
10/13/40	...	...	...	...	...
10/14/40	...	...	...	...	...
10/15/40	...	...	...	...	...
10/16/40	...	...	...	...	...
10/17/40	...	...	...	...	...
10/18/40	...	...	...	...	...
10/19/40	...	...	...	...	...
10/20/40	...	...	...	...	...
10/21/40	...	...	...	...	...
10/22/40	...	...	...	...	...
10/23/40	...	...	...	...	...
10/24/40	...	...	...	...	...
10/25/40	...	...	...	...	...
10/26/40	...	...	...	...	...
10/27/40	...	...	...	...	...
10/28/40	...	...	...	...	...
10/29/40	...	...	...	...	...
10/30/40	...	...	...	...	...
10/31/40	...	...	...	...	...



## MEDI O ABERRANTES PE- Proposit. 33.

lago, aut in solitudinibus degentes, in quos-  
simus climate, inueniuntur.

**I**NTERDUM capimus Solis altitudinem me-  
ridianam, secundum modum primum propositio-  
nis septimæ huius secundæ partis, supra expositum:  
& per trigesimam huius elevationem Arietis aut  
Libræ, hoc est æquatoris, & demum latitudinem lo-  
ci nobis incogniti in quo degimus, addiscemus. Ean-  
dem latitudinem, quia polari elevationi semper æ-  
qualis est: in tabella septem climatum supra propo-  
sitioni nonæ primæ partis annexa sub titulo, Eleua-  
tio poli, inuestigabimus: quam si præcisè inueneri-  
mus, mox leuorsum clima quod incolimus, offen-  
demus, vna cum expressione principij, mediij, aut fi-  
nis eiusdem.

Quòd si numerus latitudinis in tabella non præ-  
cise apparuerit, considerabimus duos numeros iuxta  
eum viciniore. Nam penes situm eius ad illos con-  
iectabimus clima, terrestrémque tractum quem ha-  
bitamus: & an inter principium eius & medium,  
aut mediũ & finem degamus, facile concludemus.

Quòd si latitudinis numerus minor duodecim  
gradibus & quadragintaquinque minutis repertus  
fuerit, inferemus sub torrida zona prope A Equa-  
torem, & in nullo nos climate habitare.

Quòd si numerus latitudinis quinquaginta gradus & triginta minuta excesserit, versus Aquilonem post terminum septimi climatis indubitato degimus.

Exemplum

Exemplum breue: Per organum astrolabicum inuenio eleuationem Arietis loci incogniti sexagintaquinque graduum, & quadragintaquinque minutorum. Et ex consequutione eius latitudinem aut polarem eleuationem viginti quatuor graduum, quindecim minutorum, quam in tabella climatum præcisè reperio. Quare rectè cōcludo, me esse in medio secundi climatis. Reliquas autem varietates operationum, quia faciles sunt, ingenio lectoris relinquendas censuimus, ne dicacitati potius quam utilitati studuisse videamur.

Nocturno verò tempore, idem per aliquam stellam fixam, in Aranea astrolabij positam, ex orientem & occidentem hoc pacto absoluemus. Officio astrolabij cognitæ stellæ supra Horizontem apparentis, meridianam sublimitatem obseruamus: qua habita, per propositionem trigesimam huius, eleuationem Arietis aut Libræ elicimus, & demum latitudinem obseruati loci: cum qua adiumento tabellæ climatum operabimur, quemadmodum iam præcepimus, & habebimus cupitum.

Exemplum

Verbi gratia, stellæ sinistræ manus Virginis, quæ dicitur Arista aut Spica, altitudinem meridianam dili-

diligenti obseruatione inuenio quadraginta sex graduum, per quam elicio per trigesimam huius eleuatione Arietis aut *A* Equatoris esse quinquaginta quatuor graduum, sexdecim minutorum. Elicio præterea latitudinem loci obseruati incogniti triginta quinque graduum & quadraginta quatuor minutorum: qua in tabella climatum non reperta, capio illic minorem triginta trium graduum & quadraginta minutorum: & maiorem triginta sex graduum, & viginti quatuor minutorum, quibus latitudo obseruati loci intercipitur. Infero igitur locum incognitum hoc pacto obseruatum, contineri inter principium & medium quarti climatis, quod fuit optatum.

**DISTANTIAM SOLIS A ZE-** Proposi. 34.  
nith verticali puncto propositæ habitationis facile inuestigare.

**SCIT A** (per septimam huius) sublimitate Solis meridiana, ad certum diem tibi oblatum, propositæ habitationis: eandem deme ab arcu nonaginta graduum, & arcus residuus pandet tibi distantiam Zenith aut verticalis puncti oblatae habitationis à centro corporis solaris.

Quòd si cuilibet gradui distantiæ sexaginta miliaria Italica, siue quindecim Alemanica cõmunia,

aut duodecim Sueuica aßigaueris, colliges mēsuram  
terrestris itineris ab initio propositæ habitatiōis me-  
ridiem versus proficiscendo directo itinere, quous-  
que Sol meridiano tempore super verticem capitis  
proficiscentis stabit.

**Exemplum**

In exemplo, reperiat<sup>r</sup> Sol in decimosexto gra-  
du Geminorum: cuius altitudo meridiana est sexa-  
gintaquatuor graduum, quos subtraho à nonaginta  
gradibus, & remanebunt vigintisex gradus di-  
stantiæ capitis oppidi Tubingensis, à centro Phœ-  
bei corporis, eo die anni, quo Sol decimumsextum  
gradum Geminorum possidebit. Deinceps mul-  
tiplico vigintisex gradus distantiæ capitis per quin-  
decim miliaria Alemanica communia, & pro-  
ueniunt trecenta sexaginta miliaria. Ecce mensu-  
ra terrestris itineris.

**Proposi. 35.**

**AD QVOD CLIMA, RE-**  
gionem, aut oppidum, Mater aut tabu-  
la astrolabij sit fabricata aut descripta,  
pescrutari.

**S**I dubitaueris ad quam latitudinem aut polarem  
elevationem climatis, regionis, aut oppidi, mater  
aut aliqua tabula (quam moderni tympanum vo-  
cāt,) in astrolabio posita, sit confecta, supputa in li-  
nea meridiana, gradus & minutias, si quæ fuerint,

in

in almicantarath, ab æquinoctiali circulo vsque ad zenith capitis, & numerus almicantarath latitudinem ostendet: qua scita, facile in climatis, regionis, aut oppidi cognitionem deducêris.

Vel, & est idem, numera in linea mediæ noctis, à centro astrolabij vsque ad primum almicantarath, id est, Horizontem versus septentrionem: et habebis iterum super quam altitudinem mater aut tabula astrolabij sit composita.

Altitudo verò capitis Arietis au Libræ, est tot graduum, quot fuerint ab horizõte vsque ad æquatorem, vel à zenith vsque ad centrum astrolabij.

Nullò hîc exemplo propter facilitatem propositionis opus esse reor.

**GRADVM ECLYPTICAE,**  
cum quo stella in reti descripta, oritur  
vel occidit, inquirere.

Proposi. 36.

**L**OQUIMUR impresentiarum de stellis orientibus & occidentibus. Stellæ igitur oblatae apiculum exortiuo Horizonti adiunge, & mox in linea ecliptica apparebit gradus cum quo stella exoritur: qui cuius & quotus sit signi, per nominis & numeri assignatiões facile addisces. Præterea reti gyrate stellæ caput horizonti occiduo applica: & iterum in ecliptica videbis gradum, cum quo stella labi-

*Exemplum* tur et occidit, nomine signi et quoto gradu adiectis.  
*Huius rei gratia, sit mihi oblata stella Tauri Aldebaran: iubeor inuestigare, cum quo gradu eclipticæ vel oriatur, vel occidat. Pono cacumen eius super arcum Horizontis orientalem, & dico ipsam oriri cum vndecimo gradu Geminorum: deinde reti circumducto, eius cacumen iungo arcui horizon- tis occidentali, & dico ipsam occidere ferè cum vigesimo octavo gradu Tauri. Simile iudicium de stellis reliquis.*

Proposi 37.

**GRADVM ECLYPTICAE,**  
 cum quo stella quæuis in aranea posita  
 cœlum mediat, perscrutari.

**SI SCIRE** cupis, cum quo gradu eclipticæ,  
 stella aliqua meridianæ lineæ sese iunget, pone  
 ipsius cacumen super lineam meridianam, & gra-  
 dus Zodiaci, qui super eandem lineam ceciderit, est  
 gradus cum quo stella cœlum mediat. Qui cuius sit  
 signi, & quotus in ordine graduum, adiectæ scri-  
 pturæ dicto citius indicabunt.

*Exemplum* In exemplo repetatur stella Tauri Aldebaran,  
 qua vsi sumus in propositione antecedente: apto ca-  
 cumen eius lineæ meridianæ, & dico eam cum 3.  
 gradu Geminorum mediare cœlum, quia cum eo-  
 dem ad lineam meridianam peruenit.

*Aliud.*

*Aliud. Stella Vrsæ maioris in principio caudæ eiusdem existēs, dicta Alioth, applicata lineæ meridiana, mediat coelum ferè cum 7. gradu Libræ. Non aliter cum alijs stellis operaberis.*

**QVORVNDAM VVLGAR-**  
 rium astronomorum propositiones fragi- Proposi. 38.  
 les & penè inutiles in vsum astrolabij in-  
 troductas, negligere.

**ETSI** omnibus ferme bonis artibus nonnullæ  
 deprauationes & contagia immiscentur, vt  
 somnij cuiusdam & anilis fabulæ speciem apud  
 plures etiam doctissimos contrahant, illa tamen in  
 mathematica omnino pudenda sunt & intolera-  
 bilia, quæ confessu omnium perpetuam præ se fert  
 certitudinem. Cum autem nonnullorum nouitio-  
 rum astronomorum commentaria conspicio, effu-  
 tiunt ipsi (bona venia impetrata) canones (vt aiunt)  
 aut propositiones plures, quibus per cæcitatem sto-  
 lidam præcones propriæ ineptiæ, vsum nostrum in-  
 strumentum potius obtenebrant & occultant quàm  
 elucidant. Vt igitur homines nostræ ætatis cautiores  
 fiant, & ne telis ledantur improuisis, libuit eas bre-  
 uibus recensere. Propositio ergo prima exploden-  
 da & negligenda est hæc.

*Per astrolabium scire signum & gradum Lunæ.*

Secunda, per idē inuestigare loca vera Saturni, Iouis, Martis, Veneris, et Mercurij ī ipso signifero.

Tertia, cognoscere latitudines Lunæ & omnium planetarum, dempto Sole, qui latitudine caret.

Quarta, inquirere an planeta sit directus aut anomalous, siue retrogradus.

Quinta, perscrutari in quo gradu signi sit quælibet stella fixa in reti descripta.

Sexta, scire latitudines stellarum fixarum.

Septima, determinare signum & gradum cuiuslibet stellæ fixæ in Aranea non positæ. Has propositiones & similes fuge optime lector, vt Scyllam & Charybdim. Quarum fragilitatem & imbecillitatem ostendere impresentiarum silentio prætereundum censeo, ne paulo licentius euagari videar: cum et potissimum quotidianum exercitamentum earundem falsitates tibi indicabit. Taceo quòd à mente omnium antiquorum astronomorum sunt prorsus alienæ.

Proposi. 39.

ZENITH ORTVS ET OCCASUS Solis & stellarum fixarum vtiliter inuestigare.

PRO intellectu huius & sequentis propositionis aduertendum est, quòd horizon seu primum almicanth distribuitur in quatuor quartas: qua-

rum



rum prima inchoat à puncto, vbi æquator interfecat primum almicantarath aut horizontem exortiuum. In quo quidem puncto Sol principium Arietis aut Libræ possidens, toti vniuerso æqualiter oritur, et finitur in linea meridiana sub armilla aut suspensorio: & vocatur Quarta orientalis meridionalis. Secūda incipit à linea meridiana, & terminatur in puncto vbi æquator interfecat primum almicantarath, aut horizontem occiduū: in quo Sol initium Arietis aut Libræ tenens, cunctis occidit mortalibus: et appellatur Quarta meridionalis occidentalis. Tertia initiatur ab eodem puncto vbi terminatur secunda: et finit se in lineam mediæ noctis interfecantē primum almicantarath siue horizontem: & nominatur Quarta septentrionalis occidentalis. Quarta incipit à fine tertiæ quartæ: et terminatur in principio primæ quartæ, & dicitur Quarta septentrionalis orientalis, et quælibet quarta à principio vsque in finem eius continet 90. gradus: quos azimuth nobis indicant, & ideo si habueris in qualibet quarta nonaginta azimuth, quodlibet azimuth valet vnum gradum. Si 45. tenet, valet duos gradus. Si 30. quodlibet valet 3. gradus. Si quindecim, quodlibet valet 6. gradus. Si nouem (vt in nostro astrolabio) quodlibet valet 10. gradus, & sic consequenter.

Præterea contuendum, quòd Zenith ortus Solis, aut, vt generalius loquar, Zenith Solis non accipi-

tur hîc pro puncto verticali, scilicet pro puncto capitis eorum quibus sol meridiano tempore secundum rectam lineam insidet: sed accipitur hîc Zenith ortus Solis pro puncto distantiae aut elongationis ortus Solis: ab oriente vero, quem sol in principio Arietis aut Libræ designat. Sic per Zenith occasus Solis intelligitur punctum distantiae occasus Solis ab occidente eiusdem vero, quem sol in exordio Arietis aut Libræ aperit, quare rectè dicimus, solem per Borealia aut septentrionalia signa decurrentem, Zenith ortus & occasus Boreale aut septentrionale habere. Et eundem per Austrina aut meridiana signa gradientem, Zenith ortus & occasus Australe aut meridianum sibi vendicare.

De Zenith ortus & occasus stellarum fixarum, haud secus atque de Sole argumentandum est.

Deinde (vt generalem quãdam adducamus doctrinam) Zenith Solis aut stellæ fixæ in hac materia, est distantia ipsius ab initio alicuius quartæ iam iam memoratæ: hoc est, aut ab initio lineæ veri orientis aut occidentis: meridiei aut mediæ noctis.

His prænotatis: cum scire optaueris Zenith ortus aut occasus Solis, aut alicuius stellæ fixæ, siste gradum Solis aut cacumen stellæ super horizontem exortivum: & ad situm gradus Solis aut cacuminis stellæ horizontem nota affice: postea adiumento ipsorum Azimuth supputa gradus horizontis orienti vero, id est

id est æquinoctio, & nota signata interiectos: & numerus graduum qui in nota sese terminat, pandet tibi Zenith ortus Solis aut stellæ: scilicet distantiam ortus ipsius ab ortu Arietis aut Libræ. Et dicitur Zenith huiusmodi ortus meridionale, si fuerit in quarta prima inuentum: aut septentrionale, si in quarta quarta repertum fuerit. Et super similem numerum graduum Azimuth erit Zenith occasus: & etiam in simili quarta, puta septentrionali aut meridiana.

In exemplis lucidius capies. Sit Sol in 25. gradu Exemplum  
Geminorum: volo Zenith ortus ipsius explorare, pono .25. gradum Geminorum super horizontem orientalem: & cadit in spatium horizontis inter trigesimum & quadragesimū azimuth contentū. Facio igitur ad gradum solis notam in spatio horizontis: & postea illud spatium partior à trigesimo Azimuth in quadragesimum in 10. & video Zenith ortus solis esse septentrionale, & distare ab oriente vero vel æquinoctio 37. penè gradibus: & cōsimiliter Zenith occasus septentrionale dico ab occidente vero abesse 37 gradibus. Aliud. Offeritur mihi Azimech, Spica Virginis, cacumē eius iungo Horizonti exortiuo, & concludo Zenith ortus ipsius meridionale 13. ferè graduum. Huius propositionis vtilitas hæc est, quòd per eam scimus, in quo loco Horizontis Sol vel stella fixa oritur aut oc-

cidit: administrat etiam cognitionem Stellarum nobis nondum cognitarum, prout sequentibus propositionibus abunde accipies.

Proposi. 40.

## ZENITH SOLIS ET STELLARUM fixarum indagare.

**Z**ENITH Solis, hoc est, distantiam centri ipsius ab initio alicuius quartæ, sic inuenies:

Ad horam propositam officio astrolabij observa altitudinem Solis, deinde gradum Solis in reti pone super numerum consimilem in ipsis almicantarath obseruatæ altitudinis, in ea parte qua fuerit sol: quæ admodum pro horarum inuentione facere cõsueuisti: et azimuth super quod ceciderit gradus solaris, ostendit tibi Zenith Solis, id est eius distantiam ab initio alicuius quartæ, si saltem destiterit. Et necesse est quòd huiusmodi Zenith aut sit in quarta meridiana orientali, aut meridiana occidentali, aut septentrionali orientali, aut septentrionali occidentali.

Haud dissimiliter agendũ est cum stellis fixis in reti locatis. Quod si centrum solis aut stellæ apiculus in interuallo duorũ azimuth ceciderit, age pro gradu distantiæ sciẽdo, aut per æstimationẽ, vt plerũque facimus, aut per diuisionẽ interualli in decẽ gradus, prout in propositione antecedenti satis didicisti.

Exemplum

Resumatur gratia exẽpli, sol in propositione proxima supra in vigesimoquinto gradu Geminorum repertus,

reperitus, & supponatur quòd sit hora nona æqualis antemeridiana. Capiò eadem hora solis sublimitatē supra horizontem, quā inuenio penē quadraginta-septem graduū: apto igitur vigesimūquintū gradum Geminorum super 47. almicantarath, et elicio Zenith Solis esse meridionale orientale, distans ab oriente verò viginti ferè gradibus.

Item repetatur spica Virginis, & sit sol iterum in vigesimoquinto gradu Geminorum, & ponatur quòd sit hora decima noctis æqualis: per obseruationem video Spicam eadem hora eleuari vigintitribus quasi gradibus, ac contineri in quarta meridionali occidentali, et eius Zenith abire à linea meridiana, iam dictam quartam initiante, propemodum quadragintaquatuor gradibus. ecce.

## QUATVOR MVNDI PLA- gas utiliter inuestigare.

Proposi. 41.

**M**ESSAHALLA harū rerū duos modos operādi exposuit. Verūm quia primi exequutio admodum difficilis est, ex eo quòd in locatione astrolabij super planum horizonti æquidistans ad modicā eius motionem aut rotationem circularem, lineæ quatuor plagarum indicatiuæ, facile à veris mundi plagis recedunt. Quocirca eundem modum in presentiarum missum faciemus.

Secundū autem, quē idem in calce Capituli pa-

rumper tetigit, lucidius hoc pacto prosequemur:

Recipe altitudinem solis ad horam optatam: qua quatuor mundi plagas, hoc est, Orientem & Occidentem, AEquinoctios, Meridiem et Septentrionem scire desideras: & pone gradum Solis super inuentam altitudinem inter almicantarath, in ea parte qua fuerit sol. Et animaduerte in qua quarta de supra expositis quartis sit sol, & per quot gradus de gradibus azimuth distet à principio alicuius quartæ. Numerum igitur graduum azimuth supputa in dorso astrolabij in consimili quarta: & ubi numerus terminatur, ibi pone regulam, qua inuariabiliter manente, apta astrolabium secundum superficiem planam, æquidistanter horizonti: & verte astrolabium, vt umbra amborum laterum tabellarum regulæ affixarum, cadat super duo latera regulæ directæ, scilicet umbra dextri lateris tabellæ super dextrum latus regulæ, & sinistra super sinistrum: vel æquidistanter: et mox quatuor lineæ concurrentes in centro astrolabij, indicabunt tibi quatuor mundi plagas: videlicet linea orientis, Orientem, meridiana, meridiem, & sic de reliquis.

Verum id facilius, et forsàn veriùs, per inuentionem lineæ meridianæ modo vulgato, aut per horarium Compassi absolues: habita enim linea meridiana in plano ad æquidistantiam horizontis posito, iunge rectissimè lineam meridianam astrolabij lineæ meridianæ

ridianæ inuenta: ita quòd armilla versus meridiem statuatur: quo factò, linea mediæ noctis instrumenti lineæ meridianæ versus septentrionem copulabitur, & habebis optatum.

Exemplum hîc nullum adiiciemus, quia solus vsus & visus te artificem facient.

## COGNITA VNA STELLA

Proposi. 42.

fixa Araneæ, aliarum incognitarum notitiam inquirere.

**S**I TIBI aliqua stella fixa in Aranea posita nota fuerit, per eam quamlibet aliã tibi incognitam in Aranea descriptam, hoc modo cognosces: Nocte serena altitudinem stellæ tibi notæ observa, deinde cacumen eius pone super observatam altitudinem inter almicantarath ab oriente aut occiduo computando, secundum quod videris eam in firmamento situatam. Quo factò, vide concito ad stellam tibi incognitam in reti positam, et eius altitudinem inter almicantarath considera, & in qua parte de quatuor partibus mûdi ceciderit, super æqualem altitudinem pone Alhidadam in dorso astrolabij: & verte te versus eandem plagam mundi, in quam cadebat stella ignota: & maiorem aut fulgentiorem stellam quam videbis per foramina tabellarum, ipsa est quam quæris: & sicut operatus es cum vna, sic age cum qualibet alia stella in reti locata.

Exemplum

Breue exemplum accipe: Ponatur sol in vigesimo octavo gradu Geminorum, & hora equalis decima pomeridiana, & sit azimech Spica Virginis, stella mihi nota. Alkayr autem siue Aquila volans in caelo incognita, quam cupio notam fieri. Accipio ad horam propositam altitudinem stellæ Spicæ, quam inuenio vigintiduum graduum: sed quia ipsa locatur in parte mundi occidentali, idcirco computo vigintiduos gradus altitudinis Spicæ à primo almicantarath occidentali versus lineam meridianam, & 22. Almicantarath cacumen stellæ dictæ iungo, & mox conuerto me ad stellam Alkayr in reti positam in caelo incognitam: quam video situatam in parte orientali, habentem altitudinem triginta ferè graduum. Pono igitur Alhidadam dorsum super trigessimum gradum quartæ altitudinis, & suspenso (vt solet) astrolabio, verto me versus orientem, per tabellarum foramina prospiciendo, & stella quæ visui obijcitur, ipsa est Alkayr, aut Aquila volans. Ecce incognitæ stellæ notitia, quod fuit cupitum.

Propos. 43.

**N**VLLIS STELLIS OCTAVI orbis cognitis, in earum notitiam artificiosè peruenire.

**Q**UID (per DEVM immortalem) iucundius, quid amoenius, quid denique suavius oculos



los nostros afficere potest, quàm illa tot & tanto-  
 rum luminũ venustissima & ordinatissima series?  
 Eò quippe si rapiemur animo, experiemur nihil nos  
 vnquam sensisse in hac vita delectabilius. Quocir-  
 ca si nullius stellæ fixæ tibi cognitio fuerit, & ea-  
 rum in cœlo notitiam habere optaueris, hoc pacto  
 operare. Per horologium bene correctum observa  
 horã noctis, ad quẽ gradũ solis in reti (vt assolet pro  
 nocturnarũ horarum notitia habenda) applica. Quo  
 factò, vide quæ stella super horizontem exortiuum  
 ceciderit, ea cuius notitiam quærebas, tunc tempo-  
 ris oritur: & quæ super horizontem occiduum ce-  
 ciderit, tunc occidit. Et vt absolutius & lucidius  
 rem capias, considera per decimam nonam huius,  
 qua hora noctis stella cuius notitiam quæris, veniat  
 ad horizontem orientalem. Præterea per trigesimam  
 nonam huius aduerte Zenith ortus stellæ, & nu-  
 merum graduum inter Azimuth & quartam in  
 qua Stella exorietur. Quibus habitis, per quadrage-  
 simam huius pone astrolabium secundum quatuor  
 mundi plagas, & applica Alhidadam ad gradus  
 Zenith ortus in ea quarta, in qua stellam offendisti:  
 & cum iam tempus ortus stellæ appropinquare de-  
 creueris, vide per foramina maiora tabellarum, &  
 orientis stellæ radij oculo tuo per foramina inciden-  
 tes, notitiam propositæ stellæ indicabunt. Similis est  
 de occasu stellæ operatio, & profecto (me iudice)

facilior: cum ipsam supra horizontem morantem  
 & iam occiduum petentem tabellarum foramini-  
 bus sese applicare facilimè cōiectabis, vnde prom-  
 ptior eius notitia nanciscetur. Habita igitur noti-  
 tia aliquarum stellarum pro modo huius institutio-  
 nis, per antecedentem huius, in cognitionē omnium  
 in reti descriptarum pedetentim deduceres.

## Exemplum

In exemplis: Sit sol in principio Tauri, &  
 stellæ Alkayr mihi incognitæ notitiam habere cu-  
 pio, per astrolabium elicio eandem hora vndecima  
 nocturna accedere horizontem orientalem, qua-  
 re paululum ante vndecimam quero Zenith or-  
 tus stellæ, quod est 12. ferè graduum quartæ se-  
 ptentrionalis orientalis. Deinde in loco sublimi  
 quo liber patet horizon, apto astrolabium quatuor  
 plagis mundi, & alhidadam iungo 12. gradui or-  
 tus Zenith stellæ in 4. orientali septentrionali: &  
 iuncto oculo maioribus tabellarum foraminibus,  
 stella quæ circa vndecimam oriendo oculo obiici-  
 tur, ipsa est Alkayr, cuius notitiam petebam. A-  
 liud, Ponatur Sol in principio Cancri, cupio stellæ  
 Azimech, hoc est, Spicæ Virginis notitiam acqui-  
 rere, per propositionem 39. supra, habeo quòd Zenith  
 occasus eius est 13. graduum quartæ meridionalis oc-  
 cidentalis, & officio astrolabij scio eandem circa  
 duodecimam horam noctis appropinquare occasui,  
 quare tunc astrolabium quatuor plagis, & alhi-  
 dadam

dadam 13. gradui in quarta meridionali occiden-  
tali applico. Oculo autem foraminibus tabellarum  
apposito, stella fulgentior occiduum petens, pau-  
lum post duodecimam, radios per foramina ocu-  
lo immittens, ipsa est Azimech quam noscere cu-  
piebam, & sic de reliquis.

## VENTORVM NOTITIAM Proposi. 44.

utiliter habere.

**C**um ventorum flatus varia mortalibus & re-  
bus subcoelestibus, potissimum aëri donent mi-  
nera, nonnunquam enim imbres, nebulas, tempestates,  
humiditates, siccitates, caliditates, frigiditates, sere-  
nitates, pestilentiasque præstare noscuntur, nõ ab re  
(priusquam ad operationem pro ventorum cogni-  
tione descendatur) eorundem naturas, conditiones  
& situs sub epitomate narrare decreuimus. Ventus  
itaque Subsolanus primarius à Solis ortu æquino- Subsolanus.  
Etio spirans (nascitur enim sub Phœbeis radiis,  
dum sol æquinoctialis insidet) calidus est, siccus,  
temperatus, suavis, purus, subtilis, & salubris, præ-  
cipuè mane. Nam à sole purior & subtilior effi-  
citur, vnde nihil veneni, mortalium infert cor-  
poribus.

Vulturnus, Graio sermone Cæcias appellatus, Vulturnus  
altè flat, ve  
dexterior Subsolanus, ab æstiuo Solis exortu ve-

vultur volat. Ita secundū Arist. flat vt nubes non procul pellet, sed ad se vocet, inde adagiū: Mala ad se trahit, vt Cæcias nubes.

niens, cui ab occiduo hyberno ad rectam lineam Aphricus opponitur: calidus, cuncta desiccans, Altitonans dictus. De quo Lucretius:

Altitonās Vulturnus, & auster fulmine pollēs.

Eurus à sinistro latere venit Subsolanus, à Brumali Solis ortu prouens, calidus, & siccus remissè, orientem nubibus irrigans, eo flante (teste Aristotele) omnia videntur esse maiora solito. Auster, secundum Græcos Notos, plagæ meridianaë ventus cardinalis, humidus, calidus, atque fulmineus, generans largas nubes & pluuias latissimas, faciens aërem crassum, densum & spissum: nubila nutrit, & nebulas mittit, nonnunquam pestifer ipsius est spiritus, maximè dum per Cyrenaicam regionem volat,

1. Meta. fab. 2. & 7.

de quo Ouidius: — contraria tellus, Nubibus assiduis, pluuiisque madescit ab Austro. Et idem.

Emittitque Notum, madidis Notus euolat alis.

Euroauster.

Euroauster aut Euronotus, ventus calidus & humidus, lateralis Austro orientem versus. Intonat enim à dextris Ausuri. Euroauster vocatus, quia ex vna parte habeat Eurus, ex altera Austrum, haud dissimili ratione Euronotus dictus.

Austroaphricus.

Libonotus.

Austroaphricus aut Libonotus ventus temperatus, calidus, lateralis Austro versus occidentem. Spirat enim à sinistris Ausuri. Austroaphricus appellatus, quod iunctus sit hinc inde Austro & Aphrico.

*phrico. Et Libonotus, quia Noto & Libe vallatus.*

*Zephyrus aut Fauonius ventus principalis occidentius, euentans ab occasu Solis æquinotio, caloris & humoris habens temperiem, salubris in calce diei, pruinas & niues resoluens, & quæ aspero gelu induruerant, dissipat, et relaxat, herbarum florumque origo. Omne mortale genus ad eius flammam luxuriat, reuocans Venerem, producendæ sobolis gratia. De quo Boëtius secundo met. 3.*

Zephyrus.  
Fauonius.

*Cum nemus flatu Zephyri repentis.*

*Vernis irriguit rosis.*

*Spiret insanum nebulosus Auster.*

*Iam spinis abeat decus.*

*Aphricus aut Libs ventus à dextro Zephyri latere intonans. Ad meridiem enim ab ipso recedit, brumale occupans Solstitium, frigidus, humidus, pluuiosus, tempestatisque præfagus, ab Aphrica & Libya regionibus vnde euentat, nomina sumit. De quo Vergilius primo Aeneid.*

Aphricus  
aut Libs.

*Vna Euris Notusq; ruunt, crebèrque procellis  
Aphricus, & vastos tollunt ad sidera fluctus.*

*Corus, quondam dictus Caurus, sinistram tenet Zephyri, à tropici æstiu occasu efflans, frigidus & humidus, paruum secum ducens rigorem, quoniam ad Arcton respicit. Eo flante in oriente nubila sunt die sereno. Lucanus 1. Pharsal.*

Corus  
Argestes.  
Iapix.

*— Non Corus in illum,*

Ius habet aut Zephyrus, solus sua littora  
turbat Circius.

**Septentrio.**

*Septentrio ventus primarius, Austro obiectus, à polo flans arctico. Dicitur Septentrio, eo quòd sub plaustri septem stellis (quarum quæ antè eunt triones, hoc est, boues aratorij compellatæ) originem ducit. Græcè verò quòd ab arcto flet, Aparctias appellatur, frigidus & siccus, faciens frigora & nubes siccans, constringens corpora, poros claudens, humores purificans, aërem pestiferum leuans.*

**Circius.**

*Circius à Graiis Thracias dicitur, hic à plerisque Latini nominis expers creditur, à dextris septentrionis efflans: hunc Hispani Gallicum vocant, propter flatum eius à parte Galliciae. Circius vocatus, eo quòd Coro vicinus sit, faciens niuium & grandinum coagulationes & abundantiam. De quo Lucanus supra. Non Corus, & cætera.*

**Aquilo aut Boreas.**

*Aquilo aut Boreas lateralis septentrioni orientem versus, ex alto flans, gelidus & siccus, sine pluvia, lædens flores & fructus teneros: corrumpens vineas germinantes, florètes exurens herbas, & arborum vires spolians, & vterque plerunque pro cardinali, scilicet septentrione ponitur, & Aparctias nominatur. Ouidius:*

—Scythiam septémque triones,

Horrifer inuasit Boreas &c. *Virgilius:*

Et glacialis hyēs Aquilonibus asperat vndas.

*Boëtius*

*Boëtius primo 6.*

Nunquam purpureum nemo

Lecturus violas petas:

Cùm sæuis Aquilonibus,

Stridens campus abhorruit.

*Et Proverbiorum 25. Ventus Aquilo dissipat pluuias.*

*Hæc breuiuscula pro liquidiore nostræ propositionis intelligentia notanda censuimus. Iam iamque ad operationem pro ventorum notione, & à quibus spirent oris accedendum restat. In loco igitur præcelso & aperto dispone Astrolabium (per quadragesimam huius) secundum quatuor mundi cardines aut plagas, ita vt pars antica aut facies appareat. Et in centro eius erige hastulam, cui fac vexillum in parte superiori adherere. Taliter, quòd ad flatum venti facile possit agitari, atque circumferri, quibus dispositis, vento flante, considera quem pars prior vexili indicet, aut cui applicetur. Eius enim venti obiectus oppositusque spirare perhibetur.*

*Gratia exempli, video vexillum porrigi versus Subsolanum, dico tepentem Zephyrum aut salutarem Fauonium ventum cardinalem occidentalem Subsolano obiectum spirare. Item cerno vexillum in Austrophricum dirigi, infero procellosum Aquilonem aut Boream Thracium, sonorùmque, col-*

**Exemplum**

lateralem Septentrioni versus orientem euentare.  
 simile de aliis sume iudicium.

DE ORTV ET OCCASV SI-  
 gnorum, graduum, & stellarum, pro more  
 Astrologico præambula quædam dicendis  
 accommodare.

Proposi. 45.

**H**IC de ortu aut ascensione signorum & eo-  
 rundem partium, de stellis firmis & erraticis,  
 item de descensione siue occasu signorum, partium,  
 & stellarum, quorum ortuum & occasuum præser-  
 tim astronomis præcipua cura est, exequemur.

Ortus igitur astronomicus signi, est portio æ-  
 quatoris, quæ vnâ cum signo ex Orientis parte su-  
 per horizontem emergit aut ascendit, & hoc pacto  
 de ortu partis signi dicatur, qui bifariam diduci-  
 tur, in rectum & obliquum.

Ortus astro-  
 nomicus  
 quid, & du-  
 plex, Rectus  
 & obliquus.

Signum recte oriri dicitur, cum quo maior pars  
 æquatoris oritur, & ita de parte signi dicendum.

Sed oblique, pronè aut tortuose signum oritur, cum  
 quo minor pars æquatoris super horizontem se at-  
 tollit, & ita quoque de parte signi dicatur.

Occasus autem astronomicus signi, est pars æ-  
 quatoris, quæ cum signo occidente tendit sub hori-  
 zontem, idem de parte, & etiam bifariam secatur,  
 in rectum & obliquum.

Occasus A-  
 stronomicus  
 quid, & du-  
 plex, Rectus  
 & obliquus.

Occasus



Occasus signi rectus est, quoties maior pars æquatoris, cum eo simul occidit, tenditq; in occasum.

Occasus signi pronus aut obliquus, est quoties æquatoris portio minor sub horizontem simul vnâque cum signo demergitur.

Et intelligitur maior portio æquatoris cū signo aut oriri aut cadere, quoties plures triginta gradibus æquatoris cum signo aut emergūt, aut decidūt.

Et cōtrā, minor, si pauciores triginta gradibus cum eo orientur, occidant ve: & hoc pacto de ortu & occasu partium intelligere facillimum est.

Ortum autem signi astrologi assucto vocabulo ascensionem nuncupant: Occasum verò descensionem.

Ascensio igitur signi quid est, nisi pars æquatoris, quæ cum signo oriente peroritur?

Descensio autem signi pars est æquatoris, quæ signo occidente vnâ occidit & labitur, & vtraque in rectam & obliquam distinguitur, quemadmodū de ortu & occasu iam suprâ notauimus.

Cæterum non incommode & hoc quidem hîc notandum est, quod astronomi spheram diuidunt in rectam & obliquam.

Sphæra recta est eorum qui sub æquinoctiali circulo habitant, quæ prouidè recta dicitur, quòd illis pari interuallo in medio duorum polorum interstitio positis, neuter polorum alteri magis eleuetur,

Q

Et quia eorum horizon æquinoctialem ad angulos rectos æquosque interfecat.

Sphæra obliqua.

Sphæra obliqua, est sphæra habitantium ultra citraque æquatorem, quæ ideo obliqua, prona, et decliuis dicitur, quòd æquo interuallo in medio polorum interstitio siti non sint, verum illis vnus polorum semper eleuatur, alter autem iisdem semper depressus occultatur, aut quòd illorum horizon æquinoctialem circulum ad angulos obliquos inæqualésque intercipit atque secat, quem proinde horizonta artificialem nuncupant, quòd diem artificialem à nocte artificiali dirimat, et inæquales (nisi bis in anno) reddat. Et semper obliquæ decliuisque sphære horizontem angulis imparibus æquatorem secare verum esse constabit, nisi omnino è directo sub polo iaceant, horum enim horizon æquinoctialem circulum non interfecaret: imò eundem æquatori circulo idem esse contingeret. Sphæram tamen propter primam causam obliquam decliuiemque habere censerentur, quòd alter polorum illis eleuatus maximè superemineret, alter verò maximè depressus semper occultaretur.

In sphæra igitur tum recta tum obliqua, signa Zodiaci et eorum partes rectè et obliquè ascendunt et descendunt, sequentibus propositionibus id facile indicantibus. Quare titulus communis tabule ascensionum habitantium sub æquinoctiali circulo,

culo, quem plures circulum directum aut rectum vocant, non crudè accipiendus est, ac si habitantibus spheram rectam solummodo essent ascensiones recte & nullè oblique. Titulus enim is est: Tabula ascensionum rectarum, qui hoc modo accipiendus est: Tabula ascensionum rectarum, id est, eorum qui habitant spheram rectam, vel eorum qui sunt constituti sub circulo directo aut recto. Si titulus tabularum colentium spheram obliquam aut declinè moderandus est, cum sonat: Tabula ascensionum obliquarum ad latitudinem 49. ferè graduum: obliquarum, id est, habitantium spheram obliquam, quanuis etiam ibidem aliqua signa rectè, aliqua obliquè ascendant & orientur.

Tabularum ascensionum in sphaera recta.  
Declaratio tituli tabule ascensionum rectarum.

In communibus autem nostris locutionibus, cum iubemur querere ascensionem rectam alicuius signi, partis, vel etià stellæ, id per tabulam ascensionum rectarum absoluimus, ac si iussi essemus investigare ascensionem huiusmodi per tabulam ordinatam pro sphaera recta, aut (vt alij dicunt) pro circulo directo siue recto. Item cum precipimur elicere ascensionem obliquam, ingredimur tabulam pro sphaera obliqua confectam ordinatamque. De his satis.

Præterea contuendum, quòd ascensio gradus Zodiaci aut stellæ pars est æquatoris à principio A-

Ascensio gradus.

exortiuo, cui gradus aut stella iungitur sese terminas. Quam si in sphaera recta computauerimus, ascensionem rectam gradus aut stellae appellabimus, obliquam vero si supputationem in decliui sphaera perfecerimus.

Descensio  
gradus.

Descensio autem gradus aut stellae, est portio aequatoris ab initio Arietis in contactum horizontis occidentalis, cui gradus aut stella adheret, computata.

Regula ascensionis & descensionis aequatoris.

De ascensione & descensione aequatoris aduertenda est haec regula: Aequinoctialis circulus tum in sphaera recta, tum decliui regularis vniuersis que ascendit & descendit, ita, vt in temporibus equalibus continue aequales arcus portionesque conscendant & descendant: quo fit, vt cum in omni horizonte 24. horarum intervalla completa aequatoris circuli reuolutionem contineant: In vna ergo qualibet hora continuo aequatoris 15. gradus emergunt. Cuius ratio haec sumitur, quia in polis propriis qui sunt primi mobilis circumfertur; cuius motus regularis & vniuersis est semper. In propriis igitur polis aequator motus, inexistens mobili regulari, necessario regulariter mouetur.

Regularitatem autem motus ipsius aequatoris ex nostro Astrolabio hoc pacto facile colliges. Siste principium aequatoris ad horizontem orientalem, cui Almuri applica, quo facto, promoue rete cum Almuri initio aequatoris immoranti ab hora sexta lim-

bi equali, vsque in principium septimæ succedentis, & videbis de æquatore 15. gradus exortos, promote consequenter rete, & eius ostensorem ad initium octauæ horæ equalis: & videbis in Horizõte alios quindecim gradus æquatoris emerfisse, & ad quotquot horas ostensorem accomodaueris, semper quindecim gradus æquatoris exortos conspicias. Quare sponte confiteberis motum æquatoris esse vniiformem & regularem. His tanquam prælibamentis sequentium propositionum præhabitis, stilum ad propositiones scitu dignas vertemus.

## VNIUS SIGNI ZODIACI Proposi. 46

aut potius eclipticæ vel plurium ascensionem & descensionem in sphaera recta facile numerare.

**H**orizontem sphaera rectæ in nostro instrumẽto Horizon sphaerae rectæ. ostendit diameter faciei per transversum astrolabij trãsiens. Cuius pars vna sinistram versus, orientalem horizontẽ, & quæ versus dextrã, occidentalem indicat: prout abundè propositione prima huius secundæ partis disseruimus. Præterea huius Duplex exercitium. sequentiũ propositionũ exercitiũ, aut per gradus limbi æquatorem præ se ferentes, aut per æquatorem retis in trecentos sexaginta gradus diductum absolui potest. Et si operando amborum modorum periculũ sumpseris, inuenies eos in nullo distare.

Si igitur vnius signi duntaxat ascensionem in circulo directo scire desideras, initium signi siste in linea horizontis recti in parte orientali: & almuri adiecto fac notam in gradibus limbi, aut (quod idē est) in gradibus æquatoris retis. Postea moue rete, ita quòd almuri initio signi firmiter adhæreat, donec finis signi cadat in eandem lineam horizontis recti: & iterum ad situm almuri fac notam in gradibus limbi aut æquatoris. Deinde supputa gradus limbi aut æquatoris à prima nota vsque in secundam. Tot enim gradus, quot supputando collegisti de æquatore, ascendunt cum tali signo in horizonte recto, qui ipsius ascensio aut ortus nuncupantur. Quos si per quindecim diuiseris, horas, & residuum per quatuor multiplicaueris, minuta horæ elicies: & habebis horas & minuta, quibus propositum signum in sphaera recta exoritur.

## Exemplum

In exemplo offertur mihi signum Arietis, cuius ascensionem in sphaera recta numerare præcipior: principium eius applico horizonti recto in parte exortiuo, & almuri vel ostensore adiecto, pingo notam in gradibus limbi aut æquinoctialis. Postea rete cum ostensore voluo, vsque quo terminus Arietis in lineam recti horizontis ceciderit, & ad ostensoris tactum, gradus limbi aut æquatoris, nota afficio. Tandem cõputo aut in limbo, aut æquatore, gradus his notis interceptos, & colligo penè vigintiocto. Di

coigitur, quòd ascensio arietis est vigintiseptè quasi graduū. Tot enim, Ariete oriente, de æquatore vna exoriuntur. Diuido vigintiocto grad<sup>o</sup> per quindecim & habeo vna hora: & in residuo tredecim gradus: quos per quatuor multiplico, & emergūt quinquagintaduo minuta. Quare Aries in sphaera directa, in vna hora æquali et quinquagintaduobus ferè minutis, ortum perficit.

Non dissimili operatione ascensionem duorum trium, vel plurium signorum inuestigabis: & id in exemplo facile capies: Proponuntur mihi duo signa, Virgo & Libra, quorum ascensionem in horizonte recto extrahere iubeor: sisto principium Virginis vna cum almuri ad horizontem rectum, & in limbo aut æquatore pingo signaturam: postea gyro rete cum almuri, vsquequo finis Libræ recto horizonti iungetur, & iterum facio signaturam. Et numeratis gradibus, signaturis interiectis, colligo ferè quinquagintasex, forsitan minus decem minutis, ascensionem horū duorum signorū in sphaera recta.

Simile iudiciū est de portione vnus signi, &c.

Descensio autem signi vel signorum aut portionum zodiaci in circulo recto similis est ascensionis: quamobrem non est opus seorsum tradere, quo pacto huiusmodi descensio computetur.

Cæterum si arcui eclipticæ aut signo Zodiaci assignato, ascensionem in sphaera recta, à sectio-

ne vernali, id est, à principio Arietis initiū numerationis sumendo, breui cōputo deputare volueris: siste finem oblatis arcus aut signi super horizontem rectū in parte orientali, & gradus æquatoris Araneæ tangens eundem horizontem, dicto citius indicabit tibi ascensionem ipsius in sphaera directā. Quod si hoc per gradus limbi scire volueris, termino arcus aut signi in horizonte recto stante, applica ostensorem ad principium Arietis, & scribe notam in gradibus limbi. Postea numera gradus limbi à linea horizontis recti vsq; in notam, & habebis optatum.

Exemplum

Exemplum breue: Proponitur mihi arcus aut signum Leonis: volo secundum modum iam expositum, inuenire eius ascensionem in sphaera recta. Finem signi Leonis addo horizonti recto, & in promptu video æquatorem tangere horizontem in centesimo quinquagesimo secundo gradu. Sunt igitur centum quinquagintaduo gradus, ascensio Leonis in circulo recto, ab initio sectionis vernalis supputando. Aut termino Leonis in horizonte recto durate, applico ostensorem principio Arietis, & habeo in limbo ad situm ostensoris centū quinquagintaduos gradus, vt supra. Hic modus vsitatus est astrorum iudicibus. Dicunt enim: quære mihi ascensionē rectā Leonis, ac si dicerent: Inuestiga mihi per tabulam ascensionum sphaeræ rectæ, ascensionem Leonis ab Arietis initio computando. Idem de descensione.

Quæ



**QVAE SIGNA RECTE, ET** Proposi. 47.  
 quæ obliquè in sphaera recta oriantur oc-  
 cidantque, paucis absoluerè.

**SVMPTO** experimèto per propositionè an-  
 tecedentè de ortu et occasu singulorù signorum,  
 inuenies Arietem, Taurum, Leonem, Virginem,  
 Libram, Scorpionem, Aquarium & Pisces in cir-  
 culo directo obliquè oriri & descendere. Nam cu-  
 iuslibet signi seorsum examinati, portio æquatoris  
 vnà conscendens vel descendens trigenis gradibus  
 minor est. Geminos, Cancrum, Sagittarium & Ca-  
 pricornum, hæc quatuor tantùm rectè oriri & oc-  
 cidere affirmabis: quia æquatoris portio eorum or-  
 tui & occasui respondens, trigenis gradibus maior  
 est. Colliges etiam diligenti examine adhibito, si-  
 gna opposita æquales habere ascensiones descensio-  
 nésque. Hæc & quedam alia ex subiecta formula  
 facileprehenduntur.

**TABELLA ORTVS**  
 & occasus signorum in sphæ-  
 ra recta integris signis seorsum  
 acceptis accommodata.

		G.	m.	horæ	min.	secūd.
Obliquè	♈	27	54	1	51	36
Obliquè	♉	29	54	1	59	36
Rectè	♊	32	12	2	8	38
Rectè	♋	32	12	2	8	38
Obliquè	♌	29	54	1	59	36
Obliquè	♍	27	54	1	51	36
Obliquè	♎	27	54	1	51	36
Oblique	♏	29	54	1	59	36
Rectè	♐	32	12	2	8	38
Rectè	♑	32	12	2	8	38
Obliquè	♒	29	54	1	59	36
Obliquè	♓	27	54	1	51	36

Quare non immeritò hi reprehensione digni sunt, qui Lucani metra perperam interpretantes, affirmant constitutis in æquinoctiali circulo, omnia signa rectè oriri & occidere: quin semper maior pars æquatoris oriatur occidatque, cum iam liquidum sit, sub æquinoctiali octo signa obliquè, & quatuor tantum rectè oriri & occidere. Inquit enim *Lucanus nono Pharsal.*

Deprensus est hūc esse locū, quo circulus alti Solstitij medium signorum percutit orbem. Non obliqua meant, nec Tauro Scorpius exit Rector, aut Aries donat sua tempora Libræ.

**Aut Astræa iubet lentos descendere Pisces.**

**Par Geminis Chiron: & idem quod Carci-  
nos ardens.**

**Humidus egoceros: nec pl<sup>o</sup> Leo tollitur Vrna.**

*Loquitur Poëta de processu Catonis, & exercitu ipsius per arenam Libiam versus equatorem, ubi sunt Garamantes, Syrtes, templum Iouis Ammonij, et eius fons, cum ait: Deprensus est hunc esse locum, &c. Et cum subiungit: Non obliqua meant. loquitur de signis oppositis, ac si diceret: signa Zodiaci opposita non meant, id est procedunt oriendo aut occidendo obliqua: hoc est vnum obliquius alio sibi obiecto: sed signa opposita habent ascensiones & descensiones æquales, neque aliud rectius aut obliquius oritur aut occidit reliquo, sed vniuniformiter. Sat est.*

**ASCENSIONEM RECTAM** Proposi. 48.

**gradus eclipticæ & stellæ breuiter cõputare.**

**SI ASCENSIONES** cuiuslibet gradus eclipticæ aut zodiaci aut stellæ cuiusvis cognoscere volueris: siste gradum aut cacumen stellæ super horizontem rectum exortiuum, & iuncto ostensore mox in equatore intueberis ascensionem rectam huic gradui proposito aut stellæ respondentem: computadam à sectione vernali, hoc est à prin-

cipio Arietis. Quòd si eãdem in gradibus limbi nu-  
merare optaueris, operare prout iamã instituimus.  
Ostenfore tamen sectioni vernali adycito, gradibus  
limbi notã inscribendo: postea à linea horizõtis re-  
cti numera gradus limbi vsque in notã inscriptam,  
et habebis optatum. Est autem ascensio recta gradus  
aut stellæ eius descensio, vt plenè suprà patuit.

Exemplum

Verbi gratia. Obijcitur mihi 5. gradus Virginis,  
cuius ascensionem rectam iubeor inuestigare. Pono  
eundem super horizontem rectum in parte orien-  
tali: & iuncto ostensore, capio in æquatore 157. ferè  
gradus ascensionem rectam propositi gradus. Item  
reti sic stante, addo ostensorem sectioni vernali, &  
pingo notam in gradibus limbi, & numerando ab  
horizonte recto orientali in notam vsque, colligo  
157. gradus vt suprà.

Itẽ offertur mihi stella Tauri Aldebaran, cuius  
ascensionẽ rectã inuenio hoc modo. Cacumẽ memo-  
ratæ stellæ applico horizõti recto, et video in æqua-  
tore aut limbo secũdum operationẽ iam expositã 61.  
propemodum gradus, ascensionem rectam eiusdem.

Proposi. 49.

**EX ASCENSIONE RECTA**  
stellæ cognita arcum eclipticæ sibi coa-  
scendentem indagare.

**R**ETI inuariabiliter stante pro ascensione re-  
cta stellæ secundum doctrinam propositionis  
antece-

antecedentis, computa signa & gradus Zodiaci ab Ariete initiando vsque ad horizontem rectum exortium. Hæc enim signa, hi gradus, quotquot supputando congesseris, arcum eclipticæ coascendentem palàm faciunt.

Repetatur gratia exempli per propositionem antecedentem ascensio recta stellæ Aldebaran 61. graduum: cupio experiri arcum eclipticæ huic ascensionis respondentem: sisto stellam ac si primum ascensionem rectam extrahere velim, & noto contactum lineæ eclipticæ cum horizonte recto, & facta numeratione à principio Arietis vsque in notam, colligo 2. signa, & tres ferè gradus de gradibus Geminorum. Ecce arcus eclipticæ duorum signorum & trium graduum ascensionis rectæ debitus.

**ARCUS ECLIPTICÆ QUANTO** Proposi. 50.  
 cunque ascensionem in sphaera obliqua per certum computum deputare.

**ARCUM** eclipticæ vocamus vnum signum aut partem eius siue duo, tria aut plura signa. Quorum ascensiones in sphaera obliqua cognitu facilimæ sunt, si ea quæ circa ascensiones sphaeræ rectæ in propositione quadragesima sexta monuimus et operati sumus, rectè didicisti. Aduerte tamè ascensiones & etiam descensiones sphaeræ declinæ per

astrolabium repertas, solummodo seruituras huic habitationi, ad quam mater aut tabula astrolabij secundum poli Borealis supra horizontem eleuationem, composita est.

Vnius igitur signi seorsum in sphaera obliqua ascensio hoc modo inuestigatur. Principiū signi applica horizonti obliquo in parte orientali, quem primum almicantharath facile indicat: & almuri adiuncto, fac punctum in gradibus limbi. Deinde promoue rete vna cum almuri, principio signi fixe immoranti, vsquequo exitus signi ceciderit super eundem horizontem obliquum: & iterum fac punctum in limbo ad tactum almuri, & gradus quibus mouetur almuri à primo puncto vsque in secundum, erunt ascensio eiusdem signi pro eleuatione poli, ad quam astrolabium est confectum.

Diductis gradibus ascensionis per 15. exhibunt horæ: & residuo per quatuor multiplicato, proueniunt minuta: quibus horis et minutis signum oblatum in sphaera obliqua peroritur. Quòd si idem per æquatorum in suos gradus partium absolucere volueris: initio signi, vt iam docuimus, horizonti obliquo applicato, ad contactum horizontis & æquatoris, fac notam in æquatore. Deinde reti moto taliter quòd finis signi horizonti obliquo iungitur: denuo ad tactum horizontis & æquatoris scribe notam in æquatore: numerati gradus his notis intercepti ostendunt ti-

bi ascensionem signi in Sphæra obliqua.

Exemplum primæ operationis. Cupio elicere ascensionem signi Leonis seorsum in Sphæra obliqua ad elevationem polarem 49. ferè graduum. Initium Leonis pono in parte exortiva super horizontem obliquum, & ostensore iuncto, pingo notam in gradibus limbi. Deinde Reti vnà cum Almuri motis, statuo finem eiusdem signi in eodem Horizonte: & rursus locum Almuri in limbo nota afficio: tandem supputo gradus his notis interpositos, & colligo 41. gradus, & 15. penè minuta: ascensionem Leonis per se in Sphæra obliqua, cætera omnia facilia sunt, ideo transeo.

Exemplum

Consimilis operatio est cum duobus, tribus aut quatuor signis: siue aliquo alio arcu eclipticæ seorsum accepto.

Ad habendum autem ascensiones arcuum eclipticæ, hoc est signorum aut graduum, siue etiam stellæ in Sphæra decliui, à sectione vernali computando, pone initium Arietis super horizontem obliquum in parte orientis, & ostensore iuncto, nota locum eius in gradibus marginis, postea moue rete vnà cum ostensore, donec finis arcus eclipticæ aut signi, aut gradus signi, aut apiculus stellæ cadat super eundem horizontem, & gradus quibus motus est ostensor, sunt ascensio signi, gradus aut stellæ in Sphæra obliqua à principio Arietis computata.

Exemplum

*In exemplo facilius accipies. Habeat arcus quidam eclipticæ propositus finem Leonis: volo inuenire ascensionem eius in sphaera obliqua, in habitatione ubi polus eleuatur ferè 49. gradibus. Initium Arietis addo horizonti obliquo in parte orientali, & applicato Almuri, facio signũ in gradibus marginis aut limbi: deinde Rete cum Almuri in initio Arietis durante, moueo vsque quo finis leonis memorato horizonti in vnguem copulabitur, et iterum facio signum ad situm Almuri, demũ numero gradus, signis his interceptos, & colligo ascensionem à sectione vernali computatam 139. quasi graduum in sphaera obliqua, & pro polari eleuatione quadragintanouem ferè graduum. Non aliter exemplificandum est de stellis fixis siue erraticis, &c. Idem potes absoluere per æquatorem Retis in suas partes distributum. Facile est, ideo transeo.*

Proposi. 51.

**DESCENSIONES SIGNI AVT** signorum seorsum, siue à sectione vernali & partium signorum, item stellarum in sphaera obliqua, breuiter computare.

**OPERATIO** descensionum extrahendarum & cognoscendarum signi vel signorum & partium seorsum, non distat ab operatione ascensionum, tradita in propositione antecedente: præter

id



id quod in horizonte obliquo occidentali, easdē inuestigamus atque absoluimus. Quare exemplari duntaxat computatione lectoribus satisficiemus.

Repetatur per propositionem precedentem signū Exemplum  
Leonis singulatim acceptum. Eius ascensionem in sphaera obliqua extraximus, nunc eiusdem descensionem hoc pacto inuestigabimus: Initium Leonis pono super Horizontem obliquum occidentale: & iuncto Almuri, pingo notam in limbo, aut in equatore, ad contactū tamen ipsius cum Horizonte declivi. Deinde voluo rete cū almuri, principio Leonis inherenti, taliter quod finis Leonis horizonti obliquo præcise iungetur, & rursus facio notam in limbo, aut in equatore, ad tactum eius cum horizonte.

Deinceps cōputo aut in limbo, aut equatore gradus notis interpositos: & inuenio descensionē Leonis octodecim graduum, et triginta ferè minutorum in sphaera obliqua, vbi polus borealis subleuatur quadragintanovem ferè gradibus. haud aliter operor cum pluribus signis seorsum acceptis.

PRO signis autem, quorum descensiones à principio Arietis in limbo sunt numerandæ, similiter pro stellis fixis aut erraticis (in equatore enim nulla est difficultas) sic procede. Siste initium Arietis super Horizontem obliquum in parte occidentali, et iuncto Almuri, fac signaturam in limbo, deinde volue Rete cum Almuri versus lineam mediæ no-

Etis, quousque finis vltimi signi propositi, aut cacumen stelle ceciderit super eundem Horizontem: & rursus fac signaturam in limbo ad tactum Almuri: preterea numera à prima signatura in secundam, & incipiendo quinque, decem, quindecim, viginti &c. continuando de quinque in quinque, vsque in secundam signaturam: & quod sic numerando conflabis, descensionem propositorum signorum aut stelle à principio Arietis in sphaera obliqua indicat. Vel (& est idem) à numero graduū limbo inscripto, quem Almuri ostendit, subtrahere centum octoginta gradus cum accommodatione trecentorum sexaginta, si alias subtractio fieri nequeat: & residuum tene pro descensione &c.

Proposi. 52.

**QVAE SIGNA IN SPHAERA obliqua rectè, & quæ obliquè orientur occidantque, paucis perstringere.**

**P**ER DVAS propositiones præcedentes, sume (cādide lector) singulorum signorum ascensionem siue ortus, & descensionem siue occasus: & experimento certior eris, sex signa, puta Cancrum, Leonem, Virginem, Libram, Scorpium, & Sagittarium, rectè oriri & obliquè cadere. Nam cum quouis signo per se examinato, portionem æquatoris vna condescendentē trigenis gradibus maiorem,

&

& vnà decidentem, trigenis minorem reperies.  
 Contra, Capricornum, Aquarium, Pisces, Arie-  
 tem, Taurum, Geminos, obliquè pronèque oriri, &  
 rectè occidere profiteberis. Quare non incongruè  
 infertur, in sphaera decliui sex signa rectè orientia,  
 obliquè occidere: & sex obliquè orientia, rectè ca-  
 dere. Præterea infertur, cuiusuis signi ascensionem,  
 esse descensionem signi oppositi: & descensionem,  
 obiecti ascensionem. Rectè igitur dixit poëta:  
 Recta meant, obliqua cadunt à fidere Cancri,  
 Donec finitur Chiron: sed cætera signa  
 Nascuntur pronò, descendunt tramite recto.  
 Hæc & alia ex subiecta tabella facile eliciuntur.

**TABELLA ORTVS**  
 & occasus signorum per se ac-  
 ceptorum in sphaera obliqua,  
 & ad eleuationem poli borea-  
 lis quadragintanouè ferè gra-  
 duum.

R ij

Signa	Ortus				Tempus Ortus.				Occasus				Tempus Occasus			
		G	m̄	Hore min.	secūd.		G	m̄	Hore min.	secūd.		G	m̄	Hore min.	secūd.	
γ	Obliquè	14	31	0	58	4	41	17	2	45	8					
δ	Obliquè	18	33	1	14	12	41	15	2	45	0					
ε	Oblique	27	18	1	49	12	37	6	2	28	24					
ϑ	Rectè	37	6	2	28	24	27	18	1	49	12					
Ω	Rectè	41	15	2	45	0	18	33	1	14	12					
μ	Rectè	41	17	2	45	8	14	31	0	58	4					
ν	Rectè	41	17	2	45	8	14	31	0	58	4					
η	Rectè	41	15	2	45	0	18	33	1	14	12					
Ϝ	Rectè	37	6	2	28	24	27	18	1	49	12					
ϝ	Obliquè	27	18	1	49	12	37	6	2	28	24					
Ϟ	Obliquè	18	33	1	14	12	41	15	2	45	0					
ϟ	Oliquè	14	31	0	58	4	41	17	2	45	8					

## QUANTVS ARCVS ECLY- Proposi. 53

ptica debeat cuicūque ascēſioni vel descenſioni oblata in ſphæra obliqua perſcrutari.

**O**BLATVM arcum aſcenſionis numera in æquatore à principio ſectionis vernalis, & finem numerati arcus applica præciſus quo poteſt horizonti obliquo orientali, & illico gradus eclipticæ eundem horizontem tangens, palam faciet tibi arcum eclipticæ huic aſcenſioni debitum, ſcilicet ſigna & gradus à principio Arietis uſque in gradum contactus. Si autem per limbum operari uolueris, computa arcum oblata aſcenſionis in gradibus limbi à linea horizontis reſti orientalis verſus meridiem & ultra, ſi opus fuerit, & fini iunge principium Arietis, & gradus eclipticæ tangens Horizontem obliquum, negotium tibi abſoluet pro modo iam ſuprà expoſito.

In exemplo: Offertur mihi aſcenſio obliqua ar- Exemplum  
cus ſtellæ aut gradus eclipticæ, 105. graduum, quos ſi in æquatore computaui, & finem centeſimi & quinti gradus horizonti obliquo exortiuo iunxero, video quintum gradum Leonis horizontem tangere, unde cōcludo, arcum eclipticæ, oblata aſcenſioni debitum eſſe quatuor ſignorum et quinque graduum. Idem eſt, ſi numerauero 105. gradus in limbo ab horizonte reſto orientali verſus meridiem, & ultra,

Et fini adiumento ostensoris principium Arietis copulauero, habeo vt antea quintum gradum Leonis in Horizonte, vnde infero, vt supra. Hæc de arcu egypticæ, quæ ascensioni debetur, nunc de arcu egypticæ, quæ descensionis propositæ respondet, breuiter dicemus. Propositam descensionem supputa in æquatore ab initio Arietis, et terminum eiusdem descensionis iunge horisonti obliquo occidentali, quo factò, gradus egypticæ eundem horisontem tangens indicabit tibi arcum egypticæ huic descensionis debitum, à principio Arietis numerandum.

Si autem te delectat operatio in gradibus limbi, arcum oblatæ descensionis numera in gradibus limbi, sumendo principium numerationis à linea Horizontis recti occidui, procedendo versus lineam mediæ noctis et ultra, secundum numeri quantitatem, si opus fuerit, et fini adiumento ostensoris iunge principium Arietis, et gradus egypticæ Horizontem obliquum in parte occidentis possidens, pandet tibi arcum egypticæ à sectione vernali supputandum.

**Exemplum**

Exemplum breue. Proponitur mihi descensio obliqua alicuius gradus egypticæ, aut stellæ 105. graduum, quos computo in æquatore ab initio Arietis, et vltimum gradum, scilicet quintum post centesimum, applico Horizonti obliquo occidentali: et video iam memoratum Horizontem tange-

re eclipticam in 18. gradu Geminorum. Vnde infero, arcum eclipticæ propositæ descensioni respondentem, esse duorum signorum & 18. graduū, quod fuit petatum. Sat est.

INITIA DVODECIM DOMORUM CÆLI FACILÈ CONSTITUERE. Proposi. 54.

**A**EQVANDARVM domorum ex nostro Astrolabio duos accepimus modos.

Quorum primus est Nicephoro philosopho Greco, Messahallæ, Ioanni Eligero, & vetustis astronomis vsitatissimus.

Secundus est modernorum astronomorum, præcipuè Ioanis de mōte Regio Germani, Astronomice disciplinæ restauratoris et defensoris egregij, quæ ipse cōmodiorē rationalēque vocat. De his duobus modis et etiam quodam tertio, quem idem futilem & alienum à mentibus antiquorū philosophorum nominat, consule eius scripta in Almagestum, id est, in compositionem maiorem Ptolemæi.

De primo modo accipe hæc pauca. Cum qualibet hora, aut quocunque tempore oblato, duodecim cælestia domicilia, quibus in suis iudicijs Astrologi vtuntur erigere, constituere, aut æquare, hoc est, eorundem principia aut cuspides (vt aiunt) inuenire volueris, per propositionē 28. huius (quam præambulam & Isagogicam in duodenariam cæli parti-

tionem appellauimus) ad horam aut tempus oblatū  
 disce gradum ascendentem, quem horoscopum no-  
 minamus, quem in vnguem applica horizonti obli-  
 quo in parte orientali, & ipse gradus ascendens est  
 initium, & cuspis primæ domus, & Nadayr eius,  
 id est, gradus oppositus in Zodiaco, cadēs super hori-  
 zontem occidentalem, est principium aut cuspis se-  
 ptimæ domus, quæ semper primæ opponitur domui,  
 & dicitur gradus descendens. Gradus autem tan-  
 gens lineam mediæ noctis, quartæ domui initium  
 donat, cuius obiectus lineam meridianam possi-  
 dens exordium decimæ domui, quam regiam vo-  
 citamus, aperit.

Præterea, gradum ascendentem applica arcui  
 octauæ horæ inæqualis, & gradus retis tangens li-  
 neam memoratam mediæ noctis, secundam ini-  
 tiatur domum, cuius è regione locatus gradus ini-  
 tio octauæ domus præficitur.

Rursus gradum ascēdentem immitte arcui deci-  
 mæ horæ inæqualis, gradusque lineam mediæ noctis  
 occupans, initium est tertiæ domus, & eius Nadayr  
 meridianam tenēs lineam, nonam domum incipit.

His absolutis, pone gradum initiātem septimam  
 domum super arcum secundæ horæ inæqualis, &  
 gradus retis in lineam mediæ noctis cadens initio  
 quintæ domus alligatur. Et Nadayr eius lineæ me-  
 ridianæ adhærens, vndecimam domum orditur.

Demum



Demum eundem gradum septimæ domus adiunge arcui quartæ horæ inæqualis, & gradus lineam mediæ noctis possidens, sextæ domui dat initium, cuius oppositus meridianam lineam tenens, capiti duodecimæ domus adaptatur. Et sic habes omnes cœlestes domus æquatas secundum modum primum. Quarum prima, quarta, septima, & decima appellantur cardines domus, aut anguli principales, siue primarij. Secunda, quinta, octaua, & undecima, quæ præfatas immediatè sequuntur, succedentes nominantur. Reliquas autem quatuor, puta tertiam, sextam, nonam & duodecimam cadentes appellare consueuimus.

Hos gradus omnes duodecim domibus cœli principia dantes, vnà cum signis quibus continentur extra scribe in abaco, obseruata domorum serie, & tandem inscribe figuræ aut schemati geometrico, prout infra in exemplo edoceberis.

Sit igitur gratia exempli natiuitas cuiusdam Exemplum hominis, Anno Christi. 1510. corrente, die 15. mensis Iunij: hora quarta æquali pomeridiana, iubeor erigere ad tempus propositum figuram 12. domorum cœlestium.

Principio in quodam plano describo via geometrica schema cœli generale. Quemadmodum infra depictum vides. Deinde elicio verum locum Solis ad tempus propositum, quem inuenio in tertio


gradu Cancrī, eumque diligenter signo in ecliptica  
 retis. Præterea, applico Almuri ad horam quartam  
 pomeridianam in limbo, quæ fuit hora propositæ ge-  
 nituræ, & volue rete taliter, quòd tertius gradus  
 Cancrī præcise in linea fiduciæ ipsius Almuri ia-  
 ceat. Quo factò, in Horizonte exortiuo obliquo vi-  
 deo ascendere 16. gradū Scorpj, ita quòd ferè totus  
 est ortus. Est igitur 16. gradus Scorpj, ascendens &  
 horoscopus huius genituræ principiumque primæ  
 domus, quare ad lineam vel cuspidē schematis pri-  
 mæ domus scribo characterem Scorpj & gradum  
 eius 16. sic, m. 16. Oppositus autem huius gradus est  
 16. Tauri, qui ponitur in horizonte occidentali, ini-  
 tium dans septimæ domui, quæ primæ diametraliter  
 obiicitur, quare ad lineam septimæ domus schema-  
 tis scribo, & 16. Deinceps reti inuariato, venio ad  
 lineam mediæ noctis, quæ imum cœli & initium  
 quartæ domus nuncupatur, & offendo ibidem pri-  
 mum gradum Pesciū, scribo igitur ad lineam quar-  
 tæ domus schematis sic, )( 1. Et gradus huic opposi-  
 tus est primus Virginis, lineam mediæ cœli aut me-  
 ridiei possidens, principium dans decimæ domui op-  
 positæ quartæ, quapropter ad lineam decimæ do-  
 mus schematis exaro, ix 1. & sic habeo quatuor do-  
 mus primarias, de quarum inuentione supra propo-  
 sitione 28. abunde diximus. Quibus habitis, princi-  
 pia reliquarum 8. domorum secundum hunc mo-  
 dum

dum primum hoc pacto extrahuntur. Gradum ascē-  
 dentem vel initium primæ domus, scilicet 16. Scor-  
 pij, pono super arcum octavæ horæ inæqualis, & cer-  
 no lineam mediæ noctis tangere 21. gradum Sagit-  
 tarij, qui mihi initium secundæ domus ostendit, scri-  
 bo igitur ad lineam secundæ domus schematis, ♃  
 21. Cuius Nadair 21. gradus Geminorum locatus  
 in linea meridiana, indicans mihi principium octa-  
 væ domus, ad lineam ergo octavæ domus exaro, ♃  
 21. Postea gradum ascendente[m] promoveo in arcum  
 decimæ horæ inæqualis, & habeo in linea mediæ  
 noctis quasi 25. gradum Capricorni, dante[m] initiū  
 tertiæ domui: quare ad lineam tertiæ domus sche-  
 matis pingo, ♄ 25. ferè. Cui in linea meridiana op-  
 ponitur 25. quasi Cancrī, principium nonæ domus,  
 scribo igitur ad lineam nonæ domus, ♄ 25. ferè. His  
 quatuor domibus constructis, relinquo gradum ascē-  
 dentis, & venio ad gradum septimæ domus descen-  
 dentem, qui est 16. Tauri, quem pono super arcum  
 secundæ horæ inæqualis, & video in linea mediæ  
 noctis 25. gradū Piscium, quintam domū initiante[m],  
 exaro ergo ad cuspidem quintæ domus, ♄ 26. Cu-  
 ius Nadair in linea meridiana existēs, est 26 Virgi-  
 nis principium undecimæ domus, quare lineæ undeci-  
 mæ domus ascribo, ♄ 26. Tandem gradū septimæ  
 domus, scilicet 16. Tauri, applico arcui quartæ horæ  
 inæqualis, & habeo in linea mediæ noctis 22. gradū  
 Arietis

*Arietis, dantem principium sextæ domui, quapropter lineæ sextæ domus inscribo  $\gamma$  22. Cui opponitur 26. gradus Libræ initians duodecimam domū, quare ad lineam duodecimæ domus scribo  $\omega$  22. Et sic habeo principia 12. cælestium domorum secundum mentem primi modi.*

CVIVS TALIS MODI  
pingo schema.

Figura genitura  $\diamond N$



SECUNDVS *modus inueniendi initia duodecim coelestium domiciliorum est modernorum astronomorum, præcipuè Ioannis de Regio monte & Georgij Purbachij, quem probant rationibus validissimis esse veriore[m] aliis modis omnibus, quare eundem rationalem vocant, iam vsitatus admodum in scholis vniuersalibus, à primo modo in quatuor cardinibus principalibus minimè discordans, in reliquis verò sæpenumero. Pro cuius cognitione in nostro astrolabio inscripti sunt quatuor arcus transeuntes per interseccionem horizontis obliqui & lineæ mediæ noctis, qui quatuor arcus vnà cum horizonte obliquo & linea diametrali transeunte ab armilla per cætrum astrolabij in partem oppositam (meridianum circulum præ se ferente) totū cœlum in 12. partes, inæquales tamen, distribuunt, quas domos appellamus. Horizon igitur obliquus in parte orientali initium primæ domus & gradum ascendentem, horoscopum nobis manifestat. Deinde arcus subsequens memoratum horizontem, versus lineam mediæ noctis aut angulum terræ transeundo, principium secundæ domus aperit, & iterum sequens initium tertiæ. Linea autem mediæ noctis seruit principio quartæ domus, & sequens arcus versus dextram quintam domum initiatur, & sic consequenter procedendum est vsque in arcū 12. domus. Et sunt semper 6. domus sub*


Exercitiū.

terra siue horizonte, scilicet 1.2.3.4.5. & 6. Reliquæ 6. sunt supra horizontem aut terram, scilicet 7.8.9.10.11.12. Huius modi secundi hanc sume operationem. Ad tempus quodcunque propositum, per propositionem 28. huius addisce gradum ascendentem, quem officio retis horizonti obliquo orientali in vnguem applica, & reti sic stante, initia 12. domorum in arcibus & lineis iam supra expositis sine omni difficultate patebunt. Sic, gradus retis tangens horizontem obliquum exortium, dat initium primæ domui, quare eundem & eius signum inscribe figuræ cœlesti ad hoc præparatæ, & depictæ circa lineam aut cuspidem primæ domus. Deinde gradus retis tangens arcum secundæ domus, initiatur secundam domum, scribe ergo ipsum & eius signum circa lineam secundæ domus figuræ. Item gradus retis adiectus arcui tertiæ domus, eiusdem ostendit principium, quare ipse & eius signum in lineam tertiæ domus figuræ inscribendi sunt. Similem observa formam operandi per omnes lineas & arcus omnium aliarum domorum secundum ordinem vsque in duodecimam. Et hoc pacto cum magna facilitate, & ferè sine labore potes constituere 12. domos cœlestes ad omne tempus oblatum, præteritum, præsens & futurum. In exemplo proponitur mihi coniunctio Solis & Lunæ mēsis Augusti, quæ anno Christi, 1510. corrente cadit in quartum diem eiusdem mēsis post meridiem

Exemplum

meridiem hora 6. minuto 22. ad quam precipior eri-  
gere figuram 12. domorum pro aura diiudicanda.  
Ad idem igitur tempus inuenio solem ferè in 21.  
gradu Leonis, què noto in gradibus retis, & per ad-  
iunctam regulam applico eundem gradum vige-  
simo secundo minuto post horam sextā pomeridia-  
nam in horis æqualibus, quo factò video in prom-  
ptu, in arcibus & lineis 12. domorum principia om-  
nium domorum secundum ordinem, quæ inscribo  
schemati in hunc modum.

Thema coeleste



ADVERTENDVM tamen, quòd sex domibus, quantum ad earum initia cognitis, aliæ sex per diametralem oppositionem in ipso Zodiaco facillimè cognoscentur. Primæ domui opponitur septima, secundæ octava, tertiæ nona, quartæ decima, quintæ undecima, & sextæ duodecima. His etiam domibus ex Ephemeride inscribe vera planetarum loca, nec non stellas fixas fulgentiores potiorésque: in eam enim domum planetam intrudes, quæ eius gradum sub quo planeta decurrit, in figura cœlesti comprehendit. In quam autem domum stellæ firmæ cadāt, arcus & lineæ domorum apertè indicant: & per iam expositū cœleste schema facile informaberis.

Proposi. 55. ASPECTVS ET TRADITIONES planetarum utiliter cognoscere.

CVM scientia de planetarum aspectibus tam in astrologicis quàm Physicis iudiciis sit valde utilis & necessaria. Nam crises morborum, cæterique naturæ effectus ad bonum vel malum, varietate aspectuum superiorum corporum variantur, testate Iacobo Alkindo, radiationes planetarum esse fundamentum & radicem iudiciorum. Ideo novitiis adolescentibus astronomicas institutiones adire volentibus, paucula quedam de planetarum aspectibus in Zodiaco duntaxat sumptis explicabimus:

nam



nam de his rebus alibi abundantius tractare decreuimus.

Notandum igitur, quòd aspectus aut radiatio, est certa habitudo & distantia planetarum in diuersis partibus circuli, quibus sese in suis influxibus iuuant aut impediunt notabiliter, & isto modo acceptionis aspectus, coniunctio propriè non dicitur aspectus, quia non est certa planetarum distantia, &c. Planeta enim quando coniunguntur secundum longitudinem, tunc sunt in vno signo, in vno gradu & minuto signi, igitur non distant, nisi largiori modo accipiatur aspectus, prout capiunt Al-  
bumasar & Lincon. scilicet pro omni habitudine, qua planeta alteri influentiam & virtutè suam largiri poterit. Accipiendo igitur cõmuniter aspectũ, quinque erunt, scilicet Coniunctio, Sextilis, Quartus, Trinus & Oppositus. Strictiori tamẽ vocabulo tantũ quatuor postremi erunt, dempta cõiunctione.

Aspectus.  
Radiatio.

Coniunctio igitur quantum ad propositum sufficit, quæ secundum longitudinem Zodiaci accipitur, est planetarum coitio in vno signo, signi gradu & minuto.

Aspectus  
Sextilis.

Aspectus sextilis siue hexagonus, est distantia planetarum per sextã circuli aut Zodiaci portionẽ, quæ duo signa cõtinet, aut 60. gradus, qui sunt quantitas duorum signorum, vt planeta existens in principio Arietis, respicit alium existentem in principio

Geminorum huiusmodi aspectu, & est mediocriter prospera felixque radiatio, vel ( vt aiunt ) latentis beneuolentiæ ac imperfectæ amicitia.

Aspectus  
quartus.

Aspectus quartus, quadratus siue tetragonus, est distantia planetarum per quartam circuli partem, quæ tria signa cõplectitur, aut 90. gradus, qui sunt quantitas trium signorum, & est hic aspectus minax, malitiosus, discors atque mediæ inimicitia.

Aspectus tri-  
nus.

Trinus aut trigonus aspectus, est planetarum distantia per tertiã circuli portionẽ, eo quòd teneat tertiam partem circuli, hoc est, quatuor signa completa, aut 120. gradus, & est aspectus foelix & prosper perfectæ concordia & amicitia.

Aspectus op-  
positus.

Aspectus oppositus aut diametralis, est distantia planetarum per medietatem circuli, eo quòd cõtineat sex signa, aut 180. gradus. Et est aspectus malignus & minax, perfectæque & patentis inimicitia. Exempla omnium sunt facilia.

De aspectibus  
tractant hi.

{ Ptolemæus Pheludianus in qua-  
dri. tract. 1. c. 14. & eius com.  
Iulius Firmicus. li. 2. c. 25.  
Marcus Manilius. li. 2. c. 7.  
Albumasar in intraduct. maiori.  
Alkabitius different. 1. & eius cõ.  
Guido Bonatus tract. 2. c. 13.  
Leopoldus Austria. & c. 10. Esch-  
cuidus trac. 1. di. 12. 10. Lincon.

Scire

Scire etiam debemus ex sententia Iulij Firmi-  
ci, Albumasaris & aliorum, duplicem esse aspectū,  
dextrum scilicet, & sinistrum. Dexter aspectus  
sextilis quartus aut trinus est contra successione signorū,  
sinister verò secundū successione signorum.

In exemplis, Luna in principio Arietis inuen- Exemplum  
ta, habet aspectum hexagonum dextrum ad Iouem  
in principio Aquarij repertum, quia Luna à Ioue  
abest duobus signis, quæ à Luna in Iouem cōtra si-  
gnorum consequentiam numerantur: igitur. Item,  
Luna in principio Arietis facit aspectum sextilem  
sinistrum ad Venerem in principio Geminorum re-  
pertam, nam à Luna cōputantur 2. signa in Venerē  
secūdum signorū sequelā, quare &c. Præterea, Lu-  
na in exordio Arietis inuenta aspicit Iouem qua-  
drato dextro in principio Capricorni inuentum, &  
Venerem quadrato sinistro in Cancri initio reper-  
tam. Eadem Luna principium Arietis possidens  
trigonica radiatione dextra afficit Iouem, in prin-  
cipio Sagittarij existentem, & sinistra Venerem,  
principium Leonis occupantem, & tandem Luna  
vt supra radiatione opposita, aspicit Iouem, ini-  
tium Libræ aduentem, simile sume iudicium de aliis  
signis & planetis.

His prænotatis si aspectus planetarum in Zodia-  
co scire desideras, addisce ex Ephemeride aut aliun-  
de, vera loca planetarum propositorum, & ea in

ecliptica retis signa, & vide distantias eorum, quos si offenderis per 60. gradus distare, dic eos esse in aspectu sextili, si per 90, in aspectu quarto, si per 120. in aspectu trino, quos verò per 180. in aspectu opposito. Si autem non præcise inueneris numerum prædictorum graduū, sed minus quatuor, quinque, aut sex gradibus, dicas esse applicationem ad aspectum, si plus quatuor, quinque, vel sex gradibus, pronuntia separationem & recessum ab aspectu.

In exemplo. Anno Christi 1510. corrente 29. die mensis Iulij ad meridiem inuenio Lunam in Geminis 5. quasi gradu, & Saturnū in Libra quinto ferè gradu, cupio scire, an ne quopiam aspectu sese afficiant, Signo igitur in reti pro Luna 5. gradum Geminorum, & pro Saturno 5. gradum Libræ, & cōputo à Luna in Saturnum secundum ordinem signorum gradus interceptos, & inuenio 120. dico ergo Lunam aspiciere Saturnum aspectu trino sinistro.

Hic non est silentio prætereundum, quòd si quam planeta latitudinem habuerit, parum poterit per eā aspectus in ecliptica impediri, etiam si latitudo posset esse 10. graduum, quia vix faceret huiusmodi latitudo diuersitatem in aspectu per 30. minuta vnius gradus, & hoc solum accidit in aspectu sextili & trino, sed quia id modicum est, ideo impresentiarum non curabimus.

## GRADVM REVOLVTIONIS Proposi. 56.

annorum mundi ascendentem nati, & etiam alterius rei habentis exordium, vtpu-  
ta ædificij inuenire.

**S**ciendum quòd reuolutio anni est reditus solis in eundẽ punctũ in quo fuit in principio illius anni. Reuolutio anni, annorum mudi, alicuius nati, annorum alicuius ædificij ascen-

dentis.  
Reuolutio autẽ annorũ mundi est introitus solis in principium siue in primum minutum Arietis.

Reuolutio alicuius nati, est reuersio solis ad eundem punctum Zodiaci in quo fuit natiuitatis hora.

Reuolutio annorum alicuius ædificij, est reuersio solis ad eundem locum in Zodiaco, in quo fuit in principio foundationis, scilicet quando ponebatur primus lapis & cetera.

Reuolutio verò ascendẽtis nihil aliud est, quàm inuenire gradum ascendentẽ qui est in contactu hori-  
zontis, cum reuolutio anni mudi, nati aut alterius rei principium habentis, fuerit completa.

Cum igitur quolibet anno volueris scire gradum reuolutionis annorum mundi, id est, ascendens tempore introitus solis in Arietem, addisce primũ introitũ solis in Arietẽ aliquo anno tibi noto, bene verificatum, sub certo numero dierum, horarum, minutorum, & secundorum, quantum possibile est, & id tempus introitus solis in Arietem appellabis radicem. Deinde horas & minuta (vt assolet) recen-

DE VSV

se in limbo astrolabij diligenti-  
us quo potes, & fini iunge Almuri, &  
locum eius in margine signa.

Præterea, considera annum incarnationis, ad quem cupis scire huiusmodi gradum reuolutionis, & subtrahere numerum annorum incarnationis radicis tanquam minorem à numero annorum propositorum tanquam à maiori, et residuum numerabit tibi annos interceptos annis radicis, & annis tuæ considerationis. Est enim huiusmodi residuum quantitas annorum, qui sunt à tempore radicis tuæ vsque ad illum annum, cuius ascendens queris. Pro quolibet ergo anno residui moue Almuri à loco in limbo signato per 87. gradus,

TABELLA REVOLVTIONIS ASCENDENT-

tium annorum mundi, natiuitatum & ædificiorum.

Nu.	An.	Gra.	Mi.
1		87	19
2		174	38
3		261	57
4		349	16
5		76	35
6		163	54
7		251	12
8		338	31
9		65	50
10		153	9
11		240	28
12		327	47
13		55	6
14		142	25
15		229	44
16		317	3
17		44	22
18		131	41
19		219	0
20		306	19
40		252	37
60		198	56
80		145	15
100		91	33
200		183	6
300		274	40
400		6	13
500		97	46
600		189	19
700		280	52

et 20. ferme minuta gradus, quo facto, applica principium Arietis almuri secundum omnem precisionem, & gradus retis qui ceciderit super horizontem obliquum orientalem, erit ascendens anni propositi, & dicitur gradus reuolutionis annorum mundi. Quo cognito, per 28. huius & etiam 54 facile poteris equare omnes duodecim domos, & constituere figuram reuolutionis anni propositi, per quam anni status iudicatur. Verum cum nonnunquam anni residui sint multi, laboriosum, tædiosum & difficile esset, toties per 87. gradus, & 20. minuta Almuri mouere à loco in limbo signato. Ideo ordinauimus tabellam hinc annexam, per quam huiuscemodi negotium facile absoluitur, hoc pacto. Numerum annorum residui, qui numerantur ab anno radicis usque in annum considerationis, quære in linea prima numeri annorum lateris sinistri tabellæ, & in directo versus dextram offendes gradus & minuta, quibus à loco limbi signato numeratis, & termino numerationis Almuri & principio Arietis applicatis, videbis in horizonte exortiuo gradum ascendentem, vt supra.

Quòd si annos residui non præcisè in linea prima numeri annorum inueneris, intra duplici introitu quemadmodum pro medijs planetarum motibus supputandis agere consueuimus, & si facta additione graduum & minutorum per duplicem introi-

tum inuentorum, numerus graduum in 360. gradus aut ultra euaserit, reiice 360. & residuum serua, cum quo residuo age, vt iam supra exposuimus, & habebis propositum, scilicet gradum ascendentem anni propositi, quem gradum reuolutionis annorum mundi appellamus, & ex consequitione, 12. coeli domicilia.

## Exemplum


Exemplum huius partis tale subiungendum est. Ad meridianum oppidi Tubingen. introitus solis in principiu Arietis in vnguem examinatus fuit, anno salutiferae incarnationis 1500. currete, die 10. mensis Martij post meridiem hora sexta, minuto ferme 22. tempore equato, hunc introitum Solis in Arietem, quantum ad diem, horas, & minuta, & etiam quantum ad numerum annorum Christi, seruo pro radice annis futuris. Supputo igitur horas & minuta in limbo post meridiem, & fini 22. minuti post sextam applico Almuri, facioque notam notabilem in limbo, quam etiam seruabo tanquam radicem futuris annis opportunam. His prehabitis & ordinatis, obiicitur mihi annus futurus, Millesimus quingentesimus decimus tertius currens, ad quem iubeor explorare gradum reuolutionis annorum mundi &c. Subtraho ergo annos CHRISTI radice, scilicet mille quingentos, ab annis oblatis scilicet mille quingentis tredecim, & habeo in residuo tredecim. tot enim annis distant anni propositi



siti ab annis radicis. Cum tredecim annis residui, ingredior tabellam reuolutionis ascendentium &c. Et in linea numeri annorum prima, ad sedem Tredecim, inuenio quinquagintaquinque gradus & sex minuta. Gradus hos & minuta supputo cum Almuri in gradibus limbi à nota notabili versus dextram, & fini iungo Almuri vnà cum principio Arietis, et video in Horizonte orientali ascendere decimumquartum gradum Scorpj. Proclamo igitur gradum reuolutionis mundi pro anno oblato fore decimumquartum Scorpj, quod fuit optatum. Item gradu ascendentis reuolutionis in Horizonte durante, habeo duodecim cœli domicilia, secundum modum rationalem & institutionem propositionis 54.

Fabrico

*Fabrico igitur thema cœleste tale.*



**I**NVENTO gradu reuolutionis mundi ad cer-  
tum annum oblatum, si scire optaueris tempus in-  
troitus Solis in Arietẽ, id haud difficulter hoc mo-  
do cognosces: Stãtibus Reti in gradu ascẽdente re-  
uolutionis, et Almuri in principio Arietis, cõtactus  
Almuri ostendit tibi in margine horam æqualem  
à meridie cõputandam, necnon minuta horæ si qua  
fuerint. Dies autem mensis hac nõstra tempestate  
est decimus Martij, introitui Solis in Arietem de-

dicatus. Futuris tamen annis, idem introitus propter æquinoctij verni anticipationem nono diei Martij alligabitur. Quamobrem si errorem declinare volueris per propositionem secundam huius, aut verius per tabulas Solis, supputa eius verum locum in zodiaco ad meridiem decimi diei Martij: quem si inueneris in Piscibus vigesimonono gradu cum certis minutis, manebit dies memoratus apta sedes solaris introitus: à cuius meridie horæ & minuta supra inuenta, supputanda sunt: quibus completis, sol principium Arietis adibit, æquinoctiumque vernum vniuerso mundo præstabit. Quòd si ad meridiem decimi diei per calculum inueneris solem iam aliquam partem Arietis etiam quantulamcunque occupantem, reijce decimum diem, et assume nonum Martij: à cuius meridie computa (vt iam docuimus) tuas horas et minuta, & certificaberis de die, hora, & minuto introitus &c.

In exemplo, Anno tertio decimo supra millesimum quingentesimum supra proposito, cupio scire introitum Solis in Arietem. Durante igitur Reti in gradu ascēdente reuolutionis, ita quòd finis decimi-quarti gradus Scorpj, tangat Horizontem exortuum, & Almuri in principio Arietis: Video Almuri tangere limbum fere in secundo minuto post decimā horam æqualem pomeridianam. Dico ergo eodem anno solem intraturum Arietem die de- Exemplum

cimo Martij, hora decima, minuto secundo ferme. Ut autem de hac re summatim dicam, habes optime lector primò gradum reuolutionis annorum mundi: secundo figuram duodecim coelestium domiciliorum reuolutionis anni propositi: & tertio introitum Solis in caput Arietis eiusdem anni propositi.

Hic docet  
erigere figu-  
ram coele-  
stem huma-  
nae genitu-  
rae.

De reuolutione gradus ascendentis geniturae humanae, de figura coelesti reuolutionis, et de tempore eiusdem, nonnulla perstringemus. Annum propositae geniturae, diem mensis, horam & partes horae, radicem inueniendis supponito. Disce etiam verum locum Solis ad tempus geniturae, quibus habitis, numerum horas & minuta geniturae in limbo Astrolabij à meridie, quemadmodum supra de horis & minutis introitus Solis in Arietem pro gradu reuolutionis mundi inquirendo praecipimus, & termino iunge Almuri, & pinge notam in limbo, quae tanquam radicalis quaedam nota, reuolutionibus futurorum annorum geniturae seruiet. Si igitur quocunque anno futuro gradum reuolutionis oblatae geniturae, item coeleste thema, & tempus reuolutionis scire desideras, non aliter operaberis, quam supra instituimus in paragrapho, Praeterea considera &c. praeter id quod Almuri applicabis signo et gradui Solis tempore natiuitatis inuentis.

Exemplum

In exemplo facile capies: Natus est quidam anno gratiae Millesimo Quadringentesimo Quinquagesimo

gesimonono, die vigesimo secundo emsis Martij, post meridiē hora quarta, minuto fere vigesimo, sole per Arietē decimū gradū, et 39. minutum, et 40.2<sup>m</sup>. gradiente. Annos Christi iam propositos, diē mensis, horas & minuta, appello radicem huius geniture: computoque quatuor horas & 20. minuta à meridiē, et fini cōputationis inscribo notam: à qua omnes futurarum reuolutionū gradus ascendentes supputabo. Præterea offertur mihi annus decimus post millesimum quingentesimum: ad quem gradum reuolutionis ascendentem propositæ geniture duodecim coeli domos, et tēpus reuolutionis præcipior determinare. Demo ergo annos radicis ab annis oblati, et habeo in residuo 51. annos, cum quibus intro tabellam reuolutionis duplici introitu, eo quòd eosdem ibidem nusquam offendo. Primò cum 40. annis, cum quibus reperio 252. gradus 37. minuta, quæ extra scribo. Secundò intro eandem tabulam cum 11. annis residuis, ad quorum sedem inuenio 240. gradus & 28. minuta, quæ alijs subscribo: et facta additione colligo 493. gradus et 5. minuta. Sed quia gradus excedunt 360. idcirco reijcio 360. gradus, et remanent mihi 133. gradus 5. minuta. Minuta quidem quia pauca sunt, reijcio: gradus autem computo in limbo à nota facta: et termino applico Almuri, et 11. gradum Arietis. Et mox in Horizonte orientali video ascēdere 29. gradū Sa-

gittarij: qui dicitur gradus ascendens reuolutionis huius geniturae, anni decimi propositi: das initium primae domui, ipsoque inuariabiliter in horizoete durante, reliquarum domorum principia in arcibus et lineis domorum in promptu apparet: vnde coeli figuram in hunc modum erigo atque constituo. Tandem Almurī indicat mihi in margine, quo tempore reuolutio perficiatur, fit enim hora 13. minutis 12. ferme post meridiem non 21. diei Martij, sed 21. vt facile ex Ephemeride huius anni constare poterit.



**N**ON dissimiliter operaberis in reuolutionibus aliarum rerum principia habentium, ut puta in reuolutionibus edificiorum ab exordio constructionum, electionum ad dignitates, honores, officia, &c. Sed quia pauca aut propemodum nulla sunt mihi per Germaniam edificiorum exordia cognita, ideo de his exemplificare prætereo. Vnicum tamen ut nostræ propositioni finem imponamus, de electione exemplum subiungemus.

Inuictissimus & serenissimus D. d. Maximilianus Cæsar electus est in Regem Romanorum, anno Virginei partus 1486. Currente, die 15. mensis Februarij, hora 23. Sole existente in Piscibus 7. gradu 14. ferè minuto. Huius electionis petitur reuolutio: quantum ad gradum ascendentem figuram coelestem et tempus anno salutis 1510. currente, computo primum tempus electionis in horis à meridie, & facio ad finem notam in margine: deinde subtraho annos electionis ab annis propositis, & habeo in residuo 24. cum quibus duplici introitu ingredior tabellam reuolutionis, et colligo 655. gradus 35. minuta. Et facta (propter excessum) reiectione 360. graduum, remanent 295. gradus 35. minuta, quibus à nota radice supputatis, terminoque Almuri iuncto, nec non septimo gradu, & 14. minuto Piscium, offendo in Horizonte gradum ascendentem reuolutionis anni propositi 8. quasi Piscium. Tempus

Electio Maximiliani in Regem Romanorum.

revolutionis 15. die Februarij 18. hora 42. minuto.  
 Figuram autem 12. domorum prout  
 subannectitur.



**Q**uandoque accidit in revolutionibus genitu-  
 rarum, ædificiorum, et etiam electionũ, quòd  
 verus locus Solis quæsitus ex tabulis bene exami-  
 natis, ad tempus revolutionis etiam inæquatũ, (præ-  
 sertim, cũ plures anni à radice transierunt) non con-  
 cordat cum vero loco radice. Quandoque enim est  
 maior



maior, quādoque minor. Quod ex eo euenire doctos  
 mathematicos non latet, quòd æquationes Solis, per  
 quas eius verus motus addiscitur, ì vno loco zodia-  
 ci citius crescūt aut decrescunt, in alio tardius. Sole  
 enī existēte in auge, puta Cācro aut circa, vel ì angis  
 opposito, scilicet Capricorno aut prope: æquatiōes so-  
 lares citius variātur, quām Sole trāseunte per lōgitu-  
 dines medias, puta Arietē aut Librā, aut loca his vi-  
 cina. Ibi enim ad annos plurimos æquationes inua-  
 riatæ manēt, aut ad minus nullā sensibilē diuersita-  
 tem causant. Quare fit (vt diximus) quòd nonnun-  
 quam verus locus Solis ad tēpus reuolutionis etiam  
 inæquatum, prout hoc negocium postulat, nō directē  
 quadrat cū vero loco radicis: quod absurdū est, cum  
 talis modi reuolutio nihil aliud sit, quām reditus So-  
 lis ad suū verissimum locū, in quo fuit in radice ge-  
 nituræ, ædificij aut electionis. Quare si omnē errorē  
 vitare volueris, computa ad tempus reuolutionis su-  
 præ inuentum, reiecta tamē prius dierū æquatione,  
 verum locū Solis in vnguē: qui si à verò loco radi-  
 cis minimē discordauerit, tempus reuolutionis iustē  
 est extractū et inuentū: si discordauerit, quære verū  
 locum Solis ad tempus aut minus aut maius, prout  
 negotiū petit: et ad quod inueneris verū locum So-  
 lis per omnia cōcordantem cum loco radicis, (quod  
 hoc facile absolues per tabulam veri motus Solis in  
 horis & minutis) id tēpus addita dierū æquatione,

erit verum tempus reuolutionis: & potes illud pro noua radice acceptare, & per hoc inuestigare futurorū annorū gradus ascendentes reuolutionum, figuras cœlestiū domorū &c. Quare si quis peteret scire gradus ascendentes reuolutionū ad principia omnium duodecim signorū, item figuras duodecim domorum, & tempus introitus Solis in eadem: eliciat aliquo anno sibi noto radicem pro introitu Solis in Arietem, vt prædiximus: cuius vsus propter tarditatem variationis æquationum Solis in longitudine media pluribus seculis accommodabitur: idem ferè de signo Libræ accipiendum est. Pro reliquis autem signis, elaboratis radicibus introituum Solis in ipsa ad certum annum, elapsis viginti aut triginta annis, propter causam superius expositam, instituendæ sunt nouæ radices, & habebis res certas nullo errore inuolutas.

Propositi, 57.

**TABVLAM ELEVATIONVM** signorum, qualibet hora diei confectioni horologiorum seruientem componere.

**H**ERMANNVS Contractus libro secundo de Vtilitate Astrolabij, ita inquit: Quicumque Astronomicæ peritiâ disciplinæ & cœlestiū Sphærarum, geometricaliūque mensurarum, altiorēque scientiam diligenti veritatis inquisitio-

ne altius rimari conatur, & certissimas horologiorum quorumlibet climatum rationes, & quælibet ad hæc climata pertinentia industrius discriminare nititur: hanc Vualzagoram, id est, planam spheram Ptolemæi, siue Astrolapsum, solerti indagatione perquirat & discat, & perquisitâ tenaci memoriæ firmiter commendet &c. Cùm dicit, Et certissimas horologiorum quorumlibet climatum rationes &c. voluit nobis ostendere, quòd officio astrolabij possint componi horologia ad diuersa climata, & eorundem causæ reddi, quare vnius climatis horologium ab alio alterius climatis differat. Egregiè profecto dixisset Gentilis noster Hermanus, si modum executionis aut constructionis horologiorum silentio non præterisset. Nos autem nouitijs in hac arte astrologica morem gerere volentes, docebimus, quo pacto tabulæ quædam adiumento Astrolabij componendæ sint. Quibus habitis horologia ad diuersa climata, diuersasque elevationes polares componi possunt. Adijciemus etiam in calce propositionis, vt omnia lucidius pateant, pro exemplo compositionem cuiusdam quadrantis horarij, quæ bilimbatum appellabimus.

Horologiorum compositio ad diuersa climata.

Ex Astrolabio igitur tabulam elevationum signorum ad elevationem poli borealis certi climatis, ad quã mater astrolabij aut tabula fabricata est, hoc modo compones: Principiò omnium per propositionem

trigessimam quintam huius addisce, ad quam polarem elevationem, & ad quod clima mater aut tabula astrolabij sit composita: quam à nonaginta gradibus deme, & habes elevationem meridianam ad principia Arietis et Libræ, quæ dicitur elevatio æquinoctialis. Cui si addideris vigintitres gradus et triginta minuta, Solis maximam declinationem colliges, elevationem meridianam principij Cæcri. Et si Solis maximam declinationem ab elevatione Arietis subtraxeris, videbis elevationem meridianam ad principium Capricorni. Has tres elevationes meridianas ad horum trium signorum exordia per astrolabiū hoc modo cognosces: Pone principium signi super lineam meridianam, & numera almicantarath, inchoando à primo vsque in almicantarath aut eius partem, quod principium signi tangit, & habebis idem, scilicet elevationem principij signi tempore meridiano: nota tamen secundum omnimodam præcisionem, quantum ad minuta propter instrumenti paruitatem. Et hoc modo per astrolabium addisce elevationes meridianas pro principijs omnium signorum, & etiam ad partes signorum, puta ad decem et viginti gradum cuiuslibet signi, aut ad quindecim. Quibus habitis, conde tabulam, et sub hora duodecima scribe has principiorum signorum, etiam partium eorundem elevationes meridianas, prout in subiecta tabula visu est facile.

Præterea pro elevationibus principiorum signo-

*rum ad horas pomeridianas extrahendis taliter operare. Applica Almuri horæ primæ pomeridianæ, cui iūge principiū propositi signi, et numerum in Almicantarath eius elevationem in gradibus & minutis, quantum possibile est: & eandem scribe sub hora prima tabulæ in directo principij signi propositi. Cæterum applica Almuri horæ secundæ unâ cum principio signi propositi: & iterum supputa in arcibus Almicantarath elevationem, quam tabulæ inscribe sub titulo horæ secundæ, & in directo principij propositi signi, & hoc pacto pro elevatione aliarum horarum operaberis vsque in occasum principij signi, et ita procede cum initiis sex signorum, scilicet Cancrî, Leonis, Virginis, Libræ, Scorpij & Sagittarij. Potes etiam, si te labor delectat, præter tamen necessitatem, contexere tabulam pro elevationibus partium signorum ad horas pomeridianas. Extractis autem elevationibus signorum ad horas post meridiem, easdem facile elevationibus horarū antemeridianarum aptabis. Nam elevatio signi horæ primæ pomeridianæ ascripta, horæ undecimæ antemeridianæ serviet, & elevatio secundæ post, decimæ ante, & elevatio tertiæ post, nonæ ante, & sic de reliquis horis.*

*Harum rerum omnium accipe hanc tabulam pro exemplo.*



20		10	56	30															
mp	0		8		51	q̃i	45	30	37	40	28	20	18	30					8
	10																		
	20																		
ϛ	0		γ		40	40	0	35	0	28	0	19	30	10	0	0			0
	10																		
	20																		
m	0		)		28	q̃i	40	24	30	18	10	10	0	1	10				
	10																		
	20																		
†	0		≈		30	30	0	16	20	10	30	3	10						
	10																		
	20																		
•	30		⊘		17	17	0	13	20	7	40	0	30	q̃i					

T iij

*NON* aliter operandum est, quàm iam exposuimus, pro compositione tabulæ elevationum signorum ad aliud clima, aliàmque polarem elevationem à prædicta distantem, præhabita tamen tabula aut matre, & videbis tabulas in elevationibus signorum admodum differre: quare & horologia adiumento harum tabularum fabricata, notabiliter distabunt. Vnde horologiorum rationes facile reddi possunt, & quare vnum horologium iustas horas pro certo climate aut polari elevatione indicet, & aliud iniustas.

Conditatabula elevationum signorum, per ipsam plura horaria solaria confici possunt, ad eandem tamen polarem elevationem, ad quam tabulam construximus: quorum confectioes in præsentiarum missas facimus, præter cuiusdam quadrantis bilimbati, cuius compositionem supra polliciti sumus, hîc pro exemplo adijciemus.

**Exemplum**

In plano igitur describe quadrantẽ, cuius arcum, quem limbum appellamus, in nonaginta gradus (ut assolet) partire: & ponantur differentie gratia, *a*, in centro quadrantis, *b*, sinistram versus in arcu et linea recta, *ab*, *a*, in arcum porrecta, & *c*, in eodẽ arcu versus dextram, & in linea *ab*, *a*, in arcũ producta. Asscribantur etiam gradibus limbi numeri de quinque in quinque, se augmentantes vsque in nonaginta, inchoando à litera *b*, transeundo versus *c*.

Lineam



Lineam, a, b, in duas æquales seca partes, d, puncto medio sectionis adiecto. Deinde siste unum pedem circini in centrum, a, quadrantis, & alium emitte in punctum, d, & produc arcum à linea, a, b, in lineam, a, c, qui vocetur, d, e, & accommodabitur initiis Arietis & Libræ: arcus verò, b, c, limbus initiis Cancræ & Capricorni. De initiis autem aliorum signorum inscribendis, & omnium partitione, infra dicemus.

Lineas horarias hac lege inscribe: In arcu aut limbo, b, c, supputa adiuumento tabulæ elevationum & c. elevationem Arietis ad horam duodecimam, & adiecta regula centro, a, iunge eandem fini supputationis iam dictæ, & pinge notam in arcu Arietis & Libræ, dicto die. Consimiliter in arcu, b, c, supputa elevationem Cancræ pro hora duodecima, & fac notam in eodem arcu, b, c. A nota horæ duodecimæ arcus Arietis, duc lineam rectam in notam arcus, b, c, quæ horam duodecimam meridianam, Sole gradiente per borealia signa, puta Arietem, Taurum, Geminos, Cancrum, Leonem & Virginem, representabit.


Antequam autem aliæ horarum lineæ inscribantur, necesse est initia aliorum signorum, & generaliter omnium, trifariam partitionem describere. Pro principio igitur Tauri, numerata in arcu aut limbo, b, c, (tabula indicante) quinquagintatres gradus ferè,

elevationem eius meridianam, & applicata regula  
 centro, a, & termino quinquagintatrium graduum  
 iam numeratorum, fac signaturam in linea horæ  
 duodecimæ, in quam ex centro, a, expande circinũ,  
 & pinge arculum in linea, a, b, pro initio Tauri.  
 Item pro initio Geminorum computa in limbo, b, c,  
 propemodum sexagintaduos gradus, elevationem  
 meridianam, & per applicationem regulæ, vt iam  
 docuimus, fac signaturam in linea horæ duodeci-  
 mæ, & cum circino describe arculum in linea, a, b,  
 pro initio signi Geminorum, & sic modo quodam  
 latenti habes initia duodecim signorum, propter eo-  
 rum ascensum & descensum in latere huius qua-  
 drantis, quorum inscriptio quia facilis est, ex effi-  
 gie horarũ dicto citius sciri potest. Haud aliter  
 quàm iam diximus, operandum est pro diuisione  
 signorum trifaria, id est, per decem & decem gra-  
 dus, sumptis elevationibus meridianis, ad partes si-  
 gnorum ex tabula. Et hoc modo fabricabis scalam  
 quandam adhærentem lineæ, a, b, pro signis integris  
 & partitione eorum. Reliquas horarum lineas,  
 Sole per borealia signa transeunte, taliter efficies:  
 Ex tabula accipe elevationẽ Arietis ad horam pri-  
 mam, scilicet quadraginta gradus, quibus in lim-  
 bo, b, c, numeratis, fini & centro, a, iunge regulam, et  
 fac notam in arcu Arietis & Libræ. Non dissimi-  
 liter in eodem arcu, b, c, computa elevationem Can-

cri ad horam primā, scilicet sexagintaduos gradus, viginti minuta ferè, & imprime notā arcu, b, c, has notas copula per lineam reētā, & habebis lineam horæ primæ pomeridianæ, Sole ( vt diximus ) borealia signa tenente. Consimiliter operare pro hora secūda, tertia, quarta, quinta & sexta. Pro septima autem hora recense in limbo, b, c, octo gradus, et pin-ge notam in eodem, à qua duc reētā in quintum gradum Tauri lineæ, a, b. Lineis horariis borealibus completis, ascribe eis circa limbum, b, c, ( quem limbum maiorem vocabimus ) numeros horarū primæ, secundæ, tertiæ, quartæ, quintæ, sextæ, septimæ post meridiem, & quintæ, sextæ, septimæ, octauæ, nonæ, decimæ, vndecimæ ante meridiem. Lineæ autem horariæ Sole per Australia signa tendēte, hoc pacto inscribentur: Elevationem Capricorni meridianam, scilicet octodecim gradus, decem minuta, computa in arcu, b, c, & impressa nota, ab ea duc reētā lineam ( alterius tamen coloris cum lineis borealibus, distinctionis gratiā ) in notā horæ duodecimæ arcus Arietis, & habes lineam horæ duodecimæ pro signis Austrinis, puta Libra, Scorpio, Sagittario, Capricorno, Aquario & piscibus. Pro hora prima supputa in arcu, b, c, elevationē Capricorni ad eandem horam, scilicet septemdecim gradus, & fini imprime notam: à qua duc lineam reētā in notā horæ primæ Arietis, & habes lineam horæ primæ

pro signis Australibus: et sic operare pro lineis aliarum horarum. Linea autem quintæ horæ ducitur à nota quintæ arcus Arietis, in quintum gradum Scorpij: vel, ☾ est idem, in quintum gradum Tauri. His lineis superscribe numeros horarios circa arcum Arietis, quem limbum minorem appellabimus.

ECCE FIGVRAM HORARIJ Bilimbati,



DE FABRICA HO-  
rarij Bilimbati.

Proposi. 58.

**C**AETERVM centro *A.* innecte filum  
subtile & tenue, cui margarita aut nodulus ho-  
rarium ostensor adhaereat: & termino fili alliga plu-  
bium, aut aliquod simile alicuius ponderis.

Demum super lineam, *a, c,* fabrica duas pinnu-  
las aut tabellas eleuatas, quarum vna sit versus, *a,*  
centrum, & alia versus limbum quadrantis. In  
ea quae est versus centrum fac foramen paruum, in  
alia punctum: taliter, quod sibi mutuò directe re-  
spondeant: & quod vnum sit in tanta altitudine:  
& tantum distet à linea, *a, c,* sicut aliud.

DE VSV HORA-  
rij Bilimbati.

Proposi. 59.

**H**ACTENVS de fabrica horarij bilimba-  
ti: nunc paucula de eius vsu. Pone filum ad  
scalam signorum, scilicet lineam, *a, b,* & promoue  
Margaritam aut nodulum in signum & gradum  
Solis, secundum quod praecisius potes. Deinde sini-  
strum latus horarij & pinnulam perforatam obii-  
ce Soli radianti, ita, quod radius solis per foramen  
pinnulae veniens, directe in punctum alterius tabu-  
lae cadat: et illico situs Margaritae in lineis horariis

quæsitam horam (cum hac tamen cautiuncula) indicabit. Ab exordio enim Arietis in finem Virginis, cum sol per septentrionalia aut Borealia signa graditur, quærentur horæ in limbo maiori & in lineis numero literarum vulgarium designatis. Ab initio autem Libræ in finem Piscium, Sole per meridiana aut Australia signa currente, horæ in limbo minori & lineis cifris correspondentibus inuestigantur.

**NUNC DE MENSURA**  
 tionibus Geometricis, Altime-  
 tris, planimetris, profundi-  
 metris, tractatus cum  
 earum demonstra-  
 tionibus,  
 & figuris sequitur.



**DE GEOMETRICIS MENSURATIONIBUS** rerum, altitudinum accessibilium & inaccessibilium, etiam rerum in planitie & profunditate constitutarum, in longum, latum, & profundum mensurandarum, tractatus incipit.

**MENSURIS GEOMETRICIS** præambula quædam accommodare.

Proposi. 60.

**H**EST IGITUR Geometria disciplina magnitudinis & formarum, quæ secundum magnitudinem contemplantur. Hæc autem disciplina (simplicibus loquor) à terræ mensura Græcè nomen accepit. *γῆ* enim Græcè, Latine terra dicitur: & *μέτρον* Græcè, Latine mensura exprimitur. Hinc Geometria, quasi terræ mēsurā. Huius inuētores, te-

Geometria  
quid.

De geometria & eius inuentoribus.

ste Alphorabio, primi traduntur Aegyptij, pro necessitate diuisionis terminorū terræ quos Nilus inundationis tempore limo obducens cōfundebat, eosdem Aegyptij geometricis principiis rursus distinguebant, unicuique reddentes quod suum est. Sed quamuis ad terræ dimensionis commoditatem primitus inuenta, vocabulūque inde sortita sit, à posterioribus tamen rationem eius diligentius inuestigantibus, ad alia quoque nonnulla, quæ vel cognitu utilia, vel exercitio iucunda videbantur, speculatio hæc accommodata est.

Arithmeti-  
ces origo.

Nec mirum videri debet, tam hanc quàm alias disciplinas, ab opportunitate & commodo sumpsisse principium. Nam sicut apud Phœnices propter mercimonia & commutationes, examinata numerorum cognitio sumpsit initiū, ita sane apud Aegyptios geometria ob iā memoratā scaturiuit causam.

De utilitati  
bus geome-  
triæ.

Utilitatem & necessitatem huius discipline (optime lector) experientia cognosces, cum mensurandi modos instrumento deprehenderis. Porro multas promit artes, mechanicam, perspectivam, quibus vitæ etiam conducit humanæ. Instrumenta siquidem bellica, machinæ, arietes, propugnacula, huius scientiæ præceptis inuenta sunt atque instructa: horarum cogniti cursus, positionésque locorum, & emensiones terræ, marisque. Lances & trutinas hæc procudit. Mundi ac vniuersitatis ordinem



dinem per imagines oculis subiecit humanis: omnium  
 cœlestium corporum, orbium scilicet & stellarum  
 distantias & magnitudines demonstravit: multa,  
 inscitia & caligine obruta hominibus detexit: quæ  
 nullam admittebant sua sponte fidem, reddidit  
 probabilia.

Fertur itaque Thales Milesius, primus Aegyptum petens, hanc disciplinam illinc in Græciam adduxisse: inuenitque ipse in ea facultate multa. Post hunc fuit Ameristus Geometriæ studiosus. Hunc secutus Anaxagoras Clazomenius, Theodorus quoque Cyrenæus. Primus autem fertur Hippocrates geometrica scripsisse elementa: his succedens Plato, maximum adiecit fundamentum: præterea plures alij. Post hos Euclides elementa collegit.

GEOMETRIÆ duæ sunt species: Theorica scilicet & Practica.

Theorica est, quæ sola mentis speculatione quantitates, proportionales, & earum mensuras intuetur.

Practica est, quando alicuius rei quantitatem ignotam, experimento sensibili mensuramus.

Genera mensurationum triplicia in usu ut plurimum versantur, scilicet Altimetria, Planimetria, & Stereometria. Altimetria est de mensuratione quantitatis secundum unam diuisionem, scilicet secundum longitudinem tantum. Planimetria est de mensuratione quantitatum secundum longi-

tudinem & latitudinē. Stereometria est de mensuratione quantitatum secundum longum, latum, & profundum. Dicta à στερεός Græco, quod est solidum, & μέτρον mensura, quasi mensura solidorum. Solidū autem dicimus, quicquid tribus interuallis seu dimensionibus porrigitur: id est, quicquid longitudine, latitudine, profunditateque distenditur. Primo modo linearem dimensionem metimur: secundo modo dimensionem superficialem, & tertio dimensionem corporalem.

Quantitatem autem aliquā mensurare, est inuenire quoties in ea aliqua famosa quantitas reperitur, vel quota pars aut quotæ partes sint alicuius famosæ quantitatis. Famosæ autem quantitates sunt quæ apud omnes aut multos vsitate sunt: vt sunt, Digitus, Palmus, Pes, Cubitus, Passus, Pertica, Stadiū, Miliarium, Leuca, & his consimiles.

Digitus est minima, qua agris metiendis antiqui utebantur, mensura, continens quatuor hordei grana, & latitudine contiguatim disposita, talis:




Palmus digitos habet quatuor.

Pes palmos habet quatuor.

Cubitus pedem recipit vnum & dimidium, quem plures vocant vlnam.

Passus pedes habet quinque.

Pertica aut Decempeda, aut Radius, virga est  
oblonga



oblonga, decē continens pedes, vnde decēpeda dicta est. Pertica verò dicitur, quasi portica, à portando. Manu nanque mensoris ad agros metiendos virga mensuralis portatur.

Stadium passus habet centum viginti quinque. Dicitur autem fertur à stando stadium, siue quòd iuuenes currentes emenso hoc stadio starent, seu quòd Hercules primus hoc spatium vno anhelitu transcursum stando signauerat.

Miliarium stadia habet octo, quæ faciunt mille passus, à quibus miliarium dicitur.

Leuca recipit miliarium vnum & dimidium, finitur enim passibus mille quingentis.


Altimetrie tres assignantur partes: quarum vna est de mensurationibus altitudinum secundum longitudinem tantum, alia de mensuratione planitierum secundum longitudinem tantum, & tertia de mensuratione profunditatum.

Generaliter tamen omnium partium mensurarum eadem sunt principia. Nam, vt in physicis habetur, omnis visio intus (suspicendo species rei visibilis) causatur, & sub quodam acuto angulo comprehenditur quantitas rei visibilis per modum basis: & quanto acutior est, tanto ratio quantitatem iudicat minorem, iuxta illud principium: Minori angulo minor correspondet basis, & sic in visione altitudinis altitudo locum tenet vnius rectæ lineæ:

spatium vnius alterius, & linea visualis tenet locum tertiæ: ex quibus tribus lineis cōstituitur triāgulus reētilineus orthogonius. Et sic altitudo quælibet mensuranda, seu spatium vel profunditas debet semper secundum lineas reēctas imaginari, vt patet in figura sequenti, figurata per, a, b, c: & semper altitudo cum spatio cōstituunt angulum reēctum, scilicet, c: & aliquando sub angulo, b, comprehendit statum, a, c, & aliquando sub angulo, a, comprehendimus, b, c, & sic secundum paruitatem illorum duorum angulorum acutorum, a, & b, comprehenditur res maior & minor: & hoc per sensum cum iudicio rationis, vt in persēctiua habetur.

**S**ED quia non est bene possibile, vt sensus & ratio veram quantitatem anguli acuti variati cognoscant: ideo difficillimum esset, naturaliter per solam scientiam persēctiue certissimam rei quantitatem comprehendere. Vnde vetusti rerum mensores, instrumentis quibusdam artificialibus inuenerunt artem, qua mediante quantitates rerum facile cum certitudine dignosci possunt. Sunt autem huiuscemodi instrumenta plura, & longum difficileque esset omnium compositiones & vsus reddere, ideo transeo: & dico in dorso astrolabij reperitur quadrans aut gnomon, continens scalam altimetram. Cuius quadrantis linea mediæ noctis vocatur


catur Status, quæ tenet locum altitudinis seu profunditatis, scala verò sibi iuncta, trāsuersaliter posita, est scala vmbre rectæ vel extensæ: & est diuisa in 12. partes æquales, quæ dicuntur digiti aut puncta gnomonis vmbre rectæ. Secunda verò sca-



la expositio Status sita recta versus armillam, est scala vmbre versæ: & duodecim diuisiones in ea, sunt digiti aut puncta vmbre versæ. Diameter qua-

DE GEOMETRICIS

drantis dicitur vmbra media. Linea fiducia Al-  
hidadae dicitur vmbra vel visualis linea. In exem-  
plo accipe hanc figurationem.



**D**E I N C E P S considerandum, in rebus men-  
surandis supponimus quamlibet magnitudi-  
nem finitam, siue sit longa siue breuis, diuidi in 12.  
partes equales: quas digitos aut puncta nominamus:  
& sic digitus aut punctum est duodecima pars rei.  
Ex his igitur partibus quandoque quaedam sunt &  
quales numero cum vmbra, sicut in altitudine: quã-  
doque pauciores: quandoque verò plures, secundum  
quòd

quòd Umbra est maior vel minor ex diuersa Solis aut Lunæ altitudine : & propter hoc Quadrans habet duo latera, in duodecim partes æquales partita: iuxta quas partes huiusmodi diuersitates rerū & Umbrarum addiscimus. Est autem duplex Umbra, scilicet recta & versa. Umbram rectam siue extensam dicimus, quam res orthogonaliter super superficiem Horizontis erecta efficit in ipsa superficie Horizontis, vt est Umbra turris vel alterius huiusmodi. Sed umbram versam vocamus umbram, quam res Horizontis superficiem equidistans efficit in superficie orthogonaliter super Horizontem: velut est Umbra stili in pariete aut cilindro. Et Umbra recta ante meridiem continuo fit minor: & post meridiem maior. Sed Umbra versa contrà, ante meridiem crescit, & post meridiem decrescit. Cùm autem habueris puncta Umbræ rectæ, & volueris ea reducere ad puncta Umbræ versæ: tunc 144. diuide per numerum punctorum Umbræ rectæ, & numerus quotiens erit numerus punctorum Umbræ versæ. Similiter si habueris puncta Umbræ versæ, et volueris ea cōuertere in puncta Umbræ rectæ: diuide 144. per puncta Umbræ versæ, & numerus quotiens erit numerus punctorum Umbræ rectæ.

Umbra re-  
cta.

Umbra ver-  
sa.

Notandum etiam, quòd rerum altitudines metiuntur duplici via, aut cum instrumēto, aut sine instrumento. Sine instrumento (intellige verò) aut


mediante rei umbra, aut mediante linea visuali re-  
 cta aut reflexa. Instrumenta quæ nos iuuant men-  
 suras capere, multiplicia sunt, vt prædiximus, inter  
 quæ vnum gnomon seu altimetra scala nuncupatur:  
 & illud est quadrans in dorso astrolabij, per quod  
 rerum altitudines indagare possumus, mediante li-  
 nea visuali seu radio luminosi corporis, vt paulò an-  
 tè dicebatur. His præambulis summatim expositis,  
 ad geometricas mensuras feliciter accedimus.

Proposi. 61. **ALTITVDINEM VNIVSCV-**  
 iusque corporis in plano perpēdiculariter  
 stantis, per vmbra ipsius deprehendere.

**C**V M cuiuslibet rei accessibilis perpendiculari-  
 ter erectæ super planum, cuius summitas &  
 terminus inferior videntur, altitudinē per eius um-  
 brā metiri volueris: Sole aut Luna illucescente, in-  
 terdiu officio astrolabij accipe altitudinē Solis, no-  
 ctu verò Lunæ: & si linea fiduciæ Alhidadæ præ-  
 cisè ceciderit super lineam mediæ vmbre, hoc est,  
 super diametrum quadrantis aut scalæ: tunc enim  
 altitudo Solis aut Lunæ est 45. graduū, & cuiuslibet  
 rei altitudo æqualis suæ vmbre. Mēsurā igitur um-  
 bram rei, & habes sine ambiguitate altitudinem  
 ipsius.



MENSURATIONIBVS. 157  
IN EXEMPLVM SIT  
adiecta figura.



**H**VIUS partis magna est utilitas. Nam si nonnunquam altitudo Solis aut Lunæ non fuerit præcise 45. graduum, expecta paulisper donec talem altitudinem in Astrolabio habueris, et tunc umbra altitudini rei æquabitur.

In nostro climate septimo, Sole meridiana signa possidente, nunquam umbra rei æqualis est ei: quia Sol nunquam etiam tempore meridiano, 45. gradi-

bus supra horizontem eleuatur. Secus de Luna, quæ propter latitudinem suam septentrionalem etiam in signis meridianis nonnunquam ad sublimitatem 45. graduum peruenire potest. Sole autem per septentrionalia signa eunte, à nono gradu Arietis vsque in 21. Virginis, omni die sole radiante, ad minus semel umbra corporis altitudinem eius indicat. Semel cū eleuatio Solis meridiana est præcisè 45. graduum, quod accidit circa nonum & decimum gradus Arietis. Similiter circa 20, & 21. Virginis. Bis autē huiusmodi eleuatio accidit, scilicet semel ante, & semel post meridiem, Sole ab vndecimo gradu Arietis in 19. Virginis tendente. Quo autem tempore ante & post meridiem id fiat, adiumento quartæ propositionis facile addisces. Quapropter ante prædicere potes: illo die, tali hora ante aut post meridiana, umbra rei altitudinem ipsius mensurabit. In Luna ferè idem sumitur iudiciū, præterquam quòd eius latitudo quandoque altitudinem augmentat, quandoque minuit: & diuersitas aspectus ipsius etiam nonnullam variationem ingerit, quare in Luna certior via est, cum noctu ipsam lucētem habueris, expectare vsque dum eleuabitur 45. gradibus: & tunc pronuncia rem umbræ æquari.

Secunda  
pars huius  
propositio-  
nis.


Præterea si Solis aut Lunæ altitudo maior fuerit 45. gradibus: tūc altitudo rei maior erit umbra sua: & habet se altitudo ad suam umbram in ea proportione

tione, in qua se habet 12. ad puncta tacta à linea Fiduciæ in scala vmbre rectæ. Vt si puncta per lineam Fiduciæ ipsius alhidadæ tacta esset quatuor, habet se 12. ad quatuor in propositione tripla: est ergo altitudo rei maior sua vmbra in triplo: quare si vmbre quantitatem ter recepero, habeo altitudinem rei.

Item si puncta per lineam fiduciæ abscissa essent 6. habet se 12. ad 6. in proportione dupla: quare altitudo rei dupla est ad suam vmbra. Si igitur vmbre quantitatem bis sumpsero, habeo ipsius rei certam altitudinem: & sic de alijs censendum est. Metire ergo vmbra rei aliqua mensura tibi nota: quam multiplica per 12. & productum diuide per puncta vmbre rectæ per lineam fiduciæ tacta, & numerus quotiens ostendit tibi altitudinem rei.

In exemplo sint puncta vmbre rectæ 8. inuen- Exemplum  
ta per elevationem Solis aut Lunæ: sit vmbra corporis orthogonaliter erecti sex perticarum, multiplico 6. perticas per 12. & colligo 72. perticas, quas diuido per 8. puncta vmbre rectæ inuenta, & habeo in quotiente 9. dico igitur altitudinem corporis esse 9. perticarum.

DE GEOMETRICIS  
HVIVS REI HANC  
cape figuram.



**H**IC diligenter aduertendum est, quòd quan-  
docunque linea fiducia de scala vmbrae rectae  
refecat 6. puncta praecise: quod fit quãdo Sol aut Lu-  
na eleuatur supra horizontem 63. gradibus & 30.  
sive 40. ferè minutis, tũc vniuscuiusque rei vmbrae  
recta habet se ad altitudinem rei, sicut vnũ ad duo:  
sed vnum bis sumptum constituit duo: sic vmbra rei  
bis sumpta cõstituit altitudinem rei. Est enim tunc

vmbra

*Umbra medietas rei. Vt si umbra esset 20. pedum, altitudo rei esset 40. & sic de alijs.*

*Cæterum si altitudo Solis vel Lunæ fuerit minor 45. gradibus, tunc linea fiducia cadet super puncta scale umbræ versæ: & umbra maior erit altitudine rei: & habet se altitudo rei ad suam umbram in ea proportione, in qua se habent puncta versa absissa per lineam fiducia ad 12. Vt gratia exempli: sint puncta umbræ versæ quatuor: habet autem quatuor se ad 12. tanquam pars tertia, ita habet se altitudo rei ad suam umbram: est enim tertia pars umbræ. Si igitur accepero tertiam partem umbræ, habeo rei altitudinem. Item ponantur puncta umbræ versæ esse sex: est autem sex medietas respectu 12. ita rei altitudo est medietas umbræ: recepta igitur medietate umbræ, habeo altitudinem rei.*

Tertia pars  
huius pro-  
positionis.


Exemplum

*Mensura igitur umbram rei, aliqua mensura tibi cognita: & eandem multiplica per puncta umbræ versæ super quæ cecidit linea fiducia: & productum diuide per 12, & numerus quotiens ostendit tibi altitudinem rei petitam.*

*Gratia exempli: sint puncta umbræ versæ per albidam resecta quatuor, umbra rei perpendiculariter stâtis 45. passuum: multiplico umbram per quatuor, et produco 180. quem numerum partior per 12. & habeo in quotiente 15. infero igitur altitudinem rei metienda esse 15. passuum.*

Exemplum

DE GEOMETRICIS  
 ECCE FIGURA.



**V**EL si placet, reduc (per doctrinam propositionis 58.) puncta umbræ versæ in puncta umbræ rectæ: & tunc multiplica umbrã rei per 12. et productum diuide per puncta umbræ reductæ, quæ post reductionem vocantur puncta umbræ rectæ: & pro-

**Exemplum** ueniet idem in quotiente, scilicet altitudo rei. Vt in exemplo iam exposito: habeo quatuor puncta umbræ versæ, per quæ diuido 144, et proueniunt in quotiẽte 36 puncta vocata puncta umbræ rectæ: quæ seruo ad partem. Deinde propositam umbram 45. passuum multiplico

multiplico per 12, & produco 540. quæ diuido per 36. puncta reducta: et habeo in quotiēte 15. vt supra: quare dico altitudinē rei, puta turris esse 15. passuum.

Circa hanc vltimam partem animaduertendum, quòd quandocunque in acceptione altitudinis Solis aut Lunæ linea Fiduciæ de scala vmbre versæ abscindit 6. puncta præcise, quod accidit quando Sol & Luna eleuatur supra Horizontem 26. gradibus & 30. fermè minutis: tunc vniuscuiusque rei vmbra recta, habet se ab altitudinem rei sicut duo ad vnum, continet autem duo vnum bis: sic vmbra re-  
cta in duplo maior est quàm sua res: quare eius medietas rei altitudinem perfectè indicat. Vt si vmbra arcus turris esset 60. pedum: altitudo turris esset 30.

Potes propositionē istam secūdum tres eius partes ampliare per dicta propositionis antecedentis, nam radius Solis aut Lunæ tenet locum lineæ visualis: vmbra locum spatij, res erecta locum status: igitur constituitur triangulus rectilineus orthogonius, & hoc patet ex tribus exemplis figurarum adiectarū.

**CVIVSLIBET REI ELEVA-** Proposi. 62.  
tæ accessibilis, in æquali planitie constitu-  
tæ, altitudinem aliter quàm per vmbra  
inuestigare.


**SISTE** aliquid ad am secundum lineam Fiduciæ  
in medio quadrati aut scalæ, hoc est, super lineam

Umbrae mediae vel super 45. gradum quartæ altitudinis: et levato suspensoque astrolabio de manu tua contra ipsam altitudinem rei metiendæ tam diu move te ante vel retro, quousque visualis linea per ambo foramina pinnularum trāsiciens summitati rei occurrat: id est, donec per utriusque tabulæ foramen summitatē aut cacumen rei videas. Quo habito metire spatium, quod est à medio pedis tui vsque ad radicē aut basim rei elevatæ: adiecta tamen quātitate stature tuæ: à visu oculi tui in terram ad planitiem computando: quam post te directè semper adijcies: & quanta erit hæc quantitas adæquata, tanta proculdubio erit altitudo rei elevatæ.

**Exemplum** In exemplo sit turris in planitie constituta: mensuranda, a, b, & stante linea fiduciæ in linea umbrae mediae, contemplor per utrunque mediclinij foramen cacumen turris: & sit spatium inter basim turris & medium pedis mei, d, b. Longitudo stature ab oculo meo in terram, i, d, quam spatium, d, b, retro projiciendo addo, & voco spatium facta additione stature, i, d, b, quod metior mensura aliqua mihi cognita, eandemque pronuncio æqualem altitudini turris.

E C C E





LOCO NON MVTATO, VBI Proposi. 53  
 primùm steteris, altitudinis coram positæ  
 mensuram comprehendere.

**S**I hoc idem quod in antecedente propositione  
 determinauimus, non mouendo te de loco, sed fir-  
 mato pede absoluere volueris, hoc pacto operare:  
 Sume Astrolabium, et subleuato eo contra altitu-  
 dinem mediclinium torquendo coaptabis, quousque  
 per vtrunque foramen tabellarum summitatem al-

titudinis videas: tūc si linea fiducia ceciderit super  
 latus vmbre recte vel extēse, denotat quòd altitu-  
 do rei maior est spatio intercepto inter basim aut ra-  
 dicem altitudinis, et medium pedis tui: & in quan-  
 ta proportione se habent duodecim \* ab ista puta  
 que abscindit linea fiducia, in tanta se habebit al-  
 titudo rei ad spatiū inter te & ipsam, addita quan-  
 titate stature tue, vt suprā admonuimus.

\* ad ista  
 puncta.

Et practicatur sic: Numerum punctorum recto-  
 rum per lineam fiducia abscisorum, serua: deinde  
 metire spatium, quod intercipitur inter radicem al-  
 titudinis rei mensuranda & pedem tuum, aliqua  
 mensura tibi nota, puncta per pedes vel passus &c.  
 Et multiplicentur per duodecim: et productum di-  
 uidatur per numerum punctorum suprā seruatum:  
 & quod ex diuisione exierit, erit altitudo rei, ad-  
 dita quantitate stature tue.

Verbi gratia, sit altitudo, b, c, mensuranda: spa-  
 tium à radice altitudinis ad pedem meum, c, d, quin-  
 que passuum: statura verò, d, e, duorum passuum.  
 Puncta scale vmbre recte tacta ab Alhidada,  
 sex: duco spatium quinque passuum in duodecim,  
 & procreo sexaginta, que diuido per sex puncta  
 recta, & habeo decem passus: quibus addo sta-  
 turam duorum passuum, & colligo duodecim pas-  
 sus. Concludo igitur altitudinem propositam habe-  
 re duodecim passus.

HVIVS

# HVIUS DEMONSTRATIONIS præsentem cape figuram.



**S**I verò linea fiducia ceciderit super latus umbræ versæ, tunc spatium inter te & basim rei eleuatæ, cum statura tua est maius altitudine rei eleuatæ. Et in qua proportione se habent puncta abscisa per lineam fiducia ad duodecim, in eadem se habebit altitudo rei mensurandæ ad spatium inter te & radicem altitudinis rei, adiecta tamen semper statura tua.


Huius partis practica hæc est. Puncta vmbre  
 versæ per lineam fiducia ostensa, serua ad partem,  
 deinde mensura distantiam inter te & radicem  
 rei mensurandæ, aliqua mensura tibi cognita, &  
 eam multiplica per puncta vmbre versæ supra ser-  
 uata: & quod prouenit per duodecim partiariis, &  
 habebis in quotiente quantitatem altitudinis rei,  
 addendo vt supra quantitatem stature tuæ.

**Exemplum**

In exemplo sit altitudo rei mensurandæ, f, g,  
 spatium inter pedem meum & radicem altitudi-  
 nis, g, h, quadraginta pedum: puncta vmbre versæ,  
 sex: statura mea, h, i, sit quinque pedum. Multiplico  
 quadraginta pedes per sex puncta vmbre versæ, &  
 excrescit numerus C C X L. quem diuido per  
 duodecim, & in quotiente habeo viginti pedes, qui  
 sunt altitudo rei mensurandæ propositæ.

H V I V S

MENSURATIONIBVS. 163  
 HVIVS PARTIS HANC  
 sume figuram,



VEL, si placet, reduc per propositionem quin-  
 quagesimamoctauã huius pũcta vmbre versæ, quæ  
 sunt sex, ad pũcta vmbre rectæ, et erũt puncta vmb-  
 re rectæ correspondentia viginti quatuor, per quæ  
 summã resultantẽ ex ductu quadraginta in duode-  
 cim, scilicet quadringentos octoginta, diuide: & in  
 quotiente exhibũt viginti passus, qui mensurãt alti-  
 tudinẽ, f, g, addita statura tua, quæ fuit quinque pe-  
 dũ: & sic in eundẽ hæ duæ operationes tendũt finẽ.

Animaduertendum tamen, quòd ea quæ dicta sunt, habent veritatem, si spatium inter te & rem mensurandam, fuerit planum: si secus, tunc pone aliquid cum linea fiducia super diametrum transversalem astrolabij, hoc est, super principium quartæ altitudinis: & vide per ambo foramina Tabellarum, aliquod punctum vel signum in re mensuranda, quod nota: & illud punctum aut signum & oculus tuus, sunt in vna linea recta horisoti equidistante. Deinde officio astrolabij vide cacumen eiusdem rei: & mensura spatium inter pedem tuum & rem mensurandam per lineam rectam, puta cum chorda, & operare consequenter, prout supra docuimus: et habebis altitudinem rei à puncto notato vsque ad summitatem ipsius: et tunc non accipias altitudinem quæ est ab oculo tuo vsque ad terrã: sed loco ipsius accipe altitudinem rei à puncto signato vsque ad terram: quam adde ad altitudinem rei ab eodem puncto notato vsque ad summitatem rei inuentam: & habebis quæsitum.

Propo. 64.

**REI INACCESSIBILIS IN**  
planitie perpendiculariter stantis, altitudinem artificiosè metiri.

**Q**UOD si fortè fluuij, fossæ, aut vallis alicuius obiectu spatium inter mensoris pedem & rei mensu-

mensurandæ radicem, interceptum commeabile nõ sit: hoc modo poteris propositæ longitudinis mensuram inuenire.

In loco plano, subleuato Astrolabio alhidadam contra cacumen rei mensurandæ dispone, donec per vtrūque foramen Tabellarum summitatem videas: & cõsidera subtilius, super quod latus vmbre Linea fiducia alhidadæ cadat. Quæ si ceciderit (vt frequenter accidit in huiusmodi modo mensurationis) super latus vmbre versæ, vide quot puncta linea fiducia abscindat, et per numerum punctorum diuide duodecim, & quotientem serua. Vt si linea fiducia ceciderit super tria puncta, tunc in quotiente erunt quatuor, quæ serua. Postea signato loco in quo stetisti, retrocede vel progredere modicū à priori loco: & rursum in secunda statione astrolabium subleua, & iterū summitatem rei per foramina tabellarum respice, & numerum punctorum per lineam fiducia abscisorum perpende: per quem iterum diuide duodecim, & quotientem tunc prouenientem sutrahe à primo quotiente prius seruato, si fuerit minor: aut contrà, si fuerit maior: & serua excessum. Verbi gratia, vt linea fiducia in secunda statione cadat super sex puncta, diuide per ea duodecim, manebunt in quotiente duo: quibus subtractis à prioribus quatuor seruatis, excessus est duo, quem serua. Postea mensura spatium inter pri-

nam & secundam stationes quacunque mensura volueris: & numerum illius mensuræ diuide per excessum prius seruatum, scilicet duo: & numerus qui ex diuisione exierit, addita longitudine tua, ostendit quod quæris.

Exemplum

Exempli gratia. Si numerus mensuræ spatij tui esset quadraginta pedum, tunc diuidendo quadraginta per duo, quæ sunt excessus: exeunt in quotiente viginti pedes, qui sunt pars altitudinis rei: quibus adde staturam mensurantis, quam pono esse septem pedum, & colliges vigintiseptem pedes altitudinem rei eleuatæ.

Ex his infertur regula hæc generalis: facta subtractione quotientum supra seruatorum extractorum, puncta vmbre versæ duabus stationibus inuenta. Si pro excessu vnum remanserit, stationum intervallum erit æquale altitudini rei mensurandæ, addita, vt iam sæpius admonuimus, statura mensoris. Si duo remanserint, intervallum stationum erit duplum ad altitudinem rei: quare si intervalli dimidium acceperis, & staturam tuam adieceris, mensurandæ rei altitudinem certò elicies. Si tria remanserint, spatium duarum stationum erit triplum ad rem mensurandam. Quocircò si spatij tertiam partem acceperis & eidem staturam tuam addideris, altitudinem rei dignosces. Idem sume iudicium, si quatuor remanserint.


Etsi



Et si ex iam expositis satis exemplificatū est, Exemplum  
 lucidioris tamen intelligentiæ gratia hoc exemplū  
 adiiciemus. Proponitur mihi res metienda in plani-  
 tie sita, ignotæ altitudinis, quæ sit,  $h, i$ , præcipior eius-  
 dem inuestigare altitudinem: & supponitur, quod  
 ad radicem rei mensurandæ propter aquam, fos-  
 sam aut aliud impedimentum adire nequeam. Su-  
 spenso igitur astrolabio (vt assolet) facio stationem  
 primam in puncto,  $k$ , & visa rei summitate per pin-  
 nularum foramina, inuenio per contactum lineæ fi-  
 duciæ in scala vmbre versæ, puncta 6. per quæ par-  
 tior 12. & habeo in quotiente duo: quæ seorsum ser-  
 uo. Deinde secundum lineam rectam retrorsum per-  
 go, & facio secundam stationem in puncto,  $l$ , & in-  
 tueor iterum (vt iam iam exposui) cacumen rei, &  
 offendo 2. puncta vmbre versæ: per quæ diuido 12.  
 & habeo in quotiente 6. à quibus subtraho 2. suprâ  
 seorsum seruata: & remanet mihi excessus 4. quem  
 ad partem seruo. Postea metior spatium à statione  
 prima,  $k$ , in stationem secundam,  $l$ , & inuenio gra-  
 tia exempli 16. passus: quos per excessum 4. serua-  
 tum diuido: & habeo in quotiente quatuor. Vnde  
 dico partem altitudinis huius rei eleuatæ,  $h, i$ , esse  
 quatuor passuum: quibus staturam meam quam po-  
 no esse duorum passuum adiicio: & tandem con-  
 cludo altitudinem,  $h, i$ , esse 6. passuum: quod fuit ab-  
 soluendum. Vel, & est idem, facta punctorum sub-

tractione remanserūt quatuor, accipio igitur de spatio 16. passuum inter, k, & l, quartam partem, hoc est quatuor passus, & habeo vt prius partem altitudinis rei, h, i, cui iungo staturam meam duorum passuum, & colligo mensuram 6. passuum, vt supra.

Ecce figuratio.



ET NOTA quòd foramina tabellarum per quæ transit radius visualis ad rei altitudinem comprehendendam, debent esse admodum stricta: aliter enim facile accideret error.

Plures

Plures practicando hanc propositionem, reducunt puncta vmbre versæ duabus stationibus re-  
 perta, in puncta vmbre rectæ secundum doctrinam  
 propositionis 58. & spatium duabus stationibus in-  
 terceptum aliqua mensura nota mensuratum mul-  
 tiplicant per 12. Postea numerum minorem puncto-  
 rum rectorum subtrahunt à numero maiori: & per  
 differentiam diuidunt productum multiplicatione  
 inuentum: & per quotientem adiuncta altitudine  
 stature, altitudinem rei pronuciant. Et tendit hic  
 modus in eundem finem cum modo nostro supra  
 exposito: quare ampliori sermone eundem haud  
 prosequemur.


**ALTITVDINEM REI SVPER** Proposi. 65.  
 montem erectæ, cuius altitudinis termi-  
 nus inferior & summitas videntur oculo  
 existente in valle, metiri.

**DE ALTITVDINE** in plano metien-  
 da (præcipuè nouitiis altimetris) dicta suffice-  
 re possunt. Nunc restat demonstrare qualiter cuius-  
 libet altitudinis in eminentiore loco, puta monte cõ-  
 stitutæ, nobis in imo, puta in valle positæ mensura cõ-  
 prehendi possit. Hoc quidẽ etsi difficilius videtur  
 esse, ratio tamẽ omnem viã nature perlustrat. Om-  
 ne ergo quod de terræ superficie emergens sursum tol-

litur, & vertice in altū elevato, circūiacentis plani  
 equalitatem transcēdit, altitudo est: quæ si à loco  
 dissimili aliquando à vallibus ad montes metienda  
 occurrat: primum inquirat mensor in imo aut valle  
 naturalem suæ stationis Horizontem, id est, quòd  
 habeat aliquam planitiem Horizonti æquidistan-  
 tem, in qua operationem mensurationis perficere pos-  
 sit. Qua habita, consideret primò altitudinem mon-  
 tis per duas stationes secundum doctrinam proposi-  
 tionis antecedentis. Deinde obseruet altitudinem  
 turris & montis similiter per eandem propositionē:  
 & tunc subtrahat altitudinem mōtis ab altitudine  
 totius aggregati similiter, & residuū erit altitudo  
 turris. In exemplo facilius forsità capies. Sit altitu-  
 do turris,  $a, b$ , supra montē,  $b, c$ , cuius summitas,  $a$ , &  
 terminus inferior,  $b$ , videatur à mensore existēte in  
 valle. Primum per propositionem antecedētem ad-  
 disco altitudinem montis per punctum,  $b$ , verticalē  
 ipsius visui meo obiectum: & inuenio gratia exem-  
 pli in prima statione quæ sit,  $d$ , puncta 6, vmbre ver-  
 se, per quæ partior 12. & elicio in quotiente 2. quæ  
 seruo: in secūda autem statione quæ sit,  $e$ , reperio 4.  
 puncta vmbre verse: per quæ iterum diuido 12. &  
 habeo in quotiēte 3. quæ seruo. Deinde subtraho mi-  
 norem quotientem, scilicet 2. à maiori, scilicet 3. &  
 remanet mihi vnum pro excessu. Quare infero per  
 regulam antecedētis propositionis spatium duarum  
 stationum

Stationum, d, e, semel acceptū vna cum statura mea, mensurare altitudinem montis. Sit igitur spatium inter duas stationes, d, e, quatuor perticarum, hoc est 40. pedum, & statura mea semipertica, id est 5. pedum: concludo altitudinem montis, b, c, esse 4. perticarum & dimidia, hoc est 45. pedum. ecce primum absoluendum.

Præterea considero altitudinem montis & turris simul adiumento puncti, a, supremi turris, & offendo in prima statione quæ sit, f, 4. puncta vmbre versæ: per quæ distribuo 12. & habeo in quotiente 3. quæ seruo: in secunda autem statione quæ sit, g, inuenio puncta 3. per quæ iterum diuido 12. & habeo in quotiente 4. Subtraho 3. quotientem minorem à 4. quotiente maiori, & habeo excessum 1. vnde iterum elicio, quòd intervallum harum stationum, f, g, cum statura mea est æquale altitudini turris & montis simul. Recipio igitur hoc intervallum semel, & adiicio staturam meam, & habeo altitudinem aggregati, id est turris & montis simul. Sit igitur spatium inter has duas stationes, f, g, 9. perticarum, cui si adiunxero semiperticam, habeo altitudinem turris & montis. Subtractis igitur 4. perticis & dimidia altitudine montis, a, 9. perticis & dimidia altitudine vtriusque, manent 5. perticæ altitudo turris. quod fit optatum. Ecce sequens schema.



Proposi. 66. **PLANIMETRIAM, HOC EST,**  
 longitudinum mēsuram per Astrolabium  
 experiri.

**H**ABITA notitia dictorū de altitudine rei  
 perpendiculariter stantis mensurāda, facile in-  
 telliges hæc paucula, quæ de mensuratione plani se-  
 cūdum longitudinem subiiciemus. Nam suprā per  
 longitudinem notam didicisti altitudinem ignotā,  
 hīc contrā, per altitudinem notam, cognosces longi-  
 tudinem planitie ignotam.

Cūm

Cum igitur planum cuius terminus videtur, siue sit accessibilis, siue inaccessibilis, officio astrolabij secundum longitudinem metiri volueris, principio omnium dispone virgam mensuriam, quæ secundum omnem præcisionem sit tantæ longitudinis, quantæ est statura tua ab oculo vsque ad pedem: quam per certam mensuram tibi cognitam diuide, & melior (me iudice) sit ipsius diuisio in 12. partes æquales, quæ disposita, sta in vno termino plani secundum longitudinem mensurandi: & suspensio astrolabio, eleua aut deprime alhidada, quousque per vtriusque tabellæ foramina ex aduerso alterum limitem aut terminum plani videas. Quo perspecto, supputa diligenter puncta per lineam fiduciæ abscisa: quæ ferè semper sunt puncta vmbre versæ. Tunc enim maior est longitudo plani quam virga mensuris. Per puncta igitur abscisa iam supra inuenta, diuide 12. & numerus quotiens ostendit tibi, quota est pars virgæ mensuriæ, respectu longitudinis planitie quæ mensuratur.

Si enim linea fiduciæ præcisè ceciderit super lineam mediæ vmbre, id est, super diametrum quadrantis, erit longitudo plani æqualis virgæ mensuris. Si autem linea fiduciæ ceciderit super punctum 11. vmbre versæ, erit longitudo virgæ semel sumpta cum eius parte vndecima longitudo planitie.

Si linea fiduciæ ceciderit super punctum decimum  
vmbre

Umbrae versa: erit longitudo virgæ semel accepta cum duabus decimis virgæ, longitudo spatij plani.

Si præterea linea fiducia ceciderit super 9. puncta Umbrae versa: erit virgæ longitudo semel accepta cum tribus nonis ipsius, mensura longitudinis plani.

Si fiducia linea ceciderit super 8. puncta Umbrae versa, longitudo virgæ & eius dimidium mensurabunt longitudinem planicie.

Si linea fiducia incidit in 7. puncta Umbrae versa, erit longitudo virgæ semel sumpta & 5. eius septimis longitudo plani.

Quòd si fiducia linea ceciderit in 6. puncta Umbrae versa, per quæ 12. diuisa, in quotiente relinquuntur 2. unde infertur, quòd longitudo plani est dupla ad virgam: quare si longitudinem virgæ bis sumpseris, habebis longitudinem rei mensurandæ.

Si linea fiducia super 5. puncta Umbrae versa ceciderit, & per ea 12. diuiseris, colliges in quotiente 2. & habes in residuo duas quintas: quare si virgæ longitudinem bis acceperis, & duas eius quintas, videbis plani longitudinem.

Si deinceps linea fiducia super quatuor puncta Umbrae versa ceciderit, & per ea 12. partiantur, in quotiente apparebunt 3. Quare si virgæ quantitatem ter receperis, longitudinem plani numerabis.

Si fiducia linea tria puncta versa Umbrae tetigerit,




gerit, & per ipsa 12. distribueris: numerus quotiens erit 4. significans quòd longitudo virgæ quater sumpta, spatij longitudinem metitur.

Si linea fiducia super duo puncta vmbre versæ ceciderit, per quæ 12. diuisa in quotiente emergunt 6. quare longitudo spatij mensurandi habet se in proportione sextupla ad ipsam virgam. Quam si sexies sumpseris, habebis longitudinem planiciei.

Et demum linea fiducia vnum absecans punctum, signat (vnitas enim non diuidit) quòd spatium longitudinis habet se in proportione duodecupla ad virgam. Quare si eandem duodecies sumpseris, plani longitudinem colliges.

Harum rerum particulare hoc sume exemplū, **Exemplum** proponitur mihi planities, b, c, metienda: sit virga altitudinem meam præ se ferēs, a, b, sit oculus meus in, a, puncto virgæ superiori: pes autem in, b, puncto virgæ inferiori & termino vno plani. Subleuato igitur astrolabio, moue alhidadam donec radius visualis transeat per ambo foramina pinnularum, & occurrat altero termino plani, c. Video lineam fiducia tangere 3. puncta lateris scalæ vmbre versæ: per quæ partior 12, & habeo in quotiente quatuor: & mox ex suprâ narratis concludo, quòd virga mensoria quater sumpta mensurat in vnguem planiciei longitudinem. Simile iudicium de aliis sumendum est.

DE GEOMETRICIS  
Ecce figuram hîc annexam.



Q V O D si planicies esset admodum magnæ  
quantitatis, puta centum vel ducentorum passuum  
in longitudine, & tu stans in vno termino plani  
prospectans per foramina tabellarum in alterum  
terminum eiusdem: nullius (vt ita dicam) aut mo-  
dicæ proportionis secundum staturam tuam, ad tam  
ingentem longitudinem planiciei, ita quòd tunc  
alhidada secundum lineam fiduciæ tangit primum  
punctum aut eius aliquam partem vmbre verse, in  
quo casu mensurationes sunt valde incertæ: si igi-  
tur certitudinem amaueris optauerisque, erige in

vno

Vno termino plani hastam, perpendiculariter infixam terræ, continentem staturam tuam ter, quater aut quinquies, aut ad libitum, & hasta inuariabiliter stante, adiunctis structuris vsque adeo ascende, vt oculus tuus summitati haste præcise copuletur: quo factò, per astrolabium respice eminus terminum alterum plani, & nota puncta vmbre versæ, & per ea & longitudinem haste ab oculo tuo vsque ad terram operare secundum modum supra expositum de virga mensoria, & habebis propositum, in hoc enim casu hasta supplet vices virgæ mensoriæ.

Latitudo verò plani haud aliter quàm longitudo mensuratur, notatis duobus signis in limitibus plani secundum latitudinem mensurandi.

Nec in silentio prætereundum est, si planum metiendum non fuerit rectum, neque horizonti æquidistans, sed eleuatum, eminens, lacunosum aut obliquum: hoc igitur planum ante omnia rectificabis hoc pacto. Pone duas regulas aut virgas longas & eleuatas in limitibus plani aut rei mensurandæ: & dispone alhidadam, quòd linea fiduciæ tangat in vnguem diametrum transversalem astrolabij. Illa dispositione stante applica oculum foraminibus tabellarum & radio visuali, considera signum aliquod in regula cui præsto es. Quod gratia exempli Exemplum vocetur, d: à puncto igitur, d, iterum per foramina

## DE GEOMETRICIS

videndo aduerte in regula altera erecta, quod vocetur, e. Radius igitur visualis emissus à signo, d, in, e, causat lineam horizonti æquidistantem: & rectificat planum. Quo rectificato, iunge pedes tuos puncto, d, regulæ secundum omnem præcisionem, ita quòd, d, sit basis stationis tuæ & perfice operationem mensurationis in punctum, e, secundum institutionem præhabitam, & habebis optatum.

Huius partis accipe hac figurationem.



PROFVNDRITATEM PUTEI Proposi. 67.

aut cisternæ, cuius terminus inferior visu percipi potest, breuiter metiri.


**T**ERMINVS inferior impræsentiarum dicitur punctus communis lateri putei aut cisternæ et fundo eius, si aqua caret, aut superficiei aquæ.

Metiuntur autem profunditates ferè eodem modo quo suprâ altitudines, nisi quòd astrolabium in hac operatione super extremitatem profunditatis, id est, super labrum aut orificium putei vel alterius rei profundæ: quæ quidem extremitas tenet locum altitudinis, & respicitur per ambo foramina pars opposita profunditatis, et tenet locum spatij, vbi prius ponebatur Alhidada. Et sic in hoc modo mensurandi profunditates per latitudinem notâ, deuenimus in cognitionem profunditatis ignotæ, sicut prius per spatium notum cognoscebamus altitudinẽ ignotam.

**PROFVNDRIMETER** igitur primum sciat quantitatem diametri latitudinis putei. Quæ cognita, suspensio astrolabio (vt fit) applicet alhidadam labro aut extremitati oris putei, & torqueat eandem eleuando aut deprimendo, donec per vtriusque tabellæ foramina ab isto latere in quo stat, viderit terminum in fundo putei lateris oppositi: ita, quòd vno prospectu terminum superiorem putei & inferiorem ei oppositum contempletur, quo facto, si

*linea fiducia ceciderit super lineam vmbre me-  
dia, erit profunditas æqualis latitudini putei.*

HUIUS PROPOSITIONIS  
vide figurationem sequentem.




AVT EM linea fiducia, vt propemodum  
semper accidit, ceciderit super puncta vmbre re-  
cta, tunc profunditas maior est latitudine. Conside-

igitur numerum horum punctorum, deinde diametrum latitudinis putei mensura aliqua mensura tibi nota, et eandem multiplica per 12. productumque diuide per numerum punctorum umbræ iam supra inuentorum: & numerus quotiens profunditatem putei ostendit. Vel aliter et facilius: per numerum punctorum inuentorum diuide 12. & quotientem serua, qui tibi in promptu ostendit quoties latitudinem putei recipere debeas, vt putei profunditatem elicias: & secundum hunc modum age per omnia, vt diametro latitudinis putei quemadmodum in propositione antecedente cum virga mensoria et punctis operatus es, & habebis optatum.

Breue accipe exemplum. Sit puteus, a, b, c, d, cuius diameter aut latitudo, a, b, sit, 8. pedum, puncta umbræ rectæ diligenti obseruatione reperta sint tria: multiplico latitudinem putei, a, b, 8. pedum per 12. & produco 96. quæ diuido per tria, & habeo in quotiēte 32. dico igitur profunditatem putei esse 32. pedum. Aut, & facilius, per 3. puncta inuenta distribuo 12. et habeo in quotiente 4. quæ seruo: si igitur latitudinem putei 8. pedū quater recepero propter 4. seruata: et habeo profunditatem putei 32. pedum: nam quater octo sunt 32. Exemplum

**HVIVS PARTIS ACCIPE**  
hanc figurationem sequentem.

Oculus de Lensoris.



Latitudo putei s. pedum.

Linea visibilis

Profunditas putei.

Puteus.


Fundus putei.













5026

TOLEDO

BIBLIOTECA PUBLICA

Dep.

4  
5026

Núm.

5026