

## ОЦІНКА СТАНУ ПАРОДОНТУ У ПАЦІЄНТІВ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ НА ТЛІ ЛІКУВАННЯ БІСФОСФОНАТАМИ

*Білозецький І. І.*

*Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського,  
кафедра хірургічної стоматології*

Ревматоїд-індукований остеопороз як наслідок хронічного запального процесу призводить до втрати кісткової маси шляхом стимуляції остеокластів і підвищенні резорбції кістки. На сьогоднішній день відомо, що й ревматоїдний артрит (РА) і остеопороз супроводжуються змінами пародонта. З метою лікування остеодіфіцитних станів в ревматології використовують бісфосфонати, які інгібують резорбцію кістки і збільшують її масу.

**Мета.** Метою дослідження було оцінити ефект бісфосфонатів на перебіг хронічного пародонтиту у хворих на РА.

**Методи.** Обстежено 26 пацієнтів з РА, серед яких остеопороз був діагностований у 46 %, половина з яких використовували бісфосфонати щотижнево в поєднанні з препаратами кальцію і вітаміну Д3. Стан пародонтиту оцінювали за показниками Індекс Green, Vermillion, РМА, Пародонтальний індекс, СРІТН, Індекс Фукса, МСІ, МІ, РМІ.

**Результати.** Пацієнти, що отримували бісфосфонати для лікування остеопорозу демонстрували достовірно кращі показники стану, що проявлялося вищими показниками індексу Фукса, МСІ, МІ, РМІ.

**Висновок.** Ці дані дозволяють припустити, що бісфосфонати покращують клінічний перебіг пародонтиту у хворих на РА.