

Notes sur quelques plantes rares du Valais.

Draba muralis L. que MM. Gaudin et Murith indiquent au pied du mont d'Ottan « *ad clivum arduum viæ qua pagulus seu suburbium la Batiaz intratur impendentem, monti Ottan et colli les Marques contiguum* » pourrait y avoir disparu ou être l'objet d'un *lapsus calami*, comme indication, car les docteurs Dupin et Fauconnet, de Genève, ont découvert, il y a plus de vingt ans, cette plante rare pour la Suisse, près du village du Guercet, où elle se trouve en certaine abondance. Cette année, au moment où elle se trouvait en pleine floraison dans cette localité, j'ai été à plusieurs reprises la chercher dans la localité classique, mais en vain. Peut-être que Gaudin et Murith auraient dû dire : au pied du mont Chemin, au lieu du mont d'Ottan. Du reste, Bâle est la seule autre localité indiquée en Suisse pour cette plante.

Calepina Corvini Desv., indiquée par Murith près du village de Branson, s'y trouve réellement et en bonne quantité. Je doute fort qu'elle se trouve à Saint-Maurice. Elle est moins erratique qu'on le dit, car à Fully elle se maintient d'une manière constante dans une prairie, sous le village de la Colombière. Qu'elle soit plus ou moins erratique dans les champs et vignes de Branson, cela se comprend, vu que nos laboureurs arrachent cette plante de leurs cultures comme toute autre mauvaise herbe. Ailleurs, en Suisse, elle n'a encore été trouvée qu'à la Leopoldshöhe, près de Bâle.

Trigonella monspeliaca L., indiquée par Murith à Fully, se trouve en quantité au bord de la route, entre le pont du Rhône et le village de Branson. On la rencontre encore çà et là vers le village de la Colombière et près de Sion. Plante endémique pour le Valais.

Lathyrus sphaericus Retz., que Lager indique à Branson, et Gaudin en Valais, n'est pas rare sur les pelouses incultes et rocheuses des vignes des Folleterres, entre le pont du Rhône et le village de Branson. Je l'y ai récoltée cette année en bonne quantité. Nos auteurs ne l'indiquent ailleurs en Suisse que près de Genève.

Galium pedemontanum All., que Murith et Venetz indiquent au-dessus du village de Branson, se trouve aussi dans les mêmes localités que le *Lathyrus sphaericus* et le *Calepina Corvini* L. Il n'est pas commun sous la Colombière. Il est indiqué aussi au Tessin.

Poa dura Scop. se trouve en abondance dans plusieurs localités de Fully (Colombière, Fory), à Leytron, Saillon, Riddes, Saint-Pierre, Ardon, Sion, etc.; mais pas ailleurs en Suisse.

Sisymbrium pannonicum Jacq., indiqué à Iserabloz, se trouve toujours en abondance dans cette station; je l'ai récolté cette année en outre sur Mazembroz.

Ranunculus Rionii Lager. Détruit dans la localité classique près de Sion, par suite du dessèchement de l'étang où il végétait luxurieusement, se trouve en masse entre le village du Guercet et celui de Charrat.

Chanoine E. FAVRE, *secrétaire.*
