

Contribution à la Flore valaisanne

STATIONS NOUVELLES OU MIEUX PRÉCISÉES PAR PH. FARQUET



- Anemone nemorosa* L. ac. M^t Chemin.
A. vernalis L. Arpille, côté de la Forclaz 2150 m.
Ranunculus Flammula L. Plan du Sourd 7-840 m et Marécottes (Salvan).
R. sceleratus L. Marais du Brésil sous Saxon.
Helleborus foetidus L. 1 pied sous Levrataire à Fully 1980 m.
Aquilegia alpina L. Aroley près Pierre à Voir 1850-1900 m ; d'Emaney au Col de Barberine 2100 m.
Cardamine resedifolia L. descend au M^t Clou 1039 m ; et dans la forêt au dessous 800 m.
Erysimum virgatum Roth. Arbarey sur Saxon 1284 m.
Vesicaria utriculata Lam. Sous Joux-Brûlée 1500 m.
Thlaspi alpestre L. var. *brachypetalum* Jord. M^t Clou (Jacc) et en masse à Saivan (Farquet).
Lepidium Draba L. Martigny et Charrat-Saxon.
Neslia paniculata Desv. Gillotid de Ravoire 1182 m et près de là : *Lolium temulentum*.
Helianthemum Fumana Mill. Au dessus de la Tour de la Bâtiáz env. 750 m. R.
Viola palustris L. Plan du Sourd (Salvan).
Dianthus Armeria L. ac. Coteau de Ravoire 750-1100 m et enlre Dorénaz et Collonges RR.
Silena Armeria L. Evionnaz 480 m.
Vaccaria parviflora Mnch. Sous Liddes dans les blés 1280 m.
Lychnis flos-Jovis L. Rosel 820-900 m.
Spergula arvensis L. Gillotid à Ravoire 1182 m.
Geranium rivulare Vill. = *G. aconitifolium* L, Hérit. Six-Carroz sur Joux-Brûlée 1950 m. et Bisse de Saxon sous Pierre à Voir 2040 m.
Impatiens Nolitangere L. Bâtiáz.

- Cytisus alpinus* Mill. M^t Ottan., rare. Chemin des Ecottaux à Charrat 946-700 m plus rare sur 950 m.
- Phaca frigida* L. Sous le Col de Barberine 2200 m.
- Oxytropis campistris* D. C. var *sordida* Gd. RR. Pied du Grand Chavalard 2200 m.
- Astragalus glycyphyllus* L. M^t Clou 1000-1050 m.
- Vicia sylvatica* L. Vallon de Gueuroz 650 m; C. au M^t Chemin sur le Guercet 750-800 m, Strassner y indique *V. Gerardi*: jamais vu là-haut mais au pied du Mont.
- Lathyrus hirsutus* L. L. Champs humides sous le Guercet; il est très rare et localisé. C'est très probablement la localité où Murith l'a cueillie sans donner d'autre indication que « Champs de blé ».
- Lathyrus sylvestris* L. Pied du M^t d'Ottan 480 m.
- L. niger* L. Gillotid de Ravoire 1182 m, cc.
- Prunus Padus* L. Champex d'Alesse 1080 m, cc.
- Comarum palustre* L. Par places Plan du Sourd à Salvan 650-900 m.
- Ceratophyllum submersum* L. Gouille de Saillon et la Sarvaz.
- Saxifraga aspera* L. La Barmaz-Ravoire 1500 m.
- S. exarata* Vill. = *S. leucantha* Thom. Rosel 7-900 m, cc.
- Laserpitium latifolium* L. M^t Chemin 5-600 m.
- Adoxa Moschatellina* L. Pied d'Ottan 480 m et Pied de Chemin 470 m.
- Sambucus Ebulus* L. Par-ci par-là au M^t Chemin 480-700 m.
- Aster Amellus* Sur la Bâtiaz 750 m et de Ravoire à Plan Cersier c. 6-700 m.
- Inula salicina* L. Petit bois sur Brançon 600 m.
- Bidens cernua* L. cc. Marais du Brésil sous Saxon.
- Gnaphalium sylvaticum* L. Des Follaterres à Joux-Brûlée 800-1500 m.
- Tanacetum vulgare* L. Bord de la route Martigny-Charrat.
- Achillea macrophylla* L. Sergnieux Martigny-Combe 950 m.
- A. nana* L. Petites combes du Grand Chavalard du côté du lac supérieur de Fully 2200-2500 m.
- Chrysanthemum segetum* L. Adventive. Champs au bord de la route cantonale à Martigny et cultures d'asperges du côté de Fully, en masse.

- Leucanthemum Parthenium* Gr. Godr. Gare de Martigny, Ecot-taux 954 m et Pont de Bovernier 522 m.
- Senecio Doronicum* L. sur Joux brûlée 1600 m.
- Carlina acaulis* L. répandu M^t Chemin, Guercet 480 m Ecot-taux etc..
- Serratula Rhaponticum* D. C. *Rhaponticum scariosum* Lam. Emaney sous les rochers du Luisin 1850-1750 m.
- Centaurea alpestris* Hey. Arête d'Alesse 2090-2200 et M^t Clou 1000-1050 m.
- Specularia Speculum* A. Dec. Ecottaux, M^t Chemin 954 m.
- Pyrola uniflora* L. Entre le Planard de Martigny et la Crevasse 1500 m.
- P. secunda* L. M^t Clou à 1200 m.
- P. rotundifolia* L. N. du Plan du Sourd Salvan 920 m.
- Ilex aquifolium* L. Un petit bois au milieu du Rosel 850-900 m. Sous les Ecottaux 920 m.
- Menyanthes trifoliata* L. Plan du Sourd à Salvan 900 m.
- Gentiana Cruciata* L. sur Combarigny à Martigny-Combe 1116 m.
- G. ciliata* L. Par-ci par-là de Martigny au Guercet, c. Marais du Brésil sous Saxon.
- Erythræa Centaurium* Pers. Fond du Plan du Sourd à Salvan 800 m, Ravoire.
- Symphytum officinale* L. var. *patens* Sibth. Sous Fully, route de Charrat.
- Pulmonaria montana* Lej. Cc. M^t Chemin, Alpe du Tronc 1550 m, Hôtel de Pierre à Voir. Abondante sur Boveresse 1700 m.
- Physalis Alkekengi* L. Petit bois de Brançon à Creux du Loup 600 m.
- Atropa Belladonna* L. sur Plagnui (Fully) 1250 m.
- Hyosciamus niger* Neuloz sur Fully 850 m.
- Digitalis ambigua* Murr. Sur Joux-Brûlée jusqu'à 1800 m. et c. sur Alesse (Jacc.).
- Lycopus europæus* L. Plan du Sourd et Marécottes 800 m. Pied d'Ottan 470 m.
- Salvia glutinosa* L. cc. Gorges sur le village de Sergnieux, Martigny-Combe 950 m.
- S. Sclarea* L. Neuloz = Chez les Gex (Fully) 850 m.
- Melissa officinalis* L. Brançon au sommet du village 520 m.

- Hyssopus officinalis* L. Abondante à Joux-Brûlée, côté de Brançon 1450 m.
- Galeopsis dubia* Leers. Des Marécottes à Tenda 1300 m
- Stachys annua* L. Martigny-Combe entre les Rappes et la Fontaine 750 m.
- Betonica officinalis* L. cc. à Ravoire 700-1000 m.
- Ajuga Chamæpitys* Schreb. St-Jean de Sembrancher 900 m.
- Utricularia vulgaris* L. sous Brançon, rare
- U. minor* L. sous Brançon.
- Androsace Chamæjasme* Host. Signal d'Alesse 2200 m, rare.
- Daphne Mezereum* L. Grands Plans sur Verbier 2237 m.
- Triglochin palustre* L. Sous Saxon.
- Orchis pallens* L. Sur Brançon 700 m (Meizoz) et Pied de Chemin 480-500 m.
- O. palustris* Jacq. Entre Charrat et Fully et le long de la route jusqu'à Saxon.
- O. sambucina* L. Gillotid-Ravoire, les deux couleurs 1182 m.
- Gynadenia odoratissima* Rich. Val Champex 1000 m.
- Aceras anthropophora* R. Br. Petit bois sur Brançon 6-700 m.
- Cephalanthera Xyphophyllum* Rchb. f. Bois d'Ardon-Vétroz.
- Listera ovata* R. Br. Petit bois sous Saxon.
- Neottia Nidus-avis* Rich. Entre les Cases et Epenassey 480 m, sous les Planards de Martigny 1200 m.
- Spiranthes autumnatis* Rich. Follaterres, petites combes à 750 m. (X Weiss 1905).
- Cypripedium Calceolus* L. Jeur Durand à Charrat 2 ex.
- Streptopus amplexifolius* D.-C. Dans les Vernes à Emaney 1850 m.
- Paris quadrifolia* L. Planards de Martigny à 1250 m.
- Convallaria majalis* L. Petits bois Brançon, Creux du Loup 600 m.
- Polygonatum multiflorum* All. Tiercelin sur Brocard Martigny-Combe 550 m.
- Tamus communis* L. Petit bois de Brançon à Creux du Loup 600 m.
- Lilium Martagon* L. Gillotid Ravoire cc. 1182 m. M^t Ottan 500 m, M^t Clou (Jacc).
- Gagea arvensis* Schult. De Charrat à Saxon.

Conifères

Pinus sylvestris L. Forme forêt sur Charrat jusqu'à 850 m. En nombre sous la Têtaz et autour du Guercet. C. à Ravoire-Fontaine (Martigny-Combe). J'ai trouvé les variétés suivantes qui ont été vues et déterminées par M. le professeur Dr C. Schröter.

a) var. *genuina* Herr.

1. subvar. *gibba* Christ. Petit bois sous Saxon 470 m, Follaterres 500 m. Joux-Brûlée 1550 m. Ecottaux 954 m. Confluent de la Dranse. Tiercelin au Brocard, etc.

versus var. *microcarpa* Schröter. M^t Chemin près Martigny, 550 m.

versus var. *hamata* Willk. Confluent de la Dranse.

2. subvar. *plana* Christ M^t Chemin 550 m. Follaterres 500-800 m. Ecottaux 980 m.

b) var. *hamata* Willk Forêt sous Vence 950 m rare.

P. montana Mill. var. *uncinata* Ram. ac. Daillay sur Sembrancher avec la forme *lusus pendula* 950-1100 m. Crevasse au M^t Chemin 1790 m.

subvar. *rostrata* Ant. = *castanea* Hartig. Crochet allongé, aigu, recourbé longuement en capuchon. ac. Daillay à Sembrancher 950-1100 m.

subvar. *rotundata pyramidata* Hartig. Crochet large et pyramidal, avec le précédent mais rare.

Picea excelsa Lk. *Abies excelsa* D. C.

var. *europæa* Teplouchof.

versus var. *fennica* Regel = *medioxima* Nyl. Rare. Deux ex. à Ravoire 980 et 1000 m : N^o 1 grand arbre cônes de 14 cm. N^o 2 baliveau cônes de 7 ½ cm à variation mieux prononcée.

var. *europæa* Tepl. Sous Gillotid Ravoire 1100 m, cônes très petits, presque sphériques 1 ½-4 ½ cm et même lieu une f. à écailles en dehors. M^t Chemin 750 m, cônes de 5 ½ cm. Aroley 1900 m idem.

Var. *typica* Schröter.

versus lusus viminalis Caspary. Sommet des vignes Ravoire 950 m, cônes de 13 ½ cm.

versus var. *acuminata* Beck. Arpille 2040 m, cônes de 7-7 ½ cm. Etablons 1600-1700 m, cônes de 7 cm, col du Tronc 1600 m, cônes de 8-8 ½ cm, Ravoire 900 m cônes de 13 ½ cm.

versus *lusus pendula* Plagnui sur Fully 1200 m, cônes de 13 ½ cm.

Var. *acuminata* Beck. Plus rare qu'euro-pæa. Sur les Planards à Martigny 1400 m, cônes de 3 ½-7 cm, Ravoire 980 m, cônes de 8-11 ½ cm.

Joux-Brûlée 1550-1600 m forme à acuminat-ion plus forte que le type (architypica Schröter in litt.) cônes de 10 cm.

lusus pendula Jacq. et Herinque. En nombre sur le grand plateau au fond du Plan du Sourd à Salvan de 7 à 800 m plusieurs rappelant la f. Spitzfichte des Grisons.

Var. *chlorocarpa* Purkyné, cônes verts, Ravoire 980 m, cônes de 9 cm.

Var. *erythrocarpa* Purkyné, cônes rouges, Mayen de l'Odeï à Trient 1355 m.

J'ai vu quelquefois dans les forêts autour de Martigny des Epicéas que M. Schröter décrit sous le nom de « candélabre » 1. M^t Chemin forêt de Cottentin environ 1000 m., 4 à 5 tiges partant à 1 m du sol. 2. Ravoire au dessus du sommet des vignes avec une huitaine de tiges partant inégalement du pied ou de la tige. Aucun de ces deux ne porte de traces de la foudre ; le jet central est intact.

Abies pectinata D. C. *Pinus Picea* L. ac. Joux-Brûlée de 1400 à 1600 m. Des Ecottaux à Charrat 500-1300 m.

Taxus baccata L. je signale ici cette essence que l'on m'a souvent indiquée à Charrat à Jeur-Durand sans que j'aie réussi à la trouver.

Lycopodium clavatum L. Plan du Sourd sous Salvan, 800 m.

Botrychium lunaria Sw.

Var. *incisum* Milde: Len vers Pierre à Voir 1800 m.

Pteris aquilina L. Petit bois sur Brançon 650 m.

Asplenium Adiantum nigrum L.

Var. *lanceifolium* Hefl. Ottan, Bâtiaz, Rosel.

Athyrium filix fœmina Roth.

Var. *fissidens* Doell. et *forma umbrosum* Tiercelin sur Brocard 600-650 m.

Var. *dentatum* Doell. idem.

Var. *multidentatum* Doell. idem.

A. alpestre Nyl. Bois Magnin 1300 m, Odei à Trient 1335 m.

Aspidium Lonchitis Sw. De Ravoire à Charavex 1350 m.

A. lobatum Sw. var. *aristatum* Christ. Pont de la Taillat sous Salvan.

Var. *microlobum* Milde. Gottreux de Ravoire 1350 m.

A. filix-mas Sw.; var. *crenatum* Milde. M^t Ottan 550 m.

Var. *sub-integrum* Doell. Tiercelin au Brocard 600 m.

Cystopteris fragilis Bernh. var. *anthriscifolia* Koch. M^t Chemin et Jeur Bourleya à Gueuroz.

var. *cynapifolia* Koch. cc. M^t Chemin à Martigny 480 m.

Mes récoltes ont été revues par MM. Besse et Jaccard pour les Phanérogames. — Par M. le Dr Schröter pour les Conifères et M. le Dr Christ pour les fougères. Que ces Messieurs veuillent bien agréer mes plus vifs remerciements.
