

Quelques contributions à la flore valaisanne



- Gymnogramme leptophylla* (L.) Desv.: Follatères et entre Fully et Saillon.
- Potamogeton filiformis* Pers.: assez répandu dans la plaine du Léman à Sion, la var. *alpinus* (Blytt) A. et G. p. ex. de Dorénaz à Saillon.
- Potamogeton pusillus* L. ssp. *panormitanus* (Bivona) Fischer: canal sous les Follatères et sous Fully et Saillon.
- Avena fatua* L.: fréquent aux environs de Martigny, Fully et Saillon, surtout var. *pilosissima* S. F. Gray.
- Diplachne serotina* (L.) Link: Branson.
- Poa caesia* Sm.: sur l'Haut d'Alesse.
- Festuca rubra* L. var. *trichophylla* (Ducommun) Gaudin: à Dorénaz et abondant sous Fully et Saillon, Géronde.
- Festuca silvatica* (Poll.) Vill.: aux montagnes d'Outre-Rhône et sur Branson.
- Eriophorum gracile* Roth.: sous Saillon et à Dorénaz.
- Carex dioeca* L.: sous Saillon.
- Carex depauperata* Curtis ex With.: chênaies au Rosel et sur Branson.
- Gagea arvensis* (Pers.) Dumort. var. *ramosa* Terracc.: aux environs de Sierre, p. ex. Chermignon et Lens.
- Ruscus aculeatus* L.: Rosel.
- Orchis Traunsteineri* Sauter f. *Sauteri* Klinge: Dorénaz.
- Orchis masculus* × *pallens* (*O. Jaccardi* Chenev. = *Hausknechtii* M. Schulze): Pas de la Crottaz, sur Alesse et à Joux-brûlée.

- Ophrys Arachnites* (Scop.) Murray: Follatères et Fully.
Ophrys muscifera Hudson: Bois-Noir, la Giète d'Alesse.
Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch: fréquent à Outre-Rhône.
Listera cordata (L.) R. Br.: Plex.
Liparis Læselii (L.) Rich.: sous Saillon et à Géronde.
Salix cinerea × *viminialis*: sous les Follatères.
Polygonum minus Hudson: bords de la Sarvaz.
Polygonum mite Schrank var. *ambiguum* Thellung: Dorénaz.
Melandrium album (Miller) Garcke var. *praecox* Beauverd: probablement répandu dans le Valais central, par exemple aux environs de Fully.
Minuartia viscosa (Schreber): Mazembroz, Visperterminen.
Ranunculus aquatilis L. ssp. *heleophilus* (Arvet-Touvet) Rikli: Salvan, Dorénaz, Martigny, Sion.
Ranunculus flaccidus Pers. var. *Godroni* (Grenier): entre Charrat et Fully.
Cardamine pentaphylla (Scop.) R. Br. (= *Dentaria digitata* Lam.): Gorges de Saillon.
Drosera rotundifolia L.: Plex.
Sedum ochroleucum Chaix var. *montanum* (Perr. et Song.) Burnat: paraît remplacer en Valais le *S. rupestre* L.
Pyrus nivalis Jacq. ssp. *salvifolia* (DC.): paraît indigène en Valais, p. ex. Villeneuve (Duflon), Branson, Fully, sur Vence et Lens.
Rosa arvensis Hudson: Bois-Noir, Outre-Rhône.
Trigonella monspeliaca L.: Gampel.
Lotus uliginosus Schkuhr: entre Fully et Saillon.
Vicia villosa Roth: Collonges et Branson.
Pisum sativum L. ssp. *elatius* (M. Bieb.) A. et G. est cultivé aux environs de Fully, de Saillon et ailleurs en Valais, subsponsané aux Tassonières et au Mayen à Loton.
Euphorbia virgata W. et K.: Branson et sur Mazembroz.
Helianthemum canum (L.) Baumg.: Branson (F. O. Wolf, det. Janchen) et sur Sembrancher.
Helianthemum salicifolium (L.) Miller: entre Fully et Saillon.

Epilobium montanum L. var. *Thellungianum* Léveillé: Dzéman et sur Fully.

Epilobium lanceolatum Sebast. et Mauri: sur Fully, nouveau pour la Suisse.

Epilobium nutans Schmidt: Haut d'Alesse.

Myrrhis odorata (L.) Scop.: Haut d'Arbignon.

Pyrola chlorantha Sw.: Bois-Noir, sur Saillon et Sembrancher.

Lappula deflexa (Wahlenb) Garcke: sur Collonges, Jouxbrûlée, entre Viège et Zeneggen.

Veronica Teucrium L. ssp. *Orsiniana* (Ten.) Watzl.: Lousine et Erié, sur Fully.

Tozzia alpina L.: Dzéman.

Plantago lanceolata L. ssp. *altissima* (L.) Rouy: naturalisé à Fully.

Carpesium cernuum L.: Ban de Fully.

Filago minima (Sm.) Pers.: entre Fully et Saillon.

Lactuca perennis L. var. *integrifolia* Bischoff: Rosel et sur Saillon.

Hieracium alpicola Schleicher: Illalp .

H. GAMS.
