

SIGATOKA NEGRA - DOENÇA QUARENTENÁRIA
NO ESTADO DO AMAZONAS

J.C.R. PEREIRA¹; A.F. da S. COELHO¹; L. GASPAROTTO¹; S. de M. VÉRAS¹; A.M.G. GATO²; C.A.F. SOUZA².

¹Embrapa-Amazônia Ocidental, C.P. 319, 69011-970, Manaus, AM

²Delegacia Federal de Agricultura/AM, Rua Maceió, 460, 69057-010, Manaus, AM

Em fevereiro de 1998 observou-se nos bananais, às margens do Rio Solimões, a ocorrência de uma nova doença incidindo de forma severa em folhas, inclusive nos plátanos 'Pacovi' e 'Pacovã'. Baseado em exames microscópicos, nos sintomas da doença, na frequência de infecção e na reação de cultivares, em especial dos plátanos, conclui-se que se trata da Sigatoka negra, causada pelo fungo *Mycosphaerella fijiensis* (Morelet) Deighton. Esta é a principal doença da bananeira e pode induzir perdas de até 100% em bananas verdadeiras e 50% em plátanos. A regulamentação do trânsito de material botânico suscetível, é uma estratégia de tornar a doença quarentenária, dificultando a dispersão do patógeno para as regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Apoio Financeiro: DFA/AM