



دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره در مامایی

عنوان:

بررسی تاثیر مشاوره گروهی روانی آموزشی بر صمیمیت جنسی زنان شیرده
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی رفسنجان در سال ۱۳۹۶

توسط: زهرا اکبری نژاد

استاد راهنمای: کتایون علیدوستی

استادان مشاور: دکتر زهره قرشی، زهرا اسداللهی

سال تحصیلی ۱۳۹۷-۹۸



بسمه تعالیٰ

صورتجلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
شماره: ۲۲۱۳

پیوست:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحصیلات تكمیلی دانشگاه

خواهشمند است نظر خود را در مورد پایان نامه خانم زهرا اکبری نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ورودی ۹۴ تحت عنوان " بررسی تاثیر مشاوره گروهی روانی آموزشی بر صمیمت جنسی زنان شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی رفسنجان در سال ۱۳۹۶" به راهنمایی خانم کتابیون علیدوستی در ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ با حضور اعضای محترم هیات داوران مشکل از:

امضا	نام و نام خانوادگی	سمت
	خانم کتابیون علیدوستی	الف: استاد راهنمای
دکتر مسعوده سرور دکتر مسعوده سرور	خانم دکتر زهرا قرشی خانم زهرا السداللهی	ب: استاد مشاور
	خانم فائزه قربانی	ج: عضو هیات داوران (داخلی)
	خانم دکتر ام سلیمانی رویدی	د: عضو هیات داوران (خارجی)
	خانم دکتر مهدی دهقان	ه: نماینده تحصیلات تكمیلی

تشکیل گردید و ضمن ارزیابی به شرح پیوست با درجه خوبید و نمره ۱۶ مورد تأیید قرار گرفت.

دکتر فیروزه میرزا بی رابر
دانشکده پزشکی (علی‌الملکی) داری
مهر و امضاء معاون امور پزشکی دانشکده
تحقیقات تکمیلی

مقدمه و اهداف: تحقیقات مختلف نشان می‌دهند پس از زایمان میل جنسی زنان کاهش می‌باید که منجر به کاهش صمیمیت جنسی زوجین می‌شود، بنابراین بررسی روش‌های جلوگیری از کاهش صمیمیت جنسی پس از زایمان ضروری به نظر می‌رسد. از اینرو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره گروهی روانی آموزشی بر صمیمیت جنسی زنان نخست زا مورد بررسی قرار گرفت.

روش: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی در جامعه‌ی زنان زایمان کرده شهرستان رفسنجان انجام شد. تعداد ۷۰ زن نخست زا به شیوه‌ی نمونه‌گیری آسان از دو مرکز بهداشتی انتخاب و با روش تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه‌ی صمیمیت جنسی به منظور سنجش صمیمیت جنسی استفاده شد. ابتدا هر دو گروه مداخله و کنترل پرسشنامه‌ی صمیمیت جنسی را تکمیل کردند، سپس به افراد گروه مداخله ۶ جلسه آموزشی یک ساعته با توالی هر هفته یک جلسه آموزش داده شد. پس از پایان دوره‌ی آموزشی گروه مداخله، از افراد هر دو گروه خواسته شد تا دوباره پرسشنامه‌ی صمیمیت جنسی را تکمیل کنند.

نتایج: میانگین و انحراف معیار نمرات صمیمیت جنسی گروه مداخله و کنترل در پیش آزمون به ترتیب $\pm 9/27$ و $9/46$ و $9/11$ و $9/30$ می‌باشد و نمرات دو گروه مداخله و کنترل در پس آزمون به ترتیب $4/73 \pm 10.8/90$ و $9/36 \pm 9/00$ است. پس از خارج کردن تاثیر نمرات پیش آزمون ($0/001 < p$)، اختلاف معنی‌داری بین میانگین نمرات صمیمیت جنسی دو گروه مداخله و کنترل در پس آزمون وجود دارد که نشان دهنده تاثیر مثبت مشاوره‌ی گروهی بر صمیمیت جنسی زنان نخست زا در گروه مداخله و افزایش نمرات صمیمیت جنسی این گروه می‌باشد ($0/001 < p$).
نتیجه گیری: با استفاده از برگزاری دوره‌های مشاوره روانی آموزشی در زنان پس از زایمان می‌توان زوجین را آگاه نمود و از کاهش صمیمیت جنسی و کاهش رضایتمندی زناشویی بین آنان جلوگیری نمود.

Abstract

Background: Different research suggests that after childbirth (delivery), the female libido decreases, leading to a reduction in sexual intimacy of Couples, so examining methods to prevent sexual desire loss after childbirth is necessary. This study was a clinical trial in the statistical society of obstetric women in Rafsanjan city.

Methods: 70 postpartum women were selected by convenience sampling from two health centers with convenience randomly divided into intervention and control groups. Sexual intimacy questionaries was used to measure sexual intimacy. First, both intervention and control groups completed sexual intimacy questionaries, and then the intervention group received 6 educational sessions of two hours with sequences one session every week. After the end of the intervention group's training period, both groups were asked to complete the sexual intimacyquestionari again.

Results: The mean and standard deviation of sexual intimacy scores of the intervention and control group at pre - test are 95.46 ± 9.27 and 94.30 ± 9.11 , respectively, and the scores of the intervention and control groups in Post-test are 108.90 ± 4.73 and 93.36 ± 9.00 respectively. after removing the effect of pre-test scores ($p<0.001$), there is a significant difference between the mean sexual intimacy scores of two intervention and control groups, indicating the positive effect of group counseling on the sexual intimacy and increasing the group's sexual intimacy scores ($p<0.001$).

Conclusion: With the use of psychological counseling courses in women after childbirth, couples can be notified and prevent the decrease of sexual intimacy and sexual satisfaction.

Key Words: Sexual Intimacy, Postpartum, First Delivery Women, psychoeducational Group Counseling, Rafsanjan.



Kerman University of Medical Sciences

Faculty of Nursing and Midwifery Razi

In Partial Fullfilment of the Requirements for Degree MSc

Title:

The effect of psychoeducational group counseling on sexual intimacy of lactating women referring to urban health centers in Rafsanjan city

By:

Zahra Akbarinejad

Supervisor:

Katayon Alidoosti

Advisor:

Dr. Zohre Ghorshi

Zahra Asadollahi

Year:

2019