

مطالعه تغییرات میزان ناقل مونوکربوکسیلات و بیان ژن p53 با تمرین ورزشی تناوبی در کارسینوم تجربی کولون موش

د. رفعت: ۱۳۹۷/۱/۱۱ و داشت: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ آنلاین: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

حکیمہ

مرمیه و هدف: امروزه تجویز و رژیم درمان بیماری‌ها مطرح است. هدف پژوهش کنونی تعیین تأثیر هشت هفته تمرين ایترووال هوایی بر میزان پروتئین مونوکربوکسیلات ترانسپورتر ۱ (Monocarboxylate transporter 1, MCT1) و سیان ژن p53 در یک مجموعه موش‌های مبتلا به سلطان کولون به دارد.

روش بررسی: این پژوهش تجربی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله از اردبیل است. تعداد ۲۰ سرمهوش نژاد BALB/c در سن سه هفتگی با میانگین وزنی $g = 17 \pm 1$ اختبار و به طور تصادفی به چهار گروه پنج تا ی شناسی کنترل، تمرین ورزشی، تومور و تمرین ورزشی + تومور تقسیم شدند. سرطان از طریق تزریق زیرجلدی داروی کارسینوژنیک آزوکسی متان با دوز (10 mg/kg) هفتاهی یکبار و به مدت سه هفته ایجاد گردید و تمرین ایستراول هوازی به مدت هشت هفته، هر هفته پنج روز روی دستگاه نوار گردان اعمال شد. ۴۸ ساعت پس از آخرین مداخله موش ها کشته و کلولون خارج شد. اندازه گیری میزان پروتئین MCT1 با روش ELISA و بررسی بیان نسبی mRNA ژن p53 با روش Real-time PCR انجام شد. داده ها در بخش توصیفی با میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی با Kruskal-Wallis test آنالیز شد.

یافته‌ها: در گروه تومور کلولون نسبت به سایر گروه‌ها، افزایش معنادار در میزان پروتئین MCT1 ($P < 0.01$) و کاهش معنادار در بیان ژن p53 ($P < 0.001$) مشاهده شد. همچنین کاهش معنادار در میزان پروتئین MCT1 ($P < 0.01$) و افزایش معنادار در بیان ژن p53 ($P < 0.001$) در گروه تعمیر و گروه تمیز + تومور نسبت به گروه کنترل و گروه تومور مشاهده شد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تمرين تناوبی هوازی باعث کاهش محتوای پروتئینی MCT1 و افزایش بیان ژن p53 بعنوان مهارکننده تو مور در تومور موش های متلا به سرطان کولون شده است.

كلمات كليلي: نئو بلاسم که لون، تم بيات تناوار، موشه ک به کسلاط ته انسودت، ۱، ڙن 53.p.

حسین شیروانی^{*}
امین عیسی نژاد^۱
مصطفی رحیمی^۲
بهزاد بازگیر^۳
علی محمد علیزاده^۴

- مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده سپک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی یقین‌الله (عج)، تهران، ایران.
 - گروه تربیت بدنی، دانشگاه شاهد، تهران.
 - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 - مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا،
خیابان شیخ بهایی، کوچه نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی
قیمه‌الله (پیغمبر)، مرکز تحقیقات فیزیولوژی و روزشی.

٠٢١-٨٢٤٨٢٣٩١ تلفن:

۱۰۱

جنبهای مورد مطالعه در این خصوص، متابولیسم سلول‌های سرطانی است، به طوری که Warburg مشاهده کرد که در سلول‌های سرطانی در شرایطی که به طور کامل اکسیژن وجود دارد، روند گلیکولیز شتاب می‌گیرد و به تشکیل لاكتات بیش از حد منجر می‌شود.^۳ به طور کلی در سلول‌های سرطانی پنج مرحله در تشریح افزایش مصرف گلوکز و تولید لاكتات اضافی به هدف میادله لاكتات بین یا در سلول‌ها شناسایی شده است:
 - افزایش برداشت لاكتات-۲ افزایش، بیان و فعالیت آنزیم‌های گلیکولیتیک،

سرطان کولون سومین سرطان شایع در مردان و دومین سرطان شایع در زنان در سرتاسر جهان است.^۱ به طوری که در کشورهای توسعه یافته ۶۰٪ از جمعیت در معرض خطر ابتلا به این سرطان قرار دارند و مشخص شده که به ترتیب ۱۰ و ۱۱٪ از سرطان‌های تازه تشخیص داده شده در مردان و زنان، سرطان کولون است.^۲ بکم از

باعث پایداری ژنومی می‌شود و سرکوب توموری را به طور عمدۀ با القای آپوپتوز، توقف چرخه سلولی، پیری و مهار رگزایی انجام می‌دهد.^{۱۰} جالب اینکه ارتباط مستقیمی بین عملکرد p53 و بیان In vitro کشف شده است، به طوری که در هر دو محیط In vivo تحت شرایط هایپوکسی، کاهش p53 منجر به افزایش بیان MCT1 در نتیجه افزایش شار گلیکولیتیکی و افزایش مبادله لاكتات شده است. p53 به طور مستقیم با پرومتر ژن MCT1 ارتباط برقرار می‌کند و تثبیت mRNA MCT1 را دستخوش تغییر مینماید.^{۱۱} این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تمرین ورزشی تناوبی بر میزان بیان ژن p53 و MCT1 در کارسینوم کولون ایجاد شده در موش‌های نژاد بالبسی انجام پذیرفت.

روش بررسی

این مطالعه تجربی و کاربردی در آزمایشگاه مرکز حیوانات علوم آزمایشگاهی دانشگاه بقیه‌الله و آزمایشگاه مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. تعداد ۲۰ سر موش نژاد BALB/c در سن سه هفتگی با میانگین وزنی g ۱/۶±۱/۴ انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه کنترل (n=۵)، تمرین ورزشی (n=۵)، تومور کولون (n=۵) و تمرین ورزشی + تومور کولون (n=۵) تقسیم شدند. مجوز اخلاق جهت انجام پژوهش کنونی از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) دریافت گردید. سرطان کولون در این مدل حیوانی از طریق تزریق زیرجلدی داروی کارسینوژنیک آزوکسی‌متان با دوز (۱۰ mg/kg) هفت‌مای یکبار و به مدت سه هفته به وجود آمد. سپس جهت ارزیابی و تایید سرطان از آزمایش هیستوپاتولوژی زیر استفاده شد. ابتدا اندام‌های حیاتی در فرمالدید ۱۰٪ پایدار و در پارافین پاساژ داده و جاسازی شد. سپس بلوک‌های پارافین با ضخامت μm ۳ برای رنگ‌آمیزی همانوکسیلین-ائزین (H&E) (JGDA شدن. اسلایدها با BX51 microscope Olympus) (Mord بررسی قرار گرفتند.

درجه نابهنجاری یا ابتومالیتۀ هیستولوژیک با استفاده از پنج پارامتر زیر به صورت امتیازدهی نیمه‌کمی ارزیابی شد: الف) نسبت هسته/سیتوپلاسم (۲ : ۱٪ >/٪ ۲۵ : ۱٪)، ب) طبقه‌بندی اپیتلیال (هیچ‌کدام: ۰، خفیف: ۱، شدید: ۲)، ج) انحنای هسته‌ای (هیچ‌کدام: ۰، خفیف: ۱، شدید: ۲)، د) تخلیه گابلت (حالی تا خفیف: ۰، متوسط: ۱،

۳- کاهش عملکرد میتوکندریایی ۴- افزایش تولید، تجمع و رهایش لاكتات ۵- تنظیم افزایشی ناقل‌های مونوکربوکسیلات (Monocarboxylate transporters) MCT1 و چهار (MCT4 و MCT1).

براساس نظریه بین‌سلولی لاكتات، انتقال لاكتات بین بافت‌های مختلف به طور عمدۀ از طریق MCT‌ها صورت می‌گیرد که تاکنون ۱۴ ایزوform مختلف از MCT‌ها در موش و ۹ نوع در انسان شناسایی شده‌اند که توزیعی وابسته به بافت دارند.^۰ بدلیل بیان شدن MCT1 در مکان‌های مختلف بافت‌ها و تفاوت در کیتیک آن‌ها، به MCT1 نقش برداشت‌کننده و به MCT4 نقش آزادکننده لاكتات را نسبت داده‌اند.^{۷،۸} این انتقال دهنده‌ها به طور عمدۀ در غشای پلاسمایی وجود دارند، در حالی که وجود ذخایر سیتوپلاسمی نیز برای MCT1 گزارش شده است. افزایش در بیان MCT1 و MCT4 در سلول‌های سرطانی در پژوهش‌های پیشین گزارش شده است.^۶ بدلیل اینکه گسترش اولیه تومور و ایجاد فنوتیپ تهاجمی تومور در محیطی فاقد عروق انجام می‌شود، در این مراحل حفظ انجام گلیکولیز بی‌هوایی در سلول امری حیاتی است که به‌وسیله MCTs حمایت می‌شود.^۷ افزایش بیان MCT1 و MCT4 در تومور دارای وظیفه‌ای دوگانه است: در وهله اول افزایش این انتقال دهنده‌ها در غشای پلاسمایی سلول‌های سرطانی سبب نقل و انتقال بیشتر لاكتات بین سلول‌های تومور می‌شود. این وظیفه با برداشت بیشتر لاكتات توسط MCT1 در غشای سلول‌های اکسیداتیو تومور و خروج بیشتر لاكتات از سلول‌های دور از عروق تومور توسط MCT4 غشایی، انجام می‌شود. وظیفه دوم این انتقال دهنده‌ها در تومور، حفظ pH درون سلولی است که در نهایت به زنده ماندن سلول‌های توموری کمک می‌نماید.^۶ بنابراین MCTs با کمک به نقل و انتقال این سوسترا به شکل‌گیری و حفظ فنوتیپ تهاجمی سلول‌های سرطانی کمک می‌کنند. به‌همین دلیل مهار فعالیت MCTs در تومور به عنوان ابزاری درمانی در سرطان در حال معرفی شدن است. به طور نمونه در پژوهش Sonveaux و همکاران مشخص شد که خاموش کردن ژن MCT1 در سلول‌های اندوتیلیا منجز به کاهش HIF-1 α می‌شود و از رگزایی و گسترش تومور جلوگیری می‌کند.^۸

از سویی دیگر پژوهش‌های جدید، ژن p53 را به عنوان معروف‌ترین ژن بازدارنده تومور معرفی می‌کنند که در بیش از ۵۰٪ سرطان‌های کولون جهش‌هایی در این ژن مشاهده می‌شود.^۹ ژن p53

مدت نهایی در اوخر تمرین در نظر گرفته شد. برای استخراج نمونه ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی موش‌ها بهوسیله تزریق داخل صفاقی کاتامین (Ketaset ۹۰ mg/kg, Alfasan International BV, Woerden, Netherlands) و زیالازین (Alfazyme 2%, Alfasan International BV, Woerden, ۱۰ mg/kg) بی‌هوش شدند. کولون بالافاصله استخراج و پس از وزن‌کشی در نیتروژن ۸۰-منجمد برای تجزیه و تحلیل بعدی نگهداری شد. گرداوری خون از طریق جدا کردن سر حیوان و گردآوری مستقیم خون از ناحیه گردن انجام شد. برای سنجش بیان ژن ابتدا طراحی پرایمر اختصاصی ژن p53 انجام شد که برای این منظور ابتدا توالی ژن کدکننده p53 (به عنوان ژن هدف) و توالی GAPDH (به عنوان ژن (GenBank®, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>) مرجع) از بانک ژنتی (Primer Express Software, Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) استخراج گردید. سپس با استفاده از استخراج گردید. سپس با استفاده از version 3.0 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) طراحی جفت پرایمر گردید (جدول ۲).

شدید: ۲)، ه) اختلالات ساختاری (هیچ کدام: ۰، خفیف: ۱، شدید: ۲). حداقل پنج بخش برای رتبه‌بندی مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه توسط دو نفر ارزیاب، اسلایدها به‌طور مستقل و بدون دسترسی به فایل‌ها بازنخوانی شد که توافق بین نتایج آن‌ها بیش از ۹۰٪ بود و موارد اختلاف‌نظر به‌طور مشترک توسط پاتولوژیست‌ها دوباره ارزیابی و تصمیم‌گیری از طریق اجماع انجام شد. نمره کل هر پارامتر به عنوان نمره غیرطبیعی هیستولوژیک در نظر گرفته شد. به‌طور تقریبی برای تمام نمونه‌های سرطان کولون امتیازی بین هشت تا ۱۰ محاسبه شد، درحالی که این امتیاز در نمونه‌های طبیعی صفر تا دو بود.^{۱۲}

پروتکل تمرین ایترووال هوایی به‌مدت هشت هفته و پنج روز در هفته اعمال شد (جدول ۱). تمرینات در هفته اول با سرعت ۱۰ متر بر دقیقه شروع شد و در نهایت در هفته هشتم به ۳۰ متر بر ثانیه رسید. مدت هر جلسه تمرین ۳۰ دقیقه با تناوب‌هایی از فعالیت و استراحت به نسبت دو به یک بود. به‌دلیل شرایط خاص موش‌ها، اعمال مدت‌های طولانی تر تمرینی بیشتر از ۳۰ دقیقه امکان‌پذیر نبود و این مدت به عنوان

جدول ۱: پروتکل تمرین ایترووال هوایی

هفته‌های تمرین	تناوب فعالیت	تناوب استراحت فعال	سرعت (متر بر دقیقه)	تعداد نوبت (یک دقیقه)	سرعت (متر بر دقیقه)	تعداد نوبت (دو دقیقه)
اول			۸-۷	۱۰	۱۲-۱۰	۱۰
دوم			۹-۸	۱۰	۱۵-۱۳	۱۰
سوم			۱۰-۹	۱۰	۱۸-۱۵	۱۰
چهارم			۱۱-۱۰	۱۰	۲۱-۱۸	۱۰
پنجم			۱۲-۱۱	۱۰	۲۴-۲۱	۱۰
ششم			۱۳-۱۲	۱۰	۲۶-۲۴	۱۰
هفتم			۱۴-۱۳	۱۰	۲۸-۲۶	۱۰
هشتم			۱۵-۱۴	۱۰	۳۰-۲۸	۱۰

جدول ۲: پرایمرهای مورد استفاده جهت همسان‌سازی ژن p53 و GAPDH

پرایمر	توالی پرایمراه	NCBI
p53	F: 5/- CACCTGACAAGCGCCTCTCC -3/ R: 5/- CTGCTGTCTCCAGACTCCTCTGTAGC -3/	NM_013843
GAPDH	F: 5/- TCAACAGCAACTCCCCTCTTCC -3/ R: 5/- ACCCTGTTGCTGTAGCCGTATTTC -3/	NM_008084

برای تعیین غلظت و خلوص RNA مورد استفاده قرار گرفت. برای ساخت cDNA نیز اولین رشته cDNA از روی RNA استخراج شده در مرحله پیشین با استفاده از آنزیم ترانسکرپتاز معکوس Maxima reverse transcriptase و آنرا از کیت ساخت cDNA Maxima® First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific, GmBH, Germany) تولید شد.

برای تجزیه و تحلیل داده‌های نتایج qPCR از روش $2^{-\Delta\Delta CT}$ برای بررسی بیان کمی - نسبی ژن p53 به شرح زیر استفاده شد. تمام تجزیه و تحلیل‌ها به طور مجزا برای چهار گروه نمونه انجام شد.

$$\text{Relative fold change in gene expression} = 2^{-\Delta\Delta CT}$$

$$\Delta CT = \text{CT target gene} - \text{CT reference gene}$$

$$\Delta\Delta CT = \Delta CT \text{ test sample} - \Delta CT \text{ Control sample}$$

برای اندازه‌گیری میزان پروتئین Monocarboxylate transporter (MCT1) ۱ در بافت تومور کولون از کیت تجاری (ZellBio GmbH, Ulm, Germany) با حساسیت 0.10 ng/ml استفاده شد. تمام این کیت‌ها با روش ELISA میزان پروتئین را در بافت تومور کولون موش اندازه‌گیری می‌کنند. بخش اول روش‌های آماری مربوط به توصیف ویژگی‌های آزمودنی‌ها و داده‌های خام پژوهش بود که از طریق آمار توصیفی انجام گردید، پس از آن جهت تعیین تفاوت معناداری متغیرها بین گروه‌های مختلف پژوهش از Kruskal-Wallis test و Mann-Whitney U test استفاده گردید.

یافته‌ها

در جدول ۳ شاخص‌های آماری مربوط میانگین وزن بدن موش‌ها و وزن بافت تومور در گروه‌های مختلف آورده شده است.

همان‌طور که در نمودار ۱ مشخص است نتایج Mann-Whitney U test در میزان MCT1 نشان داد که بین گروه‌های کنترل و تمرين ورزشی ($P=0.008$)، کنترل و تومور کولون ($P=0.008$)، کنترل و تمرين ورزشی + تومور کولون ($P=0.016$)، تمرين ورزشی و تومور

جهت استخراج RNA از بافت کولون توموری، کل RNA از بافت کولون موش‌ها با استفاده از روش پیشنهادی miRCURY™ RNA Isolation Kit Biofluids, Exiqon Inc., Woburn, MA, USA) استخراج گردید. ابتدا 300 ml از بافر لیزکننده به همراه $10 \mu\text{l}$ مرکاپتواتانول به بافت داخل تیوب اضافه شد.

سپس بافت را در ازت مایع موجود در بوته‌چینی له کرده و در نهایت 30 mg از بافت لشده را به تیوب حاوی 300 ml از بافر لیز بیشتر پنج دقیقه در دمای آزمایشگاه گذاشته شد. در مرحله بعد $1 \mu\text{l}$ آب فاقد آنزیم DNase و RNase به تیوب اضافه شد و در ادامه ورتكس گردید. سپس $1 \mu\text{l}$ آنزیم پروتیناز K به تیوب اضافه گردید و به مدت 15 min در دمای 55°C نگهداری گردید. تیوب حاوی بافت لیز شده در دور g 14000 به مدت یک دقیقه سانتریفیوژ شد. در مرحله بعد مایع رویی به تیوب حاوی $1 \mu\text{l}$ کل اتانول مطلق اضافه و به خوبی مخلوط شد. ستون فیلتردار بر روی تیوب گردآوری قرار گرفت و در نهایت $1 \mu\text{l}$ از لیز سلولی به همراه الكل مطلق به ستون فیلتردار منتقل گردید و در دور g 14000 به مدت یک دقیقه سانتریفیوژ شد. مایع عبور کرده تخلیه شد و در نهایت $1 \mu\text{l}$ محلول شستشوی کیت بر روی ستون منتقل شده و به مدت دو دقیقه در دور g 14000 سانتریفیوژ گردید. مایع عبور کرده تخلیه و ستون به تیوب جدید منتقل شد و سپس $1 \mu\text{l}$ بافر شستشوی بر روی فیلتر ستون ریخته شد. ستون به مدت 200 g و بعد در دور g 14000 سانتریفیوژ گردید. به دست‌آمده از هر نمونه تا زمان استفاده در یخچال فریزر -70°C ذخیره گردید.

برای تعیین غلظت و خلوص RNA نیز با استفاده از دستگاه Spectrophotometer (Picodrop Limited, Hinxton, UK) غلظت و خلوص RNA به دست‌آمده از هر نمونه پرداخته شد. برای این منظور $1 \mu\text{l}$ از RNA به دست‌آمده از هر نمونه در زمان ساخت cDNA


جدول ۳: میانگین و انحراف معيار وزن و وزن بافت تومور

متغير	کنترل (n=5)	تمرين ورزشی (n=5)	تومور کولون (n=5)	تمرين ورزشی و تومور کولون (n=5)
وزن (g)	$17/6 \pm 1/2$	$18/1 \pm 0/72$	$15/10 \pm 0/45$	$16/16 \pm 0/5$
وزن بافت (mg/0.5mL)	$0/030 \pm 0/004$	$0/044 \pm 0/015$	$0/0920 \pm 0/005$	$0/050 \pm 0/024$


MCT1 در گروه تومور نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار و در گروه تمرین ورزشی + کولون و گروه تمرین ورزشی نسبت به گروه تومور و گروه کنترل کاهش معنادار پیدا کرده است. به عبارتی مشخص شده که هشت هفته تمرین ایتروال هوایی میزان افزایش یافته پروتئین MCT1 در بافت تومور کولون را کاهش داده و آن را تعديل می‌نماید. نتایج ما با یافته‌های Aveseh و همکارانشان که کاهش معناداری در وزن تومور و میزان بیان MCT1 را به دنبال تمرین طولانی مدت استقامتی در سرطان پستان در موش‌های BALB/c مشاهده کرده بودند، همخوانی دارد.^{۱۳}^{۱۴}

در واقع یافته‌ها نشان می‌دهد که MCTs نقش مهمی در نقل و انتقال لاكتات در شاتل درون و بین‌سلولی لاكتات در بافت‌های مختلف ایفا می‌کنند.^۹ به عنوان نمونه در پژوهشی که توسط Sonveaux و همکاران انجام گرفت خاموش کردن ژن MCT1 در سلول‌های اندوتیال منجر به کاهش HIF1- α گردید و از آنزیوژن و گسترش تومور جلوگیری به عمل آمد.^۸ به این دلیل کاهش معنادار در بیان MCT1 در گروه تمرینی پژوهش کنونی می‌تواند به عنوان یک مکانیسم سلولی در تاثیر مفید تمرین در کاهش وزن تومور مشاهده شده در گروه تمرینی پژوهش کنونی ارایه شود. به احتمال، این اثر MCT1 در کاهش وزن تومور به وسیله کاهش آنزیوژن تومور انجام می‌شود چراکه در پژوهش Sonveaux نشان داده شد که خاموش کردن MCT1 منجر به کاهش آنزیوژن تومور گردید عملی VEGF که با کاهش در بیان VEGFR2-VEGFR1 از طریق آن واسطه‌گری می‌شود- است که اثرات آنزیوژنیک VEGF می‌گردد. با کاهش آنزیوژن تومور سلول‌های هم‌جوار عروق انجام می‌گردد. با استفاده بیشتر گلوكز گردیده و مقادیر کمتری از این سوپرسترا از اختیار سلول‌های دور از عروق قرار می‌گیرد که در نهایت می‌تواند تامین انرژی و حیات این سلول‌ها را به خطر بیندازد.

نتایج ما همچنین نشان داد که پس از هشت هفته تمرین ایتروال هوایی، بین بیان ژن p53 بافت کولون در گروه‌های مختلف پژوهش تفاوت معنادار وجود دارد، بدین صورت که بیان ژن p53 در گروه تومور نسبت به گروه کنترل، کاهش معنادار و در گروه تمرین ورزشی + کولون و گروه تمرین ورزشی نسبت به گروه تومور و کنترل، افزایش معنادار داشته است. به عبارتی مشخص شده که هشت هفته تمرین ایتروال هوایی بیان ژن p53 در بافت کولون سالم و



نمودار ۱: مقایسه تغییرات میزان MCT1 در گروه‌های مختلف



نمودار ۲: مقایسه تغییرات در بیان ژن p53 در گروه‌های مختلف

کولون (P=۰/۰۰۸) و تمرین ورزشی و تمرین ورزشی + تومور کولون (P=۰/۰۰۸) تفاوت معناداری وجود داشت.

همان‌طور که در نمودار ۲ مشخص است نتایج Mann-Whitney U test در میزان بیان ژن p53 نشان داد که بین گروه‌های کنترل و تمرین ورزشی (P=۰/۰۰۸)، کنترل و تومور کولون (P=۰/۰۰۸)، کنترل و تمرین ورزشی + تومور کولون (P=۰/۰۱۶)، تمرین ورزشی و تومور کولون (P=۰/۰۰۸) و تومور و تمرین ورزشی + تومور کولون (P=۰/۰۰۸) تفاوت معناداری وجود دارد.

بحث

نتایج این پژوهش نشان داد که پس از هشت هفته تمرین ایتروال هوایی، بین میزان پروتئین MCT1 بافت کولون در گروه‌های مختلف پژوهش تفاوت چشمگیری وجود دارد، بدین صورت که میزان پروتئین

نشان می‌دهد که در صورت وجود، p53 می‌تواند به عنوان عامل سرکوب‌کننده بیان MCT1 عمل کند. بهتازگی در یک حالت مشابه تنظیم متابولیسم در جهت زنده ماندن بیشتر، گزارش شده که پایداری mRNA آن در غیاب p53 افزایش می‌یابد.^{۱۸} در پژوهش‌های مختلف، که با روش‌های متعدد زن p53 را غیرفعال یا خاموش کرده بودند، مشاهده کردند که MCT1 در شرایط هیپوکسی به طور چشمگیری چهار تنظیم مثبت می‌شود.

در مجموع نتایج پژوهش کنونی نشان داد که این نوع مدل‌الیه تمرین تناوبی هوایی باعث کاهش بافت تومور کولون موش‌های سرطانی می‌گردد و این عمل با کاهش محتوای پروتئینی MCT1 در تومور موش‌های مبتلا به سرطان کولون همراه بوده است و نیز این مداخله تمرینی باعث افزایش بیان زن p53 (به عنوان مهارکننده تومور) در بافت تومور گردیده است. این عوامل بخشی از مکانیسم‌های درگیر در متابولیسم سلول می‌باشند که تمرین تناوبی هوایی به سیله آن‌ها اثرات درمانی خود را در سرطان کولون اعمال می‌کند.

سپاسگزاری: این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی تحت عنوان "بررسی تاثیر فعالیت تناوبی هوایی در پیشگیری و درمان سرطان کولون در مدل حیوانی: با تأکید بر بیان و سطح آنزیم‌های کلیدی متابولیکی مصوب دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)" در سال ۱۳۹۳ به کد ۱۳۹۳-۴۰۷-۳۸ می‌باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) اجرا شده است.

توموری افزایش می‌دهد یعنی هشت هفته تمرین ایتروال هوایی می‌تواند کاهش بیان زن p53 در بافت تومور کولون را افزایش داده و آن را تعدیل نماید.

پروتئین سرکوب‌کننده تومور p53 مانع پیشرفت سرطان از طریق مکانیزم‌های مختلف، از جمله القای آپوپتوز و توقف چرخه سلولی برای حفظ ثبات ژنوم می‌شود. بهتازگی ارتباط بین p53 و متابولیسم تومور نیز مورد بررسی قرار گرفته است.^{۱۵} به طور ویژه، مشخص شده که p53 تعادل متابولیکی بین گلیکولیز و فسفوریلاسیون اکسیداتیو SCO2 (OXPHOS) از طریق ژن‌های الفاکننده p53 به نام TIGAR و TIGAR را تنظیم می‌کند.^{۱۶} در حالی که بیان TIGAR مهار گلیکوژن را افزایش می‌دهد، بیان SCO2 باعث افزایش مصرف اکسیژن میتوکندری می‌شود. در نتیجه، از دست دادن p53، گلیکولیز را تحрیک می‌کند و تنفس میتوکندریایی را چهار اختلال می‌کند، در نتیجه باعث افزایش تولید ATP از OXPHOS به گلیکولیز می‌شود. همچنین نشان داده شده است که کمیود p53 بیان MCT1 را تحت شرایط هیپوکسی افزایش می‌دهد و بنابراین رهایش لاكتات را از طریق افزایش شار گلیکولیتیکی تسهیل می‌کند. بر عکس، هنگامی که MCT1 می‌شود و تسهیلات تصویر آینه با سرکوب بیان MCT1 مشاهده می‌شود و تسهیلات کمتری برای تغییر متابولیسم اکسیداتیو به مسیر گلیکولیتیک فراهم می‌شود. به طور مکانیکی مشخص شده که فقدان p53 با تثبیت پروتئین mRNA MCT1 در پاسخ به هیپوکسی همراه بوده و این

References

- Van Vulpen JK, Velthuis MJ, Steins Bisschop CN, Travier N, Van Den Buijs BJ, Backx FJ, et al. Effects of an exercise program in colon cancer patients undergoing chemotherapy. *Med Sci Sports Exerc* 2016;48(5):767-75.
- Ghafari M, Mohammadian M, Valipour AA, Mohammadian-Hafshejani A. Physical activity and colorectal cancer. *Iran J Public Health* 2016;45(12):1673-4.
- San-Millán I, Brooks GA. Reexamining cancer metabolism: lactate production for carcinogenesis could be the purpose and explanation of the Warburg Effect. *Carcinogenesis* 2017;38(2):119-33.
- Seyfried TN, Flores RE, Poff AM, D'Agostino DP. Cancer as a metabolic disease: implications for novel therapeutics. *Carcinogenesis* 2014;35(3):515-27.
- Halestrap AP, Price NT. The proton-linked monocarboxylate transporter (MCT) family: structure, function and regulation. *Biochem J* 1999;343(Pt 2):281-99.
- Hao JL, Cozzi PJ, Khatri A, Power CA, Li Y. CD147/EMMPRIN and CD44 are potential therapeutic targets for metastatic prostate cancer. *Curr Cancer Drug Targets* 2010;10(3):287-306.
- Pinheiro C, Longatto-Filho A, Azevedo-Silva J, Casal M, Schmitt FC, Baltazar F. Role of monocarboxylate transporters in human cancers: state of the art. *J Bioenerg Biomembr* 2012;44(1):127-39.
- Sonneaux P, Copetti T, De Saedeleer CJ, Végran F, Verrax J, Kennedy KM, et al. Targeting the lactate transporter MCT1 in endothelial cells inhibits lactate-induced HIF-1 activation and tumor angiogenesis. *PLoS One* 2012;7(3):e33418.
- Markowitz SD, Bertagnolli MM. Molecular basis of colorectal cancer. *N Engl J Med* 2009;361(25):2449-60.
- Li XL, Zhou J, Chen ZR, Chng WJ. P53 mutations in colorectal cancer-molecular pathogenesis and pharmacological reactivation. *World J Gastroenterol* 2015;21(1):84-93.
- Boidot R, Végran F, Meulle A, Le Breton A, Dessy C, Sonneaux P, et al. Regulation of monocarboxylate transporter MCT1 expression by p53 mediates inward and outward lactate fluxes in tumors. *Cancer Res* 2012;72(4):939-48.

12. Alizadeh AM, Khaniki M, Azizian S, Mohaghghehi MA, Sadeghzadeh M, Najafi F. Chemoprevention of azoxymethane-initiated colon cancer in rat by using a novel polymeric nanocarrier–curcumin. *Eur J Pharmacol* 2012;689(1-3):226-32.
13. Aveseh M, Nikooie R, Aminaei M. Exercise-induced changes in tumour LDH-B and MCT1 expression are modulated by oestrogen-related receptor alpha in breast cancer-bearing BALB/c mice. *J Physiol* 2015;593(12):2635-48.
14. Aveseh M, Nikooie R, Aminaei M. Lactate transporters expression in tumor of Balb/c mice bearing breast cancer after endurance training. *Armaghane Danesh* 2014;19(7):602-13.
15. Alizadeh AM, Heydari Z, Rahimi M, Bazgir B, Shirvani H, Alipour S, et al. Oxytocin mediates the beneficial effects of the exercise training on breast cancer. *Exp Physiol* 2018;103(2):222-235.
16. Bensaad K, Tsuruta A, Selak MA, Vidal MN, Nakano K, Bartrons R, et al. TIGAR, a p53-inducible regulator of glycolysis and apoptosis. *Cell* 2006;126(1):107-20.
17. Matoba S, Kang JG, Patino WD, Wragg A, Boehm M, Gavrilova O, et al. p53 regulates mitochondrial respiration. *Science* 2006;312(5780):1650-3.
18. Donahue JM, Chang ET, Xiao L, Wang PY, Rao JN, Turner DJ, et al. The RNA-binding protein HuR stabilizes survivin mRNA in human oesophageal epithelial cells. *Biochem J* 2011;437(1):89-96.

Changes in monocarboxylate transporter 1 and p53 gene expression by aerobic interval training in the experimental colon carcinoma of mouse

Hossein Shirvani Ph.D.^{1*}
Amin Isanejad Ph.D.²
Mostafa Rahimi Ph.D.³
Behzad Bazgir Ph.D.¹
Ali Mohammad Alizadeh Ph.D.⁴

1- Exercise Physiology Research Center, Life Style Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2- Department of Physical Education, Shahed University, Tehran, Iran.
3- Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Shahrood University, Shahrood, Iran.
4- Cancer Research Center, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran.

Abstract

Received: 31 Jan. 2018 Revised: 07 Feb. 2018 Accepted: 30 Jul. 2018 Available online: 09 Aug. 2018

Background: Recent evidence suggests that regular exercise training is effective in treating various aspects of cancer. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of 8 weeks of aerobic interval training on monocarboxylate transporter 1 (MCT1) protein and expression of p53 gene in tumor of colon cancer mice.

Methods: The present study was conducted experimentally from May to October 2014 at the Exercise Physiology Research Center of Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Twenty BALB/c mice of age 3 weekly with a mean weight of 17.6 ± 1.4 grams were selected and randomly divided into 4 groups: control (N=5), interval training (N=5), colon tumor (N=5) and interval training+colon tumor (N=5). The cancer was induced by subcutaneous injection of a carcinogenic azoxymethane (10 mg/kg) once a week for three weeks, and aerobic exercise was performed with rodent treadmill for 8 weeks and 5 days a week. Forty-eight hours after the last training session, the mice were cleared and colon removed. Measurement of MCT1 protein was performed by ELISA and commercial kits (ZellBio, Germany). Real-time polymerase chain reaction (PCR) was used to determine the relative expression of p53 gene. Data were analyzed by Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U tests.

Results: The results showed a significant increase in MCT1 protein ($P < 0.01$) and significant reductions in p53 gene expression ($P < 0.001$) in a colon tumor group compared to other groups. Also, there was a significant decrease in the level of MCT1 protein ($P < 0.01$) and significant increase in p53 gene expression ($P < 0.001$) in the exercise training group and exercise training+colon tumor group compared to control group and the tumor group was observed.

Conclusion: The findings of the study showed that aerobic interval training reduced the protein content of MCT1 and increased the expression of p53 gene (as a tumor inhibitor) in the tumor of colon cancer mice. These factors are portions of the mechanisms involved in cancer cell metabolism by which aerobic interval training shows part of its therapeutic effect in colon cancer.

Keywords: colonic neoplasms, interval training, monocarboxylate transport protein 1, p53 gene.

* Corresponding author: Exercise Physiology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Nosrati alley, Sheikh Bahaei St., Mollasadra St., Vanak Sq., Tehran, Iran.
Tel: +98 21 82482391
E-mail: shirvani.h2006@gmail.com