

鳥取県の真正クモ類 (クモガタ綱クモ目)

鶴崎展巨¹・岡田珠美²・有田立身³・井原 庸⁴

¹〒680-8551 鳥取市湖山町南4-101 鳥取大学地域学部生物学研究室

²〒680-0722 鳥取県若桜町春米 鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館響の森

³〒680-1164 鳥取市猪子199(2005年12月24日逝去)

⁴〒730-8631 広島市中区広瀬北町9-1 広島県環境保健協会

E-mail: ¹ntsuru@rstu.jp; ²okada-t@hibikinomori.gr.jp; ⁴yoh.ihara@kanhokyo.or.jp

Nobuo TSTURUSAKI¹, Tamami OKADA², Tatsumi ARITA³ and Yoh IHARA⁴ (¹Faculty of Regional Sciences, Tottori University, Tottori, 680-8551 Japan; ²Hibikinomori Museum, Tsukuyone, Wakasa-cho, Tottori Pref., 680-0722 Japan; ³Inoko 199, Tottori, deceased; ⁴Hiroshima Environment & Health Association, Hirose-kita-machi 9-1, Nakaku, Hiroshima, 730-8631 Japan): **Catalogue of the spiders (Arachnida: Araneae) of Tottori Prefecture, western Honshu, Japan.**

要旨 — 文献記録と新たに採集された標本にもとづき、鳥取県産として44科438種の真正クモ類(クモガタ綱クモ目)の記録をまとめた。次の26種は鳥取県内初記録となる：イトグモ、テナガマシラグモ、ナルトミダニグモ、コガネヒメグモ、マダラヒメグモ、クロササヒメグモ、クロテナガグモ、シバサラグモ、タイリクコサラグモ、ズブトヌカグモ、チュウガタシロカネグモ、チクニドヨウグモ、キタドヨウグモ、キヌアシナガグモ、オオクマヤミイロオニグモ、シロゴミグモ、クマダギンナガゴミグモ、*Lathys dihamata* Paik 1979, ムナキワシグモ、ヤマヨリメケムリグモ、モリメキリグモ、アシダカグモ、トライコアシダカグモ、チクニエビスグモ、ヤガタハエトリ、ナカヒラハエトリ。

キーワード — 鳥取県, クモ, 動物相, 目録

Abstract — On the basis of literature records and specimens newly obtained, a total of 438 species belonging to 44 families of spiders (Arachnida, Araneae) from Tottori Prefecture, western Honshu, Japan are catalogued. Following 26 species are recorded as new to spider fauna of Tottori Prefecture: *Loxosceles rufescens* (Dufour, 1820), *Masirana longimana* Yaginuma, 1970, *Ischnothyreus narutomii* (Nakatsudi, 1942), *Chryso scintillans* (Thorell, 1895), *Steatoda triangulosa* (Walckenaer, 1802), *Thymoites okumae* (Yoshida, 1988), *Bathypantes robustus* Oi, 1960, *Nerienne herbosa* (Oi, 1960), *Parasisis amurensis* Eskov, 1984, *Saitonia orientalis* (Oi, 1960), *Leucauge blanda* (L. Koch, 1878), *Metleucauge chikunii* Tanikawa, 1992, *Metleucauge yaginumai* Tanikawa, 1992; *Tetragnatha lauta* Yaginuma, 1959; *Araneus acuisetus* Zhu & Song, 1994, *Cyclosa alba* Tanikawa, 1992, *Cyclosa kumadai* Tanikawa, 1992, *Lathys dihamata* Paik, 1979, *Cladothela unciinsignita* (Bösenberg & Strand, 1906), *Drassyllus sasakawai* Kamura, 1987, *Gnaphosa potanini* Simon, 1895, *Heteropoda venatoria* (Linnaeus, 1763), *Sinopoda koreana* (Paik, 1968), *Synaema chikunii* Ono, 1983, *Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1825), *Sibianor kochiensis* (Bohdanowicz & Proszynski, 1987).

Key words — Araneae, catalogue, fauna, spiders, Tottori Prefecture.

鳥取県からのもっとも古いクモ(クモガタ綱クモ目)の記録は、猪股・石井(1934)の鳥取砂丘の昆虫リストにおけるイソコモリグモ(ナカムラドクグモの名称で掲載)である。地域別のまとまったリストとしては淀江町(現在は米子市)壺神山(一部、大山の記録を含む)の田中による報告(1939:14科37種)にはじまり、鳥取市(有田,1963:35科211種)、河原町(現在は鳥取市)三滝溪(有田,1969:16科39種)、大山(有田,1970:18科61種)、江府町・日野町の毛無山・宝仏山(鶴崎・岡田,2000:18科46種)、鳥取市の西因幡山地(鶴崎ら,2000:24科102種)などが出ている。しかし、鳥取県全体をカバーする目録としては、福本(1955:21科122種)と鳥取県立博物館所蔵のクモ標本(ほとんどが鳥取県産)を目録化した野村(1984:33科245種:ただし1種は岡山県産)があるのみである。残念ながら、前者は種名のみで、後者も産地は掲載されているが採集日付や性別などの情報が省略されており、採集記録としての利用にはあまり役立たない。新海らによりCD-ROMで提供されている「県別クモ分布図」はクモ各種の分布や県ごとの記録の有無を手取り早く知るうえで非常に便利な情報源であるが、その最新バージョン(新海ら,2008)によれば現在までに鳥取県から文献上で記録されているクモは303種である。しかし、分布図を眺めると隣接3県で記録されながら鳥取県のみが空白になっている種も多い。

本稿では、これまでの文献記録を網羅し未発表データを加えることで、現時点で可能な限り完全かつ詳細な種リストの作成をめざした。環境アセスメント等の調査報告書は正式な文献としてはふつう扱えないが、鳥取県内での生息がこれらによって確認されている種も少なくない。本リストでは著者らに参照の機会があり、かつ、同定精度が高いと判断された2つ(長大株式会社,2003;ウエスコ,2008)における記録を加えた。ただし種名が未決定(たとえば、「○属sp.」といった記録)は除外した。その結果、現時点で鳥取県産として数えられるクモは44科438種となった。

【凡例と補足説明】

1. 種の配列は谷川(2008)にしたがった。学名と和名もほぼ谷川(2008)に依拠している。それぞれの科内では属名、種小名のアルファベット順である。リストは、種の学名、和名、検討標本の採集地(個体数、year-month-day方式で採集日付、採集者)の順である。【既】は鳥取県内の既知産地、*は鳥取県新記録種。
2. 略語: 幼=幼体。NT=鶴崎展巨, 足達=岡田(足達)珠美, 有田=有田立身, YI=井原庸。TRPM=鳥取県立博物館(Tottori Prefectural Museum)所蔵標本の博物館略号。県博(1984)=野村(編)(1984)鳥取県立博物館所蔵標本目録。
3. ウエスコ(2008)に掲載のデータは一括して「鳥取市千代川」としたが、調査範囲は千代川の河口付近(鳥取市浜

坂)、源太橋、和奈見橋、用瀬橋と、千代川の支流である袋川の玉鉾橋の合計5地点(調査年は、1992,1998,2003,2007)である。

Suborder Opisthothelae 後疣亜目

Infraorder Mygalomorphae 原蛛(トタテグモ)下目

Family Atypidae ジグモ科

1. *Atypus karschi* Dönitz, 1887 ジグモ。三朝町福田(1♀,1999-12-10, NT)。【既】鳥取県(福本,1956)。鳥取市:猪子,古郡家(県博,1984);千代川(ウエスコ,2008)。
2. *Calommata signata* Karsch, 1879 ワスレナグモ。【既】鳥取市:猪子(有田,1963;県博,1984;佐藤ら,2007),東町鳥取県立博物館,湖山鳥取大構内(佐藤ら,2007)。岩美町:牧谷山陰自然科学館(有田・鶴崎,2002;新海,2007;佐藤ら,2007);陸上(佐藤ら,2007)。【備考】環境省レッドリスト(2006)および鳥取県RDB(2002)で準絶滅危惧(NT)。

Family Ctenizidae トタテグモ科

3. *Latouchia typica* (Kishida, 1913) キシノウエトタテグモ。鳥取市:久松公園 5334-21-09(2♀1幼,1987-4-4, NT; 巣穴多数1993-6-16; 巣穴多数クモタケあり1994-7-31; 畑守(1997); 久松山水道谷5334-2109(巣穴1(クモ不在),2000-5-9)。【既】鳥取市久松山(有田・鶴崎,1993;畑守,1997;鶴崎,2002)。【備考】環境省レッドリスト(2006)および鳥取県RDB(2002)で準絶滅危惧(NT)。
4. *Conothele fragaria* (Dönitz, 1887) (= *Ummidia fragaria* (Dönitz, 1887)) キノボリトタテグモ。【既】岩美町:浦富熊野神社;長谷長谷神社(有田・鶴崎,1991,2002;鶴崎ら,2007)。鳥取市:猪子(有田,1963;県博,1984;有田・鶴崎,1991,2002;鶴崎ら,2007);玉津玉津神社;倉田倉田八幡宮;徳尾大野見宿彌命神社。日野町金持神社(鶴崎ら,2007)。【備考】環境省レッドリスト(2006)および鳥取県RDB(2002)で準絶滅危惧(NT)。

Infraorder Araneomorphae 新蛛(フツウクモ)下目

Family Loxoscellidae イトグモ科

5. *Loxosceles rufescens* (Dufour, 1820) イトグモ* 鳥取市湖山鳥取大構内地域学部建物内(1幼,2004-8-31, NT; 1幼,2006-10-2, NT; 1♂,2007-1-13, NT; 1♀,2008-6-23, NT)。

Family Scytodidae ヤマシログモ科

6. *Scytodes thoracica* (Latreille, 1802) ユカタヤマシログモ

モ. 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963); 樗谷; 生山(県博, 1984).

Family Leptonetidae マシラゲモ科

7. *Masirana longimana* Yaginuma, 1970 テナガマシラゲモ*. 大山町長田(1♂, 1995-3-24, 野嶋宏一).

Family Pholcidae ヨウレイゲモ科

8. *Pholcus zichyi* Kulczyński, 1901 ヨウレイゲモ. 鳥取市: 国安千代川右岸国安堤(1♂, 2006-6-20, NTら); 河原町仙小屋(1♀, 1992-7-23, 有田). 倉吉市打吹山(1♂, 2008-6-21, NT). 【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 生山(県博, 1984); 徳尾(鶴崎, 1999); 河原町仙小屋(鶴崎ら, 2003). 大山(景山, 1966).
9. *Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1775) イエヨウレイゲモ. 鳥取市鳥取大学構内(屋内)(1♂, 1987-6-26, NT). 境港市境港(5♂18♀, 1995-12-2, 有田). 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市猪子(有田, 1963); 河原町北村(県博, 1984); 大山(田中, 1939).
10. *Spermophora senoculata* (Dugès, 1836) シモンゲモ. 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山; 猪子(県博, 1984).

Family Segestriidae エンマゲモ科

11. *Ariadna lateralis* (Karsch, 1881) ミヤゲモ. 鳥取市樗谿神社(1♀, 1987-6-30, NT & 細田); 覚寺(1♀, 1987-9-2, 細田). 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963); 樗谷; 生山(県博, 1984).

Family Oonopidae タマゴゲモ科

12. *Gamasomorpha cataphracta* Karsch, 1881 ダニゲモ. 【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963; 県博, 1984); 安蔵森林公園(鶴崎ら, 2003).
13. *Ischnothyreus narutomii* (Nakatsudi, 1942) ナルトミダニゲモ*. 鳥取市湖山町鳥取大構内タブノキ林(2♂3♀, 2007-5-07, NTら).

Family Mimetidae センショウゲモ科

14. *Ero cambridgei* Kulczyński, 1911 アオグロセンショウゲモ. 【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008).
15. *Ero japonica* Bösenberg & Strand, 1906 センショウゲモ. 鳥取市: 樗谿神社(1♀, 1987-6-23, NT & 細田みどり);

国安国安堤(1♀, 2006-6-20, NTら). 【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 生山; 鷲峰山(県博, 1984); 三滝溪(恩藤・江原 1974).

16. *Mimetus japonicus* Uyemura, 1938 ハラビロセンショウゲモ. 【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山(県博, 1984).

Family Oecobiidae チリゲモ科

17. *Uroctea compactilis* L. Koch, 1878 ヒラタゲモ. 日野郡日野町金持金持神社(1♀, 2004-6-20, NT). 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山; 生山(県博, 1984); 大山(田中, 1939).

Family Uloboridae ウズゲモ科

18. *Hyptiotes affinis* Bösenberg & Strand, 1906 オウギゲモ. 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山(県博, 1984).
19. *Miagrammopes orientalis* Bösenberg & Strand, 1906 マネキゲモ. 鳥取市: 湖山鳥取大構内 濃山(1♀, 2008-6-18, NT). 【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山(県博, 1984).
20. *Octonoba sinensis* (Simon, 1880) トウキョウウズゲモ. 鳥取市: 久松山(1♀, 1999-5-20, 足達); 湯所平和塔(1♂幼, 1999-5-6, 足達); 布勢日吉神社(1幼, 1999-5-6, 足達). 東伯町保(1♀, 1999-4-30, 足達). 【既】鳥取市久松山(県博, 1984).
21. *Octonoba sybotides* (Bösenberg & Strand, 1906) カタハリウズゲモ. 鳥取市: 桂見出合いの森(1♀1♂幼, 1999-5-26, 足達); 湖山町鳥取大構内(1♀, 1999-6-28, 足達); 国安堤(11♂10♀2幼, 2006-6-20, NTら). 【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 東町; 生山(県博, 1984); 三滝溪(恩藤・江原 1974). 大山(景山, 1966; 有田, 1970).
22. *Octonoba varians* (Bösenberg & Strand, 1906) ウズゲモ. 鳥取市: 湖山池青島(1幼, 1999-4-22, 足達); 大畑天日名鳥命神社(1♀, 1999-5-11, 足達). 三朝町小鹿溪(1♀, 1995-10-22, 有田). 倉吉市打吹山(1♀, 1999-5-16, 足達). 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963); 三滝溪(恩藤・江原, 1974, 鶴崎ら, 2003); 佐治町山王滝(鶴崎ら, 2003). 大山(有田, 1970).

Family Nesticidae ホラヒメゲモ科

23. *Nesticella brevipes* (Yaginuma, 1970) コホラヒメゲモ 【既】鳥取市樗谿(鶴崎, 1999).
24. *Nesticella mogera* (Yaginuma, 1972) チビホラヒメゲモ. 智頭町湯屋千代川河川敷(1♂, 2005-8-3, NT). 【既】鳥取市(Yaginuma, 1970, 1972); 千代川(ウエスコ, 2008).

Family Theridiidae ヒメグモ科

25. *Achaearanea angulithorax* (Bösenberg & Strand, 1906) ツリガネヒメグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 東町; 久松山 (県博, 1984); 天神山 (鶴崎, 1999); 佐治町三国山三国山林道 (鶴崎ら, 2003).
26. *Achaearanea asiatica* (Bösenberg & Strand, 1906) キヒメグモ. 【既】鳥取市樗谷 (吉田, 2003)
27. *Achaearanea culicivora* (Bösenberg & Strand, 1906) カグヤヒメグモ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (有田, 1970).
28. *Achaearanea ferrumequina* (Bösenberg & Strand, 1906) ヒザブトヒメグモ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 三滝溪 (鶴崎ら, 2003).
29. *Achaearanea japonica* (Bösenberg & Strand, 1906) ニホンヒメグモ (= ヒメグモ). 鳥取市国安堤 (1♂2幼, 2006-6-20, NTら). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 千代川 (ウエスコ, 2008); 三滝溪; 仙小屋 (鶴崎ら, 2003). 三朝町小河内 (吉田, 2003).
30. *Achaearanea kompirensis* (Bösenberg & Strand, 1906) コンピラヒメグモ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
31. *Achaearanea oculiprominentis* (S. Saito, 1939) キヨヒメグモ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
32. *Achaearanea tabulata* Levi, 1980 オオツリガネヒメグモ. 鳥取市: 千代大橋千代川右岸河川敷 (1♀, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 国安堤 (1♂, 2006-6-20, NTら); 河原町和奈見橋 (2♂1♀, 2005-8-8, NTら). 智頭町湯屋千代川河川敷 (1♂1♀, 2005-8-3, NT). 【既】鳥取市河原町和奈見 (吉田2003).
33. *Anelosimus crassipes* (Bösenberg & Strand, 1906) アシブトヒメグモ. 鳥取市湖山町鳥取大構内 (5♂4♀1幼, 2007-5-9, NTら; 5♀, 2008-6-18, NT); 智頭町毛谷千代川河川敷 (1♀, 2005-8-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 鷲峰山 (県博, 1984). 大山 (有田, 1970).
34. *Argyrodes bonadea* (Karsch, 1881) シロカネイソウロウグモ. 鳥取市桂見出合いの森 (3♂, 2♀, 2004-8-22, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 淀江町壺上山 (田中, 1939).
35. *Argyrodes cylindratus* Thorell, 1889 トビジロイソウロウグモ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963).
36. *Argyrodes kumadai* Chida & Tanikawa, 1999 チリイソウロウグモ. 鳥取市国安堤 (1幼, 2006-6-20, NTら) 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984).
37. *Argyrodes miniaceus* (Doleschall, 1867) アカイソウロウグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963); 県博, 1984). 大山 (田中, 1939).
38. *Ariamnes cylindrogaster* (Simon, 1889) オナガグモ. 八頭町船岡町大江 (1♀, 1993-5-30, 有田). 三朝町: 小鹿溪 (1♀, 1995-10-22, 有田); 馬場の滝 (2幼, 1999-9-3, NT). 智頭町駒帰 沖ノ山林道 (1幼, 2005-8-3, NTら). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 三滝溪; 仙小屋; 佐治村山王滝 (鶴崎ら, 2003); 佐治村尾際 (県博, 1984).
39. *Chrosiothes sudabides* (Bösenberg & Strand, 1906) ヨツコブヒメグモ. 【既】鳥取市: 猪子; 湖山神社 (鶴崎, 1999); 千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町大江 (県博, 1984).
40. *Chryso albipes* (S. Saito, 1935) (= *Theridion rapulum* Yaginuma, 1960) ギボシヒメグモ. 智頭町那岐山西仙コース (1♂1幼♀, 2004-6-5, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 千代川 (ウエスコ, 2008); 安蔵森林公園, 河原町仙小屋 (鶴崎ら, 2003); 鷲峰山 (県博, 1984).
41. *Chryso foliata* (L. Koch, 1878) (= *Chryso punctifera* (Yaginuma, 1960)) ホシミドリヒメグモ. 智頭町那岐山西仙コース (1♀, 2004-6-5, NT). 【既】鳥取市猪子 (県博, 1984); 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
42. *Chryso scintillans* (Thorell, 1895) コガネヒメグモ*. 船岡町大江 (1♀, 1984-6-9, 有田).
43. *Chryso vesiculosa* (Simon, 1894) ヒシガタヒメグモ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963).
44. *Coleosoma blandum* O. Pickard-Cambridge, 1882 サヤヒメグモ. 【既】鳥取市猪子 (八木沼・新海, 1971; 大野・八木沼, 1972).
45. *Coleosoma octomaculatum* (Bösenberg & Strand, 1906) ヤホシサヤヒメグモ. 鳥取市: 八千代橋 (1♀, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 源太橋 (2♀1幼, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 国安堤 (2幼, 2006-6-20, NTら); 河原町出合橋 (1♀, 2005-8-8, NTら); 和奈見橋 (2♀, 2005-8-8, NTら). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 倉吉市上井 (吉田, 2003).
46. *Crustulina sticta* (O. Pickard-Cambridge, 1861) オオノヒメグモ. 【既】鳥取市猪子 (県博, 1984).
47. *Dipoena punctisparsa* Yaginuma, 1967 シモフリミジングモ. 鳥取市: 桂見出合いの森 (1♂幼, 1999-5-14, 足達); 湖山鳥取大構内濃山 (1♀, 2008-6-18, NT). 【既】鳥取市布勢日吉神社 (吉田, 2003).
48. *Enoplognatha abrupta* (Karsch, 1879) (= *Enoplognatha transversifoveata* (Bösenberg & Strand, 1906)) カレハヒメグモ. 鳥取市: 東町久松山 (1♀, 1999-5-20, 足達); 湖山町鳥取大構内 (1♀, 2007-5-9, NTら). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984); 湖山

- 初覧山, 石破山, 浜坂神社 (鶴崎, 1999). 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974).
49. *Enoplognatha caricis* (Fickert, 1876) (= *Enoplognatha japonica* Bösenberg & Strand, 1906) ヤマトコノハグモ. 鳥取市千代大橋 (1♀, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵). 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
50. *Episinus affinis* Bösenberg & Strand, 1906 ヒシガタグモ. 智頭町那岐山西仙コース (1♀, 2004-6-5, NT). 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
51. *Episinus nubilus* Yaginuma, 1960 ムラクモヒシガタグモ. 鳥取市: 樗谷神社 (1♂, 1♀幼, 1987-10-18, 細田みどり). 【既】鳥取市: 久松山; 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 布勢日吉神社 (吉田, 2003).
52. *Euryopsis octomaculata* (Paik, 1995) ヤホシヒラタヒメグモ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
53. *Keijia mneon* (Bösenberg & Strand, 1906) サトヒメグモ. 【既】鳥取市湖山町鳥取大構内 (吉田哉, 2003)
54. *Keijia sterninotata* (Bösenberg & Strand, 1906) ムナボシヒメグモ. 鳥取市: 樗谷 (1♀, 1987-5-28, NTら); 千代川国安堤 (1♀, 2006-6-20, NTら); 湖山町鳥取大学構内 (1♂3♀, 2007-5-9, NTら; 2♀, 2008-6-18, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 千代川 (ウエスコ, 2008); 三朝町下谷橋 (吉田, 2003).
55. *Moneta caudifera* (Dönitz & Strand, 1906) ハラナガヒシガタグモ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
56. *Neospintharus fur* (Bösenberg & Strand, 1906) フタオイソウロウグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984); 樗谿 (吉田, 2003); 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974).
57. *Paidiscura subpallens* (Bösenberg & Strand, 1906) ハイイロヒメグモ. 智頭町湯屋千代川 (1♀, 2005-8-3, NT). 【既】鳥取市猪子 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
58. *Parasteatoda tepidariorum* (C. Koch, 1841) (= *Achaearanea tepidariorum* (C. Koch, 1841)) オオヒメグモ. 鳥取市: 八千代橋 (1♂1幼, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 千代大橋 (3♂4♀, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵). 智頭町駒帰沖ノ山林道 (1♀, 2005-8-3, NTら). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 千代川 (ウエスコ, 2008); 三滝溪 (鶴崎ら, 2003); 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974). 大山 (田中, 1939; 有田, 1970). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
59. *Phoroncidia pilula* (Karsch, 1879) ツクネグモ. 【既】鳥取市吉岡 (長大, 2003).
60. *Phycosoma flavomarginatum* (Bösenberg & Strand, 1906) キベリミジングモ. 鳥取市: 布勢日吉神社 (1♂, 幼, 1999-5-11, 足達); 湖山町鳥取大学構内 (1♀, 2007-5-9, NT). 【既】鳥取市樗谷 (吉田, 2003); 大山 (有田, 1970).
61. *Phycosoma mustelinum* (Simon, 1889) カニミジングモ. 三朝町小河内 (1♀, 1999-9-9, NT). 日南町鍵掛峠 (1♂, 2008-6-27, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963, Yoshida & Ono, 2000); 久松山; 生山 (県博, 1984); 湖山石破山, 湖山神社, 浜坂神社 (鶴崎, 1999); 千代川 (ウエスコ, 2008); 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974). 大山 (景山, 1966).
62. *Rhomphaea sagana* (Dönitz & Strand, 1906) ヤリゲモ. 鳥取市: 安蔵森林公園 (1♀, 2008-8-26, NT); 河原町出合橋 (1♂, 2005-8-8, NTら). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 河原町仙小屋 (鶴崎ら, 2003); 船岡町大江 (県博, 1984).
63. *Robertus nojimai* Yoshida, 2002 ノジマモリヒメグモ. 【既】智頭町芦津溪 (吉田, 2003).
64. *Robertus saitoi* Yoshida, 1995 サイトウモリヒメグモ. 【既】鳥取市玉鉾, 三朝町湯谷 (吉田, 2003).
65. *Robertus sibiricus* Eskov, 1987 キタモリヒメグモ. 【既】日南町神戸上 (吉田, 2003).
66. *Steatoda cingulata* (Thorell, 1890) (= *Steatoda cavernicola* (Bösenberg & Strand 1906)) ハンゲツオスナキグモ. 鳥取市湖山町鳥取大学構内屋内 (1♀, 2006-10-2, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 生山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
67. *Steatoda triangulosa* (Walckenaer, 1802) マダラヒメグモ*. 境港市境港 (1♂, 2♀, 1995-12-2, 有田).
68. *Stemmops nipponicus* Yaginuma, 1969 スネグロオチバヒメグモ. 鳥取市湖山: 鳥取大学構内 (1♀1幼, 1989-10-12, NT; 1♀, 2007-5-7, NTら; 1幼, 2008-5-14, NTら); 鳥取大学構内第2食堂付近スギ林 (3幼, 1987-11-20, NT); 鳥取市: 国安堤, 千代川河川敷 (2幼, 2006-4-18, NTら); 松上松上神社 (1♂, 1987-9-20, NT). 船岡町大江 (1♀, 1975-5-2, 有田). 【既】鳥取市猪子 (県博, 1984). 賀露砂丘, 湖山鳥取大構内 (鶴崎 1999); 湖山町鳥取大学構内 (吉田哉, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
69. *Takayus chikunii* (Yaginuma, 1960) バラギヒメグモ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963), 船岡町大江 (県博, 1984).
70. *Takayus takayensis* (S. Saito, 1939) タカコヒメグモ. 智頭町那岐山西仙コース避難小屋付近, 920 m (3♂1幼♀, 2004-6-5, NT). 【既】大山 (景山, 1966; 有田, 1970). 河原町三滝溪 (吉田, 2003) 河原町三滝溪, 佐治村三国山三国山林道 (鶴崎, 2003); 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974).
71. *Theridion latifolium* Yaginuma, 1960 ヒロハヒメグモ. 【既】鳥取市猪子 (県博, 1984).
72. *Thymoites okumae* (Yoshida, 1988) クロササヒメグモ*. 日南町鍵掛峠 (1♀, 2008-6-27, NT).
73. *Yunohamella lyricus* (Walckenaer, 1841) (= *Theridion lyricum* Walckenaer, 1841) シモフリヒメグモ. 鳥取市湯所平和塔 (1幼, 1999-5-6, 足達). 智頭町那岐山西仙コース避難小屋付近, 920 m (1♀, 2004-6-5, NT). 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).

74. *Theridion pinastri* L. Koch, 1872 ムネグロヒメグモ。【既】大山(有田, 1970)。鳥取市猪子(有田, 1963; 県博, 1984); 覚寺(吉田哉, 2003); 千代川(ウエスコ, 2008)。
75. *Yunohamella subadulta* (Bösenberg & Strand, 1906) コケヒメグモ。【既】鳥取市下坂本(長大, 2003)。
76. *Yunohamella yunohamense* (Bösenberg & Strand, 1906) ヌノハマヒメグモ。【既】鳥取市佐治村: 尾際(県博, 1984); 北谷(鶴崎ら, 2003)。
77. *Yaginumena castrata* (Bösenberg & Strand, 1906) ボカシミンジグモ。【既】大山(景山1966; 有田, 1970)。

Family Theridiosomatidae カラカラグモ科

78. *Ogulnius pullus* Bösenberg & Strand, 1906 ヤマジグモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 生山(県博, 1984)。
79. *Theridiosoma epeiroides* Bösenberg & Strand, 1906 カラカラグモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 佐治村北谷(恩藤・江原, 1974)。若桜町氷ノ山(県博, 1984)。

Family Anapidae ヨリメグモ科

80. *Comaroma maculosa* Oi, 1960 ヨロイヒメグモ。福部村坂谷神社(2♂, 4♀, 1992-3-14, NT)。鳥取市: 御熊御熊神社(1♂, 1994-1-6, NT); 洞谷(1♀, 1988-4-19, NT); 榎原(1♂1♀, 1988-4-11, NT)。三朝町福田福田神社(1♂, 1♀, 1999-9-3, 目片隆)。伯耆町大山二ノ沢 980m(1♂1♀, 2008-10-14, NT)。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963; 県博, 1984); 禰谿, 久松山, 浜坂神社, 布勢山王山(鶴崎, 1999)。
81. *Conculus lyugadinus* Komatsu, 1940 ヨリメグモ。智頭町: 駒帰沖ノ山林道(1幼, 2005-8-3, NTら); 副ヶ滝(1♀垂成体, 2005-8-3, NTら)。三朝町馬場の滝(1♀, 1999-9-3, NT)。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山(県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008)。

Family Mysmenidae コツブグモ科

82. *Mysmenella jobi* (Kraus, 1967) ナンブコツブグモ。【既】鳥取市猪子(八木沼・新海, 1971)。

Family Pimoidae ピモサラグモ科

83. *Weintrauboa contortipes* (Karsch, 1881) アシヨレグモ。鳥取市久松山水道谷～山頂(1♀, 2000-5-9, NT)。【既】鳥取市猪子(有田, 1963; 県博, 1984)。

Family Linyphiidae サラグモ科

84. *Aprifrontalia mascula* (Karsch, 1879) コサラグモ。鳥取市源太橋(1♀, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵)。【既】鳥取市久松山(県博, 1984)。
85. *Arcuphantes hibanus* Saito, 1992 ヒバヤミサラグモ。大山町大山(1♀, 19-X-1973, 有田: TRPM374-0304-01: 県博, 1984でナガエヤミサラグモとされている標本)。大山町大山: 大神山神社(1♀, 1996-8-23, NT); 大山寺 850 m(1♂3♀, 2008-10-14, NT)。【既】日南町道後山, 花見山(Saito, 1992); 日南町稲積山, 江府町新小屋峠, 大山町大山寺, 中山町萩原, 赤碓町船上山, 三朝町福吉(Ihara, 1995)。江府町毛無山(鶴崎・岡田, 2000)。【備考】タイプ産地は広島県側の道後山。県博(1984)に掲載されている“*Arcuphantes longiscapus* (Oi, 1960)ナガエヤミグモサラグモ”はその後、複数種に分割されている(Ihara, 1995)。ナガエヤミサラグモの分布域は鳥取県内には到達していないと考えられるので、リストから削除する。
86. *Arcuphantes iharai* Saito, 1992 アキヤミサラグモ。【既】鳥取市: 三滝溪(Saito, 1992; Ihara, 1995); 佐治村尾際, 山王滝。智頭町: 那岐山登山口(Ihara, 1995)。
87. *Arcuphantes saitoi* Ihara, 1995 イズモヤミサラグモ。【既】大山町川床。伯耆町溝口町上代矢倉峠。南部町西伯町: 上中谷大河内; 東上。日南町: 菅沢中原; 船通山; 大入峠(Ihara, 1995)。
88. *Arcuphantes tsurusakii* Ihara, 1995 ツルサキヤミサラグモ。【既】鳥取市佐治町辰巳峠。三朝町小鹿溪谷。江府町: 大山鏡ヶ成; 新小屋峠。(Ihara, 1995)。
89. *Asperthorax communis* Oi, 1960 ザラアカムネグモ。福部村坂谷神社(1♀, 1992-3-14, NT)。日南町花見山スキー場入口(1♂1♀, 1988-4-25, NT)。【既】鳥取市猪子(有田, 1963; 有田, 1973); 久松山, 浜坂神社, 石破山(鶴崎, 1999); 江府町毛無山(鶴崎・岡田, 2000)。
90. *Asthenargus matsudae* Saito & Ono, 2001 ヒメウスイロサラグモ【既】岩屋堂, 鳥取市, 花見山(Saito & Ono, 2001)。
91. *Bathyphantes robustus* Oi, 1960, クロテナガグモ*。三朝町下谷橋(1♂1♀, 1999-9-3, NT)。
92. *Centromerus sylvaticus* (Blackwall, 1841) マルサラグモ。鳥取市鳥取砂丘有島武郎碑(2♀, 1991-12-1, NT)【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 賀露砂丘(鶴崎 1999); 千代川(ウエスコ, 2008)。若桜町氷ノ山(県博, 1984)。
93. *Ceratinopsis setoensis* (Oi, 1960) イソヌカグモ。【既】鳥取市久松山(有田, 1973)。
94. *Dicornua hikosanensis* Oi, 1960 ヒコサンヌカグモ。【既】日南町多里(小川, 2007)。
95. *Diplocephaloides saganus* (Bösenberg & Strand, 1906) ハラジロムナキグモ。鳥取市湖山鳥取大学構内(2♀,

- 2007-5-9, NTら)。【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008)。
96. *Diplocephalus bicurvatus* Bösenberg & Strand, 1906 ムナキグモ。【既】鳥取市生山(県博, 1984)。
97. *Doenitzius peniculus* Oi, 1960 デーニッツサラグモ。若桜町氷ノ山(1♀, 1974-10-29, 有田)。鳥取市湖山町南鳥取大学構内タブノキ林(3♀, 2008-5-14, NT)。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 生山(県博, 1984)。
98. *Doenitzius pruvus* Oi, 1960 コデーニッツサラグモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 生山; 久松山(県博, 1984); 湖山青島, 湖山鳥取大構内, 湖山神社, 湖山足山, 石破山, 吉山, 里仁, 徳尾, 布勢山王山, 馬場倉田八幡宮, 樗谿, 久松山, 浜坂(鶴崎, 1999)。
99. *Drapetisca socialis* (Sundevall, 1832) ムレサラグモ。【既】扇ノ山(八木沼, 1971)。
100. *Erigone prominens* Bösenberg & Strand, 1906 ノコギリヒザグモ。智頭町副ヶ滝(2♂2♀, 2005-8-3, NTら) 【既】鳥取市猪子(有田, 1963); 千代川(ウエスコ, 2008)。大山町大山(有田, 1970)。琴浦町赤碓町船上山(県博, 1984)。
101. *Floronia exornata* (L. Koch, 1878) ハナサラグモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山(県博, 1984); 鳥取市(Saaristo, 1996)。
102. *Gnathonarium dentatum* (Wider, 1834) ヤマアカムネグモ。【既】鳥取市猪子(有田, 1963; 県博, 1984)。大山町大山(有田, 1970)。
103. *Gnathonarium exsiccatum* (Bösenberg & Strand, 1906) ニセアカムネグモ。鳥取市: 千代大橋(1♀, 2005-8-8, NT・竹内); (1♀, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 国安堤(1♂1♀, 2006-6-20, NTら) 【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008)。
104. *Gonatium arimaense* Oi, 1960 アリマケズネグモ。【既】三朝町三滝溪(有田, 1969)。
105. *Gonatium japonicum* Simon in Bösenberg & Strand, 1906 ヤマトケズネグモ。【既】鳥取市猪子(有田, 1963)。
106. *Gongylioides communis* Saito, H. & Ono, 2001 ナミズキンヌカグモ。【既】鳥取市樗谿(Saito & Ono, 2001)。
107. *Gongylioides cuculatus* Oi, 1960 ズキンヌカグモ 【既】日南町新屋(小川, 2007)。
108. *Hylyphantes graminicola* (Sundevall, 1830) クロナンキングモ。三朝町下谷橋(1♀, 1999-9-3, NT) 【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008)。日南町多里(小川, 2007)。
109. *Lepthyphantes japonicus* Oi, 1960 ヤセサラグモ。若桜町氷ノ山(1♀, 1974-10-29, 有田) 【既】鳥取市猪子(有田, 1963); 若桜町氷ノ山(県博, 1984)。
110. *Lepthyphantes serratus* Oi, 1960 ノコバヤセサラグモ。【既】鳥取市: 湖山神社, 樗谿, 久松山, 浜坂神社(鶴崎, 1999)。
111. *Mermessus naniwaensis* (Oi, 1960) ナニワナンキングモ。【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008)。
112. *Nematogmus sanguinolentus* (Walckenaer, 1837) チビアカサラグモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963, 1973); 千代川(ウエスコ, 2008)。
113. *Nematogmus stylitus* (Bösenberg & Strand, 1906) ズダカサラグモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963; 有田, 1973); 千代川(ウエスコ, 2008)。
114. *Neriere angulifera* (Schenkel, 1953) ハンモックサラグモ。若桜町氷ノ山(2♀, 1999-6-5, 足達)。【既】大山町大山(有田, 1970)。
115. *Neriere fusca* (Oi, 1960) クスミサラグモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 佐治村佐治(鶴崎ら, 2003)。若桜町氷ノ山。船岡町大江(県博, 1984)。
116. *Neriere japonica* (Oi, 1960) ツリサラグモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 河原町仙小屋; 佐治村佐治; 三国山三国山林道(鶴崎ら, 2003)。若桜町氷ノ山。船岡町大江(県博, 1984)。大山(景山1966)。
117. *Neriere nigripectoris* (Oi, 1960) ムネグロサラグモ。鳥取市桂見とっとり出合いの森(1♀, 2♂, 1999-5-7; 1♀, 1♂, 1999-5-14, 足達)。三朝町福田(1♀, 1999-9-3, NT)。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 佐治村北谷(恩藤・江原, 1974)。大山町大山(有田, 1970)。佐治村尾際。大山町大山(景山, 1966; 県博, 1984)。日南町新屋(小川, 2007)。
118. *Neriere albolimbata* Karsch, 1879 ヤガスリサラグモ。【既】鳥取市生山(県博, 1984)。
119. *Neriere brongersmai* (Helsdingen, 1969) チビサラグモ。【既】鳥取県(福本, 1956)。船岡町大江(県博, 1984)。
120. *Neriere clathrata* Sundevall, 1830 コウシサラグモ。若桜町氷ノ山(1幼, 1999-6-5, 足達); 倉吉市打吹山(1♀, 1999-5-16, 足達)。【既】鳥取市: 河原町仙小屋; 佐治村尾際(鶴崎ら, 2003)。大山町大山(有田, 1970)。
121. *Neriere herbosa* (Oi, 1960) シバサラグモ*。八頭町: 扇ノ山八東ふるさとの森ブナ林 800m(1♀, 1994-5-22, NT)。
122. *Neriere oidedicata* (Helsdingen, 1969) ヘリジロサラグモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963; 県博, 1984), 千代川(ウエスコ, 2008)。大山(景山, 1966)。
123. *Neserigone nigriterminorum* (Oi, 1960) ハシグロナンキングモ。【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008)。
124. *Neserigone torquialpis* (Oi, 1960) マダランナンキングモ。【既】日南町新屋(小川, 2007)。
125. *Nippononeta unguolata* (Oi, 1960) ツメケシグモ。【既】鳥取市千代川(1922, 1998)(ウエスコ, 2008)。
126. *Oia imadatei* (Oi, 1964) イマダテテングヌカグモ。鳥取市: 賀露砂丘(4♂, 4♀, 1991-11-26, NT); 湖山鳥取大学構内(2♀, 2008-5-14, NTら); 徳尾, 徳尾の森(3♀, 2006-4-18, NTら)。【既】鳥取市: 賀露砂丘, 樗谿, 浜坂神社(鶴崎, 1999); 千代川(ウエスコ, 2008)。
127. *Orientopus yodoensis* (Oi, 1960) アバタムナキグモ。

- 【既】鳥取砂丘(引地, 1973; 有田, 1973).
128. *Paikiniiana vulgaris* (Oi, 1960) コテングヌカゲモ.
【既】鳥取市: 賀露, 浜坂 (鶴崎, 1999); 千代川 (ウエスコ, 2008).
129. *Parasisis amurensis* Eskov, 1984 タイリクコサラゲモ*.
智頭町那岐山登山口 (1♀, 1989-7-29, YI).
130. *Parhypomma naraense* (Oi, 1960) ナラヌカゲモ. 【既】
大山町大山 (有田, 1973).
131. *Nerienne limbatinella* (Bösenberg & Strand, 1906) フタスジ
サラゲモ. 若桜町氷ノ山 (2♀, 1994-10-29, 有田). 【既】
鳥取市猪子 (有田, 1963); 江府町毛無山 (鶴崎・岡田,
2000).
132. *Nerienne longipedella* (Bösenberg & Strand, 1906) アシナ
ガサラゲモ. 鳥取市: 安蔵溪谷 (1♀, 2008-8-26, NT); 河原
町三滝溪谷沿い歩道 (2♂, 3♀, 1992-8-22, NT). 【既】
鳥取市: 樗谷; 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川(ウ
エスコ, 2008). 大山町大山 (景山, 1966; 有田, 1970).
133. *Nerienne marginella* (Oi, 1960) コシロブチサラゲモ. 若桜
町氷ノ山(1♀, 1999-6-5, 足達). 【既】鳥取市: 生山 (県博,
1984); 佐治村三国山北嶺登山道 (鶴崎ら, 2003).
134. *Nerienne montana* (Clerck, 1758) ヤマジサラゲモ. 【既】
鳥取県 (福本, 1956). 大山 (田中, 1939).
135. *Nerienne radiata* (Walckenaer, 1842) シロブチサラゲモ.
【既】大山町大山 (有田, 1970). 鳥取市: 猪子 (有田,
1963); 久松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
136. *Pseudomicrargus acuitegulus* (Oi, 1960) ホソテゴマゲ
モ. 【既】鳥取市久松山. 若桜町氷ノ山 (有田, 1973; 県
博, 1984). 鳥取市浜坂神社 (鶴崎, 1999).
137. *Saitonia orientalis* (Oi, 1960) ズプトヌカゲモ*. 日南町
神戸上 (2♂, 1♀, 1992-11-24, 野嶋宏一).
138. *Savignia kawachiensis* Oi, 1960 ズナガヌカゲモ.
【既】鳥取市千代川 (1992) (ウエスコ, 2008).
139. *Silometopoides yodoensis* (Oi, 1960) ヨドテナガゲモ.
【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
140. *Solenysa mellottei* Simon, 1834 アリマネゲモ. 福部
村坂谷神社 (1♂, 1992-3-14, NT). 三朝町福田 (7♂,
1999-1-10, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博,
1984); 湖山天神山, 布勢山王山, 石破山, 徳尾, 樗谿, 久松
山, 浜坂神社 (鶴崎, 1999); 千代川 (ウエスコ, 2008). 鳥取
市安蔵森林公園鷲峰山登山口 (鶴崎ら, 2003). 日南町多
里 (小川, 2007).
141. *Strandella quadrimaculata* (Uyemura, 1937) ヨツボシサ
ラゲモ. 智頭町那岐山西仙コース 避難小屋付近 920m
(5♂11♀, 2004-6-5, NT). 大山町大山大神山神社 (1♀,
1996-8-23, NT). 【既】鳥取市佐治村: 山王滝; 三国山三
国山林道 (鶴崎ら, 2003). 若桜町氷ノ山 (有田, 1973). 船
岡町大江 (県博, 1984).
142. *Strandella yaginumai* H. Saito, 1982 ヒメヨツボシサラゲ
モ. 【既】河原町三滝溪 (鶴崎ら, 2003).
143. *Tmeticus bipunctis* (Bösenberg & Strand, 1906) ヌカゲモ.
智頭町駒帰沖ノ山林道千代川左岸480 m (1♂, 2005-8-3,
NTら). 【既】鳥取市: 千代川 (ウエスコ, 2008); 佐治村
北谷 (恩藤・江原 1974); 大山町大山 (有田, 1970). 智頭
町沖ノ山. 大山町大山 (有田, 1973). 大山町大山 (県博,
1984).
144. *Turinyphia yunohamensis* (Bösenberg & Strand, 1906)
ユノハマサラゲモ. 鳥取市: 久松山水道谷～山頂 (2
♀, 2000-5-9, NT); 三津三津神社 (1♀, 1999-4-27, 足
達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田,
1963); 生山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008); 佐治
村北谷 (鶴崎ら, 2003). 船岡町大江 (県博, 1984). 日南町
多里 (小川, 2007).
145. *Ummeliata angulituberis* (Oi, 1960) コトガリアカムネグ
モ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 有田, 1973); 生山 (県
博, 1984).
146. *Ummeliata erigonoides* (Oi, 1960) トガリアカムネグモ.
【既】大山町大山 (有田, 1970).
147. *Ummeliata feminea* (Bösenberg & Strand, 1906) トウキョ
ウアカムネグモ (アトグロアカムネグモ). 【既】鳥取
市猪子 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 若桜町氷
ノ山 (有田, 1973).
148. *Ummeliata insecticeps* (Bösenberg & Strand, 1906) セス
ジアカムネグモ. 鳥取市: 千代大橋 (1♀, 2005-8-8, NT・
竹内瑞恵); 源太橋 (2♂, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 河
原町出合橋 (1♂, 2005-8-8, NTら); 和奈見橋 (1♂1♀,
2005-8-8, NTら). 智頭町湯屋 (1♀, 2005-8-3, NT). 【既】
鳥取市: 古郡家 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).

Family Tetragnathidae アシナガゲモ科

149. *Pachygnatha quadrimaculata* (Bösenberg & Strand, 1906)
ヨツボシヒメアシナガゲモ. 鳥取市: 千代大橋 (3♀,
2005-8-8, NT・竹内); 河原町出合橋 (1♀, 2005-8-8, NT
ら). 大山二ノ沢ブナ林 (1♀, 1994-4-16, NT). 【既】鳥取
市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984); 千代川 (ウエス
コ, 2008).
150. *Pachygnatha tenera* Karsch, 1879 ヒメアシナガゲモ. 鳥
取市湖山町鳥取大学構内 (1♀, 2008-5-14, NT). 倉吉市
大塚天神川左岸 (大塚橋～天神橋間) (3♂, 2006-10-27,
NT). 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
151. *Leucauge blanda* (L. Koch, 1878) チュウガタシロカネグ
モ*. 鳥取市: 樗谷 (1♂, 1999-6-3, 足達); 雲山面影山 (2♀,
1999-7-7, 足達); 湖山町湖山神社 (1♀, 1999-6-23, 足達).
152. *Leucauge magnifica* Yaginuma, 1954 オオシロカネグモ.

- 鳥取市: 桂見出合いの森 (1♀, 1999-6-21; 1♀, 1999-7-5, 足達); 樗谷 (1♂, 1♀幼, 1987-6-4, 細田みどり・NT); 国安堤 (1♀, 2006-6-20, NTら); 和奈見 (1♀, 2006-6-6, NT); 用瀬町別府 (2♀, 2000-7-14, NT). 智頭町副ヶ滝千代川左岸 (3♀, 2005-8-3, NTら). 三朝町: 下谷橋 (1♂, 1♀, 1幼, 1999-9-3, NT); 坂戸 (1♀, 1999-9-9, NT); 小河内 (2♀, 1999-9-9, NT); 福田福田橋 (1♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 東町; 生山 (県博, 1984); 河原町三滝溪; 杣小屋; 三国山林道 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
153. *Leucauge subblanda* Bösenberg & Strand, 1906 コシロカネグモ. 鳥取市: 雲山面影山 (1♀, 1999-7-7, 足達); 桂見出合いの森 (1♂, 1999-5-26, 足達); 湖山町湖山神社 (1♀, 1999-6-23, 足達); 鳥取大学構内 (1♀, 1999-6-28, 足達); 用瀬町美成余井 (2♂, 2006-6-6, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 久松山; 生山 (県博, 1984); 河原町三滝溪 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山町大山 (景山, 1966; 有田, 1970).
154. *Leucauge subgemmea* Bösenberg & Strand, 1906 キラシロカネグモ. 鳥取市: 桂見 (1♀, 2000-7-23, NT); 桂見出合いの森 (1♀, 2004-8-22, NT). 三朝町坂戸 (1♀, 1999-9-9, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 東町; 久松山; 生山 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 千代川 (ウエスコ, 2008); 河原町北谷 (恩藤・江原, 1974). 船岡町大江 (県博, 1984).
155. *Menosira ornata* Chikuni, 1955 キンヨウグモ. 鳥取市 樗谿神社 (1♂, 1987-9-29, 細田みどり), 三朝町福田 (1幼, 1999-9-3, NT). 【既】倉吉市関金町清水谷 (國本, 1993). 日南町多里 (小川, 2007).
156. *Meta nigridorsalis* Tanikawa, 1994 チビクロドヨウグモ 【既】鳥取市徳尾 (Tanikawa, 1994).
157. *Meta reticuloides* Yaginuma, 1958 ヤマジドヨウグモ. 智頭町駒帰沖ノ山林道 (1幼♂, 2005-8-3, NTら); 鳥取市: 安蔵溪谷 (1♀, 2004-9-27, NT); 鹿野町鷲峰山小畑林道 (2♀, NT). 三朝町馬場の滝 (3♂3♀, 1999-9-3, NT). 日野町荒神原, 300 m (4♀, 2001-10-1, NT). 【既】鳥取市河原町三滝溪 (鶴崎ら, 2003). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
158. *Metleucauge chikunii* Tanikawa, 1992. チクニドヨウグモ*. 智頭町副ヶ滝 (1♀, 2005-8-3, NTら). 日野郡日野町金持金持神社 (1♀, 2004-6-20, NT).
159. *Metleucauge kompirensis* (Bösenberg & Strand, 1906) タニマノドヨウグモ. 河原町三滝溪: 入口林道終点 (1♀, 2001-9-18, NT); 溪谷沿い歩道 (1♀, 1992-8-22, NT). 佐治村山王滝 (1♀, 2001-6-3, NT・足達・岡田純). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963). 船岡町大江. 鹿野町鷲峰山 (県博, 1984).
160. *Metleucauge yaginumai* Tanikawa, 1992. キタドヨウグモ*. 若桜町氷ノ山 (1♂, 1999-6-5, 足達). 智頭町駒帰沖ノ山林道千代川左岸480m (1♀, 2005-8-3, NTら).
161. *Metleucauge yunohamensis* (Bösenberg & Strand, 1906) メガネドヨウグモ. 智頭町毛谷千代川左岸 (1♀, 2005-5-5, NT). 三朝町馬場の滝 (1幼, 1999-9-3, NT). 赤碓町船上山 (1♀, 1999-5-2, 足達). 日野郡日南町神福サクラソウ生育地 (2♀, 2004-5-7, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 河原町三滝溪; 佐治村山王滝 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 若桜町氷ノ山 (県博, 1984). 大山 (景山, 1966). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000). 日南町多里 (小川, 2007).
162. *Tetragnatha caudicula* (Karsch, 1879) トガリアシナガグモ. 鳥取市: 八千代橋 (1幼, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 源太橋 (1幼, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 河原町出合橋 (1♂, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵). 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (Okuma, 1988).
163. *Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758) ハラビロアシナガグモ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
164. *Tetragnatha lauta* Yaginuma, 1959 キヌアシナガグモ*. 倉吉市打吹山 (1♀, 1999-5-16, 足達).
165. *Tetragnatha maxillosa* Thorell, 1895 ヤサガタアシナガグモ. 鳥取市: 鳥取市桂見 (1♀, 2000-7-23, NT); 国安堤 (1♂2♀, 2006-6-20, NTら); 河原町出合橋 (7♂2♀, 2005-8-8, NTら); 用瀬町別府 (1♂1♀, 2000-7-14, NT). 智頭町毛谷 (1♀, 2005-8-3, NTら). 三朝町: 下谷橋 (6♂, 5♀, 1幼, 1999-9-3, NT); 坂戸 (3♂, 1幼, 1999-9-9, NT); 小河内 (3♂5♀1幼, 1999-9-9, NT); 福田福田橋 (8♂5♀3幼, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
166. *Tetragnatha pinicola* L. Koch, 1870 ミドリアシナガグモ. 若桜町氷ノ山 (2♂, 1999-6-5, 足達). 【既】鳥取市生山. 船岡町大江 (県博, 1984).
167. *Tetragnatha praedonia* L. Koch, 1878 アシナガグモ. 鳥取市: 湖山町湖山池鳥大附属小学校前 (2♂2♀, 1987-6-14, NT), 鳥取大学構内 (2♂1♀, 2007-5-9, NTら); 桂見 (2♀, 2000-7-23, NT); 八千代橋 (9♂2♀8幼, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 源太橋 (1♂1♀1幼, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 国安堤 (4♂3♀, 2006-6-20, NTら); 2♂1♀, 2006-7-4, NT); 河原町出合橋 (4♂1♀, 2005-8-8, NTら); 和奈見橋 (1♂2♀, 2005-8-8, NTら). 智頭町毛谷 (1♀, 2005-8-3, NT). 三朝町: 下谷橋 (2♂5♀, 1幼, 1999-9-3, NT); 坂戸 (1♂1♀8幼, 1999-9-9, NT); 小河内 (1♀, 5幼, 1999-9-9, NT); 福田福田橋 (2♂4♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 河原町三滝溪; 杣小屋 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 若桜町氷ノ山 (県博, 1984). 大山 (有田, 1970).

168. *Tetragnatha squamata* Karsch, 1879 ウロコアシナガグモ. 鳥取市: 湖山神社 (2♂, 1999-5-13, 足達); 鳥取大構内 (1♂, 2007-5-9, NTら). 源太橋 (1♂, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 河原町和奈見橋 (1♂, 2005-8-8, NTら). 若桜町氷ノ山 (1♂, 1999-6-5, 足達). 倉吉市打吹山 (1♂, 1999-5-16, 足達). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (有田, 1970). 日南町多里 (小川, 2007).
169. *Tetragnatha vermiformis* Emerton, 1884 シコクアシナガグモ. 鳥取市湖山池鳥大附属小学校前 (1♂, 1987-6-14, NT). 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
170. *Tetragnatha yesoensis* S. Saito, 1934 エゾアシナガグモ. 鳥取市湖山町湖山神社 (1♂, 1999-5-13, 足達). 智頭町那岐山西仙コース避難小屋付近 (1♂, 2004-6-5, NT). 【既】鳥取市河原町三滝溪; 佐治村山王滝; 三国山三国山林道; 北谷 (鶴崎ら, 2003). 日南町多里 (小川, 2007).

Family Nephilidae ジョロウグモ科

171. *Nephila clavata* L. Koch, 1878 ジョロウグモ. 鳥取市桂見出合いの森 (亜成体♀, 2004-8-231, NT); 鳥取市桂見 (1幼, 2000-7-23, NT). 三朝町: 坂戸 (1♂, 1999-9-9, NT); 福田 (1♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 東町 (県博, 1984); 河原町三滝溪 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 倉吉市関金町清水谷 (國本, 1993). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).

Family Araneidae コガネグモ科

172. *Acusilas coccineus* Simon, 1895 ハツリグモ. 鳥取市: 樗谿神社 (1♂, 16-VI-1987, 細田みどり); 桂見出合いの森 (1♀, 1999-5-31, 足達); 湖山町湖山神社 (1幼, 1999-5-13, 足達). 若桜町氷ノ山 (1♀, 1999-6-5, 足達). 倉吉市打吹山 (1幼, 1999-5-16, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 東町; 生山 (県博, 1984).
173. *Alenatea fuscocolorata* (Bösenberg & Strand, 1906) ヤミイロオニグモ. 【既】日南町新屋 (小川, 2007). 【備考】小川 (2007)には同時に広島県側のオオクマヤミイロオニグモの記録も含まれている, これは正しく同定された記録と考えられる.
174. *Araneus acuisetus* Zhu & Song, 1994. オオクマヤミイロオニグモ*. 鳥取市猪子 (1♀, 1961-6-24, 有田: TRPM 374-0702-01, examined), 船岡町大江 (1♀, 1975-6-3, 有田: TRPM 374-0702-02, examined). 【備考】以上の2標本は, 県博 (1984) のリストでは *Neoscona fuscocolorata* (Bösenberg & Strand, 1906) (現在は,

Alenatea fuscocolorata (Bösenberg & Strand, 1906)) ヤミイロオニグモとして掲載されているが, 過去の「ヤミイロオニグモ」の記録にはオオクマヤミイロオニグモが混在している可能性が新海ら (2008) によって指摘されている. 谷川 (2007) に照らして再検査したところ, 両者ともにオオクマヤミイロオニグモであることを確認しえた. 有田 (1963: 鳥取市猪子), 恩藤・江原 (1974: 三滝溪, 佐治村北谷) で扱われた「ヤミイロオニグモ」の標本は, 現在, 再確認できないため, ヤミイロオニグモの記録からは削除しておきたい.

175. *Araneus ejusmodi* (Bösenberg & Strand, 1906) ヌサオニグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
176. *Araneus ishizawai* Kishida, 1928 イシサワオニグモ. 鳥取市: 安蔵安蔵溪谷 ca. 450m (1♀, 2004-9-27, NT); 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963); 河原町三滝溪 (有田, 1969; 県博, 1984; 鶴崎ら, 2003). 大山 (景山, 1966).
177. *Araneus macacus* Uyemura, 1961 ヤエンオニグモ. 【既】鳥取市鹿野町乙亥正 (長大, 2003).
178. *Araneus mitificus* (Simon, 1886) ビジョオニグモ. 智頭町芦津倉谷 (1♀, 2003-9-17, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 三滝溪 (有田 1969; 鶴崎ら, 2003).
179. *Araneus nojimai* Tanikawa, 2001 マメオニグモ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
180. *Araneus ogatai* Tanikawa, 2001 オガタオニグモ. 【既】大山町豊房 (Tanikawa, 2001).
181. *Araneus pentagrammicus* (Karsch, 1879) アオオニグモ. 智頭町那岐山西仙コース避難小屋付近 920 m (1♀ 亜成体, 2004-6-5, NT). 江府町毛無山登山口 (1♂, 1999-7-13, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 三滝溪 (鶴崎ら, 2003). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
182. *Araneus rotundicornis* Yaginuma, 1972 マルコブオニグモ (= コブオニグモ). 鳥取市佐治村三国山三国山林道 810m (1♀, 2002-6-10, NT: 谷川明男氏同定) 【既】大山 (有田, 1970).
183. *Araneus semilunaris* (Karsch, 1879) マルツメオニグモ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
184. *Araneus seminiger* (L. Koch, 1878) コケオニグモ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
185. *Araneus tsurusakii* Tanikawa, 2001 カラオニグモ. 【既】鳥取市: 佐治村尾際 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
186. *Araneus uyemurai* Yaginuma, 1960 ヤマオニグモ. 智頭町那岐山西仙コース避難小屋付近 920m (1♀ 亜成体, 2004-6-5, NT). 【既】鳥取市河原町三滝溪 (鶴崎ら, 2003).

187. *Araneus variegatus* Yaginuma, 1960 ニシキオニグモ. 鳥取市安蔵溪谷 (1♀, 2008-8-26, NT). 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市三滝溪 (有田, 1969).
188. *Araneus ventricosus* (L. Koch, 1878) オニグモ. 三朝町馬場の滝 (1♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (有田, 1970).
189. *Araneus viridiventris* Yaginuma, 1969 ハラビロミドリオニグモ. 【既】鳥取市吉岡温泉 (長大, 2003).
190. *Araniella displicata* (Hentz, 1847) トガリハナオニグモ. 【既】日南町新屋 (小川, 2007).
191. *Araniella yaginumai* Tanikawa, 1995 ムツボシオニグモ. 鳥取市: 桂見出合いの森 (1幼, 1999-4-21, 足達); 樗谷公園 (1♀, 1999-6-3, 足達). 若桜町氷ノ山 (2♀, 1999-6-5, 足達). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 安蔵溪谷. 河原町; 三滝溪 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (有田, 1970). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
192. *Argiope amoena* L. Koch, 1878 コガネグモ. 鳥取市: 久松山 (1♀, 1999-5-20, 足達); 桂見出合いの森 (1幼, 1♀, 1999-7-5, 足達); 湖山神社 (1♂, 1999-6-23, 足達); 大畑天日名鳥命神社 (1♀, 2004-8-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
193. *Argiope boesenbergi* Levi, 1983 チュウガタコガネグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 出合いの森, 吉岡温泉町 (長大, 2003).
194. *Argiope bruennichii* (Scopoli, 1772) ナガコガネグモ. 鳥取市: 桂見 (1♂, 2000-7-23, NT); 桂見出合いの森 (2幼, 1999-7-5, 足達). 智頭町湯屋 (2♂1♀1幼, 2005-8-3, NT). 若桜町氷ノ山春米 (1♂1♀, 2007-9-1, 足達). 三朝町: 坂戸 (1♀, 1999-9-9, NT); 小河内 (1♀, 1999-9-9, NT); 福田福田橋 (2♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 河原町三滝溪 (1♀, 2001-9-18, NT); 三滝溪 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
195. *Argiope minuta* Karsch, 1879 コガタコガネグモ. 三朝町: 馬場の滝 (1♀, 1999-9-3, NT); 福田 (1♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (景山, 1966).
196. *Chorizopes nipponicus* Yaginuma, 1963 ヤマトカナエグモ. 鳥取市: 樗谿 (1♂1♀, 15-V-1987, NT); 湖山町鳥取大学構内 (1♀垂成体, 2007-5-9, NTら). 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963).
197. *Cyclosa alba* Tanikawa, 1992 シロゴミグモ*. 鳥取市湖山町南鳥取大学構内 (1♀, 2007-5-9, 鶴崎ら).
198. *Cyclosa argenteoalba* Bösenberg & Strand, 1906 ギンメッキゴミグモ. 鳥取市: 湯所平和塔 (2幼, 1999-4-27; 1♀, 1999-5-6, 足達); 雲山面影山 (4幼, 1999-7-7, 足達); 樗谷公園 (1♀, 1999-6-3, 足達); 久松山 (1♀, 1999-5-20, 足達); 布勢日吉神社 (1幼, 1999-5-6; 1♂幼, 1999-5-11, 足達); 桂見出合いの森 (19幼, 1999-4-21; 7♂2♀4幼, 1999-5-7; 3♀, 1999-5-14; 3♀, 1999-5-26, 足達); 湖山池青島 (2幼, 1999-4-22, 足達); 湖山町湖山神社 (1♀, 1999-5-13, 足達). 若桜町氷ノ山 (1♀, 1999-6-5, 足達). 三朝町坂戸 (1幼, 1999-9-9, NT). 倉吉市打吹山 (1♀, 1999-5-16, 足達). 赤碕町船上山 (1幼, 1999-5-2, 足達). 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008); 用瀬町 (Tanikawa, 1992); 河原町三滝溪; 佐治村山王滝 (鶴崎ら, 2003).
199. *Cyclosa atrata* Bösenberg & Strand, 1906 カラスゴミグモ. 三朝町下谷橋 (1♀, 1999-9-3, NT). 赤碕町船上山登山口 (1♀, 27-VIII-1987, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963); 千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町大江 (県博, 1984). 大山町 (Tanikawa, 1992).
200. *Cyclosa kumadai* Tanikawa, 1992 クマダギンナガゴミグモ*. 鳥取市河原町三滝溪 (1♀, 1987-6-7, NT). 備考: 同一標本が *Cyclosa ginnaga* Yaginuma, 1959 ギンナガゴミグモとして記録されているが (鶴崎ら, 2003), 本種の誤同定であることを確認した. 佐治村北谷からのギンナガゴミグモの記録 (恩藤・江原, 1974) も同様に本種であった可能性が高い.
201. *Cyclosa japonica* Bösenberg & Strand, 1906 ヤマトゴミグモ. 【既】鳥取市久松山 (県博, 1984).
202. *Cyclosa monticola* Bösenberg & Strand, 1906 ヤマゴミグモ. 鳥取市樗谿 (2♀, 4-VI-1987, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 出合いの森, 下坂本, 青谷 (長大, 2003).
203. *Cyclosa octotuberculata* Karsch, 1879 ゴミグモ. 鳥取市: 樗谿 (1♀, 1999-6-3, 足達); 久松山 (1幼, 1999-4-15, 足達); 湯所平和塔 (3幼, 1999-5-6, 足達); 鳥取砂丘子供の国 (1♀幼, 2000-5-4, NT); 桂見出合いの森 (1幼, 1999-4-21; 1幼, 1999-5-7; 1♂, 1999-5-14; 2♀1♂幼, 1999-5-26, 足達); 布勢日吉神社 (1幼, 1999-5-6; 1♂幼, 1999-5-11, 足達); 布勢運動公園 (8幼, 1999-4-21, 足達); 湖山池青島 (8幼, 1999-4-22, 足達); 湖山町湖山神社 (2幼, 1999-4-13; 11幼, 1999-4-22; 1♂, 1999-5-13; ♀, 1999-6-23, 足達); 湖山町湖山池沿い (1幼, 1999-4-27, 足達); 湖山町鳥取大学構内 (1幼, 1999-4-9, 足達; 2♂2♀6幼, 2007-5-9, NTら); 三津三津神社 (1幼, 1999-4-27, 足達). 岩美町大羽尾 (1♀, 31-VII-1987, NT). 倉吉市打吹山 (1♂, 1999-5-16, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973). 三滝溪 (有田, 1969); 千代川 (ウエスコ, 2008).

204. *Cyclosa omonaga* Tanikawa, 1992 シマゴミグモ【既】鳥取県(福本, 1956).
205. *Cyclosa onoi* Tanikawa, 1992 オノゴミグモ【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008).
206. *Cyclosa sedeculata* Karsch, 1879 ヨツデゴミグモ. 鳥取市: 栲谿(2♀, 30-VI-1987, NT & 細田みどり; 1幼, 1999-4-17, 足達); 桂見出合いの森(1幼, 1999-4-21; 2♀, 1999-5-7; 1♀, 1999-5-14; 2♀, 1999-5-26; 2♀, 1999-5-31, 足達); 布勢日吉神社(1♀, 1999-5-11, 足達); 湖山池青島(8幼, 1999-4-22, 足達); 三津三津神社(1幼, 1999-4-27, 足達); 良田椿神社(1幼, 1999-4-27, 足達). 倉吉市打吹山(1♂1♀, 1999-5-16, 足達).【既】鳥取県(福本, 1956).鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山(県博, 1984); 河原町三滝溪(鶴崎ら, 2003).
207. *Cyclosa vallata* (Keysening, 1886) マルゴミグモ. 鳥取市: 湖山町海岸(2♀, 1999-5-20, 足達), 鳥取大学構内(1♀, 2007-5-9, NTら).【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963; 県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008); 鳥取砂丘(引地, 1973; Tanikawa, 1992).
208. *Cyrtarachne bufo* (Bösenberg & Strand, 1906) トリノフンダマシ. 鳥取市桂見(1幼, 2000-7-23, NT).【既】鳥取市猪子(有田, 1963; 県博, 1984).
209. *Cyrtarachne inaequalis* Thorell, 1895 オオトリノフンダマシ.【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山(県博, 1984).
210. *Cyrtarachne nagasakiensis* Strand, 1918 (= *Cyrtarachne nigra* Yaginuma, 1960) シロオビトリノフンダマシ(= クロトリノフンダマシ). 鳥取市桂見(1♀, 2000-7-23, NT; 1♀, 2008-8-26, NT).【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963; 県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008).
211. *Cyrtarachne yunoharuensis* Strand, 1918 アカイロトリノフンダマシ. 鳥取市: 岩倉稲葉山(4♀, 1987-8-6, 細田みどり); 桂見(1♀, 2000-7-23, NT; 1♀, 2004-8-15, NT).【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963); 西町(県博, 1984).
212. *Eriophora sachalinensis* (S. Saito, 1934) カラフトオニグモ. 若桜町氷ノ山(1♀, 1999-6-5, 足達). 智頭町副ヶ滝(1♀, 2005-8-3, NTら).【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市佐治町北谷(鶴崎ら, 2003).若桜町氷ノ山(県博, 1984); 大山(景山, 1966; 有田, 1970). 日南町新屋(小川, 2007).
213. *Eriophora astridae* (Strand, 1917) サガオニグモ. 鳥取市布勢日吉神社(1♂, 1999-5-6, 足達).【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取県(福本, 1956). 鳥取市猪子(有田, 1963). 若桜町氷ノ山. 大山町大山(県博, 1984).
214. *Eriovixia pseudocentredes* (Bösenberg & Strand, 1906) トガリオニグモ.【既】鳥取市久松山(県博, 1984).
215. *Gasteracantha kuhlii* C. L. Koch, 1838 トゲグモ. 鳥取市佐治村余戸三原台登山口(1♀, 2005-8-6, NT). 中山町香取甫登神社(1♀, 1987-8-27, NT).【既】鳥取県(福本, 1956).鳥取市: 猪子(有田, 1963; 県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008). 大山(景山, 1966).
216. *Gibbaranea abscissa* (Karsch, 1879) キザハシオニグモ.【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 千代川(ウエスコ, 2008). 船岡町大江(県博, 1984).
217. *Hypsosinga pygmaea* (Sundevall, 1831) ヨツボシショウジョウグモ.【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008). 日南町新屋(小川, 2007).
218. *Hypsosinga sanguinea* (C. Koch, 1844) シロスジショウジョウグモ. 三朝町下谷橋(1幼, 1999-9-3, NT).【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008).
219. *Larinia argiopiformis* Bösenberg & Strand, 1906 コガネグモダマシ. 鳥取市: 湯所平和塔(1幼, 1999-5-6, 足達); 浜坂新浜坂橋下流(1♂, 2006-10-25, NT).【既】鳥取県(福本, 1956).鳥取市: 猪子(有田, 1963; 県博, 1984; Tanikawa, 1989); 千代川(ウエスコ, 2008).
220. *Mangora herbeoides* (Bösenberg & Strand, 1906) ゴマジロオニグモ.【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 三滝溪(有田, 1969); 千代川(ウエスコ, 2008).
221. *Neoscona adianta* (Walckenaer, 1802) ドヨウオニグモ(ヒメオニグモ). 鳥取市: 桂見出合いの森(1♀, 1999-6-21, 足達); 国安千代川右岸国安堤(11♂3♀11幼, 2006-6-20, NTら; 1♀, 2006-7-4, NT). 三朝町下谷橋(1幼♂, 1999-9-3, NT). 溝口町毛無山登山口(1♂, 1999-7-13, 足達).【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963), 久松山; 佐治村尾際(県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008); 佐治村北谷(恩藤・江原 1974). 江府町毛無山(鶴崎・岡田, 2000). 大山(景山1966; 有田, 1970).
222. *Neoscona mellottei* (Simon, 1895) ワキグロサツマノミダマシ.【既】鳥取県(福本, 1956).鳥取市: 久松山(県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008); 河原町三滝溪(鶴崎ら, 2003).
223. *Neoscona nautica* (L. Koch, 1875) イエオニグモ. 鳥取市: 八千代橋(1♀垂成体, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 千代大橋(3♂, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 湖山池湖山川流出口の橋(1♀1幼, 2006-10-3, NT).【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山(県博, 1984).
224. *Neoscona punctigera* (Doleschall, 1857) コゲチャオニグモ. 三朝町下谷橋(1♀, 1999-9-3, NT).【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963; 県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008); 鳥取県(Tanikawa, 1998).
225. *Neoscona scylla* (Karsch, 1879) ヤマシロオニグモ.【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山; 生山(県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008). 大山

- (有田, 1970; 県博, 1984). 日南町新屋 (小川, 2007).
226. *Neoscona scylloides* (Bösenberg & Strand, 1906) サツマノミダマシ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山, 船岡町大江 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974). 大山 (有田, 1970). 鳥取県 (Tanikawa, 1998).
227. *Neoscona subpullata* (Bösenberg & Strand, 1906) ヘリジロオニグモ. 岩美町大羽尾 (1♀幼体, 31-VII-1987, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市出合いの森 (長大, 2003).
228. *Ordgarius hobsoni* (O. Pickard-Cambridge, 1877) マメイタイセキグモ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
229. *Paraplectana sakaguchii* Uyemura, 1938 サカグチトリノフンダマシ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963); 船岡町大江 (県博, 1984).
230. *Pronoides brunneus* Schenkel, 1936 コオニグモモドキ. 大山町大山川床大休峠登山口 (1♀, 1987-8-27, NT). 【既】鳥取市猪子 (県博, 1984). 大山 (景山, 1966). 日南町新屋 (小川, 2007).
231. *Yaginumia sia* (Strand, 1906) ズグロオニグモ. 鳥取市湖山池湖山川流出口の橋 (4♀1幼, 2006-10-3, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963), 久松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
- Lycosidae コモリグモ科
232. *Allohogna ishikariana* (S. Saito, 1934) (= *Lycosa ishikariana* (S. Saito, 1934)) イソコモリグモ. 鳥取市: 鳥取砂丘 (1♀, 1986-5-13; 1♀, 有田; 1♀, 1990-9-23, NT, 1991-8-30, 有田); 中ノ茶屋海岸 (1♀, 1999-8-10, 藤井佑). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取砂丘 (猪股・石井, 1934; 生駒, 1955; 県博, 1984; 福本, 1955, 1989; Ono & Shinkai, 1988; Tanaka, 1990; 有田, 1993; 鶴崎, 2002). 鳥取砂丘以外の記録については, 福本 (1955), 福本 (1989), Suzuki et al. (2006) を参照. 【備考】現在確認されている鳥取県内の生息地は鳥取砂丘 (砂丘海水浴場付近) から米子市皆生海岸までの砂浜海浜. 鳥取砂丘より東では有田 (1993) が岩美町東浜を生息地を含めているが, 現在, 東浜ではその後の複数回の探索でも確認できていない (Suzuki et al., 2006; 鶴崎ら未発表). 長い間, 米子市皆生海岸が本種の日本海側の分布南西限だったが, 最近, 島根県の砂浜海岸数カ所からも確認された. 現在の分布南西限は益田市戸田海岸 (Suzuki et al., 2006). 環境省レッドリスト (2006), 鳥取県RDB (2002) とともに, 絶滅危惧II類 (VU).
233. *Alopecosa moriutii* Tanaka, 1985 ハタチコモリグモ. 【既】鳥取市千代川 (2007) (ウエスコ, 2008).
234. *Alopecosa virgata* (Kishida, 1909) スジブトコモリグモ. 【既】大山 (Tanaka, 1992).
235. *Arctosa depectinata* (Bösenberg & Strand, 1906) カガリビコモリグモ. 【既】米子市皆生海岸 (田中, 1999).
236. *Arctosa ebicha* Yaginuma, 1960 エビチャコモリグモ. 鳥取市: 千代橋 (2♀, 1992-5-17, NT); 和奈見 (1♂, 1992-5-17, NT); 国安堤 (1♀, 2006-5-2, NT); 用瀬町美成 (1♀, 2005-11-8, NT). 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 日南町新屋 (小川, 2007).
237. *Arctosa hikosanensis* Tanaka, 1985 ヒコサンコモリグモ. 【既】倉吉市: 鴨河内; 関金町佐野 (田中, 1999).
238. *Arctosa ipsa* (Karsch, 1879) ヒノマルコモリグモ. 鹿野町鷲峰山 (1♂, 1992-5-2, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
239. *Arctosa stigmosa* (Thorell, 1875) クロココモリグモ 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
240. *Lycosa coelestis* L. Koch, 1878, ハラクロコモリグモ. 鳥取市浜坂十六本松 (1♀, 1992-5-17, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963; Tanaka, 1990); 久松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (田中, 1939; 有田, 1970).
241. *Lycosa suzukii* Yaginuma, 1973 スズキコモリグモ. 【既】鳥取市生山, 佐治村尾際 (県博, 1984).
242. *Pardosa agraria* Tanaka, 1985 イナダハリゲコモリグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (Tanaka, 1985, 1993); 千代川 (ウエスコ, 2008).
243. *Pardosa astrigera* L. Koch, 1878 ウヅキコモリグモ. 鳥取市: 千代橋 (1♀, 1992-5-17, NT); 国安堤 (1♂1♀, 2006-4-18, NT); 和奈見橋 (2♂1♀, 2005-8-8, NTら). 智頭町毛谷 (2♀, 2005-5-5, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山, 久松山 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 三滝溪 (恩藤・江原, 1974); 千代川 (ウエスコ, 2008). 日南町新屋 (小川, 2007).
244. *Pardosa brevivulva* Tanaka, 1975 ヤマハリゲコモリグモ. 【既】大山 (Tanaka, 1993). 日南町新屋 (小川, 2007).
245. *Pardosa isago* Tanaka, 1977 イサゴコモリグモ. 鳥取市千代大橋 (4♀, 1992-5-17, NT). 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
246. *Pardosa laura* Karsch, 1879 ハリゲコモリグモ. 鳥取市: 桂見出合いの森 (1幼, 1999-5-14; 1♂, 1999-6-21, 足達); 布勢日吉神社 (1♀, 1999-5-11, 足達); 智頭町芦津倉谷湿原 (1♀, 2003-6-14, NT). 三朝町坂戸 (1♀, 1999-9-9, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子, 若桜町氷ノ山 (県博, 1984); 佐治村北谷 (鶴崎ら, 2003); 鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 八頭町船岡町大江, 大山 (有田, 1970). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000). 日南町新屋 (小川, 2007).

247. *Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802) エゾコモリグモ.
【既】鳥取砂丘(引地, 1973).
248. *Pardosa pseudoannulata* (Bösenberg & Strand, 1906) キク
ヅキコモリグモ. 鳥取市河原町和奈見橋(1♀, 2005-8-8,
NTら)【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市猪子(有田,
1963; 県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008).
249. *Pardosa yaginumai* Tanaka, 1977 キシベコモリグモ
【既】鳥取市千代川(1998)(ウエスコ, 2008). 大山
(Tanaka, 1993).
250. *Pirata clercki* (Bösenberg & Strand, 1906) クラーコ
モリグモ. 若桜町氷ノ山(1♂, 1999-6-5, 足達); 日野町荒
神原(1♀, 2001-10-1, NT). 【既】鳥取市佐治村山王滝
(鶴崎ら, 2003). 大山(Tanaka, 1988). 日南町新屋(小川,
2007).
251. *Pirata meridionalis* Tanaka, 1974 ミナミコモリグモ
【既】鳥取市千代川(1992)(ウエスコ, 2008).
252. *Pirata piraticus* (Clerck, 1757) カイゾクコモリグモ.
【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山; 生山. 船岡町大
江(県博, 1984).
253. *Pirata piratoides* (Bösenberg & Strand, 1906) イモコモリ
グモ. 【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008).
254. *Pirata procurvus* (Bösenberg & Strand, 1906) チビコモ
リグモ. 【既】智頭町沖ノ山(県博, 1984). 大山(景山,
1966). 【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008); 佐治村北
谷(恩藤・江原, 1974).
255. *Pirata subpiraticus* (Bösenberg & Strand, 1906) キバラコ
モリグモ. 鳥取市和奈見(1♂, 2006-6-6, NT). 【既】鳥取
市千代川(ウエスコ, 2008).
256. *Pirata yaginumai* Tanaka, 1974 ナミコモリグモ【既】
鳥取市千代川(ウエスコ, 2008).
257. *Trochosa ruricola* (DeGeer, 1778) アライトコモリグモ.
鳥取市桂見出合いの森(1幼, 1999-5-26, 足達). 倉吉市大
塚天神川左岸(大塚橋~天神橋間)(1♂, 2006-10-27, NT).
【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008). 日南町新屋(小
川, 2007).
258. *Trochosa terricola* Thorell, 1856 カラフトコモリグモ
【既】鳥取市猪子(有田, 1963).

Family Trechaleidae サヤアシグモ科

259. *Shinobius orientalis* (Yaginuma, 1967) シノビグモ. 若桜
町諸鹿陣鉢山北西斜面(1♂, 1999-4-7, NT), 智頭町駒
沖ノ山林道(3幼, 2005-8-3, NTら). 【既】鳥取市佐治町
三国山(鶴崎ら, 2003).

Family Pisauridae キシダグモ科

260. *Dolomedes saganus* Bösenberg & Strand, 1906 (= *Dolomedes pallitarsis* Dönitz & Strand, 1906) スジブト
ハシリグモ(=スジアカハシリグモ). 【既】鳥取市猪
子(有田, 1963; 県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008). 日
南町新屋(小川, 2007).
261. *Dolomedes raptor* Bösenberg & Strand, 1906 アオグロ
ハシリグモ. 若桜町諸鹿陣鉢山北西斜面(2垂成体♀,
1999-4-7, NT). 【既】鳥取市猪子(有田, 1963). 大山町大
山(県博, 1984).
262. *Dolomedes sulfureus* L. Koch, 1878 イオウイロハシリ
グモ. 鳥取市桂見(1♂, 2000-7-23, NT). 智頭町芦津倉谷
湿原(2幼, 2003-6-14, NT). 智頭町副ヶ滝(1♀, 2005-8-3,
NTら). 三朝町: 小河内(1♀, 1999-9-9, NT); 福田下谷橋
(1♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市:
猪子(有田, 1963); 久松山(県博, 1984); 千代川(ウエス
コ, 2008). 三朝町(Tanikawa & Miyashita, 2008). 日南町新
屋(小川, 2007).
263. *Perenethis fascigera* (Bösenberg & Strand, 1906) ハヤテ
グモ. 【既】鳥取県(福本, 1956).
264. *Pisaura lama* Bösenberg & Strand, 1906 アズマキシ
ダグモ. 鳥取市: 湯所平和塔(1♂, 1999-4-27, 足達; 1
♂, 1999-5-6, 足達); 桂見出合いの森(1♀, 1999-5-14, 足
達); 湖山町鳥取大学構内(1♂3♀, 2007-5-9, NTら); 国
安国安堤(1♂1♀, 2002-6-7, NT; 1♂, 2006-5-30, NT; 3
♀, 2006-5-16, NT; 1♀, 2006-6-20, NTら); 和奈見(1
♂, 2006-6-6, NT); 用瀬町美成余井(1♂, 2006-6-6, NT).
【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田, 1963);
久松山; 生山, 鷲峰山(県博, 1984); 千代川(ウエスコ,
2008); 河原町三滝溪(鶴崎ら, 2003). 大山(有田, 1970).
江府町毛無山(鶴崎・岡田, 2000).

Family Oxyopidae ササグモ科

265. *Oxyopes koreanus* Paik, 1969 コウライササグモ. 【既】
智頭町那岐山(新海・八木沼 1977).
266. *Oxyopes sertatus* L. Koch, 1878 ササグモ. 鳥取市湖
山町鳥取大学構内(1♀, 1999-6-28, 足達; 6幼, 2007-5-9,
NTら). 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市: 猪子(有田,
1963; 県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008).

Family Zoropsidae スオウグモ科

267. *Takeoa nishimurai* (Yaginuma, 1963) ムロズミノレグモ.
【既】鳥取市久松山(県博, 1984).

Family Ctenidae シボグモ科

266. *Anahita fauna* Karsch, 1879 シボグモ. 鳥取市国安堤 (1♀, 2006-6-20, NT). 三朝町福田 (1幼, 1999-1-10, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 湖山池青島, 賀露砂丘, 湖山天神山, 石破山, 徳尾, 馬場倉田八幡宮, 樗谿, 久松山, 浜坂神社 (鶴崎, 1999); 千代川 (ウエスコ, 2008).

Family Agelenidae タナグモ科

267. *Agelena labyrinthica* (Clerck, 1757) イナズマクサグモ. 【既】鳥取県 (八木沼, 1967).
268. *Agelena silvatica* Oligier, 1983 (= *Agelena limbata* Thorell, 1897) クサグモ. 鳥取市: 大畑天日名鳥命神社 (1幼, 1999-5-11, 足達); 徳尾大野見宿禰命神社 (1幼, 1999-5-13, 足達); 布勢日吉神社 (1幼, 1999-5-11, 足達); 湖山町鳥取大学構内 (1幼, 1999-5-13, 足達; 1♀, 1999-9-7, 足達); 鹿野町鷲峰神社 (1♀, 1987-9-20, NT). 倉吉市打吹山 (2幼, 1999-5-16, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 河原町三滝溪 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山町大山 (県博, 1984). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
269. *Allagelena opulenta* (L. Koch, 1878) (= *Agelena opulenta* L. Koch, 1878) コクサグモ. 鳥取市湖山町鳥取大学構内 (1♀, 1999-9-7, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 湖山神社 (鶴崎, 1999). 三滝溪 (有田, 1974); 千代川 (ウエスコ, 2008).
270. *Tegenaria domestica* (Clerck, 1758) イエタナグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956).

Family Cybaeidae ナミハグモ科

271. *Cybaeus daisen* Ihara & Nojima, 2004 ダイセンナミハグモ 【既】鳥取市: 岩坪; 湖山初覧山, 足山, 鳥取大学構内, 天神山; 樗谿; 国府町玉銚; 佐治町中 (Ihara & Nojima, 2004); 千代川 (ウエスコ, 2008). 八頭町郡家町花原 倉吉市鴨河内, 三朝町三仏寺. 琴浦町船上山 (Ihara & Nojima, 2004). 大山町: 豊房; 長田; 大山; 大山三ノ沢 (Ihara & Nojima, 2004). 【備考】タイプ産地: 大山 (Ihara & Nojima, 2004). 鳥取県以外では岡山県から記録される (新海ら, 2008).
272. *Cybaeus jinsekiensis* Ihara, 2006 ジンセキナミハグモ. 【既】米子市尾高, 大山町長田, 日南町: 上萩山, 神戸上 (Ihara, 2006).
273. *Cybaeus kiuchii* Komatsu, 1965, キウチナミハグモ. 【既】鳥取市河原町小河内; 佐治村尾際 (鶴崎ら, 2003).
274. *Cybaeus mimasaka* Ihara & Nojima, 2005. ミマサカナミ

ハグモ. 【既】鳥取市河原町北村, 北村権現神社, 三滝溪, 加瀬木, 尾際, 鹿野町河内. 智頭町芦津溪谷 (Ihara & Nojima, 2004). 三朝町小鹿溪 【備考】智頭町芦津溪谷がタイプ産地. 鳥取県外では岡山県と兵庫県から知られる (Ihara & Nojima, 2004).

275. *Cybaeus nipponicus* (Uyemura, 1938) カチドキナミハグモ. 智頭町: 芦津溪 (1♂, 2♀, 1990-10-14, YI; 2♂, 1990-10-14, 野嶋宏一); 右手峠 (1♀, 1989-11-26, NT). 鳥取市国府町殿 (1♀, 1991-10-21, YI). 三朝町: 三徳山三仏寺 (2♂, 1♀, 1990-9-15, YI); 小鹿溪谷 (1♀, 1990-9-16, YI). 赤碓町船上山: (1♀, 1990-9-16, YI); 鱒返し橋 (1♀, 1990-9-16, YI). 中山町うぐいす橋 (1♀, 1990-7-18, YI). 大山町川床 (1♂, 1990-9-16, YI). 溝口町毛無山頂上 (1♂, 1999-7-13, 足達). 日南町奥萩 (1♀, 1991-9-23, YI). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 河原町北村権現神社; 佐治村山王滝; 尾際 (鶴崎ら, 2003). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
276. *Cybaeus nojimai* Ihara, 1993 ノジマコガタナミハグモ. 鳥取市: 御熊御熊神社 (1♂3♀, 1994-1-6, NT); 鹿野町河内 (1♀, 1994-1-6, NT). 大山町大山: 横手道北入口 (1♂1♀, 1994-4-16, NT); 三ノ沢 (1♂1♀, 1994-10-9, YI); 三ノ沢 (3♀, 1994-10-9, 野嶋宏一), 二ノ沢 (5♀, 1994-4-16, NT). 【既】鳥取市: 百谷百谷神社, 河原町北村権現神社; 用瀬町赤波土居 (Ihara, 1993).
277. *Cybaeus tottoriensis* Ihara, 1994 イナバナミハグモ. 【既】智頭町芦津溪 (タイプ産地); 鳥取市樗谿; 倉吉市打吹山 (Ihara, 1994); 樗谿 (鶴崎, 1999).
278. *Cybaeus tsurusakii* Ihara, 1993, イズモコガタナミハグモ. 大山町大山三ノ沢 (1♂2♀, 1994-10-9, YI; 1♀, 1994-10-9, 野嶋宏一).
279. *Cybaeus yoshiakii* Yaginuma, 1968, ヨシアキナミハグモ. 智頭町芦津溪 (1♂2♀, 1990-10-14, YI; 2♀, 1990-10-14, 野嶋宏一). 用瀬町赤波土居 (1♂1♀, 1991-10-23, YI). 大山町大山三ノ沢 (1♀, 1994-10-9, 野嶋宏一; 2♂1♀, 1994-10-9, YI). 【既】鳥取市: 河原町北村; 佐治村尾際 (鶴崎ら, 2003). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).

Family Desidae ウシオグモ科

280. *Badumna insignis* (L. Koch, 1872) クロガケジグモ. 【既】鳥取市: 湖山町出津水橋; 鳥取大学附属小学校; 桂見桂見台 (鶴崎, 2007).
281. *Paratheuma shirahamaensis* (Oi, 1960) イソタナグモ. 【既】湯梨浜町泊村泊 (八木沼, 1990).

Family Hahniidae ハタケグモ科

282. *Hahnia corticicola* Bösenberg & Strand, 1906 ハタケグモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山; 千代橋(ウエスコ, 2008). 赤碕町船上山(県博, 1984). 大山(有田, 1970).
283. *Hahnia pinicola* Arita, 1978 アカマツハタケグモ。若桜町氷ノ山(15♂7♀, 1980-10-10, 有田). 鳥取市: 猪子(2♂, 1976-2-8, 有田); 生山(津ノ井)(2♀, 1981-5-22, 有田). 【既】鳥取市: 猪子(タイプ産地), 古郡家(Arita 1978; 県博, 1984). 【備考】タイプ産地は鳥取猪子。鳥取県以外では現在までに兵庫県と三重県から記録されているのみ(新海ら, 2008)。
284. *Neoantistea quelpartensis* Paik, 1958 ヤマハタケグモ。福部村坂谷神社(5♀1幼, 1992-3-14, NT). 【既】鳥取市: 猪子(Arita 1978; 県博, 1984); 湖山神社(鶴崎, 1999).

Family Dictynidae ハグモ科

285. *Brommella punctosparsa* (Oi, 1957) ナシジカレハグモ。【既】鳥取市猪子(有田, 1963; 県博, 1984).
286. *Cicurina japonica* (Simon, 1886) コタナグモ。【既】鳥取市: 猪子(県博, 1984); 賀露砂丘(鶴崎 1999).
287. *Dictyna felis* Bösenberg & Strand, 1906 ネコハグモ。【既】鳥取市千代川(ウエスコ, 2008).
288. *Dictyna foliicola* Bösenberg & Strand, 1906 ヒナハグモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 千代川(ウエスコ, 2008); 佐治村三国山三国山林道(鶴崎ら, 2003). 大山(有田, 1970).
289. *Lathys annulata* Bösenberg & Strand, 1906 カレハグモ。【既】鳥取市猪子(有田, 1963; 県博, 1984).
290. *Lathys dihamata* Paik, 1979*. 鳥取市湖山町南鳥取大学構内(1♂, 2008-5-14, NTら). 【備考】日本国内初記録である。事務局前のクロマツ植栽の芝生(ササ群落をとまなう)のササの根元付近のリターをシフターでふるい、それをツルグレン装置でかけて得られた。和名なし。Paik (1979)および Namkung (2001)により本種と同定した。詳細は別に報告予定。
291. *Lathys sexoculata* Seo & Sohn, 1984 ムツメカレハグモ。鳥取市国安千代川右岸国安堤(1♂, 2006-6-20, NTら). 【既】鳥取市(Ono & Ogata, 1993).

Family Amaurobiidae ガケジグモ科

292. *Coelotes antri* (Komatsu, 1961) ホラズミヤチグモ。【既】鳥取市: 猪子; 久松山(県博, 1984); 佐治村北谷(恩藤・江原, 1974); 尾際(有田, 1987). 八頭町船岡町大江。若桜町中原(有田, 1987).
293. *Coelotes decolor* Nishikawa, 1973 ウスイロヤチグ

モ。【既】鳥取市(西川, 1973). 鳥取市: 千代川(ウエスコ, 2008); 久松山; 猪子; 佐治村尾際。八頭町船岡町大江。大山町大山(有田, 1987).

294. *Coelotes eharai* Arita, 1976 ダイセンヤチグモ。三朝町小鹿溪(1♂, 1995-10-22, 有田). 伯耆町大山: 三ノ沢(4♂6♀, 1994-10-9, 野嶋宏一; 4♂9♀, 1994-10-9, YI); 二ノ沢(2♀, 2008-10-14, NT). 【既】大山町大山(タイプ産地). 船岡町大江(Arita, 1976; 県博, 1984). 氷ノ山, 大山(井原, 2002) 【備考】鳥取県RDB(2002)でその他の重要種(OT)(井原, 2002).
295. *Coelotes exitialis* L. Koch, 1878 クロヤチグモ(=ヤチグモ)。鳥取市岩坪(1♀, 1991-10-23, YI). 国府町雨滝(1♂1♀, 2007-11-15, NT). 智頭町副ヶ滝(1♀2005-8-3, NTら). 三朝町小鹿溪谷(1♀, 1990-9-16, YI). 赤碕町船上山鱒返し橋(1♀, 1990-9-16, YI). 中山町うぐいす橋(1♀, 1990-7-18, YI). 大山町: 川床(1♀, 1990-7-18, YI); 川床(1♂1♀, 1990-9-16, YI); 三ノ沢(1♂6♀, 1994-10-9, YI); 三ノ沢(1♀, 1994-10-9, 野嶋宏一); 豊房(1♂, 1994-10-9, 野嶋宏一); 豊房(1♂1♀, 1994-10-9, 野嶋宏一); 豊房(1♂2♀, 1994-10-9, 野嶋宏一). 【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山(県博, 1984); 国府町捨石普含寺(西川, 1975); 河原町北村権現神社, 佐治村山王滝; 尾際(鶴崎ら, 2003), 辰己峠(西川, 1975). 若桜町氷ノ山, 船岡町大江(県博, 1984). 倉吉市関金町山守~清水谷(西川, 1975). 江府町毛無山(鶴崎・岡田, 2000). 日南町新屋(小川, 2007).
296. *Coelotes hiratsukai* Arita, 1976 コヤチグモ。三朝町小鹿溪谷(1♀, 1990-9-16, YI). 大山町川床(1♀, 1990-9-16, YI). 日南町新屋(2♂1♀, 1989-11-12, YI). 【既】鳥取市: 安蔵森林公園; 河原町三滝溪; 佐治村三国山林道(鶴崎ら, 2003). 八頭町船岡町大江。大山町大山(Arita, 1976; 県博, 1984; 有田, 1987). 江府町毛無山(鶴崎・岡田, 2000). 【備考】八頭町船岡町大江がタイプ産地。県外では、広島, 愛媛, 徳島, 熊本の各県から記録されている(新海ら, 2008).
297. *Coelotes inabaensis* Arita, 1974 イナバヤチグモ。【既】若桜町若桜中原(タイプ産地: Arita 1974; 県博, 1984); 扇ノ山, 氷ノ山(有田, 1987). 【備考】鳥取県以外では兵庫県と岡山県で記録されているのみ(新海ら, 2008).
298. *Coelotes personatus* Nishikawa, 1973 カメンヤチグモ。鳥取市鳥取砂丘(1♂, 1999-4-15, 足達). 日南町道後山湯河川上流の峠(1♀, 1988-4-25, NT). 【既】鳥取市: 猪子; 久松山(県博, 1984); 霊石山(西川, 1973); 佐治村三国山三国山林道(鶴崎ら, 2003). 智頭町上板井原(西川, 1973). 大山町大山(県博, 1984).
299. *Coelotes tarumii* Arita, 1976 ヒメヤチグモ。鳥取市国府町扇ノ山山頂南斜面ブナ林1300m(1♀, 2004-5-8, NT).

大山町大山大山寺850m (1♀, 2008-10-14, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (Arita 1976; 県博, 1984); 河原町北村権現神社 (鶴崎ら, 2003). 船岡町大江. 大山町大山 (Arita 1976; 県博, 1984). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000). 【備考】大山がタイプ産地。県外では岐阜, 三重, 大阪, 兵庫, 広島, 長崎, 熊本の各県から記録されている (新海ら, 2008).

300. *Coelotes yaginumai* Nishikawa, 1972 カミガタヤチグモ. 鳥取市: 岩坪 (1♂, 1991-10-23, YI); 樗谷 (1♀, 1991-11-22, NT); 樗谷 (1♂1♀, 1993-4-11, YI); 国安堤 (1♂1♀, 2006-4-18, NT). 倉吉市関金町金屋 (1♀, 1991-10-15, 野嶋宏一). 【既】鳥取市: 湖山天神山, 布勢山王山, 石破山, 徳尾, 樗谿, 浜坂 (県博, 1984); 河原町北村権現神社 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
301. *Iwogumoa insidiosa* (L. Koch, 1878) シモフリヤチグモ. 鳥取市桂見 (屋内) (1♂, 2006-12-4, NT; 1♂, 2008-2-19, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
302. *Iwogumoa interunus* (Nishikawa 1977) ヒメシモフリヤチグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (県博, 1984; 有田, 1987); 浜坂神社 (県博, 1984); 久松山; 古郡家 (有田, 1987); 千代川 (ウエスコ, 2008); 佐治村尾際. 八頭郡船岡町大江. 若桜町: 中原, 氷ノ山 (有田, 1987).
303. *Pireneitega luctuosa* L. Koch, 1878 メガネヤチグモ. 鳥取市: 東町県庁建物内 (1♀, 1987-5-5, NT); 桂見 (1♀, 2007-10-29, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 国府町拾石普含寺 (西川, 1977). 智頭町上板井原 (1977). 若桜町氷ノ山 (県博, 1984).
304. *Taira flavidorsalis* (Yaginuma 1964) (= *Amaurobius flavidorsalis* Yaginuma, 1964) セスジガケジグモ. 【既】鳥取市: 猪子. 三滝溪 (有田, 1974). 大山町大山 (県博, 1984; 有田, 1970).
305. *Tegeocoelotes corasides* (Bösenberg & Strand, 1906) ヤマヤチグモ. 鳥取市: 国府町雨滝 (1♂1♀, 2007-11-15, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 湖山天神山, 湖山神社, 石破山, 吉山 (県博, 1984); 安蔵溪谷; 佐治村三国山三国山林道 (鶴崎ら, 2003); 若桜町氷ノ山. 船岡町大江 (県博, 1984). 大山 (田中, 1939; 景山, 1966). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
306. *Tegeocoelotes michikoeae* (Nishikawa, 1977) ヒメヤマヤチグモ. 【既】江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).

Family Titanoecidae ヤマトガケジグモ科

307. *Nurscia albofasciata* (Strand 1907) (= *Titanoeca albofasciata* Strand 1907) ヤマトガケジグモ. 河原町和奈見千代川河原 (2幼, 1992-5-17, NT). 【既】鳥取市: 猪

子 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).

Family Miturgidae ツチフクログモ科

308. *Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer, 1802) アカスジコマチグモ. 【既】鳥取市千代川 (2003) (ウエスコ, 2008).
309. *Cheiracanthium eutittha* Bösenberg & Strand, 1906 アシナガコマチグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 古郡家; 船岡町大江 (県博, 1984).
310. *Cheiracanthium japonicum* Bösenberg & Strand, 1906 カバキコマチグモ. 岩美町唐川湿原 (1♀, 1994-7-17, NT); 若桜町氷ノ山春米 (1♀, 2007-7-31, 足達). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町大江 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (景山, 1966; 有田, 1970).
311. *Cheiracanthium lascivum* Karsch, 1879 ヤマトコマチグモ. 鳥取市: 千代橋 (1♂, 1992-5-17, NT); 国安堤 (1♂, 2006-6-20, NTら); 湖山池鳥大附属小学校前 (1♂8♀, 1987-6-14, NT). 【既】鳥取市: 生山; 古郡家 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
312. *Cheiracanthium unicum* Bösenberg & Strand, 1906 ヤサコマチグモ. 岩美町唐川湿原 (1♂, 1994-7-17, NT). 【既】鳥取市: 生山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).

Family Anyphaenidae イヅツグモ科

313. *Anyphaena ayshides* Yaginuma, 1958 ナガイヅツグモ. 【既】佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974). 大山町大山 (県博, 1984).
314. *Anyphaena pugil* Karsch, 1879 イヅツグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984).

Family Liocranidae ウエムラグモ科

315. *Itatsina praticola* (Bösenberg & Strand, 1906) イタチグモ. 鳥取市湖山町天神山 (2♀, 1992-2-18, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 湖山池青島, 賀露砂丘, 湖山鳥取大学構内, 湖山神社, 天神山, 石破山, 里仁, 馬場倉田八幡宮, 樗谿, 久松山, 浜坂 (鶴崎, 1999); 千代川 (ウエスコ, 2008).

Family Clubionidae フクログモ科

316. *Clubiona corrugata* Bösenberg & Strand, 1906 コフクログモ. 【既】鳥取市千代川 (1998) (ウエスコ, 2008).

317. *Clubiona diversa* O. Pickard-Cambridge, 1862 ミチノクフクログモ。【既】鳥取市猪子(県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008)。
318. *Clubiona japonica* L. Koch, 1878 ヤマトフクログモ。【既】鳥取県(福本, 1956)。鳥取市: 猪子; 古郡家(県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008)。
319. *Clubiona japonicola* Bösenberg & Strand, 1906 ハマキフクログモ。鳥取市: 千代橋(1♂3♀1幼, 1992-5-17, NT); 湖山池鳥大附属小学校前(2♀1幼♀, 1987-6-14, NT)。【既】鳥取県(福本, 1956)。鳥取市: 猪子(有田, 1963); 雁金山(県博, 1984)。
320. *Clubiona jucunda* (Karsch, 1879) ヤハズフクログモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山(県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008)。大山町大山(県博, 1984)。
321. *Clubiona kurilensis* Bösenberg & Strand, 1906 ヒメフクログモ。鳥取市: 八千代橋(1♀, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵); 千代大橋(1♂1♀, 2006-10-18, NT)。三朝町坂戸(1♀, 1999-9-9, NT)。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963; 県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008)。
322. *Clubiona kurosawai* Ono, 1986 クロサワフクログモ【既】鳥取市湖山鳥取大構内(鶴崎 1999)。
323. *Clubiona lena* Bösenberg & Strand, 1906 トビイロフクログモ。鳥取市樗谿(3♀, 1987-5-15, NT)。【既】鳥取市: 猪子; 久松山; 鳥取砂丘(県博, 1984)。
324. *Clubiona lutescens* Westring, 1851 キフクログモ。【既】鳥取市猪子(有田, 1963; 県博, 1984)。
325. *Clubiona neglectoides* Bösenberg & Strand, 1906 ヨモギフクログモ。【既】鳥取市千代川(1998)(ウエスコ, 2008)。
326. *Clubiona vigil* Karsch, 1879 ムナアカフクログモ。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山; 生山(県博, 1984); 河原町三滝溪(鶴崎ら, 2003); 千代川(ウエスコ, 2008)。

Family Corinnidae ネコグモ科

327. *Castianeira shaxianensis* Gong, 1983 オビジガバチグモ。【既】鳥取市猪子(有田, 1963; 県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008)。
328. *Orthobula crucifera* Bösenberg & Strand, 1906 オトヒメグモ。鳥取市: 樗谿(1♀, 1987-5-15, NT); 百谷百谷神社(1♀, 1992-3-14, NT); 鳥取砂丘海岸クロマツ林リター(2♂4♀, 1991-4-10, NT); 湖山町南鳥取大学構内(1♀, 2008-5-14, NTら)。【既】鳥取市: 猪子(有田, 1963); 久松山(県博, 1984); 賀露砂丘, 湖山神社, 石破山, 吉山, 浜坂神社(鶴崎, 1999); 千代川(ウエスコ, 2008)。
329. *Phrurolithus claripes* (Dönitz & Strand, 1906) イナズマウラシマグモ。【既】鳥取市猪子(有田, 1963)。

330. *Phrurolithus coreanus* Paik, 1991 キレオビウラシマグモ。【既】鳥取市千代川(1992, 2003, 2007)(ウエスコ, 2008)。
331. *Phrurolithus labialis* Paik, 1991 ウスイロウラシマグモ。【既】岩美町陸上(Kamura, 2005)。
332. *Phrurolithus nipponicus* Kishida, 1914 ウラシマグモ。鳥取市国府町扇ノ山上地ルートブナ林(1♂1♀, 2004-6-1, NT); 八頭町扇ノ山八東ふるさとの森800m(2♀, 1994-5-22, NT)。【既】船岡町大江(県博, 1984)。大山(有田, 1970; 県博, 1984)。
333. *Phrurolithus pennatus* Yaginuma, 1967 ヤバネウラシマグモ。鳥取市樗谿(1♂1♀, 1987-6-30, NT & 細田みどり); 岩美町大羽尾(3♀, 1987-7-31, NT)。【既】鳥取市猪子(八木沼 1968)。
334. *Otacilia komurai* (Yaginuma, 1952) コムラウラシマグモ。倉吉市打吹山: 山頂付近(1♂2♀, 1994-1-9, NT); 長谷寺付近(1♂, 1♀, 1994-1-9, NT); 東斜面(1♀, 1994-1-9, NT)。大山横手道北入口820m(1♀, 1996-8-11, NT)。【既】鳥取市猪子(有田, 1963)。若桜町氷ノ山。船岡町大江(県博, 1984)。
335. *Trachelas japonicus* Bösenberg & Strand, 1906 ネコグモ。鳥取市湖山町南鳥取大学構内(2♂2♀, 2007-5-9, NTら)【既】鳥取市: 猪子(県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008)。

Family Zodariidae ホウシグモ科

336. *Asceua japonica* (Bösenberg & Strand, 1906) ドウシグモ。【既】鳥取市猪子(有田, 1963; 県博, 1984)。

Family Gnaphosidae ワシグモ科

337. *Callilepis schuszteri* (Herman, 1879) フタホシテオノグモ。【既】鳥取市猪子。大山町大山。(県博, 1984)。
338. *Cladothela unciinsignita* (Bösenberg & Strand, 1906) ムナキワシグモ*。鳥取市鳥取大学構内(1♂, 7-VII-1991, NT)。
339. *Drassodes depilosus* Dönitz & Strand, 1906 アカクロワシグモ。【既】鳥取市猪子(有田, 1963)。
340. *Drassodes serratidens* Schenkel, 1963 トラフワシグモ。【既】鳥取市千代川(2003)(ウエスコ, 2008)。
341. *Drassyllus sanmenensis* Platnick & Song, 1986 エビチャヨリメケムリグモ。鳥取市: 湖山町南鳥取大学構内(1♀1垂成体♀, 2007-5-7, NTら); 用瀬町美成余井(1♀, 2006-6-6, NT)。【既】鳥取市: 猪子(Kamura, 1987); 千代川(ウエスコ, 2008)。日南町新屋(小川, 2007)。
342. *Drassyllus sasakawai* Kamura 1987 ヤマヨリメケムリ

- グモ*. 鳥取市国府町扇ノ山上地ルートブナ林 950 m (1♀, 2004-6-1, NT).
343. *Drassyllus yaginumai* Kamura, 1987 ヒメヨリメケムリグモ. 【既】鳥取市千代川 (1998, 2003)(ウエスコ, 2008).
344. *Gnaphosa kamurai* Ovtsharenko, Platnick, Song, 1992 カワラメキリグモ. 【既】鳥取市千代川 (1992, 1998, 2003)(ウエスコ, 2008).
345. *Gnaphosa kompirensis* Bösenberg & Strand, 1906 メキリグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
346. *Gnaphosa potanini* Simon, 1895 (= *Gnaphosa silvicola* Kamura, 1988) モリメキリグモ*. 鳥取市箕上山 (1♂, 28-V-1989, NT: 加村隆英氏同定).
347. *Haplodrassus pugnans* (Simon, 1880) ハイタカグモ. 湖山町南鳥取大学構内タブノキ林 (1♀2幼, 2007-5-7, NTら; 2♀, 2008-5-14, NTら). 【既】鳥取砂丘 (Kamura, 2006).
348. *Haplodrassus nojimai* Kamura, 2006. ホウキハイタカグモ. 倉吉オケ崎 (タイプ産地). 北栄町東新田場 (Kamura, 2006). 【備考】今のところ, 鳥取県外からの記録はない (新海ら, 2008).
349. *Hitobia asiatica* (Bösenberg & Strand, 1906) シノノメトンビグモ. 【既】鳥取市千代川 (2003)(ウエスコ, 2008).
350. *Hitobia unifascigera* (Bösenberg & Strand, 1906) ヒトオビトンビグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市本高 (長大, 2003).
351. *Odontodrassus hondoensis* (S. Saito, 1939) ヤマトフトバワシグモ. 【既】鳥取市千代川 (1992, 1998, 2003, 2007)(ウエスコ, 2008).
352. *Kishidaia albimaculata* (S. Saito, 1934) ヨツボシワシグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (有田, 1970; Kamura, 2001).
353. *Sernokorba pallidipatellis* (Bösenberg & Strand, 1906) マエトビトンビグモ (=マエトビケムリグモ). 鳥取市: 桂見出合いの森 (1♂, 1999-5-14, 足達); 円通寺杉ヶ谷橋 (1♂, 2006-6-6, NT). 【既】鳥取市樗谿 (Kamura, 1992).
354. *Sergiulus hosiziro* Yaginuma, 1960 ホシジロトンビグモ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963).
355. *Zelotes asiaticus* (Bösenberg & Strand, 1906) クロチャケムリグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 河原町三滝溪 (1♀, 1992-8-22, NT) (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
- Family Selenopidae アワセグモ科
356. *Selenops bursarius* Karsch, 1879 アワセグモ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984).
- Family Sparassidae アシダカグモ科
357. *Heteropoda venatoria* (Linnaeus, 1763) アシダカグモ*. 鳥取市: 商栄町倉庫内 (1♀, 1999-3-30, 梅津中伸・津村貴司); 湖山鳥取大学構内 (1♀, 1999-10-22, 浦島弘文). 鳥取市湖山町鳥取大学構内 (1亜成体♂, 2008-7-8, NT; 1♂, 2008-8-2, NT). 【備考】県博 (1984) には, 本種の記録として1966年に大山町大山で採集された標本が掲載されているが, 徳本 (2004) はこれがコアシダカグモ属のクモの誤同定であることを確認した (トライコアシダカグモの備考を参照).
358. *Micrommata virescens* (Clerck, 1758) ツユグモ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 大山 (景山, 1966).
359. *Sinopoda koreana* (Paik, 1968) トライコアシダカグモ*. 鳥取市湖山町鳥取大学構内 (1♀, 1999-5-28, 足達; 1♂, 2000-6-29, 足達; 1♂, 2008-8-2, NT). 日野町荒神原 300m alt. (1♀, 2001-10-1, NT). 鳥取県大山 (1♂1亜成体♂, 1966-6-10, 山下幹生: 鳥取県立博物館標本TRPM 378-13-01-01, examined). 【備考】最後の大山産の標本は, 県博 (1984) では「アシダカグモ」として掲載されているが, 徳本 (2004) はこれが, アシダカグモではないことを確認し, コアシダカグモ (*Sinopoda forcipata*) の近縁種に位置づけながらも種までの言及は避け, かわりに雄の触肢の図 (図2 in 徳本, 2004) を掲げた. 著者らの一人鶴崎は今回, この大山産の雄の標本を検査し, 触肢の脛節後側面突起 (RTA) の形状では, Jaeger & Ono (2002) によって日本国内での生息が確認された *Sinopoda koreana* (Paik, 1968) トライコアシダカグモの福岡県産の雄にもっとも近いことを確認した. 鳥取市鳥取大学構内で採集されている雄は触肢のRTAの二叉状突起のうち下面側の突起が大山産のものよりもさらに発達してやや「コアシダカグモ風」となり, 韓国 (Paik, 1968) や福岡産のトライコアシダカグモの触肢の図とは隔たりが目立つ. しかし, 鳥取県内の雌 (鳥取大学構内と日野町荒神原) の外雌器は, いずれもトライコアシダカグモの原記載であるPaik (1968) の図 (第3図版の図12) にほぼ一致する. よって, 本リストではこれらを取りあえずトライコアシダカグモとして掲載する. これまで鳥取県内各地から採集され *Sinopoda forcipata* (Karsch, 1881) コアシダカグモに同定されてきた標本 (有田, 1963, 1970; 鶴崎 1999; 鶴崎ら, 2003) はいずれも幼体なので (あるいは, 成体であったとしても現在標本が確認できない), 鳥取県の種リストからはとりあえず抹消する.
360. *Sinopoda stellatops* (Jäger & Ono, 2002) ヒメアシダカグモ. 日野町船通山金明水コース (1♀, 2000-9-4, NT).

- 【既】河原町三滝溪 (鶴崎ら, 2003). 日南町新屋 (小川, 2007).
361. *Thecticopsis severa* (L. Koch, 1875) カマスグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984).
- Family Philodromidae エビグモ科
362. *Philodromus aureolus* (Clerck, 1758) コガネエビグモ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 江府町深山口 (鶴崎・岡田, 2000).
363. *Philodromus auricomus* L. Koch, 1878 キンイロエビグモ. 鳥取市桂見出合いの森 (1幼, 1999-5-14, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
364. *Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802) シロエビグモ. 若桜町氷ノ山 (1♂, 1999-6-5, 足達). 【既】鳥取県 (八木沼, 1967); 鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町大江 (県博, 1984). 大山町大山 (景山, 1966; 県博, 1984).
365. *Philodromus emarginatus* (Schränki, 1803) (= *Philodromus flavidus* S. Saito, 1934) キエビグモ. 【既】佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974). 大山町大山 (有田, 1970; 県博, 1984).
366. *Philodromus spinitarsis* Simon, 1895 キハダエビグモ. 鳥取市東町久松山 (1♀, 1999-5-20, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984). 日南町多里 (小川, 2007).
367. *Philodromus subaureolus* Bösenberg & Strand, 1906 アサヒエビグモ. 鳥取市湖山町鳥取大学構内 (1♀, 1999-6-28, 足達). 赤碕町船上山 (1♂, 1999-5-2, 足達). 江府町毛無山登山口 (1♂, 1999-7-13, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 大山 (有田, 1970). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山; 古郡家 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974); 千代川 (ウエスコ, 2008).
368. *Thanatus miniaceus* Simon, 1880 ヤドカリグモ. 鳥取市鳥取砂丘西側 (1♀, 2007-7-7, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 樗谷 (県博, 1984); 鳥取砂丘 (引地, 1973); 千代川 (ウエスコ, 2008).
369. *Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802) スジシャコグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956).
370. *Tibellus japonicus* Efimik, 1999 (= *Tibellus tenellus* (L. Koch, 1876) (nec)) シャコグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 樗谷 (Efimik, 1999).
- Family Thomisidae カニグモ科
371. *Bassaniana decorata* (Karsch, 1879) キハダカニグモ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 大山 (有田, 1970).
372. *Coriarachne fulvipes* (Karsch, 1879) コカニグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984).
373. *Diaea subdola* O. Pickard-Cambridge, 1885 コハナグモ. 鳥取市: 樗谷公園 (1♂, 1999-6-3, 足達); 湖山鳥取大学構内濃山 (1♂1♀, 2008-6-18, NT). 智頭町芦津倉谷湿原 (1♂, 2003-6-14, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山; 樗谷 (県博, 1984); 三滝溪 (有田, 1969); 千代川 (ウエスコ, 2008). 赤碕町船上山 (県博, 1984); 大山 (有田, 1970; Ono, 1988). 日南町新屋 (小川, 2007).
374. *Ebelingia kumadai* (Ono, 1985) (= *Misumenops kumadai* Ono, 1985) クマダハナグモ. 【既】鳥取市千代川 (1998, 2007) (ウエスコ, 2008).
375. *Ebrechtella tricuspidata* (Fabricius, 1775) (= *Misumenops tricuspidatus* (Fabricius, 1775)) ハナグモ. 鳥取市: 雲山面影山 (1♀, 1999-7-7, 足達); 千代大橋 (1♂, 2005-8-8, NT・竹内瑞恵). 鳥取市国安堤 (1♀1幼, 2006-6-20, NTら; 1♀, 2006-7-4, NT); 大畑天日名鳥命神社 (1幼, 1999-5-11, 足達); 湖山鳥取大学構内 (3♂2♀, 1987-5-22, NT; 15♂4♀2幼, 2007-5-9, NTら); 湖山池鳥大附属小学校前 (3♂2幼♀, 1987-6-14, NT). 湖山町鳥取大学構内 (1♀, 1999-6-28, 足達). 三朝町: 下谷橋 (3幼, 1999-9-3, NT); 坂戸 (1幼, 1999-9-9, NT); 小河内 (1幼, 1999-9-9, NT). 琴浦町: 東伯町保 (2♀, 4♂, 1999-4-30, 足達); 赤碕町船上山 (1幼, 1999-5-2, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 安蔵森林公園安蔵溪谷 (鶴崎, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 江府町深山口, 日野町宝仏山 (鶴崎・岡田, 2000). 日南町新屋 (小川, 2007).
376. *Lysiteles coronatus* (Grube, 1861) アマギエビスグモ. 若桜町氷ノ山 (1♀, 1999-6-5, 足達). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 樗谷 (県博, 1984); 安蔵溪谷; 河原町三滝溪; 佐治村山王滝; 三国山三国山林道; 北谷 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008). 江府町毛無山, 宝仏山 (鶴崎・岡田, 2000). 大山 (有田, 1970; Ono, 1988).
377. *Misumena vatia* (Clerck, 1758) ヒメハナグモ. 【既】鳥取出合いの森 (長大, 2003).
378. *Oxytate striatipes* L. Koch, 1878 ワカバグモ. 鳥取市: 湖山町鳥取大学構内 (1♂1♀, 2007-5-9, NTら); 桂見出合いの森 (1♀, 1999-6-21, 足達); 若桜町氷ノ山 (1♂1♀, 1999-6-5, 足達). 智頭町那岐山西仙コース (1♂, 2004-6-5, NT). 三朝町: 坂戸 (4幼, 1999-9-9, NT); 福田福田橋 (1幼, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 古郡家 (県博, 1984); 安

- 蔵溪谷 (1幼, 2001-9-27, NT); 河原町林道ふるさと安蔵線 (1幼, 2001-9-18, NTら); 三滝溪; 佐治村三国山三国山林道; 北嶺登山道(鶴崎ら, 2003). 船岡町大江 (県博, 1984); 千代川(ウエスコ, 2008). 大山 (有田, 1970; Ono, 1988). 日南町: 新屋, 多里 (小川, 2007).
379. *Ozyptila matsumotoi* Ono, 1988 マツモトオチバカニグモ. 鳥取市: 福部村坂谷神社 (1♀, 1992-3-14, NT); 徳尾徳尾の森 (1♂, 2006-4-18, NTら); 湖山町南鳥取大学構内 (1♂2♀1幼, 2008-5-14, NTら). 【既】湖山池青島, 湖山天神山, 吉山, 里仁浜坂神社 (鶴崎 1999).
380. *Ozyptila nipponica* Ono, 1985 ニッポンオチバカニグモ. 鳥取市: 福部村坂谷神社 (1♂, 1992-3-14, NT); 湖山鳥取大学構内 (1幼, 1987-11-20, NT). 【既】鳥取市: 湖山池青島, 湖山神社, 布勢山王山, 石破山, 吉山, 徳尾, 久松山, 浜坂神社 (鶴崎, 1999). 日南町多里 (小川, 2007).
381. *Ozyptila nongae* Paik, 1974 クロスジオチバカニグモ. 【既】米子市車尾 (Ono, 1996).
382. *Phrynarachne katoi* Tikuni, 1955 カトウツケオグモ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963).
383. *Pistius undulatus* Karsch, 1879 ガザミグモ. 智頭町芦津倉谷湿原 (1♀, 2003-6-14, NT). 【既】鳥取県(福本, 1956). 鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町大江 (県博, 1984); 大山 (有田, 1970). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
384. *Synaema chikunii* Ono, 1983 チクニエビスグモ*. 若桜町氷ノ山 (1♀, 1999-6-5, 足達).
385. *Synaema globosum* (Fabricius, 1775) フノジグモ. 【既】鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984). 大山 (景山, 1966). 日南町多里 (小川, 2007).
386. *Thomisus labefactus* Karsch, 1881 アズチグモ. 鳥取市: 湖山町湖山神社 (2幼, 1999-6-23, 足達); 湖山鳥取大学構内濃山 (2幼, 2008-6-18, NT); 国安堤 (2幼, 2006-6-20, NTら). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963), 久松山; 湖山町 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
387. *Tmarus piger* (Walckenaer, 1802) トラフカニグモ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町大江 (県博, 1984). 大山 (Ono, 1988). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
388. *Tmarus rimosus* Paik, 1973 セマルトラフカニグモ. 湖山鳥取大学構内濃山 (1♀, 2008-6-18, NT). 【既】鳥取市千代川 (2003, 2007)(ウエスコ, 2008).
389. *Xysticus croceus* Fox, 1937 ヤミイロカニグモ. 鳥取市湖山鳥取大学構内 (1♂1♀, 1987-5-22, NT; 1♂8♀, 2007-5-9, NTら). 東伯町保 (1♀, 1999-4-30, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子; 久松山; 生山 (県博, 1984); 三滝溪 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
- 大山 (景山, 1966). 日南町多里 (小川, 2007).
390. *Xysticus concretus* Utochkin, 1968 (= *Xysticus dichotomus* Paik, 1973) ヤマヤミイロカニグモ. 【既】大山 (Ono, 1988).
391. *Xysticus ephippiatus* Simon, 1880 カラカニグモ. 溝口町毛無山8-9合目 (1♂, 1999-7-13, 足達). 【既】鳥取市: 千代川 (ウエスコ, 2008); 佐治村北谷 (恩藤・江原, 1974). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
392. *Xysticus hedini* Schenkel, 1936 クロボシカニグモ. 【既】鳥取市: 鳥取砂丘 (引地, 1973); 千代川 (1992, 2008)(ウエスコ, 2008).
393. *Xysticus insulicola* Bösenberg & Strand, 1906 アズマカニグモ. 鳥取市: 布勢日吉神社 (1♀, 1999-5-11, 足達); 湖山町鳥取大学構内 (1♀, 1999-6-28, 足達; 1♂3♀, 2007-5-9, NTら). 【既】鳥取市: 猪子 (八木沼・有田, 1966); 千代川 (ウエスコ, 2008). 船岡町大江 (県博, 1984). 大山 (Ono, 1988).
394. *Xysticus saganus* Bösenberg & Strand, 1906 オオヤミイロカニグモ. 鳥取市国府町扇ノ山上地ルートブナ林 (1♀, 2004-6-1, NT). 【既】鳥取市: 鳥取砂丘 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (景山, 1966; Ono, 1988).
395. *Xysticus transversomaculatus* Bösenberg & Strand, 1906 ヨコフカニグモ. 【既】鳥取市千代川 (1998, 2007)(ウエスコ, 2008).

Family Salticidae ハエトリグモ科

396. *Asianellus festivus* (L. Koch, 1834) ヤマジハエトリ. 鳥取市湖山町鳥取大学構内 (1♀, 2007-5-9, NTら). 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
397. *Carrohotus xanthogramma* (Latreille, 1819) ネコハエトリ. 鳥取市久松山 (1♂, 1966-5-5, 山下幹生: TRPM 377-0203-02 県博 (1984) でイソハエトリとされている標本). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 河原町三滝溪 (鶴崎ら, 2003); 千代川 (ウエスコ, 2008).
398. *Euophrys kataokai* Ikeda, 1996 カタオカハエトリ. 【既】鳥取市千代川 (1998, 2003, 2007)(ウエスコ, 2008).
399. *Evarcha albaria* (L. Koch, 1878) マミジロハエトリ. 鳥取市: 久松山 (1♂, 1968-8-4, 山下幹生: TRPM 377-0203-03 県博 (1984) ではイソハエトリに誤同定); 樗谿公園 (1♂2♀1幼, 1987-6-23, NT・細田みどり; 1♀, 1999-6-3, 足達); 湯所平和塔 (2♂, 1999-5-6, 足達); 湖山鳥取大学構内 (3♀, 1987-5-22, NT; 1♀, 2007-5-9, NT; 1♂, 1999-5-13, 足達); 湖山池青島 (1幼, 1999-4-22, 足達); 大畑末松神社 (1♀, 1999-5-11, 足達); 国安堤 (1

- ♀, 2006-6-20, NTら). 智頭町毛谷千代川左岸 (1♂, 2005-5-5, NT). 三朝町: 下谷橋 (3幼, 1999-9-3, NT); 坂戸 (2幼, 1999-9-9, NT); 福田福田橋 (1幼, 1999-9-3, NT). 東伯町: 上伊勢方見神社 (1♂, 1999-5-2, 足達); 保 (1幼, 1999-4-30, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984); 河原町三滝溪 (鶴崎ら, 2003). 船岡町大江 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 大山 (有田, 1970). 日南町多里 (小川, 2007).
400. *Evarcha fasciata* Seo, 1992 マミクロハエトリ. 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
401. *Evarcha flavocincta* (C. L. Koch, 1848) フィッシャーハエトリ. 【既】鳥取県 (福本, 1956).
402. *Hakka himeshimensis* (Dönitz & Strand, 1906) イソハエトリ. 鳥取市猪子 (1♂, 1962-5-7, 有田: TRPM 377-0203-01) 赤碕町赤崎港 (1♂1♀, 1999-5-3, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 【備考】本種は海岸性のクモで, 河川でもふつうは感潮域にしか出現しない. 県博 (1984) に産地として挙げられている鳥取市猪子と久松山は, 千代川の感潮限界である八千代橋から最短でも猪子は約7 km, 久松山は約2.5 km離れており, これらの記録は疑問であった. 県博 (1984) に保管されている標本を再検査したところ, 久松山の標本 (TRPM 377-0203-02および03) は, それぞれネコハエトリ♂, マミジロハエトリ♂の誤同定であることを確認した. いっぽう, 猪子の標本は正しくイソハエトリであった. 台帳によれば, 有田氏から1963年4月15日に, 鳥取県立博物館に寄贈された猪子産イソハエトリを含む211種のクモ標本は, 「鳥取市猪子4平方km区内」で採集されたことになっているとのことである (一澤圭氏, 私信). したがって, この「猪子」産とされている標本も厳密には, 鳥取市内の海岸に近いどこかで採集されたものと推定される.
403. *Harmochirus insulanus* (Kishida, 1914) ウデブトハエトリ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
404. *Heliophanus aeneus* (Hahn, 1831) チビクロハエトリ. 【既】江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000).
405. *Heliophanus lineiventris* Simon, 1868 タカノハエトリ. 【既】鳥取市千代川 (1998, 2003, 2007) (ウエスコ, 2008).
406. *Laufeia aenea* Simon, 1889 エキスハエトリ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984).
407. *Marpissa milleri* (Peckham & Peckham, 1894) (= *Marpissa dybowskii* (Kulczyński, 1895)) オオハエトリ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 禰谷 (県博, 1984). 大山 (有田, 1970).
408. *Marpissa pulla* (Karsch, 1879) ヨダンハエトリ. 鳥取市禰谷 (1♀, 1987-5-28, NT). 桂見出合いの森 (1♀, 1999-5-7, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963); 湖山鳥取大学構内 (Logunov, 1999); 千代川 (ウエスコ, 2008).
409. *Mendoza canestrinii* (Ninni in Canestrini & Pavesi, 1868) (= *Marpissa magister* (Karsch, 1879)) オスクロハエトリ. 鳥取市湖山池鳥大附属小学校前 (1♂1幼♀, 1987-6-14, NT). 三朝町坂戸 (2♂, 1999-9-9, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 生山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
410. *Mendoza elongata* (Karsch, 1879) ヤハズハエトリ. 若桜町氷ノ山春米 (1♂, 2007-8-16, 足達) 【既】船岡山 (どこを指すか不明: 仲辻, 1942: ヒロセハエトリ. 池田, 1998). 鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 生山; 古郡家 (県博, 1984).
411. *Menemerus fulvus* (L. Koch, 1878) (= *Menemerus confusus* Bösenberg & Strand, 1906) シラヒゲハエトリ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984).
412. *Myrmarachne formicaria* (DeGeer, 1778) タイリクアリグモ. 【既】鳥取市千代川 (1992, 1998, 2003, 2007) (ウエスコ, 2008).
413. *Myrmarachne inermichelis* Bösenberg & Strand, 1906 ヤサアリグモ. 鳥取市禰谷神社 (2♂, 1987-6-23, NT・細田みどり). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 三滝溪 (有田, 1969); 久松山; 生山 (県博, 1984).
414. *Myrmarachne japonica* (Karsch, 1879) アリグモ. 鳥取市禰谷公園 (1♂1♀, 1999-6-3, 足達). 三朝町: 坂戸 (1幼, 1999-9-9, NT); 小河内 (1幼, 1999-9-9, NT); 福田福田橋 (1幼, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
415. *Myrmarachne kuwagata* Yaginuma, 1967 クワガタアリグモ. 【既】鳥取県 (大野・八木沼, 1972).
416. *Neon minutus* Zabka, 1985 コガタネオンハエトリ. 【既】鳥取市浜坂浜坂神社 (Ikeda, 1995).
417. *Neon ningyo* Ikeda, 1995 ニンギョウネオンハエトリ. 【既】鳥取市河原町高福 (Ikeda, 1995). 【備考】タイプ産地は岡山県人形峠.
418. *Neon reticulatus* (Blackwall, 1853) ネオンハエトリ. 【既】河原町三滝溪 (鶴崎ら, 2003).
419. *Pancorius crassipes* (Karsch, 1881) アシブトハエトリ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山; 古郡家 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
420. *Phintella abnormis* (Bösenberg & Strand, 1906) チャイロアサヒハエトリ. 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市猪子 (有田, 1963; 県博, 1984); 三滝溪 (有田, 1974); 千代川 (ウエスコ, 2008).

421. *Phintella arenicolor* (Grube, 1861) マガネアサヒハエトリ. 鳥取市: 樗谷公園 (1♂, 1999-6-3, 足達); 湖山町湖山神社 (1幼, 1999-4-13, 足達). 三朝町: 下谷橋 (1♀, 1999-9-3, NT); 馬場の滝 (2幼, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 江府町毛無山 (鶴崎・岡田, 2000). 日南町多里 (小川, 2007).
422. *Phintella bifurcilinea* (Bösenberg & Strand, 1906) キアシハエトリ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 生山 (県博, 1984).
423. *Phintella linea* (Karsch, 1879) メガネアサヒハエトリ. 鳥取市湖山池鳥大附属小学校前 (1♂, 1987-6-14, NT); 千代川 (ウエスコ, 2008).
424. *Phintella versicolor* (C. Koch, 1846), メスジロハエトリ. 東伯町保 (1♂1♀, 1999-4-30, 足達). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
425. *Plexippoides doenitzi* (Karsch, 1879) デーニッツハエトリ. 鳥取市: 久松山 (1♀5幼, 1987-9-1, 細田みどり); 湖山池青島 (1♀, 1987-9-28, 細田みどり); 桂見出合いの森 (1♀, 1999-5-26, 足達); 三津三津神社 (1幼, 1999-4-27, 足達). 三朝町坂戸 (1♀1幼, 1999-9-9, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 千代川 (ウエスコ, 2008). 日南町: 新屋, 多里 (小川, 2007).
426. *Plexippus setipes* Karsch, 1879 ミスジハエトリ. 鳥取市: 湖山町鳥取大学構内 (1♂, 2007-5-9, NTら), 桂見 (1♀, 2007-10-1, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984).
427. *Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1825) ヤガタハエトリ*. 八頭町扇ノ山八東ふるさとの森ブナ林 (1♂, 1994-5-22, NT: 植松いのり氏同定).
428. *Pseudicius vulpes* (Grube, 1861) イナズマハエトリ. 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山; 古郡家 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008). 日南町多里 (小川, 2007).
429. *Rhene atrata* (Karsch, 1881) カラスハエトリ. 鳥取市桂見出合いの森 (1♂, 1999-5-26, 足達). 【既】鳥取市: 佐治村北谷 (恩藤・江原 1974); 千代川 (ウエスコ, 2008).
430. *Rhene albiger* (C. L. Koch, 1848) ヒメカラスハエトリ. 鳥取市湖山鳥取大構内 (1♀, 2007-5-9, NTら). 東伯郡三朝町馬場の滝 (1♀, 1999-9-3, NT). 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
431. *Sibianor kochiensis* (Bohdanowicz & Proszynski, 1987) ナカヒラハエトリ*. 鳥取県八頭町扇ノ山八東ふるさとの森ブナ林 (1♀, 1994-5-22, NT: 植松いのり氏同定).
432. *Sibianor nigriculus* (Logunov & Wesołowska, 1992) クロツヤハエトリ 【既】鳥取市千代川 (1998, 2003)(ウエスコ, 2008).
433. *Sibianor pullus* (Bösenberg & Strand, 1906) キレワハエトリ. 【既】鳥取市: 猪子 (県博, 1984); 安蔵森林公園林道ふるさと安蔵線 (鶴崎ら, 2003), 千代川(ウエスコ, 2008).
434. *Siler cupreus* Simon, 1881 アオオビハエトリ. 鳥取市久松山 (1♂幼, 1999-4-15, 足達). 【既】鳥取市: 猪子 (有田, 1963); 久松山 (県博, 1984); 千代川 (ウエスコ, 2008).
435. *Sitticus penicillatus* (Simon, 1875) シラホシコゲチャハエトリ. 智頭町駒帰沖ノ山林道 (1♂, 2005-8-3, NTら). 【既】鳥取市千代川 (ウエスコ, 2008).
436. *Synagelides agoriformis* Strand, 1906 アメイロハエトリ. 【既】船岡町大江 (県博, 1984).
437. *Talavera ikedai* Logunov & Kronstedt, 2003 ヒメスジハエトリ. 【既】鳥取市千代川 (1992, 1998)(ウエスコ, 2008).
438. *Yaginumaella striatipes* (Grube, 1861) ウススジハエトリ. 若桜町氷ノ山 (2♀, 1♂, 1999-6-5, 足達; 1♂, 2007-9-1, 足達). 智頭町駒帰沖ノ山林道 (1♂, 2005-8-3, NTら); 智頭町那岐山西仙コース (1♂6幼, 2004-6-5, NT). 大山町大山大山寺850m (1♀, 2008-10-14, NT). 【既】鳥取県 (福本, 1956). 鳥取市生山. 船岡町大江. 智頭町那岐山 (県博, 1984).

【過去に記録されているが本稿では再録しなかった種】

古い文献中に記録されている種には学名・和名のどちらからも、現在使用されている学名・和名のいずれに対応するかがわからないものが若干含まれている。標本が残されていないければこれらがどの種であったかは追跡できないので、本リストでは除外した。また、現在知られる分布範囲から考えて誤同定の疑いが高い種も再録しなかった。それらを個々にとりあげることは省略するが、次の1種のみ補足説明しておきたい。

・*Coelotes micado* Strand, 1907 ミカドヤチグモ. 本種は福本 (1956)による鳥取県産のクモ類のリストに掲載されているが、鳥取県産のヤチグモ類をまとめた有田 (1987)には掲載されていない。本種は中国地方では島根県 (江ノ川付近まで)と広島県 (東北部をのぞく地域まで)が東限になっており、それより東では *Coelotes exitialis* クロヤチグモに分布が交替する (井原未発表)。したがって、この記録は同属の他種の可能性が高いので、再録しなかった。

謝 辞

今回のリスト作成の過程で、谷川明男 (東京大学), 加村隆英 (追手門学院大学), 奥村賢一 (長崎県), 植松いのり (北海道大学)の諸氏には一部の標本の同定でお世話になった。

一部の文献の入手では新海明, 小川光昭の両氏のお手を煩わせた。また, 鳥取県立博物館の標本の借用と関連情報の入手については川上靖, 一澤圭の両氏にお世話になった。一部の標本の採集には著者ら以外にも何人かの方が関与している(とくに, 野嶋宏一, 細田みどりの両氏の貢献が大きい)。以上の方々に厚く御礼申し上げる。本原稿作成中の2008年10月7日に, 鳥取県のクモの研究を長年にわたって側面から支援して下さった鳥取大学名誉教授の江原昭三先生が亡くなられた。本目録を謹んで江原昭三先生に捧げる。

文献

- 有田立身 (1963) 鳥取市に生息する蜘蛛. 郷土と科学(鳥取県立博物館), 9: 19-26.
- 有田立身 (1969) 河原町三滝溪のクモ. 鳥取生物, 3/4: 16-18.
- 有田立身 (1970) 大山の真正蜘蛛類目録. 郷土と科学, 15: 25-29.
- 有田立身 (1973) 鳥取県産コサラゲモ類について. 郷土と博物館, 19: 15-20.
- Arita, T. (1974) A new species of *Coelotes* (Araneae: Agelenidae) from Tottori Prefecture, Japan. *Acta Arachnologica*, 25: 41-43.
- Arita, T. (1976) Three new *Coelotes* (Araneae, Agelenidae) from Tottori Prefecture, West Japan. *Annotationes Zoologicae Japonenses*, 49: 197-204.
- Arita, T. (1978) Two species of the family Hahniidae (Arachnida, Araneae) from Japan. *Annotationes Zoologicae Japonenses*, 51: 240-244.
- 有田立身 (1983) 空気乾燥標本によるクモ精子の軸索の観察. 鳥取生物, 17: 8-9.
- 有田立身 (1987) 鳥取県産ヤチゲモ類(タナゲモ科)について. 鳥取生物, 21: 1-9.
- 有田立身 (1993) ヤチゲモ類. アカマツハタケゲモ. イソコモリゲモ. pp. 186-191. In: 江原昭三・鶴崎展巨 (編) 鳥取県のすぐれた自然. 動物編. 鳥取県生活環境部自然保護課, 327 pp.
- 有田立身・鶴崎展巨 (1993) キシノウエトタテゲモ・キノボリトタテゲモ. pp. 184-185. In: 江原昭三・鶴崎展巨 (編) 鳥取県のすぐれた自然. 動物編. 鳥取県生活環境部自然保護課, 327 pp.
- 有田立身・鶴崎展巨 (2002) キノボリトタテゲモ, ワスレナゲモ. pp. 163-164. In: 鳥取県自然環境調査研究会動物調査部会(編)レッドデータブックとっとり (動物). 鳥取県生活環境部環境政策課, 214 pp.
- 長大株式会社 (2003) 都市計画道路 鳥取青谷線 現地調査結果 (動物).
- Efimik, V. E. (1999) A review of the spider genus *Tibellus* Simon, 1875 of the East Palaearctic (Aranei: Philodromidae). *Arthropoda Selecta*, 8: 103-124.
- 福本伸男 (1955) 鳥取県砂丘のイソドクゲモの分布. *Atypus*, No. 8, pp. 1-5.
- 福本伸男 (1956) 鳥取県産蜘蛛類目録. 健屋中学校科学部誌, 1: 13-20.
- 福本伸男 (1989) 鳥取県海浜におけるイソコモリゲモの分布. *Atypus*, No. 94, pp. 5-9.
- 畑守有紀 (1997) クモタケ *Nomuraea atypicola* の全国分布調査結果 (1993~1996年). *Kishidaia*, No. 72, pp. 34-47.
- 引地勘治 (1973) 砂丘地松林内のクモとマルゴミゲモおよびナガコガネゲモの網について. *砂丘研究*, 19: 47-52.
- Ihara, Y. (1993) Five new small-sized species of the genus *Cybaeus* (Araneae: Cybaeidae) from the Chugoku District, Honshu, Japan. *Acta Arachnologica*, 42: 115-127.
- Ihara, Y. (1994) Two new species of the genus *Cybaeus* (Araneae: Cybaeidae) from the Chugoku district, Honshu, Japan. *Acta Arachnologica*, 43: 87-93.
- Ihara, Y. (1995) Taxonomic revision of the *longiscapus*-group of *Arcuphantes* (Araneae: Linyphiidae) in western Japan, with a note on the concurrent diversification of copulatory organs between males and females. *Acta Arachnologica*, 44: 129-152.
- 井原 庸 (2002) ダイセンヤチゲモ. pp. 164. In: 鳥取県自然環境調査研究会動物調査部会 (編) レッドデータブックとっとり (動物). 鳥取県生活環境部環境政策課, 214 pp.
- Ihara, Y. (2006) *Cybaeus jinsekiensis* n. sp., a spider species with protogynous maturation and mating plugs (Araneae: Cybaeidae). *Acta Arachnologica*, 55: 5-13.
- Ihara, Y. & Nojima, K. (2004) Geographic distribution of the *Cybaeus kuramotoi*-group (Araneae: Cybaeidae) in Okayama, Tottori and Hyogo Prefectures, western Honshu, Japan, with descriptions of five new species. *Acta Arachnologica*, 53: 131-146.
- Ikeda, H. (1995) A revisional study of the Japanese salticid spiders of the genus *Neon* Simon (Araneae: Salticidae). *Acta Arachnologica*, 44: 27-42.
- 池田博明 (1998) ヒロセハエトリを求めて. *Kishidaia*, No. 75, pp. 14-16.
- 猪股修二郎・石井輝士 (1934) 鳥取砂丘地帯に於て採集せられたる昆虫に就て. 生物の研究 (鳥取高農生物同好会), Nos. 3/4. Pp. 116-120.
- Jäger, P. and Ono, H. (2002) Sparassidae from Japan, II. First *Pseudopoda* species and new *Sinopoda* species (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae). *Acta Arachnologica*, 51: 109-124.

- 景山純孝 (1966) 山陰地方の真正蜘蛛類第1報. 松江市立教育研究所研究集録, 3: 94-102.
- Kamura, T. (1987) Three species of the genus *Drassyllus* (Araneae:Gnaphosidae) from Japan. *Acta Arachnologica*, 35:77-88.
- Kamura, T. (1992) Two new genera of the family Gnaphosidae (Araneae) from Japan. *Acta Arachnologica*, 41: 119-131.
- Kamura, T. (2001) A new genus *Sanitubius* and a revived genus *Kishidaia* of the family Gnaphosidae (Araneae). *Acta Arachnologica*, 50: 193-200.
- Kamura, T. (2005) Description of the male of *Phrurolithus labialis* (Araneae: Corinnidae). *Acta Arachnologica*, 54:93-94.
- Kamura, T. (2006) Spiders of the genus *Haplodrassus* (Araneae: Gnaphosidae) from Japan. *Acta Arachnologica*, 55:95-103.
- 建設省倉吉工事事務所 (1993) 河川水辺の国勢調査 平成4年度日野川水系 (日野川・法勝寺川)陸上昆虫類等調査報告書. 建設省倉吉工事事務所(刊), 242 pp. + (写真)89 pp.
- 國本洗紀 (1985) コモリグモ類の染色体についての考察. 鳥取生物, 19: 5-7.
- 國本洗紀 (1993) 清水谷観察会記録. 鳥取生物, 27: 22.
- Logunov, D. V. (1999) Redefinition of the genera *Marpissa* C. L. Koch, 1846 and *Mendoza* Peckham & Peckham, 1894 in the scope of the Holarctic fauna (Araneae, Salticidae). *Revue Arachnologique*, 13: 25-60.
- 仲辻耕二 (1942) 伊豆七島産蜘蛛類に就いて. 東京農業大学 輯報, 1: 287-328. + 2 plates.
- Namkung J. (2001) The Spiders of Korea. Kyo-Hak Publishing, Seoul, 647 pp. (In Korean)
- 野村幸弘 (編) (1984) 鳥取県立博物館所蔵目録32. クモ類目録. 鳥取県立博物館, 3・4, 18 pp.
- 西川喜朗 (1973) 日本産 *Coelotes* (ヤチグモ属) の2新種. 追手門学院大学文学部紀要, No. 7, pp. 75-81.
- 西川喜朗 (1975) ヤチグモ (*Coelotes exitialis*) の分布と変異について (予報). 追手門学院大学文学部紀要, 9: 173-185.
- 西川喜朗 (1977) 大阪府箕面産ヤチグモの3新種. *Acta Arachnologica*, 27: 33-44.
- 小川光昭 (2007) 庄原市立比和自然科学博物館に収蔵された2004~2006年に採集された真正クモ類. 庄原市立比和自然科学博物館標本資料報告, 7: 1-55.
- 大野正男・八木沼健夫 (1972) 日本産真正蜘蛛類分布資料 (II). 東洋大学紀要教養課程編(自然科学), No. 14, pp. 51-64.
- Okuma, C. (1988) A revision of the genus *Tetragnatha* Latreille (Araneae, Tetragnathidae) of Asia, Part I. *J. Fac. Agr. Kyushu Univ.*, 32:165-181.
- 恩藤芳典・江原昭三 (1974) 氷ノ山等東中国山地国定公園 拡大予定地域の動物相.—鳥取県内地域の実情—. pp. 141-154. In: 東中国山地自然環境調査報告. 兵庫県・岡山県・鳥取県. 310 pp.
- Ono, H. (1988) A Revisional Study of the Spider Family Thomisidae (Arachnida, Araneae) of Japan. National Science Museum, Tokyo, 252 pp.
- Ono, H. (1996) New records of two Korean species of the spider families Mimetidae and Thomisidae (Araneae) from Japan. *Acta Arachnologica*, 45: 19-24.
- Ono, H. and Ogata, K. (1993) Records of *Lathys sexoculata* (Araneae: Dictynidae) from Japan, with a description of the male. *Acta Arachnologica*, 42: 129-133.
- Ono, H. and Shinkai, E. (1988) Notes on the Japanese sandy-beach spider, *Lycosa ishikariana* (Araneae, Lycosidae), based upon fresh topotypical specimens. *Mem. Natn. Sci. Mus.*, Tokyo, No. 21, pp. 131-135.
- Paik, K.-Y. (1968) The Heteropodidae (Araneae) of Korea. Kyungpook University. Theses Collection, 12: 167-185.
- Paik, K.-Y. (1979) Korean spiders of family Dictynidae. *Research Review of Kyungpook National University*, 27: 419-431.
- Saaristo, M. I. (1996) Notes on the Japanese species of the genera *Tapinopa* and *Floronia* (Arachnida: Araneae: Linyphiidae: Micronetinae). *Acta Arachnologica*, 45: 1-6.
- Saito, H. (1992) New linyphiid spiders of the genus *Arcuphantes* (Araneae: Linyphiidae) from Japan. *Korean Arachnology*, 8: 13-31.
- Saito, H. & Ono, H. (2001) New genera and species of the spider family Linyphiidae (Arachnida, Araneae) from Japan. *Bull. Nat. Sci. Mus. Ser. A (Zool.)*, 27: 1-59.
- 佐藤隆士・和田年史・中島ちづる・鶴崎展巨 (2007) 新たに確認された鳥取県東部のワスレナグモの生息地. 山陰自然史研究, No. 3, pp. 6-10.
- 新海 明 (2007) ワスレナグモの全国分布調査結果. *Kishidaia*, No. 92, pp. 39-52.
- 新海 明・安藤昭久・谷川明男 (2008) 県別クモ類分布図 ver. 2008. CR-ROM.
- 新海栄一・八木沼健夫 (1977) 分布資料. *Atypus*, No. 70, p. 43.
- Suzuki, S., Tsurusaki, N. and Kodama, Y. (2006) Distribution of an endangered burrowing spider *Lycosa ishikariana* in the San'in Coast of Honshu, Japan (Araneae: Lycosidae). *Acta Arachnologica*, 55: 79-86.
- Tanaka, H. (1985) Descriptions of new species of the Lycosidae (Araneae) from Japan. *Acta Arachnologica*, 33: 51-87.
- Tanaka, H. (1988) Lycosid spiders of Japan. I. The genus *Pirata*

- Sundevall. *Acta Arachnologica*, 36: 33-77.
- Tanaka, H. (1990) Lycosid spiders of Japan. III. The genus *Lycosa* Latreille. *Sonoda Women's College Studies*, 24: 193-213.
- Tanaka, H. (1992) Lycosid spiders of Japan. VIII. The genus *Alopecosa* Simon. *Sonoda Women's College Studies*, No. 26, pp. 315-340.
- Tanaka, H. (1993) Lycosid spiders of Japan. X. The genus *Pardosa* C. L. Koch – *monticola*-group. *Bulletin of the Biogeographical Society of Japan*, 48: 9-16.
- 田中穂積 (1999) コモリグモ科標本のデータの追加(リスト). *Kishidaia*, No. 77, pp. 119-124.
- 田中正行 (1939) 鳥取県淀江町壺瓶山, 大山にて採集せる蜘蛛. *Acta Arachnologica*, 4: 24-27.
- Tanikawa, A. (1992) A revisional study of the Japanese spiders of the genus *Cyclosa* Menge (Araneae: Araneidae). *Acta Arachnologica*, 41: 11-85.
- Tanikawa, A. (1994) A new species of the spider genus *Meta* C. L. Koch, 1836 (Araneae: Tetragnathidae) from Japan. *Acta Arachnologica*, 43: 65-69.
- Tanikawa, A. (1998) A revision of the Japanese spiders of the genus *Neoscona* (Araneae: Araneidae). *Acta Arachnologica*, 47: 133-168.
- Tanikawa, A. (2001) Twelve new species and one newly recorded species of the spider genus *Araneus* (Araneae: Araneidae) from Japan. *Acta Arachnologica*, 50: 63-86.
- Tanikawa, A. and Miyashita, T. (2008) A revision of Japanese spiders of the genus *Dolomedes* (Araneae: Pisauridae) with its phylogeny based on mt-DNA. *Acta Arachnologica*, 57: 19-35.
- 谷川明男 (2007) 日本産コガネグモ科ジョロウグモ科アシナガグモ科のクモ類の同定の手引き. *日本蜘蛛学会*, 121 pp.
- 谷川明男 (2008) 日本産クモ類目録. Ver. 2008R1. 94 pp. <http://www.asahi-net.or.jp/~dp7a-tknw/japan.pdf>
- 徳本 洋 (2004) アシダカグモ分布記録へのコアシダカグモ属の種の誤入. *Kishidaia*, 86: 1-9.
- 鳥取県立博物館 (1984) 鳥取県立博物館所蔵目録. クモ類目録. 鳥取県立博物館, 18 pp.
- 鶴崎展巨 (1999) 鳥取平野残存林における大型土壌節足動物の多様性とその保全. *鳥取大学教育地域科学部紀要(地域研究)*, 1: 57-68.
- 鶴崎展巨 (2002) イソコモリグモ. p. 165. In: 鳥取県自然環境調査研究会動物調査部会 (編) レッドデータブックとっとり (動物). 鳥取県生活環境部環境政策課, 214 pp.
- 鶴崎展巨 (2007) 鳥取県からのクロガケジグモ (ウシオグモ科) の生息確認. *山陰自然史研究*, No. 3, pp. 24-26.
- 鶴崎展巨・川口みなこ・船倉大和・松本 透 (2007) 鳥取県内のキノボリトタテグモの新産地. *山陰自然史研究*, No. 3, pp. 23-24.
- 鶴崎展巨・岡田 純 (2000) IV. 動物. pp. 59-92. In: 鳥取県生活環境部景観自然課 (編) 毛無山・宝仏山自然地域学術調査報告書. 鳥取県生活環境部景観自然課, 135 pp.
- 鶴崎展巨・岡田純・岡本宗裕 (2003) 西因幡山地 (鳥取県三國山・高鉢山・高山)の動物. pp. 117-147. In: 鳥取県環境政策課 (編) 西因幡山地学術調査報告書. 鳥取県, 170 pp.
- ウエスコ (2008) 平成19年度千代川陸上昆虫類等調査業務報告書. ウエスコ, 58pp+5+4+19+4+37+3+3+31+46+24pp.
- 八木沼健夫 (1967) 最近とれた珍しいクモ. *Atypus*, No. 44, pp. 18-23.
- 八木沼健夫 (1968) 最近のクモの新種. *Atypus*, No. 45, p. 33.
- Yaginuma, T. (1970) Two new species of small nesticid spiders of Japan. *Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo*, 13: 385-394.
- 八木沼健夫 (1971) 分布資料[II]. *Atypus*, No. 57, p. 38.
- Yaginuma, T. (1972) Revision of the short-legged nesticid spiders of Japan. *Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo*, 15: 619-622.
- 八木沼健夫 (1990) イソタナグモの学名と分布. *南紀生物*, 32: 1-6.
- 八木沼健夫・有田立身 (1966) カニグモの性モザイク. *Acta Arachnologica*, 20: 18-20.
- 吉田 亮 (1979) イソコモリグモの生態について. *Atypus*, No. 74, pp. 23-28.
- 吉田 哉 (2003) 日本産ヒメグモ科総説. *日本蜘蛛学会*, 223 pp.
- Yoshida, H. & Ono, H. (2000) Spiders of the genus *Dipoena* (Araneae, Theridiidae) from Japan. *Bull. National Sci. Mus., Tokyo, Ser. A (Zool.)*, 26: 125-158.

【付記】この目録の作成は、故有田立身さん(2005年12月24日ご逝去)がお元気であった2002年頃に着手され、有田さんからいただいた未発表データを含んでいる。県博(1984)に掲載の標本は有田さんが採集・同定し鳥取県立博物館に寄贈したものが主体であるが、これらは現在でもよく保存・管理されており、今回、一部の疑問種の再検討に役だった。ただし、このコレクションには有田さん以外の採集による標本もかなり多く含まれていることが、今回の検査の過程で判明した。県博(1984)には「同定はすべて有田立身氏」と記されている。しかし、今回検査し誤同定を確認した大山の「アシダカグモ」や久松山の「イソハエトリ」(両者とも有田氏の採集品ではない)の誤同定はきわめて初歩的なもの(とくに後者)であり、それらの同定に有田さんの目がとおっていなかったことはまず確実である。

Received October 13, 2008 / Accepted October 15, 2008