

LISTA ATUAL DA AVIFAUNA NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, SUL DO BRASIL

**André Luis da Rosa Seixas^{1,3}
Darliane Evangelho Silva^{2,3}
Luiz Liberato Costa Corrêa^{2,3}**

RESUMO

Apresenta-se lista atualizada de aves silvestres encontradas no município de Caçapava do Sul, com 206 espécies registradas. Contribuindo assim com informações sobre a ocorrência e distribuição de aves na região Serra do Sudeste, Rio Grande do Sul.

Palavras chaves: Aves, Serra do Sudeste, Rio Grande do Sul, Sul do Brasil.

CURRENT LIST OF BIRDLIFE IN THE MUNICIPALITY OF CACAPAVA DO SUL, SOUTHERN BRAZIL

ABSTRACT

Here are the updated list of wild birds found in the municipality of Cacapava do Sul, with 206 species recorded. Contributing with information about the occurrence and distribution of birds in the Southeast Sierra region of Rio Grande do Sul state, Southern Brazil.

Keywords: Birds, Southeast Sierra, Rio Grande do Sul, Southern Brazil.

¹PPG em Ciências Fisiológicas, Universidade Federal do Rio Grande, Campus Carreiros, Av. Itália km 8, Campus Carreiros, CEP 96.201-900, Rio Grande – RS, Brasil.

²PPG em Ambiente e Desenvolvimento, Centro Universitário UNIVATES, Avenida Avelino Tallini, 171, CEP 95900-000, Lajeado – RS, Brasil.

³Organização Não Governamental – Interação de Trabalhos Ambientais Caçapava do Sul - RS, Brasil.

Email para correspondência: lc_correa@yahoo.com.br ou ds_evangelho@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

Caçapava do Sul, 53°29'16" W e 30°31'11" S, (SEIXAS *et al.*, 2010), esta localizada na região Serra do Sudeste no estado do Rio Grande do Sul (BRASIL, 1973). Inserida no Bioma Pampa, apresentando formação gramíneo-lenhosa, estepe em transição com floresta estacional decidual (IBGE, 2004). A região é formada por campos, em relevo fortemente ondulado onde apresenta afloramentos rochosos (BRASIL, 1973). O clima é classificado como temperado úmido, com precipitação pluvial média de 1588 mm e temperatura média anual de 16,8°C (MALUF, 2000), podendo chegar até 38°C no verão, e no inverno poderá ocorrer à formação de 15 a 20 geadas (IBGE, 2002).

O Município classifica-se como área prioritária para conservação e utilização sustentável da diversidade biológica (MMA, 2002), no entanto, sofre alterações antrópicas pela agricultura, atividades agropastoris e atualmente existem grandes áreas utilizadas para silvicultura, fato que contribui muito para a fragmentação do habitat local (SEIXAS *et al.*, 2010). É conhecida uma lista com 180 espécies registradas para Caçapava do Sul (SEIXAS *et al.*, 2010). Conforme Corrêa *et al.* (2013) a região é muito expressiva em diversidade de espécies na área ornitológica, tornando-se importante a continuidade de novos dos inventários de campo em Caçapava do Sul, visando obter no futuro uma lista completa, contribuindo com informações da ocorrência das aves silvestres na região e o conhecimento ornitológico no Bioma pampa (SEIXAS *et al.*, 2010).

MATERIAL E MÉTODOS

Para a atualização da lista de aves silvestres encontradas em Caçapava do Sul foram compiladas informações e registros disponíveis em Seixas *et al.* (2010), Duarte (2012) e Corrêa *et al.* (2013). No entanto, observações pessoais qualitativas aleatórias não sistematizadas em campo foram realizadas pelos autores entre maio de 2011 a agosto de 2013.

RESULTADOS

Através dos métodos utilizados e compilação de dados resultou numa lista atual com 206 espécies (Tabela 1) registradas para Caçapava do Sul, adicionando 26 novas espécies conforme a lista publicada em Seixas *et al.* (2010). Deve-ses destacar o registro de quatro espécies consideradas ameaçadas no Estado, de acordo em Bencke *et al.* (2003), são elas: *Amazona pretrei*, *Sporophila collaris*, *Ramphastos toco* e *Pyroderus scutatus*. A nomenclatura das espécies registradas segue a Lista de aves do Brasil (CBRO, 2011).

REFERÊNCIAS

CBRO - Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. **Lista das aves do Brasil.** 10^a Edição. (2011). Disponível em <<http://www.cbro.org.br>>. Acesso em: 24 maio, 2013.

CORRÊA, L. L. C.; SILVA, D. E. ; PAZINATO, D. M. M.; DUTRA, C. R. S. Levantamento preliminar da avifauna no Parque Municipal da Pedra do Segredo no Município de Caçapava do Sul, Sul do Brasil. **Scientia plena**, v.9, n.6, p.1-7, 2013.

BENCKE, G. A.; FONTANA, C. S.; DIAS, R. A. MAURÍCIO, G. N. MÄHLER JR, J. K. F. Aves. (In): FONTANA, C. S.; BENCKE, G. A.; REIS, R. E. (eds.). **Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Edipucrs, Brasil, 2003. Pp. 189–479.

DUARTE, M. [WA708925, *Pyroderus scutatus* (Shaw, 1792)]. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. 2012. Disponível em: <<http://www.wikiaves.com/708925>> Acesso em: 24 maio de 2013.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Mapa de Vegetação do Brasil, Esc. 1: 5.000.000.** (2004). Disponível em <ftp://ftp.ibge.gov.br/Cartas_e_Mapas/Mapas_Murais/>. Acesso em: 24 de maio, 2013.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Perfil dos municípios brasileiros**. Meio ambiente - Livro com CD. 2002. 394p.

MALUF, J. R. T. Nova classificação climática do Estado do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, n. 8, v1, p.141-150, 2000.

M.M.A. **Biodiversidade Brasileira**. Ministério do Meio Ambiente, Brasília. 2002. 404p.

SEIXAS, A. L. da; OLIVEIRA, S. V.de.; TRINDADE, A. de O.; CORRÊA, L. L. C; SILVA, D. E. NUNES, A. Avifauna do Município de Caçapava do Sul, RS, Brasil. **Biodiversidade Pampeana**, n. 8, v. 1: p.50-61, 2010.

Tabela 1- Lista atualizada da avifauna encontrada no município de Caçapava do Sul, Serra do Sudeste, Rio Grande do Sul.

Táxons	Nome-comum
STRUTHIONIFORMES	
RHEIDAE	
<i>Rhea americana</i> (Linnaeus, 1758)	Ema
TINAMIFORMES	
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	Inhanbuguaçu
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	Perdiz
<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)	Codorna-amarela
ANSERIFORMES	
ANHIMIDAE	
<i>Chauna torquata</i> (Oken, 1816)	Tachã
ANATIDAE	
<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	Marreca-caneleira
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	Irerê
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	Pé-vermelho
<i>Anas flavirostris</i> Vieillot, 1816	Marreca-pardinha
<i>Anas versicolor</i> Vieillot, 1816	Marreca-cricri

<i>Netta peposaca</i> (Vieillot, 1816)	Marrecão
GALLIFORMES	
CRACIDAE	
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	Aracuã
<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	Jacuaçu
PODICIPEDIFORMES	
PODICIPEDIDAE	
<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	Mergulhão-caçador
CICONIIFORMES	
CICONIIDAE	
<i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789)	Maguari
<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	Cabeça-seca
SULIFORMES	
PHALACROCORACIDAE	
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	Biguá
PELECANIFORMES	
ARDEIDAE	
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	Socó-boi
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Savacu
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	Socozinho
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Garça-vaqueira
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	Garça-moura
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Garça-branca-grande
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	Maria-faceira
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	Garça-branca-pequena
THRESKIORNITHIDAE	
<i>Plegadis chihi</i> (Vieillot, 1817)	Caraúna-de-cara-branca
<i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823)	Tapicuru-de-cara-pelada
<i>Theristicus caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	Maçarico-real
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	Curicaca
<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	Colhereiro
CATHARTIFORMES	
CATHARTIDAE	
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	Urubu-de-cabeça-vermelha
<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	Urubu-de-cabeça-amarela
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	Urubu-de-cabeça-preta
ACCIPITRIFORMES	
ACCIPITRIDAE	
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	Gavião-peneira
<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	Gavião-do-banhado
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	Sovi
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	Gavião-caramijero
<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	Gavião-caboclo
<i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	Gavião-preto
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	Gavião-carijó
FALCONIFORMES	
FALCONIDAE	
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	Caracará
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	Carrapateiro
<i>Milvago chimango</i> (Vieillot, 1816)	Chimango

<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	Quiriquiri
GRUIFORMES	
ARAMIDAE	
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	Carão
RALLIDAE	
<i>Aramides ypecaha</i> (Vieillot, 1819)	Saracuraçu
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	Saracura-três-potes
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	Saracura-do-mato
<i>Pardirallus sanguinolentus</i> (Swainson, 1837)	Saracura-do-banhado
<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	Frango-d'água-comum
<i>Gallinula melanops</i> (Vieillot, 1819)	Frango-d'água-carijó
<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	Frango-d'água-azul
CARIAMIFORMES	
CARIAMIDAE	
<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	Seriema
CHARADRIIFORMES	
CHARADRIIDAE	
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	Quero-quero
<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818	Batuíra-de-coleira
RECURVIROSTRIDAE	
<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	Pernilongo
SCOLOPACIDAE	
<i>Gallinago paraguaiae</i> (Vieillot, 1816)	Narceja
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	Maçarico-de-sobre-branco
JACANIDAE	
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	Jaçanã
COLUMBIFORMES	
COLUMBIDAE	
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	Rolinha-roxa
<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	Rolinha-picuí
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Pombo-doméstico
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	Pombão
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	Pomba-de-bando
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	Juriti-pupu
PSITTACIFORMES	
PSITTACIDAE	
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	Tiriba-de-testa-vermelha
<i>Myiopsitta monachus</i> (Boddaert, 1783)	Caturrita
<i>Amazona pretrei</i> (Temminck, 1830)	Papagaio-charão
CUCULIFORMES	
CUCULIDAE	
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Alma-de-gato
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	Papa-lagarta-acanelado
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	Anu-preto
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	Anu-branco
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	Saci
STRIGIFORMES	
TYTONIDAE	
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Coruja-de-igreja
STRIGIDAE	

<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	Corujinha-do-mato
<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	Jacurutu
<i>Glaucidium brasiliense</i> (Gmelin, 1788)	Caburé
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	Coruja-buraqueira
CAPRIMULGIFORMES	
NYCTIBIIDAE	
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	Mãe-da-lua
CAPRIMULGIDAE	
<i>Antrostomus rufus</i> (Boddaert, 1783)	João-corta-pau
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	Tuju
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	Bacurau-tesoura
<i>Chordeiles nacunda</i> (Vieillot, 1817)	Corucão
APODIFORMES	
APODIDAE	
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	Andorinhão-do-temporal
TROCHILIDAE	
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	Beija-flor-preto
<i>Stephanoxis lalandi</i> (Vieillot, 1818)	Beija-flor-de-topete
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	Besourinho-de-bico-vermelho
<i>Hylocharis chrysura</i> (Shaw, 1812)	Beija-flor-dourado
<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	Beija-flor-de-papo-branco
TROGONIFORMES	
TROGONIDAE	
<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	Surucuá-variado
CORACIIFORMES	
<i>Megacyrle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Martim-pescador-grande
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	Martim-pescador-verde
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	Martim-pescador-pequeno
PICIFORMES	
RAMPHASTIDAE	
<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	Tucanuçu
<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	Tucano-de-bico-verde
PICIDAE	
<i>Picumnus nebulosus</i> Sundevall, 1866	Pica-pau-anão-carijó
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	Pica-pau-branco
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	Pica-pauzinho-verde-carijó
<i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821)	Pica-pau-dourado
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	Pica-pau-verde-barrado
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	Pica-pau-do-campo
PASSERIFORMES	
THAMNOPHILIDAE	
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	Choca-de-chapéu-vermelho
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	Choca-da-mata
<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	Borralhara-assobiadora
CONOPOPHAGIDAE	
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	Chupa-dente
FORMICARIIDAE	
<i>Chamaezza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)	Tovaca-campainha
DENDROCOLAPTIDAE	
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu-verde

<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	Arapaçu-escamado-do-sul
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	Arapaçu-grande
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	Arapaçu-de-garganta-branca
FURNARIIDAE	
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	
<i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885	Trepadorzinho
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	Trepador-quiete
<i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817)	Cochicho
<i>Schoeniophylax phryganophilus</i> (Vieillot, 1817)	Bichoita
<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	Pichoré
<i>Synallaxis cinerascens</i> Temminck, 1823	Pi-puí
<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859	Petrim
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	João-teneném
PIPRIDAE	
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	Tangará
TITYRIDAE	
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	Caneleiro-preto
COTINGIDAE	
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	Pavó
INSERTAE SEDIS	
<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	Patinho
YNCHOCYCLIDAE	
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	Cabeçudo
<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	Borboletinha-do-mato
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	Bico-chato-de-orelha-preta
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	Tororó
TYRANNIDAE	
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	Gibão-de couro
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	Risadinha
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	Guaravaca-de-barriga-amarela
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	Guaravaca-de-bico-curto
<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	Tuque
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	Alegrinho
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	Irré
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	Bem-te-vi
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	Suiriri-do-gado
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	Bem-te-vi-rajado
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	Neinei
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	Suiriri
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	Tesourinha
<i>Empidonax varius</i> (Vieillot, 1818)	Peitica
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	Filipe
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	Príncipe
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	Freirinha
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	Enferrujado
<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	Maria-preta-de-bico-azulado
<i>Knipolegus lophotes</i> Boie, 1828	Maria-preta-de-penacho
<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816)	Primavera
<i>Xolmis irupero</i> (Vieillot, 1823)	Noivinha
VIREONIDAE	

<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	Juruviara
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	Pitiguari
CORVIDAE	
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	Gralha-azul
<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	Gralha-picaça
HIRUNDINIDAE	
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	Andorinha-pequena-de-casa
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	Andorinha-do-campo
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	Andorinha-doméstica-grande
TROGLODYTIDAE	
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	Corruíra
TURDIDAE	
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	Sabiá-laranjeira
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	Sabiá-barranco
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	Sabiá-poca
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	Sabiá-coleira
<i>Turdus subalaris</i> (Seebold, 1887)	Sabiá-ferreiro
MIMIDAE	
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	Sabiá-do-campo
<i>Mimus triurus</i> (Vieillot, 1818)	Calhandra-três-rabos
MOTACILLIDAE	
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	Caminheiro-zumbidor
COEREBIDAE	
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	Cambacica
THRAUPIDAE	
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	Trinca-ferro-verdadeiro
<i>Saltator aurantiirostris</i> Vieillot, 1817	Bico-duro
<i>Lanio cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	Tico-tico-rei
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	Sanhaçu-cinzento
<i>Tangara preciosa</i> (Cabanis, 1850)	Saíra-preciosa
<i>Stephanophorus diadematus</i> (Temminck, 1823)	Sanahaçu-frade
<i>Paroaria coronata</i> (Miller, 1776)	Cardeal
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	Saíra-viúva
<i>Pipraeidea bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	Sanhaçu-papa-laranja
EMBERIZIDAE	
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	Tico-tico
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	Tico-tico-do-campo
<i>Poospiza nigrorufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Quem-te-vestiu
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	Canário-da-terra
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	Canário-do-campo
<i>Embernagra platensis</i> (Gmelin, 1789)	Canário-do-banhado
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	Tiziú
<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	Coleirinho
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	Coleirinho-do-brejo
CARDINALIDAE	
<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	Sanhaçu-de-foto
<i>Cyanoloxia brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	Azulão
<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Azulinho
PARULIDAE	
<i>Parula pityayumi</i> (Vieillot, 1817)	Mariquita

<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	Pia-cobra
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	Pula-pula
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	Pula-pula-assobiador
ICTERIDAE	
<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	Tecelão
<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	Encontro
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	Graúna
<i>Amblyramphus holosericeus</i> (Scopoli, 1786)	Cardeal-do-banhado
<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	Garibaldi
<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	Chopim-do-brejo
<i>Agelaioides badius</i> (Vieillot, 1819)	Asa-de-telha
<i>Molothrus rufoaxillaris</i> Cassin, 1866	
<i>Lolothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	Vira-bosta
<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	Policia-inglesa-do-sul
FRINGILLIDAE	
<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	Pintasilgo
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	Fin-fin
PASSERIDAE	
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Pardal
