

RESUMOS DOS TRABALHOS APRESENTADOS

CISTO TRIQUILEMAL, UMA LESÃO MALIGNIZÁVEL RARA EM MUCOSA LABIAL: RELATO DE CASO

Santos, B.S.

Filippetti, N.P.

Queiroz, E.A.

RESUMO

Introdução: O Cisto Triquilemal é um cisto raro, com pouca incidência em boca, que pode afetar ambos os sexos com predominância em mulheres, tendo a possibilidade de se malignizar. O seu aparecimento está relacionado à obstrução dos ductos das glândulas sebáceas levando à retenção de secreção, sendo preenchido por queratina. Sua ocorrência é mais comum em regiões que têm pêlo ou próximo das mesmas, como neste relato. **Relato de Caso:** Paciente de 54 anos, sexo masculino, fumante esporádico, em tratamento dermatológico para alopecia na região da pele do lábio superior, lateralmente ao filtro; e em tratamento psiquiátrico para stress e ansiedade. Compareceu em 04/10/2017 à Clínica de Semiologia da UMESP, com queixa principal de “bolinha que se movimenta de um lado para o outro no lábio”. O exame físico relatou a presença de um nódulo de aproximadamente 5 mm, móvel, assintomático, revestido de mucosa íntegra e avermelhada. Procedimentos clínicos: Foi realizada biópsia excisional. Evolução: Pós-operatório mediato (7 dias): remoção de suturas, paciente sem queixas, reparação compatível com o procedimento. O resultado do exame anatomopatológico foi: Cisto Triquilemal. Conclusão: O Cisto Triquilemal é raro, principalmente na região intra-oral. O diagnóstico precoce e tratamento correto são de suma importância, dado o seu potencial de malignização. **Conclusão:** Neste caso, foi realizada exérese com pequena margem de segurança, e o paciente segue assintomático e sem sinais de recidiva. Seu prognóstico é favorável.

REFERÊNCIAS

- Perez LM, Bruch JW, Murrah VA. Trichilemmal cyst of the upper lip. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1997;84:58-60.
- Hayashi I, Harada T, Muraoka M, Ishii M. Malignant proliferating trichilemmal tumour and CAV (cisplatin, adriamycin, vindesine) treatment. Br J Dermatol. 2004; 150:156-7.