

HIPERPARAQUERATOSE E ACANTOSE

Nataline Santos Nery; Márcio Américo Dias; Lais Gonçalves Silva; Rafael Aguiar Vilela Junior; Marcondes Sena Filho.

Instituto Nacional de Ensino Superior e Pós-Graduação Padre Gervásio Faculdade de Odontologia – INAPOS - Pouso Alegre – MG

Paciente Z.S.F., gênero feminino, feoderma, 68 anos, casada residente no município de Borda da Mata/MG, foi encaminhado ao serviço de cirurgia da Faculdade de Odontologia do INAPÓS com encaminhamento de um CD para avaliação e conduta. No exame extra bucal não foi observado nenhuma alteração. No exame intra bucal observou uma lesão branca em lateral de língua lado esquerdo, indolor, sem crescimento, onde o paciente relatou que tinha observado há mais de 8 meses. E teve como hipótese diagnóstica de Leucoplasia. Foi feita biopsia incisiva e o material foi encaminhado para exame anatopatológico no Centro de Patologia Oral da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP – Unicamp) – SP, com diagnóstico microscópico de hiperparaqueratose e acantose com observação para remoção total da lesão. Foi feita a remoção total da lesão e novamente encaminhado Centro de Patologia Oral da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP – Unicamp) – SP com diagnóstico final confirmando o inicial. O paciente se encontra em preservação.

1. NEVILLE, B. W. et al. Patologia oral e maxilofacial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
2. Ramos-e-Silva M & Fernandes NC. Afecções das Mucosas e Semimucosas. JBM, 2001; 80(3): 50-66.
3. Frigerio M, Santi V, Di Micoli A, Trevisani F. Hyperkeratosis of nipple skin during sorafenib treatment. Dig Liver Dis. 2009;41:611.