

## CISTO DO DUCTO SALIVAR ( CISTO DE RETENÇÃO DE MUCO) – RELATO DE CASO CLÍNICO

Marielle Cristina MOREIRA; Alessandro Antonio Costa PEREIRA; Felipe Fornias Sperandio; Letícia Monteiro de BARROS; Roseli Teixeira MIRANDA

Clínica de Diagnóstico Bucal – Faculdade de Odontologia - Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS (campus Alfenas)

Paciente do gênero feminino, 52 anos, faioderma, procedente de Nova Resende- MG, foi encaminhada para a clínica de diagnóstico da UNIFENAS por um cirurgião-dentista de sua cidade, devido à presença de uma lesão bolhosa em assoalho bucal com evolução de, aproximadamente, 2 anos, sem sintomatologia ou desconforto. Na anamnese verificou-se que a paciente era saudável e os sinais vitais estavam dentro de valores normais. No exame de ectoscopia não foi encontrada nenhuma alteração. No exame de oroscopia observou-se que a paciente era edentada total superior e inferior e no assoalho bucal, do lado direito havia uma lesão bolhosa de mais ou menos 1 cm de diâmetro, firme à palpação. Foi feita uma biópsia excisional removendo toda a lesão. A peça foi fixada em formol a 10% e enviada para estudo histopatológico. O resultado dos cortes microscópicos corados em HE revelou glândula salivar composta por seus ácinos e ductos incluídos em um estroma de tecido conjuntivo, com extravasamento de material eosinofílico granular compatível com mucina. Este material encontrava-se permeado por macrófagos espumosos, com o tecido conjuntivo permeado por moderado infiltrado inflamatório mononuclear e, em áreas profundas, revelava a presença de epitélio cúbico simples, corrugado e de ampla extensão, compatível com epitélio cístico. A lesão encontrava-se revestida por epitélio pavimentoso, estratificado, paraqueratinizado, fechando o diagnóstico de cisto do ducto salivar (cisto de retenção de muco). A paciente foi acompanhada por 6 meses, sem sinal de recidiva. O cisto do ducto salivar ou de retenção de muco é uma lesão caracterizada pelo aumento volumétrico de líquido nos tecidos após uma obstrução parcial ou completa do ducto excretor glandular, o que provoca retenção da secreção e dilatação ductal..

### Referências:

1. ANDRADE, VC; BACCHI, A; SALIM, MAA, BOURGUIGNON FILHO, AM. Cisto Mucoso De Retenção – Relato De Caso Clínico. Saber Científico Odontológico, Porto Velho, 2 (1): 66 - 72, jan/jun., 2012.
2. CONSOLARO, RB. Análise morfológica microscopia de mucocelos na mucosa bucal e inter relação com a sua etiopatogênia. Tese de Doutorado. Faculdade de Odontologia de Bauru – USP, 2010.
3. NEVILLE, BW; DAMM, DD; ALLEN, CN; BOUQUOT, JE. **Patologia oral & Maxilofacial**. 3ed, Rio de Janeiro: Elsevier; 2009.