

## MUCOCELE EM LÁBIO INFERIOR DE UMA CRIANÇA

Nicole Ribeiro dos ANJOS<sup>1</sup>, Raquel Laís Ottoni NUNES<sup>2</sup>, Carolina Freitas LAGE<sup>3</sup>,  
Marco Antônio de Oliveira MONTEIRO<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Estudante de Odontologia/UNINCOR e-mail: nick\_ribe@hotmail.com

<sup>2</sup>Estudante de Odontologia/UNINCOR e-mail: raquelottoninunes@gmail.com

<sup>3</sup>Co-orientadora e Professora de Odontologia/UNINCOR  
e-mail: carolinaitabira@yahoo.com.br

<sup>4</sup>Orientador e professor de Odontologia/FEAD  
e-mail: marcomonteiro888@gmail.com

**Palavras-Chave: Mucocele, cirurgia, recorrência.**

### RESUMO

A mucocele é uma lesão benigna comum da mucosa oral, resultante da ruptura de um ducto de glândula salivar e o extravasamento da mucina para dentro dos tecidos moles adjacentes. Este extravasamento geralmente é resultante de um trauma local, embora em muitos casos não haja história de trauma associado. Essa lesão pode acometer qualquer região da cavidade oral, porém é mais comum no lábio inferior. Clinicamente se apresentam como aumento de volumes mucosos em forma de cúpula, que podem ter seus tamanhos variando de 1 a 2 mm a alguns centímetros. Caracteristicamente, a lesão é flutuante, mas algumas mucoceles são firmes a palpação. O tempo de evolução para esta lesão varia de poucos dias a diversos anos, muitos pacientes relatam uma história de aumentos de volumes recorrentes, que podem romper-se periodicamente e liberar seu conteúdo fluido. Algumas lesões são auto limitantes que se rompem e cicatrizam sozinhas, entretanto, muitas dessas lesões são de natureza crônica, e a excisão cirúrgica local é necessária. Devido a isso, o objetivo deste estudo foi descrever o caso clínico de uma paciente que apresentou esta lesão. A paciente M.E.B.T., 9 anos de idade, leucoderma, sexo feminino, apresentou-se a Clínica Odontológica da Faculdade FEAD em Belo Horizonte- MG, apresentando lesões no lábio inferior, de aspecto bolhoso e assintomático, sugerindo mucocele. A paciente relatou que apresentava as lesões a cerca de três anos. Foi realizada a excisão cirúrgica das lesões. O material coletado foi encaminhado para o exame histopatológico confirmando o diagnóstico clínico de mucocele. Os dados apresentados reiteram estudos da literatura que afirmam que a mucocele pode aparecer em qualquer idade, embora seja mais frequente em crianças e adolescentes. Além disso, essa lesão tem como principal etiologia associada ao trauma, e podem estar presentes por períodos prolongados, como no caso clínico apresentado.