

REABILITAÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL APÓS TRAUMATISMO NA DENTIÇÃO DECÍDUA: SÉRIE DE CASOS

Jaqueline Luara Lopes Marques TELES¹, Stella Roque ARAÚJO², Kelly Oliva JORGE³

¹ Estudante do Curso de Odontologia/UNINCOR

² Estudante do Curso de Odontologia/UNINCOR

³ Orientadora e Professora do Curso de Odontologia/UNINCOR

Palavras-chave: Traumatismos dentários, mantenedor de espaço, reabilitação oral.

A perda precoce de dentes decíduos anteriores pode ocorrer devido a traumatismos dentários ou lesões cáries. São consideradas perdas precoces quando ocorrem antes dos 6 anos de idade. Diversas são as consequências quando principalmente dentes anteriores superiores são perdidos, como comprometimento da fala, alimentação, da integridade do arco e do desenvolvimento e erupção dos dentes sucessores permanentes, além de danos psicológicos e estéticos. Com objetivo de demonstrar aspectos do planejamento e procedimentos clínicos relativos à sua execução, o presente estudo apresentou uma série de casos clínicos de reabilitação de crianças que tiveram perda precoce de dentes anteriores decíduos com a utilização de mantenedores de espaço estéticos funcionais com dentes naturais. O estudo relata três casos clínicos de pacientes com idade entre 3 a 5 anos atendidos no projeto de extensão "Atendimento a Pacientes com Traumatismo na Dentição Decídua" da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (FO-UFMG). De acordo com o relato dos responsáveis, foi possível identificar uma melhora quanto à inserção social dessas crianças em seus respectivos contextos sociais.