



دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشکده پزشکی

پایان نامه دوره پزشکی عمومی
عنوان:

بررسی عوامل موثر بر فراوانی پارگی زودرس کیسه آب در زنان باردار مراجعه کننده به
بیمارستان افضل پور شهر کرمان در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷

استاد راهنما:
سرکار خانم دکتر مریم لیلی

توسط :
فاطمه کلانتری مقدم

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی برخی عوامل موثر بر پارگی زودرس کیسه آب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور شهر کرمان در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ انجام شد.

مواد و روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی (cross-sectional) بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی خانم های باردار با پارگی زودرس کیسه آب و خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور شهر کرمان در سال ۹۶-۹۷ بودند. روش نمونه گیری این مطالعه به صورت نمونه گیری آسان بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از طریق طراحی یک فرم بوده که متغیرهای مطالعه براساس اهداف در آن آمده است. اطلاعات پس از جمع آوری جهت تجزیه و تحلیل آماری وارد نرم افزار spss گشتند.

یافته ها: نتایج نشان داد که میان گروه مادران با پارگی زودرس کیسه آب و مادران سالم از لحاظ میانگین سن بارداری ($p= ۰/۱۴۲$)، شغل ($p= ۰/۳۶۱$)، عفونت ادراری ($p= ۰/۰۹۳$)، خونریزی در بارداری ($p= ۰/۰۷۲$) ($p=$) اختلاف آماری معناداری وجود نداشت این در حالی بود که میان گروه مادران با پارگی زودرس کیسه آب و مادران سالم از لحاظ سن مادران، تعداد دفعات بارداری ($p= ۰/۰۱۲$)، تحصیلات ($p= ۰/۰۱۸$)، سابقه قبلی پارگی زودرس کیسه آب ($p= ۰/۰۴۶$)، زایمان زودرس قبلی ($p= ۰/۰۱۳$)، تروما ($p= ۰/۰۳۷$)، مراقبت های بارداری مناسب اختلاف آماری معناداری وجود داشت و فراوانی این متغیرها در گروه مادران با پارگی زودرس کیسه آب بیشتر از مادران سالم بود

نتیجه گیری: پارگی زودرس کیسه آب با عوارض متعدد مادری و جنینی همراه است. برخی از عوامل خطر موثر در بروز prom سن کمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ۳۵ سال، تعداد دفعات بارداری بیشتر، سابقه prom، سابقه زایمان زودرس و تروما و مراقبت نامناسب قبل از بارداری می باشد. با آموزش عوامل خطر موثر به مادران باردار می توان بروز و عوارض ناشی از prom را کاهش داد.

کلید واژه: عوامل خطر، پارگی زودرس کیسه آب، کرمان

Abstract

Background and Aim: The aim of this study was to investigate the factors affecting preterm premature rupture of membrane in pregnant women. It was performed at Afzalipour Hospital of Kerman in 1396-1397.

Materials and Methods: This study was a cross-sectional study. The statistical population of this study was all pregnant women with PROM and pregnant women referring to Afzalipour Hospital of Kerman in 1997-96. The study sample was a easy sampling . The data collection tool in this study was by designing a form that included study variables according to the goals. Data were analyzed by SPSS software.


Results: The results showed that there was no statistically significant difference between mothers with premature rupture of membrane and healthy mothers in term of mean of gestational age, Occupation ($p=0/361$) , Urinary tract infection ($p = 0.093$), bleeding in pregnancy ($p = 0.072$) .However there was a significant difference between mothers with premature rupture of membrane and healthy mothers in term of Age of mothers, number of pregnancies, education ($p = 0/018$), previous history of premature rupture of the membrane ($p = 0/046$), previous preterm delivery ($p = 0/013$), trauma ($p = 0/037$) and pregnancy care. the frequency of these variables was higher in the mothers with premature rupture of the membrane than the healthy mothers.

Conclusion: Premature rupture of the membrane is associated with multiple maternal and fetal complications. Some of the risk factors for PROM occurrence :age of onset of 16 years and more than 35 years .multi parity , previous PROM and preterm delivery ,trauma and inappropriate prenatal care.Promoting risk factors to pregnant women can reduce the incidence and complications of PROM.

Keyword: risk factor,premature preterm rupture of membrane,kerman

بسمه تعالی

تاریخ
شماره
پوست



فرم شماره ۵- نمره نهایی دفاع از پایان نامه

پایان نامه تحصیلی خانم فاطمه کلانتری

تحت عنوان: (بررسی عوامل موثر بر فراوانی پارگی زودرس کیسه آب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان افضلای پور شهر کرمان در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶)

جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی

در تاریخ ۹۸/۵/۳۰ با حضور اساتید راهنما و اعضای محترم هیئت داوری دفاع و با میانگین نمره ۱۹/۸۵ مورد تایید قرار گرفت.

استادیار

دکتر مریم دلیلی سمت

استاد راهنما

مرکز آموزشی درمانی افضلای پور
دکتر مریم دلیلی
جراح و متخصص زنان و زایمان،
فلوشیپ فوق تخصصی پریناتالوژی
نظام پزشکی: ۸۸۹۳۸

دکتر رضوان امیری
مهر و امضای سرپرست آموزش بالینی

تذکره فرم می بایست با توجه به نمرات دفاع تکمیل و به تعداد نسخه های پایان نامه تکثیر و در کلیه پایان نامه ها در زمان صحافی درج گردد سپس توسط استاد یا اساتید راهنما و دبیر کمیته پایان نامه ها مهر و امضا شود.



تاریخ
شماره
پوست

فرم شماره ۳- صورتجلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم / آقای در تاریخ دانشجوی دوره دانشکده پزشکی افضلی پور با عنوان در
تاریخ با حضور اعضای محترم هیئت داوران و نماینده دانشکده پزشکی برگزار گردید.

| سمت | نام و نام خانوادگی | نمره (از بیست) | مهر و امضاء |
|--|--------------------|----------------|-------------|
| استاد (ان) راهنما | | | |
| استاد (ان) مشاور | | | |
| عضو هیات داوران | دکتر حسین صادقی | ۱۹/۱۸ | |
| عضو هیات داوران | دکتر سیمین صیقلی | ۱۹/۰۹ | |
| عضو هیات داوران | | | |
| عضو هیات داوران | | | |
| عضو هیات داوران (نماینده شورای پژوهش بالینی) | دکتر سحر حسینی | ۲۰ | |

پس از استماع مراحل اجرا و نتایج حاصله، پایان نامه با درجه و نمره (از بیست) مورد تایید قرار گرفت.
روال برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و صحت مدارک ارائه شده شامل خلاصه مقالات و مقالات استخراج شده از پایان نامه مورد تایید
اینجانب نماینده شورای پژوهش بالینی می باشد.

مهر و امضاء
.....