



University of Groningen

Endoscopy of the upper airways

C.T., Buiter,

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1976

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

C.T., B. (1976). Endoscopy of the upper airways. [S.l.]: [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Stellingen

- 1 Als sanerende ooperatie is een "combined approach tympanoplasty" niet altijd te verkiezen boven een radicale mastoïdectomie.
- 2 Het verdient aanbeveling de patient bij wie een tympanoplastiek verricht is post-operatief te verplegen in anti-Trendelenburg houding van 20 – 25° ten opzichte van horizontaal.
- 3 Voor het röntgenologisch aantonen van een vloeistofspiegel in één der kaakholtes leent zich de combinatie van schedelfoto's: een opname volgens Waters (occipitomentale projectie), waarbij de patient ligt op de éne zijde, samen met een opname volgens Waters, waarbij de patient ligt op de andere zijde, het beste.
- 4 De eis dat een arthroscoop een dieptescherpte heeft van 1 tot bijna oneindig is onredelijk. (H. R. Eikelaar: Arthroscopy of the knee)
- 5 Verwacht mag worden dat in de toekomst het fonetogram een reden tot ont-raden van een bepaalde beroepskeuze kan vormen, zoals dat nu reeds geldt voor het audiogram.
- 6 Bij patienten met een voor een maligne proces suspecte klier aan de hals dienen de bovenste luchtwegen röntgenologisch èn endoscopisch onderzocht te zijn alvorens extirpatie van deze klier pro diagnosi plaatsvindt.
- 7 Aan de operatieve reconstructie van de traanwegen dient rhinologisch onderzoek vooraf te gaan.
- 8 Een proefschrift dient niet te ontaarden in een prentenboek!

Stellingen behorende bij het proefschrift van C. T. Buiters, "Endoscopy of the upper airways", Groningen 1976.