

DISFUNÇÃO ERÉTIL EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS

Alvany Neto Santiago Santana Sousa¹, Bruno Godoi Sant'Ana¹, Marcelo De Vilela Rebouças¹, Gutembergue Silva Oliveira Junior¹, Guilherme de Assis Rodrigues¹; Henrique P Zani².

1. Discente curso de medicina Centro Universitário UniEVANGÉLICA;
2. Docente do curso de medicina Centro Universitário UniEVANGÉLICA

RESUMO: A disfunção erétil é um tipo de disfunção sexual muito comum, sobretudo, nos brasileiros que perpassam os 40 anos, com média de 2 milhões de casos anuais. O objetivo deste estudo foi realizar uma análise detalhada e comparativa da relação entre disfunção erétil (DE) e Diabetes Mellitus (DM). Trata-se de um resumo expandido de 5 artigos encontrados nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, buscados através dos descritores: disfunção erétil, disfunção erétil e diabetes e impotência sexual, que relacionavam DE à DM em alguma parte do estudo, em um período de busca entre 2004 a 2016. Os artigos convergiam em relação ao real aumento de incidência de DE em indivíduos portadores de DM e divergiam na comprovação dessa relação a partir de dados estatísticos significativos provenientes de suas amostras. Além disso, descreveu-se o conceito, a fisiopatologia, e os tratamentos terapêuticos sobre disfunção erétil que foram somados as estatísticas presentes nos trabalhos estudados. Permitindo assim, concluir uma real relação entre o aumento de incidência de DE em portadores de DM.

Palavras-chave:

Disfunção Erétil.
Diabetes Mellitus.
Impotência Sexual.