

ANTITHROMBOTIC STEWARDSHIP

Stollingsteam

1. Implementatie van een multidisciplinair stollingsteam in een ziekenhuis resulteert in een significante vermindering van het aantal patiënten met een bloeding of trombose. *(Dit proefschrift)*
2. Een risicopredictie model op basis van elektronisch verzamelde gegevens tijdens de ziekenhuisopname geeft informatie over welke patiënten een verhoogd risico hebben op een $INR \geq 4,5$. *(Dit proefschrift)*
3. Publicatie van de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling 2.0 heeft geen effect op het aantal gerapporteerde anticoagulantia gerelateerde medicatie-incidenten. *(Dit proefschrift)*
4. Implementatie van een multidisciplinair stollingsteam in het ziekenhuis leidt tot een betere naleving van de richtlijnen door artsen. *(Dit proefschrift)*
5. Ondanks implementatie van een multidisciplinair stollingsteam treden voorschrijffouten met laag moleculaire gewicht heparines frequent op. *(Dit proefschrift)*
6. Ongeveer één op de vier gebruikers van directe orale anticoagulantia is therapieontrouw. Een structurele organisatie is nodig om de therapietrouw te bevorderen. *(Borne et al. BMC Cardiovascular Disorders. 2017;17:236)*
7. Tweemaal daags doseren van laag moleculaire gewicht heparines leidt tot een verhoogde kans op bloedingen ten opzichte van eenmaal daags doseren. *(Van Rein et al. Journal of thrombosis and haemostasis. 2017;15:1386-91)*
8. Bij patiënten met vitamine K-antagonist-gerelateerde intracraniale bloedingen is een initiële vaste dosis van 1.000IE factor IX protrombinecomplex concentraat inferieur aan de variabele dosering gebaseerd op de INR bij binnenkomst in het ziekenhuis en het lichaamsgewicht. *(Abdoellakhan et al. Neurocrit Care. 2017;26:64-69)*
9. Invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier toegankelijk voor alle zorgverleners leidt tot minder medicatiefouten en verhoogt de efficiëntie. *(Brief van ministerie van VWS, kenmerk MEVA/ICT-2848356)*
10. De stijging van testosteron- en cortisolniveaus van voetbalfans tijdens belangrijke voetbalwedstrijden kan mogelijk bijdragen aan een protrombotische toestand. *(van der Meij et al. Plos One. 2012;7:e34814)*
11. Wie zich niet alles herinnert wat hij wil vergeten, loopt het risico dat hij bepaalde zaken vergeet te vergeten. *(Ilja Leonard Pfeiffer)*

Albert R. Dreijer