


# Veileder til startpakkene for kartlegging av marint biologisk mangfold Troms



**Hovedkontor**

Gaustadalléen 21  
0349 Oslo  
Telefon (47) 22 18 51 00  
Telefax (47) 22 18 52 00  
Internet: www.niva.no

**Sørlandsavdelingen**

Televeien 3  
4879 Grimstad  
Telefon (47) 37 29 50 55  
Telefax (47) 37 04 45 13

**Østlandsavdelingen**

Sandvikaveien 41  
2312 Ottestad  
Telefon (47) 62 57 64 00  
Telefax (47) 62 57 66 53

**Vestlandsavdelingen**

Postboks 2026  
5817 Bergen  
Telefon (47) 55 30 22 50  
Telefax (47) 55 31 22 14

**Midt-Norge**

Pirsenteret, Havnegata 9  
Postboks 1266  
7462 Trondheim  
Telefon (47) 22 18 51 00  
Telefax (47) 73 54 63 87

Tittel Veileder til startpakkene for kartlegging av marint biologisk mangfold. Troms	Løpenr. (for bestilling) 5403-2007	Dato 21. aug 2009
	Prosjektnr. Undernr. O 26049	Sider Pris 74
Forfatter(e) Rinde, Eli Rygg, Brage Norderhaug, Kjell Magnus Nygaard, Kari Longva, Oddvar (NGU) Olsen, Heidi Anita (NGU) Bodvin, Torjan (HI) Steen, Henning (HI)	Fagområde Biologisk mangfold	Distribusjon
	Geografisk område Troms	Trykket NIVA

Oppdragsgiver(e) Direktoratet for naturforvaltning (DN), Fiskeridirektoratet (Fiskeridir), Statens forurensningstilsyn (SFT), Forsvarsbygg	Oppdragsreferanse
---	-------------------

Sammendrag Den foreliggende rapporten utgjør en veileder til Troms sin digitale startpakke, med oversikt over hvilke informasjon som er inkludert i startpakken, status for kartleggingen for de ulike naturtypene, og et forslag til prioritering av framtidig innsats for å få kartlagt de gjenstående viktigste forekomstene.
---

Fire norske emneord 1. Kartlegging 2. Biologisk mangfold 3. Marine naturtyper 4. Habitatklasser	Fire engelske emneord 1. Mapping 2. Biological diversity 3. Marine nature types 4. Habitat-classes
---	--

  
**Kari Nygaard**  
Prosjektleder

  
**Mats Walday**  
Forskningsleder  
ISBN 978-82-577-5138-8

  
**Bjørn Faafeng**  
Seniorrådgiver

## Forord

For kartlegging av marint biologisk mangfold etter DNs håndbok nr. 19 har det vært behov for å etablere kostnadseffektive kartleggingsmetoder, struktur for organisering av arbeidet, sammenstilling og kartfesting av eksisterende data for de ulike naturtypene og å utvikle et best mulig kartgrunnlag med oversikt over den potensielle utbredelsen til ulike typer marine leveområder. Dette arbeidet ble gjennomført i perioden 2003-2006 gjennom pilotstudier i Aust-Agder, Hordaland, Nordland og Finnmark i det nasjonale programmet "Kartlegging og overvåking av biologisk mangfold".

Den foreliggende rapporten utgjør en veileder til **Troms** sin digitale startpakke, med oversikt over hvilken informasjon som er inkludert i startpakken, status for kartleggingen for de ulike naturtypene, og et forslag til prioritering av framtidig innsats for å få kartlagt de gjenstående viktigste forekomstene.

Arbeidet med å utvikle startpakkene og anbefalingene i veilederne er utført i et samarbeid mellom Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI), Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Høgskolen i Bodø (HiBo).

Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Forsvarsdepartementet har finansiert arbeidet.

Oslo, 6. mai 2007

*Kari Nygaard*  
*Prosjektleder*

---

---

# Innhold

<b>Sammendrag</b>	<b>6</b>
<b>Summary</b>	<b>7</b>
<b>1. Bakgrunnen for etablering av startpakkene og forslaget til inndeling i kommunegrupper</b>	<b>8</b>
<b>2. Hvilke data er inkludert i startpakkene?</b>	<b>8</b>
2.1 Registrerte observasjoner	9
2.2 Beregninger av forekomst av poller, oksygensvake fjorder og sterke tidevannsstrømmer	9
2.3 Modellert utbredelse av habitater	11
<b>3. Naturtyper som anses godt kartlagt gjennom pilotperioden med hensyn til nasjonalt viktige forekomster</b>	<b>11</b>
<b>4. Opprettelse av skoleprosjekt for å få kartlagt Litoralbasseng (I06)</b>	<b>12</b>
<b>5. Naturtyper som bør kartlegges på et nasjonalt nivå</b>	<b>13</b>
5.1 Løstliggende kalkalger (I10)	13
5.2 Korallforekomster (I09)	13
<b>6. Behov for avgrensning, verifisering og verdisetting av data i startpakkene</b>	<b>13</b>
6.1 Registrerte observasjoner	13
6.2 Beregninger av forekomst	14
6.3 Modellering av potensielle områder for tareskog, ålegras og bløtbunnsområder i strandsonen	14
6.4 Etablering av manuskart for avgrensning / verifisering i felt eller gjennom intervju	15
<b>7. Kriterier for verdisetting av forekomster av naturtypene</b>	<b>15</b>
<b>8. Forslag til organisering i kommunegrupper for Troms</b>	<b>20</b>
<b>9. Status og anbefalinger på fylkesnivå</b>	<b>20</b>
9.1 Større tareskogforekomster (I01)	21
9.2 Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)	21
9.3 Israndavsetninger (I07)	21
9.4 Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)	22
9.5 Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)	22
9.6 Skjellsandforekomster (I12)	22
9.7 Østersforekomster (X11)	22
9.8 Større kamskjellforekomster (X12)	23
9.9 Gyteområder for fisk (X13)	23

---

<b>10. Referanser</b>	<b>23</b>
<b>11. Vedlegg</b>	<b>26</b>
<b>Vedlegg A. Oversikt over de viktigste kildene til data fra nasjonale databaser i startpakkene.</b>	<b>26</b>
<b>Vedlegg B. Oversikt over modellerte data, inkludert informasjon om metadata som varierer mellom datasettene.</b>	<b>29</b>
<b>Vedlegg C. Status og anbefalinger på fylkesnivå</b>	<b>31</b>
<b>Vedlegg D. Status og anbefalinger på kommunegruppenivå</b>	<b>35</b>
11.2 Sør-Troms	35
11.3 Midt-Troms	37
11.4 Nord-Troms	39
<b>Vedlegg E. Status og anbefalinger per kommune</b>	<b>42</b>
11.5 Sør-Troms	42
11.5.1 Tranøy	42
11.5.2 Bjarkøy	43
11.5.3 Sørreisa	44
11.5.4 Dyrøy	46
11.5.5 Harstad	47
11.5.6 Salangen	48
11.5.7 Ibestad	50
11.5.8 Kvæfjord	51
11.5.9 Lavangen	52
11.5.10 Gratangen	54
11.5.11 Skånland	55
11.6 Midt-Troms	56
11.6.1 Tromsø	56
11.6.2 Lenvik	58
11.6.3 Berg	59
11.6.4 Balsfjord	61
11.6.5 Torsken	62
11.6.6 Målselv	63
11.7 Nord-Troms	65
11.7.1 Skjervøy	65
11.7.2 Karlsøy	66
11.7.3 Kvænangen	68
11.7.4 Lyngen	69
11.7.5 Nordreisa	70
11.7.6 Kåfjord	72
11.7.7 Storfjord	73

---

## Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over status og anbefalinger for kartleggingen av hver av naturtypene for Troms på fylkes-, kommunegruppe- og kommunenivå. Det er foreslått en inndeling i 3 kommunegrupper i Troms: Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms.

Basert på stortareskogmodellen er naturtypen forventet i de ytre kystområdene i alle kommunegruppene. Det anbefales oppfølgende feltarbeid for å validere modellene.

Det er beregnet fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet for mange av kommunene i fylket. Det anses ikke nødvendig med ytterligere kartlegging av naturtypen i regionen. Israndavsetninger er kartlagt ut fra geologiske kart og en grov dybdemodell og påvist i alle kommunegruppene. Analyser av mer detaljerte dybdedata, vil påvise flere israndavsetninger. Det trengs ikke nye feltregistreringer, men en gjennomgang av detaljerte dybdedata bør gjøres.

Bløtbunnsområder i strandsonen er både modellert og observert i fylket og det er potensielt store områder av naturtypen i alle deler av fylket. Dårlige dybdedata gjør modellene usikre i enkelte områder. Innsamling av informasjon gjennom intervju og feltvalidering av de modellerte områdene gis høy prioritet. Ålegras er ikke modellert eller registrert i Troms. Ekstraunis-klassen viser at det er potensiale for forekomst av ålegras i alle kommunene. Status mht. kartlegging av denne naturtypen anses derfor som dårlig. Omfattende feltkartlegging av skjellsand er utført i mesteparten av fylket og naturtypen anses som godt kartlagt. Det anbefales ikke ytterligere kartlegging av skjellsand. Østers forekommer ikke nord for polarsirkelen. Kamskjell forventes ikke i større forekomster, men det er store forekomster av haneskjell (i kategori A og B) i fylket. Feltverifisering av forekomstene prioriteres høyt, men med utgangspunkt i intervjuer og bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell i regionen.

Gyteområdene i Troms er i varierende grad kartlagt og dokumentert. Det anbefales at kartleggingen gis høy prioritet og samordnes med Havforskningsinstituttets arbeid i forbindelse med kysttorsk-problematikken.

## Summary

Title: Instruction manual for mapping of marine biological diversity in the Norwegian county Troms.

Year: 2007

Author: Rinde, Eli; Rygg, Brage; Norderhaug, Kjell Magnus; Nygaard, Kari; Longva, Oddvar; Olsen, Heidi Anita; Bodvin, Torjan; Steen, Henning

Source: Norwegian Institute for Water Research, ISBN No.: 978-82-577- 5138-8

The report gives an overview of the current status and provides recommendations for the mapping of nature types in relation to marine biological diversity in the County of Troms. The municipalities are suggested organised in three clusters: Sør-Troms, Midt-Troms and Nord-Troms.

Models indicate the presence of kelp forests along most of the coast of all clusters. It is recommended to update the mapping through interviews and targeted field validation. Calculations show that fjords with a deficiency of bottom water oxygen exist in inshore areas in many municipalities. No further mapping of this nature type is needed. Ice marginal deposits have been mapped from geological maps and a crude depth model. Such deposits are found throughout the county. Analyses using better bathymetric models will reveal many more deposits and this is recommended. Soft sediment areas in the littoral zone have been modelled and observed within the county and covers potentially large areas, but the status of mapping for this nature type is poor. It is recommended that mapping of these soft sediment areas is given high priority.

The potential existence of eelgrass beds is not modelled for Troms and there are no registrations of this nature type. However, the extraeunis classification shows potential for eelgrass beds in all municipalities. The status of the mapping of eelgrass habitat is hence regarded as poor, and fieldwork based on information from interviews for this purpose is recommended. Shell sand beds have been mapped in all three clusters. No further mapping for this nature type is recommended. Oyster beds are not found north of the Polar Circle. Major communities of clams are not expected, however large stocks of scallops exist and mapping of these scallop stocks based on interviews and field validation should be given high priority and coordinated with work done by the Marine Institute.

The quality of the mapping of spawning areas varies highly in Troms. Mapping should be given high priority and coordinated with the work of the Marine Institute's work on coastal cod stocks.

# 1. Bakgrunnen for etablering av startpakkene og forslaget til inndeling i kommunegrupper

For kartlegging av marint biologisk mangfold etter DNs håndbok nr 19 har det vært viktig å etablere kostnadseffektive kartleggingsmetoder, og en hensiktsmessig organisering av arbeidet. I tillegg har etablering av et godt kartgrunnlag vært ansett som helt nødvendig for å kunne utføre en kostnadseffektiv kartlegging. Målet til de marine pilotstudiene i det nasjonale programmet "Kartlegging og overvåking av biologisk mangfold" har derfor vært å utvikle effektive kartleggingsmetoder i felt, sammenstille og kartfeste eksisterende data fra sentrale databaser for de ulike naturtypene og utvikle et best mulig kartgrunnlag med oversikt over den potensielle utbredelsen til ulike typer marine leveområder. Dette arbeidet ble gjennomført i perioden 2003-2006 gjennom pilotstudier i Aust-Agder, Hordaland, Nordland og Finnmark i det nasjonale programmet "Kartlegging og overvåking av biologisk mangfold".

De anbefalte kartleggingsmetodene for de ulike naturtypene og hovedstrukturen for organiseringen av arbeidet er beskrevet i den reviderte versjonen av DNs håndbok 19 for den marine kartleggingen.

De innsamlede data og kart med oversikt over den potensielle utbredelsen til ulike typer habitater er inkludert i DNs NATURBASE og er tilgjengelige for fylker og kommuner fra og med mars 2007. Denne rapporten gir en oversikt over hvilke data som er inkludert i de digitale startpakkene og hvilke habitat det er laget potensielle utbredelseskart for. Som grunnlag for planlegging og beregning av kostnadene til den forestående kartleggingen i alle kystkommunene er det etablert et forslag til inndeling i kommunegrupper for hvert av kystfylkene. De involverte kommunene i pilotstudiene har anbefalt et samarbeid mellom kommuner både å samle og fokusere ressurser på kartlegging av felles naturtyper, men også for å øke motivasjonen for kartleggingsarbeidet. Den foreslåtte inndelingen er tentativ, og er basert på å samle kommuner innen fylket som har lignende naturtyper, landskapsstruktur og vannforekomster etter Eus vannrammedirektiv. Med unntak av Vest-Agder (som har organisert arbeidet sitt gjennom et samarbeid som involverer alle kommunene) krysser ingen av de foreslåtte kommunegruppene økoregiongrenser. Inndelingen i kommunegrupper er brukt som veiledning for å få oversikt over datatilgangen til de ulike naturtypene for ulike områder, og for å kunne gi råd i forhold til fordeling av ressurser etter anslått behov for supplerende kartlegging.

For hvert fylke og kommunegruppe er det laget en oversikt over status for kartleggingen for de ulike naturtypene, og et forslag til prioritering av innsatsen basert på behovet for å få kartlagt de viktigste forekomstene av hver av naturtypene. Det er også laget en oversikt over status og prioritering for hver enkelt kommune.

Denne rapporten gir ovsikt over status og prioriteringer for **Troms**. Kap 1-7 er felles for hver av de fylkesvise startpakkeveilederne.

## 2. Hvilke data er inkludert i startpakkene?

Startpakkene inneholder informasjon fra ulike typer undersøkelser; blant annet fra ressurskartlegginger, vitenskapelige undersøkelser, tidligere sammenstillinger av habitatinformasjon (OSPAR), beregninger basert på sjøkart og modellering av potensielle habitater. Noen av dataene er

fra registreringer eller målinger gjennom feltundersøkelser, andre er basert på intervju eller spørreundersøkelser, og noen er beregnet eller modellert ut fra sjøkart eller georefererte miljøvariable.

De ulike kildene og metodene som er benyttet varierer både i dekningsgrad og kvalitet (kap. 11 Vedlegg A). Feltundersøkelsene spenner fra store dekkende datasett gjennom multistråleteknikk, til detaljerte observasjoner av naturtypen langs linjer / transekter gjennom dykkeundersøkelser eller bruk av ROV ("Remote Operated Vehicle") eller senkekamera, til punktinformasjon innhentet via senkekamera, vannkikkert eller grabb-undersøkelser. Senkekamera gir god informasjon om forekomsten til naturtypen i det undersøkte punktet, ROV gir informasjon av en tilsvarende kvalitet for linjen/transektet som senkekameraet gir for det registrerte punktet. Vannkikkert gir på samme måte som senkekamera, en god oversikt over naturtypen på et overordnet nivå, i forhold til mer detaljerte studier (gjennom dykke- eller grabbundersøkelser) der det hentes inn prøver eller gjøres mer kvantitative undersøkelser av egenskaper til naturtypen. Datatypene som er inkludert i startpakken omfatter punkter, polygoner og linjer.

Det kan grovt skilles mellom tre hovedtyper data i startpakken

- registrerte observasjoner gjennom feltundersøkelser, registreringer fra litteratur, eller fra intervju-undersøkelser
- beregnede forekomster av naturtyper
- modellerte forekomster av potensielle habitater

Kvaliteten til dataene varierer både ut fra formålet med undersøkelsen, hvilken metode som er brukt og hvilken skala som er benyttet (gjelder både feltundersøkelsene, beregningene og modelleringene). De beregnede eller modellerte forekomstene er evaluert for noen få utvalgte områder, og graden av usikkerhet eller pålitelighet til modellene vil variere mellom ulike regioner og områder. Dette er det tatt hensyn til i rapporteringen av status og prioritering av innsats for de ulike fylkene.

## **2.1 Registrerte observasjoner**

De registrerte observasjonene er data hentet fra sentrale kilder med vekt på digital informasjon. Dette har vært en viktig avgrensning. Regionale data og data som bare finnes på papir har bare unntaksvis blitt inkludert. Sammenstilling og digitalisering av slike data må gjøres på regionalt nivå, og er en viktig oppgave for de fylkesvise gruppene. I tillegg til data fra de sentrale kildene er feltregistreringene som er utført innen programmet i pilotperioden inkludert. Oversikt over kildene til de registrerte observasjonene er beskrevet i kap. 11 Vedlegg A. I tillegg gir egenskapstabellen til shapefilene og metadata for data som er inkludert i NATURBASE, nyttig informasjon som kildevurdering (kvalitet), type registrering og dataeier. Oversikt over metadata til de registrerte og beregnede datasettene er gjengitt i Tabell 1.

## **2.2 Beregninger av forekomst av poller, oksygenvake fjorder og sterke tidevannsstrømmer**

Høgskolen i Bodø har gjort beregninger av forekomst av fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold, poller og sterke tidevannsstrømmer for kysten fra Rogaland og nord til og med Finnmark. Metoden er basert på innflytelsen av tidevann, og er ansett som lite egnet for Skagerrak-kysten. Kartgrunnlaget for beregningene er sjøkart fra Statens kartverk: Den Norske Kyst. Målestokk 1:50 000 og 1.100 000. Programmet SeaPro ver. 5.102 er benyttet til å identifisere de ulike forekomstene basert på beregning av topografisk tidevannsfaktor ("Topography Tidal Factor", TTF) ut fra informasjon om areal, bassengdyp og munningstopografi. Metoden er beskrevet i Skreslet et al. (2006).

**Tabell 1.** Metadata for registrerte og beregnede datasett i startpakkene. Kodene for Kildetype er: 1-Feltundersøkelser, 2-Innmeldte opplysninger, 3-Intervju/spørreskjema, 4-Litteratur, 5-Vitenskapelige samlinger. Kodene til Kildevurdering er: 1-Sikker, 2-Usikker, 3-Sannsynlig, 4-Ikke vurdert

Fylke

Naturtype

SOSI-kode

Fjordkatalogen\_ID

ID

Områdenavn

Kommunenavn

Kommune-/områdenummer(3+3)

BM-verdi

Type registrering

Kildetype (kode 1-5)

Kildevurdering (kode 1-4)

Dato (datafangst)

Projeksjon

Koord nord

Koord øst

Parameter (en kolonne for hver)

Parameter

Parameter

Lagringsform

Dataeier (institusjon)

Kommentarer

### **Naturlig oksygen svake fjorder**

Alle fjorder med terskeldyp grunnere enn 50 m er undersøkt. Fjorder med dypere terskler mottar trolig regelmessige innstrømninger av dypvann over terskelen. De oksygen svake fjordene er definert som fjorder med beregnet indeksverdi (TTF) lavere enn 0.02.

### **Poller**

Følgende sett av kriterier er benyttet for å skille poller fra fjorder:

- Vannsøylen er todelt, med et blandingslag og et underliggende bassengvann som er permanent eller periodisk oksygenholdig
- Blandingslagets dybde er lik eller større enn terskeldypet gjennom hele året
- Slaggrunnslinjen krysser ikke terskelområdet men går ubrutt forbi på utsiden av åpningen
- Terskelens bredde er mindre enn distansen fra sadeldypet til bassengets indre ende

Pollene er identifisert ut fra uavbrutt slaggrunnslinje på sjøkartene. Basert på utregning av indeksverdien er det skilt mellom poller som kan karakteriseres som oksygen svake ( $TTF < 0.02$ ) eller oksygenrike ( $TTF > 0.02$ ).

### **Sterke tidevannsstrømmer**

Poller og fjorder som er beregnet å være oksygenrike ( $TTF > 0.02$ ) er antatt å ha et strømrøkt sund som innløp. Oksygenrike poller og fjorder ( $TTF > 0.02$ ) er identifisert som polygoner (poll\_strom.shp/fjord\_strom.shp). I tillegg er det etablert en punkt-shapefil over punkter i terskelområdet til disse polygonene for å indikere sannsynlige områder med sterk tidevannsstrøm.

Metoden kan ikke identifisere tidevannstrømmer i sund mellom to åpne sjøområder (sund mellom øyer og i arkipeler). Beregningene har derfor vært avgrenset til tidevannstrømmer i åpninger til sjøområder som er omkranset av land på minst tre kanter (dvs fjorder og poller). Beregningene av sterke

tidevannsstrømmer er supplert med data om forekomst av naturtypen fra alle kystvaktfartøy langs kysten.

## 2.3 Modellert utbredelse av habitater

For naturtypene tareskog (hele landet), bløtbunnsområder i strandsonen (hele landet unntatt Barentshavregionen) og ålegras (Skagerrak) er det laget modeller som viser den potensielle utbredelsen til naturtypen i utvalgte områder. I tillegg er det gjort en modellering / klassifisering av alle norske kystområder med hensyn til 8 klasser av bølgeeksponering og 7 dybdeklasser (EUNIS habitatklasser). EUNIS-inndelingen gir en god oversikt over habitatmangfoldet til de norske kystområdene, og vil gjøre det lettere å få oversikt over og planlegge den framtidige innsatsen av kartlegging av marine naturtyper. Ved å koble land (høyde) og sjødata (dybde) har vi etablert en god terrengmodell med 25 m oppløsning for hele landet (med unntak av Barentshavregionen pga manglende kystnære dybde data), som koblet med eksponeringsgrad gir en god oversikt over hvor det er mulig å finne ålegras (jf senere anbefalinger for kartlegging av ålegras). Rinde et al. (2006) gir en detaljert beskrivelse av modellene og en evaluering av disse.

Generelle metadata for de modellerte naturtype(habitat)forekomstene som ble sendt over til DN 29. november 2006 er:

**Dato:** 29. november 2006

**Data eier:** NIVA

**Formål:** Modellene er utviklet som verktøy for kommunenes kartlegging av marine naturtype

**Skala for den underliggende bølgeeksponeringsmodellen:** 25x25 m

**Geografisk koordinatsystem:** Datum WGS 84 og projeksjon UTM sone 33

**Dokumentasjon:** Link til denne rapporten på DN's internettside for den marine kartleggingen

Metadata som varierer mellom datasettene og som er angitt i kap. 11 Vedlegg B er:

**Modell versjon**

**Navnet på datasettet (= filnavnet)**

**Skala på dybdemodellen**

**Treffprosent** (kun relevant for tareskog og ålegras)

**Geografisk område / økoregion**

## 3. Naturtyper som anses godt kartlagt gjennom pilotperioden med hensyn til nasjonalt viktige forekomster

Det er noen av naturtypene som anses for godt kartlagt gjennom pilotperioden med hensyn til nasjonalt viktige forekomster for hele landet. Disse er Sterke tidevannsstrømmer, Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet, Spesielt dype fjorder, Poller (med unntak av Sør-Norge), Israndavsetninger og østersforekomster. Nedenfor gis det en generell beskrivelse av status og anbefalinger for kartlegging av disse naturtypene for alle fylkene.

**Sterke tidevannsstrømmer (I02):** De nasjonalt viktige er ansett som kartlagt gjennom informasjon hentet fra alle kystvaktfartøy langs kysten, og gjennom Høgskolen i Bodøs beregninger. Naturtypen er lite aktuell i Sør-Norge pga små tidevannsvariasjoner.

Det mangler imidlertid arealinformasjon og informasjon om strømstyrke til mange av de registrerte forekomstene. Denne informasjonen og resterende kartlegging av regionalt og lokalt viktige forekomster anbefales å bli dekket gjennom de fylkesvis koordinerte intervjuundersøkelsene og sammenstilling av eksisterende kunnskap fra rapporter.

**Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03):** I Sør-Norge er denne naturtypen godt kartlagt gjennom en litteraturstudie (jf referanselisten for naturtypen i kap. 10). For Rogaland og nord til Finnmark er det gjort beregninger basert på metoden beskrevet i Skreslet (2006). Det er anslått at metoden vil fange opp mulige forekomster av naturtypen, og at det er tilstrekkelig med en kvalitetssikring av disse gjennom de fylkesvise innsamlingene av eksisterende kunnskap (intervju og eksisterende litteratur). I Rogaland er noen av de beregnede oksygenfattige fjordene ikke observert og dermed ikke sikre forekomster av naturtypen. Siden metoden er usikker i dette området er det et ekstra behov for kvalitetssikring av disse.

**Spesielt dype fjordområder (I04):** anses som ferdig kartlagt både med hensyn til nasjonalt og regionalt viktige forekomster.

**Poller (I05):** De store og nasjonalt viktigste (verdi A) er kartlagt. De mindre, regionalt og lokalt viktige bør dekkes gjennom intervju. Det mangler data for Sør-Norge, fra Vest-Agder til Østfold. Det kan ligge informasjon om forekomst av poller som kommentarer i DN's database. Denne informasjonen lot seg ikke søke opp og hente ut fra basen i en operasjon, og en må gå gjennom hvert polygon for å undersøke om det er tilknyttet informasjon om poll eller ei til polygonet. Det har ikke vært mulig å utføre dette for hele landet i pilotperioden, men det kan eventuelt gjøres fra DN sentralt, eller i de fylkesvise gruppene. Denne gjennomgangen ble gjort for Hordaland i pilotperioden.

**Israndavsetninger (I07):** De største og nasjonalt viktige er ansett som kartlagt. En gjennomgang og tolking av terrengmodeller basert på de nyetablerte 25 m dybdemodeller som er etablert gjennom prosjektet vil sannsynligvis fange opp resterende forekomster av regional og lokal betydning.

**Østersforekomster (X11):** Det er god oversikt over de viktige utformingene (naturlige poller og grunne bukter). Det har imidlertid vært en stor oppblomstring de siste årene og arten har utviklet seg fra å tidligere være ansett som en truet art til å kunne bli en kommersiell ressurs. Som ressurs er arten dårlig kartlagt. Østers finnes nå også i ytre kystområder. Norge har den eneste sykdomsfrie bestanden i Europa. Det er god kunnskap om utbredelse av arten, men det mangler informasjon om tetthet. Intervjuundersøkelser relevant opp til Lofoten.

## 4. Opprettelse av skoleprosjekt for å få kartlagt Litoralbasseng (I06)

Det vil bli igangsatt et skoleprosjekt i løpet av 2007 for å få kartlagt litoralbasseng. Naturtypen bør i tillegg søkes kartlagt gjennom intervjuundersøkelsene og ved gjennomgang av flyfoto / skråfoto i de fylkesvise gruppene eller i kommunegruppene. Naturtypen har ikke vært inkludert i gjennomgangen av de sentrale, digitale kildene og er i utgangspunktet ansett som dårlig kartlagt i alle fylker og kommuner.

## 5. Naturtyper som bør kartlegges på et nasjonalt nivå

To av naturtypene vil kreve omfattende kartlegging for å få oversikt over nasjonalt og regionalt viktige forekomster. Disse er:

- Løstliggende kalkalger (I10) og
- Korallforekomster (I09)

### 5.1 Løstliggende kalkalger (I10)

En god del forekomster av løstliggende kalkalger vil kunne bli kartlagt gjennom detaljerte sedimentkartlegginger utført av NGU, enten i forbindelse med den foreslåtte skjellsandkartleggingen i programmet (jf nedenfor) eller i forbindelse med kartlegginger som foregår i andre prosjekter (bl.a. MAREANO, Astafjord-prosjektet, SUSHI-Map m.fl.). Det er inkludert mange registreringer med punktinformasjon om forekomst av løstliggende kalkalger fra tidligere undersøkelser utført av NGU. En analyse av disse dataene vil kunne bli benyttet til å etablere kunnskap om hvor naturtypen kan forventes. I tillegg vil intervjuundersøkelsene kunne fange opp noen av forekomstene av løstliggende kalkalger.

### 5.2 Korallforekomster (I09)

Den nasjonale prosjektgruppen anbefaler at kartlegging av korallforekomster er et nasjonalt ansvar og ikke et regionalt/lokalt ansvar. Kartlegging av aktuelle lokaliteter kan foretaes ved hjelp av multistrålelodd og verifisering ved bruk av ROV. Arbeidet krever både spesialisert utstyr, båt og personell, noe som innebærer høye kostnader, i størrelsesorden kr 50.-100.000,- pr døgn. Prosjektgruppen foreslår at en bør styrke den kartleggingen av korallforekomster som per i dag gjennomføres.

Arbeidet på regionalt og lokalt nivå bør fokusere på å gå gjennom ”grå litteratur” og å få innhentet og digitalisert eksisterende kunnskap om forekomster.

Det er viktig at kunnskapen om korallforekomster blir gjort tilgjengelig fortløpende til fiskerne via OLEX systemet, slik at nøyaktig lokalisering av korallrevne fremkommer på fiskernes kartsystemer.

## 6. Behov for avgrensning, verifisering og verdisetting av data i startpakkene

### 6.1 Registrerte observasjoner

Mange av de registrerte forekomstene for de ulike naturtypene er inkludert i startpakkene som punkter. Noen er registrert som linjer. Det vil være behov for å avgrense utbredelsen til naturtypen for disse forekomstene. En slik avgrensning er hensiktsmessig i forhold til å ta hensyn til forekomsten ved arealplanlegging generelt, men er også nødvendig for å kunne verdisette forekomsten siden de fleste av de foreslåtte kriteriene for verdisetting (jf kap 7) er basert på størrelse som et uttrykk for forekomstens betydning ut fra økologisk funksjon.

Avgrensingen kan skje gjennom nye feltundersøkelser av naturtypen, gjennom intervjuundersøkelser eller gjennom sammenholding med ny informasjon innhentet fra ”grå litteratur” i de fylkesvise gruppene. De registrerte observasjonene (og de beregnede forekomstene av tidevannsstrømmer, oksygenfattige fjorder og poller, jf nedenfor) bør sammenholdes med resultatene fra fylkesgruppens gjennomgang og digitalisering av informasjon fra rapporter for de ulike naturtypene. Flere kilder som angir samme forekomst vil styrke påliteligheten til dataene.

## **6.2 Beregninger av forekomst**

De beregnede forekomstene av poller, sterke tidevannsstrømmer og oksygen svake fjorder bør verifiseres gjennom intervjuundersøkelser. Som over vil det være hensiktsmessig å sammenholde de beregnede forekomstene med resultatene fra de fylkesvise gjennomgangene av ”grå litteratur”.

## **6.3 Modellering av potensielle områder for tareskog, ålegras og bløtbunnsområder i strandsonen**

De potensielle områdene for de ulike naturtypene som identifiseres i modellene har ulik grad av pålitelighet. Dokumentasjonsrapporten for modelleringsarbeidet (Rinde et al 2006) gir en utdypende forklaring av modellenes svakheter og styrker, og gir tall på påliteligheten av prediksjonene både av forekomst og fravær av naturtypen. Her er en generell beskrivelse av hvor de ulike modellene er ansett som pålitelige og hvor der er ansett som mindre pålitelige. I områder som ikke dekkes av modellene eller der modellene er mindre pålitelige er det nødvendig å verifisere eller supplere modellene med registreringer i felt eller gjennom de fylkesvise gjennomgangen av eksisterende informasjon i grå litteratur eller via intervju.

### **Tareskog**

Tareskogsmodellene vil i stor grad fange opp de største forekomstene av stortareskog, som finnes i de ytre, eksponerte kystområdene. Modellene fanger ikke opp fravær av tareskog på nedbeitede områder, som kan ha stor økologisk betydning. For å kartlegge disse behøves det kartlegging i felt eller innsamling av informasjon fra intervjuer. Nedbeitingproblematikken gjelder fra Sør-Trøndelag og nordover. Fra Rogaland og nord til Sør-Trøndelag har HI overvåking tilknyttet taretråling. Det kan være aktuelt med supplerende registreringer i disse områdene. Modellene gir også mangelfull informasjon i beskytta områder med sterk strøm. Siden det per i dag ikke finnes tilgjengelig arealdekkende strømdata, har det ikke vært mulig å inkludere strøm som faktor i modellene. Det vil derfor være mindre pålitelig informasjon om forekomst av stortare i områder som er beskyttet for bølger, men utsatt for strøm. I Sør-Norge gir Kystovervåkingsprogrammet informasjon om tareskog langs enkelte transekter i de ytre kystområdene. Generelt gjelder det at det kreves oppfølgende kartlegging særlig i indre områder og i Nord-Norge. Det er også behov for å avgrense forekomsten av tareskog innenfor området den er modellert til å forekomme. Siden substrat ikke er inkludert i modellene vil det blant annet være behov for å ekskludere arealer med uegnet substrat for tareskog (løsmasser) fra arealene med modellert sannsynlighet for forekomst.

### **Ålegras**

Ålegras er kun modellert i Skagerrak. Der er det laget en modell for å identifisere alle potensielle områder basert på dybde og grad av bølgeeksponering, og en annen modell som avgrenser og utpeker områder hvor det er mest sannsynlig å finne de største ålegrasengene.

Basert på evalueringen av modellen (Rinde et al 2006) fanger den grove modellen opp over 90 % av ålegrasforekomstene (dvs vanlig ålegras utforminger, *Zostera marina*). Og modellen vil danne et godt grunnlag for å planlegge kartleggingen av de faktiske forekomstene av naturtypen. Modellen som avgrenser det potensielle området basert på skråningsforhold vil sannsynligvis være mindre relevant for kartlegging av de andre utformingene av naturtypen, som ofte forekommer i små flekker som ikke

nødvendigvis fanges opp av den relativt grove skalaen til beregning av skråning. For disse utformingene vil den grove modellen peke ut de potensielle områdene.

I de andre regionene (Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet) har vi identifisert de grunne (0-10 m), beskytta områdene som det vil være relevante å sjekke ut for forekomst av ålegras (denne modellen er kalt "Ekstra-eunisklassen" i oversikten i **Vedlegg B**).

Det er generelt lite data av god kvalitet på ålegras på landsbasis, særlig mht utstrekning. Mange punktdata må avgrenses i forhold til utstrekning. Lokalkjente kan gi god, nyttig informasjon. God informasjon om forekomst av ålegras er viktig, særlig i områder med høyt press på kystarealene.

#### **Bløtbunnsområder i strandsonen**

Potensielle områder for denne naturtypen er identifisert som flate områder (skråning < 3 grader, på ca 40x40 m skala) i dybdeintervallet -1 til +1 m for alle regionene unntatt Barenshavet. De potensielle områdene er dermed indikert for disse regionene. Men siden modellen overestimerer utbredelsen av disse områdene er det nødvendig å sammenholde de modellerte områdene med feltdata, eller informasjon fra intervju eller litteratur i den forestående kartleggingen. De store forekomstene er generelt ansett som godt kartlagt. SFT sitter på papirrapporter fra sårbarhetsundersøkelser for olje for hele landet, der substrattypene til strendene ble godt kartlagt. DNV har opparbeidet et datasett som tilknytter substratinformasjon til kystlinjen basert på disse rapportene og annen informasjon. Denne informasjonen vil etter hvert bli gjort tilgjengelig fra DNV via en wms-løsning.

### **6.4 Etablering av manuskart for avgrensing / verifisering i felt eller gjennom intervju**

For opprettelse av manuskart for de ulike naturtypene for utsjekking gjennom intervju og/eller feltarbeid anbefales det å bruke scannede sjøkart som grunnlagskart. Disse er tilgjengelige digitalt for de fleste Fylkeskommuner gjennom Norge Digitalt samarbeidet via WMS. Linken til Sjøkartverkets tjeneste med slike sjøkart er [http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.sjo\\_hovedkart](http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.sjo_hovedkart).

DNs reviderte håndbok for kartlegging av marine naturtyper gir oversikt over hvilke hensyn som er viktige å ta for gjennomføring av intervjuundersøkelsene.

## **7. Kriterier for verdisetting av forekomster av naturtypene**

Arbeidet med å fastsette kriterier for verdisetting av forekomster av marine naturtyper er kommet relativt kort på grunn av manglende oversikt over de marine naturtypene. Det ble i pilotfasen til det nasjonale programmet etablert generelle kriterier som bør ligge til grunn for verdisettingen (**Tabell 2**), men som ikke vil kunne konkretiseres før en har fått oversikt over den faktiske utbredelsen til de ulike naturtypene og bedre kunnskap om de ulike naturtypenes økologiske funksjon. Basert på dagens kunnskapsgrunnlag er det laget et foreløpig forslag til konkretisering av kriterier for de nasjonalt svært viktige (A) og de regionalt viktige (B) forekomstene (**Tabell 3**). Disse tabellene er hentet fra den reviderte håndboken til den marine kartleggingen (DN håndbok nr 19 2007) som også gir litt mer generell informasjon om verdisetting av naturtyper. Det er viktig å peke på at de foreslåtte kriteriene er basert på mangelfull oversikt over den faktiske utbredelsen til de ulike naturtypene, og at det sannsynligvis vil være behov for å revidere kriteriene etter hvert som vi får bedre oversikt og

kunnskap om utbredelsen til marine arter og naturtyper. Både gjennom programmets supplerende kartleggingsarbeid og andre aktiviteter tilknyttet kartlegging som MAREANO, samt andre prosjekter som gjennomføres av de ulike forskningsinstituttene i Norge (bl.a. Kystovervåkingsprogrammet, sukkertareprosjektet).

Det er for eksempel liten kunnskap om sjeldne eller truede marine arter og naturtyper siden det i liten grad er gjort kartlegging på artsnivå i marine habitater. I tilfeller der kommunen har opplysninger om arter som er sjeldne lokalt kan *habitatene for disse forekomstene* verdsettes som lokalt viktig (C). *Hvis artene er ansett som sjeldne på regionalt eller nasjonalt nivå kan habitatene bli verdsatt som henholdsvis B og A.*

Artsdatabanken har nylig etablert en ny nasjonal rødliste for truede arter (Norsk rødliste 2006). Graden av truethet er basert på seks IUCN-kategorier, og vil også gjelde som kriterier for prioritering av de marine naturtypene.

Følgende kriterier for verdisetting gjelder for alle naturtyper:

A: omfatter kategoriene: Kritisk truet, Sterkt truet og Sårbar

B: omfatter kategoriene: Nær truet

Siden kartleggingen av marine naturtyper foreløpig er kommet svært kort, og kriteriene for å verdsette de ulike forekomstene er foreløpige, er det behov for at det gis tilbakemelding til prosjektstyringsgruppen for programmet dersom det er grunn til å tro at de foreslåtte kriteriene ikke fungerer eller er relevante for ulike regioner.

**Tabell 2.** Generelle kriterier for verdisetting av marine naturtyper

Kriterier	Grunnlag for verdisetting
<i>Økologiske kriterier</i>	
Økologisk funksjon	Naturtyperikdom
	Størrelse
	Alder
	Produksjonsrate
	Lite avvik fra naturtilstand med hensyn på funksjon
Grad av sjeldenhet	Sjelden i regionen
	Sjelden nasjonalt
	Lite avvik fra naturtilstand med hensyn på artsmangfold
Grad av truethet	Små forekomster
	Sårbarhet (lang restitusjonstid)
	I tilbakegang
<i>Kulturbetingede kriterier</i>	
Estetikk	
Bruk og bruksområder	Gir naturforståelse
	Betydning som friluftsområde
	Bruk i undervisning / forskning
	Lange dataserier – kunnskap om utvikling

**Tabell 3.** Foreløpige verdikriterier for marine naturtyper i DNs reviderte håndbok for kartlegging av marine naturtyper (tabell 4.2).

Naturtype	SOSI-kode	Verdisetting og presiseringer (viktige utforminger med sosi-kode)
Større tareskogforekomster	<b>I01</b>	<p><b>A</b> – Lokalteter med store, intakte tareskogområder (&gt;500 000 m<sup>2</sup>). I Skagerrak regnes alle større tareskogsområder som svært viktige selv om utbredelsen er mindre enn 100 000 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>B</b> – Mindre områder med tareskog (~100 000 m<sup>2</sup>). Tareskog i nedbeita områder. Tareforekomster (særlig sukkertare) i beskyttete kyst- og fjordområder.</p> <p>Viktige utforminger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stortareskog kun bestående av stortare (I0101)</li> <li>• Stortareskog med innblanding av andre tarearter (I0102)</li> <li>• Sukkertare i tette forekomster (I0103)</li> </ul>
Sterke tidevannsstrømmer	<b>I02</b>	<p><b>A</b> - de sterkeste strømmene, dvs strømhastighet over 10 knop eller lengden på området er &gt;500m.</p> <p><b>B</b> - alle strømmer over ca. 5 knop</p> <p>Viktige utforminger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trange sund (I0201)</li> <li>• Fjordmunnninger (I0202)</li> <li>• Terskelområder (I0203)</li> </ul>
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet	<b>I03</b>	<p><b>A</b> - fjordområder med permanent naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvann (&lt;2 ml/l)</p> <p><b>B</b> - Fjorder der bunnvannet tidvis har naturlig lavt oksygeninnhold</p>
Spesielt dype fjordområder	<b>I04</b>	<p><b>A</b> - Fjordområder med dyp &gt; 700 m</p> <p><b>B</b> - Fjordområder med dyp i intervallet 500-700 m</p>
Poller	<b>I05</b>	<p><b>A</b> - Poller som er lite påvirket eller upåvirket av menneskelig aktivitet, som er større enn ~200 000 m<sup>2</sup> og/eller har spesielle arter.</p> <p><b>B</b> – Andre poller som er lite påvirket eller upåvirket av menneskelig aktivitet.</p>
Litoralbassenger	<b>I06</b>	<b>A</b> – Store, urørte litoralbasseng (>10 m <sup>2</sup> ).
Israndavsetninger	<b>I07</b>	<p><b>A</b> – Store morenerygger med god kontrast til miljøet for øvrig</p> <p><b>B</b> – Mindre avsetninger</p> <p>Viktige utforminger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Randmorener (I0701)</li> <li>• Breelvavsetninger (glasifluvial) (I0702)</li> <li>• Morene uspesifisert (I0703)</li> </ul>
Bløtbunnsområder i strandsonen	<b>I08</b>	<p><b>A</b> - Større strandflater (&gt; 500 000 m<sup>2</sup>) som er næringsområde for bestander av overvintrende og trekkende vadefugler.</p> <p><b>B</b> - Større strandflater (&gt; 200 000 m<sup>2</sup>) som er næringsområde for stedegne fugler (vadefugler, andefugler) og fisk (kutlinger, flyndrer). Syd for Stad regnes strandflater større enn ~100 000 m<sup>2</sup> som viktige.</p> <p>Viktige utforminger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bølgepåvirkede strender av ren sand (I0801)</li> <li>• Strandflater av mudderblandet sand med skjell og fjæremark (<i>Arenicola</i>), ofte også med spredt vegetasjon av tang på stein ("makkfjære") (I0802)</li> <li>• Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder (I0803)</li> </ul>

Korallforekomster	<b>I09</b>	<p><b>A</b> – Alle store rev av <i>Lophelia</i>, både på eggakanten og i fjordene, og alle tette bestander av hornkoraller.</p> <p>Viktige utforminger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steinkoraller (<i>Lophelia pertusa</i>) (I0901)</li> <li>• Hornkoraller (I0902)</li> </ul>
Løstliggende kalkalger	<b>I10</b>	<p><b>A</b> – Store forekomster av løstliggende kalkalger (mergelbunner). Alle forekomster av ”ekte” mergelarter (sjeldne).</p> <p><b>B</b>– enkeltfunn/mindre forekomster av løstliggende kalkalger</p> <p>Viktige utforminger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorterugl (<i>Lithothamnion glaciale</i>) (I1001)</li> <li>• ”Ekte mergel” <i>Phymatolithon calcareum</i>/<i>Lithothamnion corallioides</i> (I1002). De to artene er sjeldne, men finnes i enkelte områder på sør-vestlandet og vestlandet.</li> <li>• <i>Lithothamnion tophiforme</i> (I1003) (danner løstliggende bestander i Nord-Norge)</li> </ul>
Ålegrasenger og andre undervannsenger	<b>I11</b>	<p><b>A</b> – Større upåvirkede komplekser av undervannsenger (&gt; 50 000 m<sup>2</sup>) og forekomster av sterkt truede utforminger som Dvergålegras, Havfruegras og Kortskuddplante-under-vannseng/forstrand-utforminger.</p> <p><b>B</b> - Alle ålegrasområder i samme fjordbasseng som gytefelt.</p> <p>Viktige utforminger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanlig ålegras (<i>Zostera marina</i>) (I1101)</li> <li>• Dvergålegras (<i>Zostera noltii</i>) (I1102).</li> <li>• Havgras, Tjønnaks-undervannseng (I1103)</li> </ul>
Skjellsandforekomster	<b>I12</b>	<p><b>A</b> - Større sammenhengende forekomster (&gt; 100 000 m<sup>2</sup>) av ren skjellsand på grunt vann ned til ca. 10 m dyp, ofte med spredt bevosning av tare</p> <p><b>B</b> - Større forekomster av ren skjellsand (&gt; 100 000 m<sup>2</sup>). I Skagerrak regnes alle forekomster større enn ca. 20 000 m<sup>2</sup> som viktige.</p>
Østersforekomster	<b>I13</b>	<p><b>A</b> - Poller og terskelfjorder med god forekomst (0,5 - 4 ind/m<sup>2</sup>) av østers med stor aldersspredning og tydelig gjentatt rekruttering. Forekomst av gamle (&gt;12 cm skallbredde) levende individer. Gjelder økoregionene Skagerrak og Nordsjøen (til 62°N)</p> <p><b>B</b> - Økoregionene Skagerrak og Nordsjøen: Større områder (&gt;1000 m<sup>2</sup>) med god forekomst (0,5 - 4 ind/m<sup>2</sup>) av østers med flere årsklasser. Østersbanker (&gt;10 ind/m<sup>2</sup>) i områder større enn 1000 m<sup>2</sup>. Poller eller fjorder som gir hyppig gytesuksess under nåværende klimatiske forhold. Økoregion Norskehavet (62-70 °N): Poller, bukter og fjorder med forekomst av levende østers av flere årsklasser.</p> <p>Viktige utforminger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naturlige poller (I1301)</li> <li>• Grunne bukter (I1302)</li> </ul>

Større kamskjell-forekomster	<b>I14</b>	<p><b>A</b> - Store områder i arealskala 100 km<sup>2</sup>, dominert av sandbunnhabitater hvor bestander med stort <b>kamskjell</b> forekommer i høye tettheter og med bred alderssammensetning. Store arealer (10-50 km<sup>2</sup>), med sand-, stein- og grusbunn hvor bestander med <b>haneskjell</b> forekommer i høye tettheter og med bred alderssammensetning. Fjordlokaliteter hvor relikte haneskjell i store tettheter forekommer.</p> <p><b>B</b> – Områder i arealskala 10-50 km<sup>2</sup>, dominert av sandbunn hvor bestander med <b>stort kamskjell</b> forekommer i høye tettheter og med bred alderssammensetning. Områder i <u>arealskala 1 km<sup>2</sup></u>, med sand-, stein og grusbunn hvor bestander med <b>haneskjell</b> forekommer i høye tettheter og med bred alderssammensetning.</p> <p>Viktige utforminger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stort kamskjell (I1401)</li> <li>• Haneskjell (I1402)</li> </ul>
Gyteområder for fisk		<p><b>A</b> - Gyteområder for store, kommersielt utnyttede bestander, eks. områder i Lofoten og andre kjente, store gyteområder på Vestlandet og i Nord Norge.</p> <p><b>B</b> – Geografisk mindre, men godt dokumenterte lokale gyteområder.</p> <p>Viktige utforminger: Definerte bassenger innenfor terskler hvor gytte egg og nyklekte larver holdes tilbake i området. Særlig viktig: Gytebassenger med nærhet til gode oppvekstområder, eks. ålegrassenger.</p>
Andre viktige marine naturtyper	<b>I15</b>	<p><b>C</b> - områder som vurderes som viktige på lokalt nivå</p> <p>Marine områder av betydning for kommunen</p>

## 8. Forslag til organisering i kommunegrupper for Troms

Det er foreslått en inndeling i 3 kommunegrupper i Troms: Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Oversikt over hvilke kommuner som er inkludert i de ulike gruppene, samt oversikt over totalt sjøareal og strandlinje per kommune er angitt i Tabell 4.

**Tabell 4.** Oversikt over inndeling i kommunegrupper i Troms, med oversikt over sjøareal og strandlengde.

Kommune	Kommunegruppe	Kommun egr.nr.	Sjøareal (km <sup>2</sup> )	Strandlengde (km)
Tranøy	Sør-Troms	19138	414	273
Bjarkøy	Sør-Troms	19138	653	240
Sørreisa	Sør-Troms	19138	29	36
Dyrøy	Sør-Troms	19138	179	100
Harstad	Sør-Troms	19138	419	269
Salangen	Sør-Troms	19138	65	78
Ibestad	Sør-Troms	19138	351	147
Kvæfjord	Sør-Troms	19138	188	187
Lavangen	Sør-Troms	19138	23	31
Gratangen	Sør-Troms	19138	63	76
Skånland	Sør-Troms	19138	86	94
Tromsø	Midt-Troms	19139	1819	1299
Lenvik	Midt-Troms	19139	438	363
Berg	Midt-Troms	19139	261	212
Balsfjord	Midt-Troms	19139	248	216
Torsken	Midt-Troms	19139	539	193
Målselv	Midt-Troms	19139	33	66
Skjervøy	Nord-Troms	19140	1145	308
Karlsøy	Nord-Troms	19140	2167	1086
Kvænangen	Nord-Troms	19140	574	370
Lyngen	Nord-Troms	19140	474	246
Nordreisa	Nord-Troms	19140	243	193
Kåfjord	Nord-Troms	19140	123	83
Storfjord	Nord-Troms	19140	62	67

## 9. Status og anbefalinger på fylkesnivå

Nedenfor gis det en oversikt over status og anbefalinger for kartleggingen av hver av naturtypene for Troms. Kapittel 11. Vedlegg C, D og E. gir en oversikt over anbefalinger på henholdsvis fylke-, kommunegruppe- og kommunenivå.

## 9.1 Større tareskogforekomster (I01)

Basert på stortareskogmodellen er naturtypen forventet i de ytre kystområdene i alle kommunegruppene. Det vil si Bjarkøy i Sør-Troms, Tromsø, Lenvik, Berg og Torsken i Midt-Troms, og Skjervøy og Karlsøy i Nord-Troms. Modellen fanger opp de potensielle store forekomstene av stortareskog i fylket, men den vil ikke fange opp viktige forekomster på beskyttede lokaliteter i områder med strøm, eller forekomster på middels eksponerte områder med kråkebollenedbeiting. Ikke nedbeitet tareskog på eventuelt nedbeita områder vil være viktig å få kartlagt generelt for alle fylkene i Nord-Norge. Det er inkludert noen registreringer av naturtypen i Harstad.

Tareskogmodellen har en relativt høy treffprosent (ca 70 %) i regionen. Det vil generelt være et behov for å avgrense de faktiske forekomstene av stortareskog innenfor de modellerte områdene. Dette kan gjøres ved å ekskludere områder som en gjennom intervjuundersøkelser eller fra andre kilder vet inneholder uegnet substrattypen (løsmasser) for tareskog, og ved gjennom analyser av data på forekomst / ikke forekomst beregne sannsynligheten for forekomst av naturtypen innenfor området med modellert forekomst (fundamental nisje).

Modellene omfatter kun utbredelse av stortareskog, og ikke utbredelse av sukkertare. Sukkertare-utformingen var ikke inkludert i DNs håndbok før i 2007. Det er behov for å sammenstille eksisterende data for tidligere forekomster av sukkertare, og status for naturtypen per i dag. Informasjon om sukkertare kan fås gjennom det pågående sukkertareprosjektet som er finansiert av SFT og ledet av NIVA.

**Feltkartlegging:** Det anbefales å supplere datamengden mht forekomst / ikke forekomst av tareskog i kommunene nevnt over med forventet forekomst av naturtypen. Utvelgelsen av punkter som kartlegges må skje etter et nøye planlagt design der en plukker ut tilfeldige punkter fra områder som dekker ulike habitater innenfor hver av kommunene. Basert på disse og de tilgjengelige data fra pilotperioden vil det være mulig å avgrense utbredelsen til taren innenfor områdene som er modellert til å ha potensiale for forekomst.

### **Avgrensning / kartfesting:**

- 1) ekskludere områder som en gjennom intervjuundersøkelser eller fra andre kilder vet inneholder uegnet substrattypen (løsmasser) for tareskog
- 2) Ved analyser av innsamlede data på forekomst / ikke forekomst av tareskog – etablere sannsynlighetskart for naturtypens forekomst innenfor naturtypens fundamentale nisje.

### **Sukkertareforekomster:**

Inkludere informasjon om sukkertareutforminger fra det pågående prosjektet, og gjennom den foreslåtte supplerende kartleggingen i felt.

## 9.2 Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)

Det er beregnet fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet for mange av kommunene i fylket. Metoden er ansett som pålitelig i områder med tidevann, og det anses ikke nødvendig med ytterligere kartlegging av naturtypen i regionen.

## 9.3 Israndavsetninger (I07)

Naturtypen er kartlagt ut fra geologiske kart og en grov dybdemodell og påvist i alle kommunegruppene. Sjekk av mer detaljerte dybdedata som finnes for det meste av fylket, vil påvise flere israndavsetninger. Det trengs ikke nye feltregistreringer, men en gjennomgang av detaljerte dybdedata bør gjøres.

## 9.4 Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)

Naturtypen er både modellert og observert i fylke. Det er funnet en del registrerte forekomster av naturtypen i de sentrale, digitale kildene.

Modellen predikerer mange potensielle områder i de fleste kommunene i alle kommunegruppene. Unntakene er Sørreisa og Kvæfjord i Sør-Troms, og Kvænangen og Kåfjord i Nord-Troms. Berg og Torsken i Midt-Troms er også uten modellert bløtbunn. Men det skyldes sannsynligvis at dybdemodellen er usikker i dette området pga mangelfulle data. Kommunene med forventet lav forekomst har fått lav prioritering mht kartlegging i felt.

Det er behov for å samle informasjon fra rapporter og kilder som ikke er inkludert i startpakkene, inkludert informasjon om forekomster av naturtypen gjennom intervju. Det er behov for å fastsette utbredelsen til de observerte forekomstene, avgrense og fastsette utbredelsen til reelle forekomster blant de modellerte som ikke er inkludert blant de observerte, og verdisette de ulike forekomstene. Kystlinjen med substratinformasjon fra DNV kan være nyttig i forhold til avgrensing, og verifisering av de modellerte forekomstene.

## 9.5 Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)

Ålegras er ikke modellert for Norskehavregionen, og dermed heller ikke for Troms. Det er ikke funnet noen registreringer av ålegras i de sentrale kildene for fylket.

Ekstraeunis-klassen som angir beskyttede og moderat beskyttede lokaliteter i dybdeintervallet 0-10 m viser at det er potensielle for forekomst av ålegras i alle kommunene. Status mht kartlegging av denne naturtypen anses derfor som dårlig.

Det anbefales å skaffe informasjon om forekomst av naturtypen for alle de relevante kommunene gjennom intervju og fra kilder som ikke er gjennomgått ved utarbeidelsen av startpakkene. Ekstraeunis-klassen vil vise de potensielle områdene med ålegras, og kan sammen med informasjon fra intervju og innsamlet informasjon om observasjoner av naturtypen, benyttes til å avgrense observerte forekomster. Kystlinjen med substratinformasjon fra DNV kan være nyttig i forhold til avgrensing av forekomstene. Ålegras forekommer kun på løsmassebunn og ikke på fjell eller rullesteinsstrand.

## 9.6 Skjellsandforekomster (I12)

Omfattende feltkartlegging av skjellsand er utført i mesteparten av fylket, men det mangler undersøkelser for deler av Karlsøy kommune og for Skjervøy og Kvenangen kommuner. Ønsker man en oversikt over skjellsand som ressurs trengs det svært ressurskrevende feltregistreringer ved hjelp av seismikk og prøvetaking. Anbefalingene på kommunalt nivå er gitt med tanke på skjellsand som ressurs. For formålet med naturtypekartlegging anses de viktigste forekomstene i fylket å være kartlagt og det anbefales ikke videre kartlegging på fylkesnivå.

## 9.7 Østersforekomster (X11)

Gjennom en gjennomgang av tilgjengelig litteratur samt gjennomføring av intervjuer, vil en relativt enkelt kunne registrere "de gamle" forekomstene av østers i kategori A (Svært viktig) eller B (Viktig). Dette vil i all hovedsak dreie seg om poller f.o.m. Rogaland t.o.m. Nordland. Forekomster av østers i kategori A eller B ut over dette vil en kun forvente å finne på Skagerrakkysten. Derfor er feltverifisering i denne regionen prioritert høyt, men med utgangspunkt i intervjuer. Kartlegging av naturtypen er ikke aktuelt i Troms fylke.

## 9.8 Større kamskjellforekomster (X12)

Grenseverdiene for kategori A og B for stort kamskjell er satt så høyt at disse lokalitetene i all hovedsak vil forekomme i de ytre deler av Trøndelag-fylkene og samt i de sørlige deler av Nordland (Helgelandskysten). For haneskjell vil en tilsvarende finne forekomster i disse kategoriene i Troms og Finnmark. Feltverifisering i de omtalte regionene prioriteres derfor høyt, men med utgangspunkt i intervjuer. Kartlegging av Haneskjell i Troms bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell i regionen.

## 9.9 Gyteområder for fisk (X13)

Gyteområdene i Troms er i varierende grad kartlagt, og kartleggingen er hovedsakelig basert på intervjuundersøkelser. Informasjon om gytefelt foreligger sannsynlig på ikke-digitalisert form i sentrale dataregistre, og slik informasjon bør eventuelt sammenstilles og digitaliseres. Ytterligere intervjuundersøkelser anbefales i alle kommunegrupper, og verifisering i felt bør prioriteres dersom gytefelt indikeres gjennom intervjuer. Feltverifisering av gyteområder er relativt kostbart, men synes å være nødvendig da intervjuer gir et noe varierende resultat. For å få en mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene, må dette arbeidet samordnes med HI's arbeid i forbindelse med kysttorsk-problematikken, samt andre aktuelle fiskeslag. En gjennomføring av en fullstendig feltverifisering vil dessuten være avhengig av en vesentlig tilleggsfinansiering på regionalt/lokalt nivå.

# 10. Referanser

### Rapporter som beskriver modeller og beregninger

- Lehmann A, Overton JM, Leathwick JR (2003) GRASP: generalized regression analysis and spatial prediction. *Ecological Modelling* 160:165
- Rinde E, Storeid S-E, Bakkestuen V, Bekkby T, Erikstad L, Longva O (2004) Modellering av utvalgte marine naturtyper og EUNIS klasser. To delprosjekter under det nasjonale programmet for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Report No. NINA Oppdragsmelding 807: 1-33, NINA, Oslo
- Rinde E, Rygg B, Bekkby T, Isæus M, Erikstad L, Storeid S-E, Longva O (2007) Dokumentasjon av modellerte marine naturtyper i DNs Naturbase. Førstegenerasjonsmodeller til kommunenes startpakker for kartlegging av marine naturtyper 2007. NIVA Rapport nr 5321-2006
- Skreslet S, Doksrød T, Frogh M, Krogstad M, Olsen K (2006) Simple identification of some coastal marine habitats by modeling with sea-chart data. *Coastal Management* 34:141-152

### Israndavsetninger

- Andersen, B.G. 1975: Glacial geology of Northern Nordland, North Norway. Norges geologiske undersøkelse 320, Bulletin 33, 74 pp.
- Andersen, B.G., Bøen, F., Rasmussen, A. & Vallevik, P.N. 1979: The deglaciation between Skjerstadvik and Svartisen, north Norway. *Boreas* 8, p. 199-201.
- Andersen, B.G., Bøen, F., Nydal, R., Rasmussen, A. & Vallevik, P.N. 1981: Radiocarbon dates of marginal moraines in Nordland, North Norway. *Geografiska Annaler* 63A, p. 155-160.
- Andersen, B.G., Bøen, F., Rasmussen, A., Rokoengen, K. & Vallevik, P.N. 1982: The Tjøtta glacial event in southern Nordland, North Norway. *Norsk Geologisk Tidsskrift* 62, p. 39-49.
- Andersen, B.G., Mangerud, J., Sørensen, R., Reite, A., Sveian, H., Thoresen, M. & Bergstrøm, B. 1995: Younger Dryas ice marginal deposits in Norway. *Quaternary International* 28, p. 147-169.

- Bargel, T.H. 2001: Løsmassekart over Nordland fylke. Norges geologiske undersøkelse. (Kartet er bl.a. basert på kvartærgeologiske kart i M 1:50.000 utgitt vesentlig av NGU, men også av UiO).
- Bargel, T.H. 2003: Quaternary geological mapping of Central Fennoscandia and Nordland: Deglaciation, deposition, stratigraphy and applications. Doktor Ingeniør Thesis. Department of Geology and Mineral Resources Engineering, NTNU, 324 pp.
- Lohne Ø. S. (2005) Late Weichselian relative sea-level changes and glacial history in Hordaland, Western Norway. Dr. Philos thesis, University of Bergen, Norway. 39 pp.
- Longva, O. 1997: Potensielle undersjøiske sand- og grusressursar i Nordland. Norges geologiske undersøkelse, Rapport 97.079, 20 pp.
- Rasmussen, A. 1979: Deglasiasjonsforløpet i Meløy og Gildeskål. Hovedoppgave i kvartærgeologi og geomorfologi, Univ. i Bergen. Bind 1 & 2.
- Rasmussen, A. 1981: The deglaciation of the coastal Area NW of Svartisen, Northern Norway. Norges geologiske undersøkelse 369, Bulletin 63, 31 pp.
- Rasmussen, A. 1984a: Kvartærgeologiske undersøkelser i Nordland. Dr.scient.-avhandling, Universitetet i Bergen.
- Rasmussen, A. 1984b: Late Weichselian moraine chronology of the Vesterålen islands, North Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 64, p.193-219.

### **Oksygenfattige fjorder**

- ANON, 1997. Kyststrekningen Jomfrula-d - Stad. Vurdering av eutrofitilstand. Rapport 2 fra ekspertgruppe for vurdering av eutroforhold i fjorder og kystfarvann. Statens forurensningstilsyn (SFT). 129 sider.
- Aure, J. & Danielsen, D. 1993: Terskelbasseng på Sørlandskysten – organisk belastning og vannutskiftning. Fisken og Havet, Nr. 1 – 1993 16 s.
- Aure, J., Føyn, L. og Pettersen, R., 1997. Miljøundersøkelser i norske fjorder 1975-96. Sørfjorden - Hardanger (1991-96). Fisken og Havet nr. 12 -1997. 24 sider.
- Aure, J., Dahl, F.E., Johannesen, T., Golmen, L., Molvær, J., 1997: Vurdering av oksygenutvikling og organisk belastning på kyststrekningen Jomfruland-Stavanger. ISBN 82-82-577-3105-6
- Bøhle, B., Jåvold, T. og Kristiansen, K. 1989: Hydrografiske forhold i noen fjorder og poller på Sørlandet vinteren 1989. Flødevigen Meldinger Nr. 4 – 1989. 28 s.
- Erga, S.R., Oug, E., Knutzen, J., Magnusson, J., 1990: Eutrofitilstand for norske fjorder og kystfarvann med tilgrensende havområder. NIVA rapport nr. 2370. ISBN 82-577-1655-3.
- Jacobsen, T., Dahl, E., Oug, E., 1994: Miljøstatus I vannforekomster I Aust-Agder. Del II. Marine resipienter. NIVA rapport nr. 3154. ISBN 82-577-2627-3.
- Johansen, Ø., Kolstad, S., Bokn, T. og Rygg, B., 1973. Resipientvurderinger av nedre Skienselva, Frierfjorden og tiliggende fjordområder. NIVA-rapport 70111. Oslo. 93 sider.
- McKee, B. & Skei, J. 1999: Introduction – Framvaren Fjord as a natural laboratory for examining biogeochemical processes in anoxic environments. Marine Chemistry 67 (3/4): 147-148.
- Molvær, J., Selvik, J.R. & Tjomsland, T. 2003: Common Procedure for Identification of the Eutrophication Status of Maritime Area of the Oslo and Paris Conventions. Report on the Comprehensive Procedure for the Norwegian Skagerrak Coast. NIVA-rapport 4654. SFT TA-1927-2003, 93s.
- Molvær, J. Magnusson, J. Selvik, J.R. & Tjomsland, T., 2003: Common Procedure for Identification of the Eutrophication status of Maritime Area of the Oslo and Paris Conventions. Report on the Screening Procedure for the Norwegian Coast from Lindesnes to Stad. NIVA-rapport 4653. SFT TA-1928/2003, 30s.
- Molvær, 2001: Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden. Oksygen og siktedyp i 1999-2000. NIVA Rapport nr 4350-2001. ISBN 82-577-3985-5.
- Molvær, J., 1998. Sørfjorden. Overvåking av oksygenforholdene i juli-desember 1997. NIVArapport nr. 3775-98. Oslo. 32 sider.

- Molvær, J., 1991: Undersøkelse av eutrofiering i Grenlandsfjordene 1988-89. Delrapport 9. Konklusjoner. Overvåkingsrapport nr. 751/97. NIVA-rapport nr. 2697. Oslo. 46 sider.
- Molvær, J., 1999. Grenlandsfjordene 1994-97. Undersøkelser av vannkjemiske forhold og vannskiftning. Statlig program for forurensningsovervåking rapport nr. 756-99. NIVA-rapport nr. 3960-98. Oslo. 47 sider.
- Molvær, J., 2000. Overvåking av Grenlandsfjordene 1998-99. Badevannskvalitet og oksygenforhold. Statlig program for forurensningsovervåking, rapport nr. 794/00. NIVA-rapport nr.4214-2000. Oslo. 36 sider.
- Molvær, J. og Stigebrandt, A., 1991: Undersøkelse av eutrofiering i Grenlandsfjordene 1988-89. Delrapport 3. Vannskiftning i fjordene. Overvåkingsrapport nr. 450/91. NIVA-rapport nr. 2588. Oslo/Gøteborg. 43 sider.
- Molvær, J., 1992: Fjorder i Vest-Agder. Vurdering og kommentarer til fysiske-kjemiske analyseresultater for tidsrommet 1979-1989. NIVA rapport nr. 2769. ISBN 82-577-2077-1.
- Molvær J., 1982: Vannforekomster i Vest-Agder. Vurdering og kommentar til fysisk-kjemiske analyseresultater fra fjorder i tidsrommet 1978-1983. NIVA rapport nr. 1361. ISBN 82-577-0470-9.
- Molvær, J., 2000: Overvåking av Grenlandsfjordene 1998-99 Badevannskvalitet og oksygenforhold. Rapport nr: OR-4214. ISBN. 82-577-3835-2.
- Strøm, K.M. 1936. Land-locked waters. Hydrography and bottom deposits in badly ventilated Norwegian fjords with remarks upon sedimentation under anaerobic condition. - Mat.-Naturv. Kl. 1936 No 7.
- Sørensen, K. 1988: The distribution and biomass of phytoplankton and phototrophic bacteria in Framvaren, a permanently anoxic fjord in Norway. *Marine Chemistry* 23 (3/4): 229-241.

**Poller**

- Brattegård, T. & Holthe, T. 1995. Kartlegging av marine verneområder i Norge. Tilrådning fra rådgivende utvalg. Utredning for DN 1995-3.
- Bøhle, B. 1986. Østerspoller på Skagerrakkysten. Egnethetsundersøkelser sommeren 1985. Flødevigen Meldinger Nr 4 1986. 65 s.
- Bøhle, B. 1987. Hydrografi i 4 poller på Skagerrakkysten 1986-1987. Flødevigen Meldinger Nr 4 1987. 42 s.
- Bøhle, B., Jåvold, T. og Kristiansen, K. 1989. Hydrografske forhold i noen fjorder og poller på Sørlandet vinteren 1989. Flødevigen Meldinger Nr 4 1989. 28.

## 11. Vedlegg

### Vedlegg A. Oversikt over de viktigste kildene til data fra nasjonale databaser i startpakken.

I de tilfeller regionale data har vært tilgjengelig har disse, så langt som mulig, også blitt tatt med. I noen tilfeller har også data fra rapporter blitt digitalisert. Tabellen viser også hva slags undersøkelse dataene stammer fra, om dataene angir utstrekning, hva slags metode som er brukt for innsamling og viktige dataeiere. Tabellen er ikke uttømmende og startpakken omfatter i tillegg en rekke mindre datakilder som ikke er vist.

	Undersøkelse/Formål	Datatype	Innsamlingsmetode	Dataeiere
<b>SPESIELLE NATURTYPER</b>				
Større tareskogforekomster	Modellevaluering ulike prosjekter	Punkter	Feltundersøkelser, Senkeamera	Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Sterke tidevannsstrømmer	Ressurskartlegging	Polygoner	Feltundersøkelser, Ekkolodd	Taretrålingsnæringen, Fiskeridirektoratet (Fdir), Havforskningsinstituttet (HI)
	Vitenskapelige undersøkelser	Punkter	Feltundersøkelser, Dykking, senkeamera, ROV	Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), NIVA, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI)
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet	Ressurskartlegging	Polygoner	Feltinnsamling	Fylkesmannen (FM) S-Trøndelag
	Naturypekartlegging i kommunene	Punkter	Litteratur/Beregning	Høyskolen i Bodø (HiBo)
	Naturypekartlegging i kommunene	Punkter	Intervju	Kystvakten, NIVA
Spesielt dype fjordområder	Naturypekartlegging i kommunene	Polygoner	Litteratur/Beregning	HiBo
	Miljø- og vitenskapelige undersøkelser	Punkter	Feltundersøkelser, litteratur	Strøm (1936), Statens forurensningsstilsyn (SFT), NIVA, HI
	Naturypekartlegging i kommunene	Polygoner	Registrering fra kart	Norsk Institutt for vannforskning (NIVA), Havforskningsinstituttet (HI)/Norges geologiske undersøkelse (NGU)
	Mareano		Feltundersøkelser	(Mareano)

Poller	Naturtypekartlegging i kommunene	Polygoner	Litteratur/Beregning	HiBo
Litoralbaseng	Ingen tilgjengelige data i nasjonale kilder			
Israndavsetninger	Vitenskapelige undersøkelser	Polygoner	Feltundersøkelser/litteratur	Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Bløtbunnsområder i strandsonen	Vitenskapelige undersøkelser	Linjer (punkter)	Litteratur	Lohne 2005, NGU, UiB, UiO
	OSPAR prioriterte habitater	Punkter	Intervju	Direktoratet for naturforvaltning (DN)
	Naturtypekartlegging i kommuner	Polygoner	Feltundersøkelser	Naturbase, FM, NIVA, HI
Korallforekomster	Vitenskapelige undersøkelser/ Mareano	Punkter	Intervju, feltundersøkelser (ROV)	Korallbasen HI
<b>Undersøkelse</b>				
<b>Datatype</b>				
<b>Innsamlingsmetode</b>				
<b>Viktige dataeiere</b>				
<b>SPEIELLE NATURTYPER</b> forts. fra forrige side				
Kalkalgeforekomster	Ressurskartlegging (skjellsand)	Polygoner	Modellering, feltundersøkelser (grabb)	NGU
Ålegrasenger og andre undervannsenger	Naturtypekartlegging i kommunene	Punkter	Intervju	NIVA
	OSPAR prioriterte habitater	Punkter	Intervju	FM, NIVA
	Naturtypekartlegging i kommuner	Polygoner	Feltundersøkelser (vannkikkert, senkekamera)	Havforskningsinstituttet (HI)
Skjellsandforekomster	Vegetasjonsregistrering på strandnotstasjoner			
	Vitenskapelige undersøkelser	Punkter	Feltundersøkelser (vannkikkert, senkekamera)	HI, NIVA, UiO, NINA
	Modellevaluering	Punkter	Senkekamera	NIVA
	Ressursundersøkelser	Polygoner, punkter	Feltundersøkelser, ekkolodd, grabb	NGU, NIVA
NØKKELOMRÅDER FOR SPEIELLE ARTER				
	Østersforekomster	Vitenskapelige undersøkelser	Feltundersøkelser, intervju, litteratur	HI
	Større kamskjellforekomster	Vitenskapelige	Feltundersøkelser, intervju,	HI

	undersøkelser	litteratur
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE STAMMER</b> Gyteområder for fisk	Ressurskartlegging	
	Vitenskapelige undersøkelser	Intervju (fiskere) Feltundersøkelser
		Punkter Punkter Polygoner
		Fdir, HI HI

## Vedlegg B. Oversikt over modellerte data, inkludert informasjon om metadata som varierer mellom datasettene.

For informasjon om felles metadata for alle datasettene jf hovedteksten. Dybdemodellene som er etablert i prosjektet er referert til som P instituttnavn for å angi hvilke institutt som er ansvarlig for de ulike datasettene. S-G refererer til Sjøkartverket / Geodatasenterets 50 m dybdemodell, S refererer til den nye 25 m dybdemodellen for nord-områdene fra Sjøkartverket. Treffprosenten er Type 1 som angir presisjonen til modellen både med hensyn til forekomst og av fravær av naturtypen.

Økoregion / Geografisk område	Naturtype	Datasettnavn / Shapefil	Modell versjon	Skala (m) / dybde-modell	Treffprosent
Skagerrak	Tareskog	tare_sk_25m.shp	2	25 / P NINA	81.7
	Ålegras	skager_aalgras12_5m_max.shp skager_aalgras12_5m_avgr enset.shp	1	12.5 / P NINA	78.2
	EUNIS-klasse	eunis_skager50.shp	1	50 / S-G	
	Ekstraunis klasse (kyst/land 0-10m)	ekstraunis_skagerak25.shp	1	25 / P NINA	
	Tidevannflate / bløtbunn strandsonen	blb_lit_skagerrak.shp	1	25 / P NINA	
Nordsjøen	Tareskog	tare_ns_25m.shp	2	25 / P NIVA	72.5
	EUNIS-klasse	eunis_nordsj50.shp	1	50 / S-G	
	Ekstraunis klasse (kyst/land 0-10m)	ekstraunis_nordsjoen25.shp	1	25 / P NIVA	
	Tidevannflate / bløtbunn strandsonen	blb_lit_nordsjoen.shp	1	25 / P NIVA	
Norskehavet	Tareskog	tare_nhsor_25m_ikke_nedb eitet.shp, tare_nhsor_25m_nedbeitet. shp tare_nhnord_50m_nedbeitet	1  1	25 / P NINA  25 / P	71.3

		.shp	1	NINA	
	EUNIS-klasse	eunis_norskeh50.shp	1	50 / S-G	
	Ekstraunis klasse (kyst/land 0-10m)	eskræunis_norskehavet25.shp	1	25 / P NINA	
	Tidevannsflate / bløtbunn strandsonen	blb_lit_norskehavet.shp	1	25 / P NINA	
Barentshavet	Tareskog	tare_bh_25m_nedbeitet.shp	1	25 / P NIVA	79.6
	EUNIS-klasse	eunis_barentsh50.shp	1	25 / P NIVA	

## Vedlegg C. Status og anbefalinger på fylkesnivå

Oversikt over status – prioriteringer på fylke-kommunegruppenivå for Troms. For tareskogforekomster gjelder status stortareskog og ikke sukkertareskog. For ålegrasenger gjelder status vanlig ålegras.

	Modellert	Funnet i felt	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>								
Større tareskogforekomster ( <b>I01</b> )	+	+	+	+	Dårlig-middels	+	Høy	Modellen for området er basert på 50 m dybdemodellen, og ikke 25 m som for de andre fylkene. Det er kun noen få registreringer av tareskog i området inkl i startpakkene. De sterkeste er kanskje kartlagt, men det mangler sannsynligvis registrering av mindre og regionalt viktige forekomster.
Sterke tidevannsstrømmer ( <b>I02</b> )	+	+	+	+	Middels	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet ( <b>I03</b> )	+	+	+	-	God		Lav	
Speielt dype fjordområder ( <b>I04</b> )	+	+	+	+	God		Lav	Forekommer i Sør-Troms
Poller ( <b>I05</b> )	+	+	+	-	Middels	+	Lav	De største er sannsynligvis identifisert gjennom beregning
Litoralbaseng ( <b>I06</b> )								

<b>Israndavsetninger (107)</b>	+	Middels	Lav	Naturtypen er kartlagt ut fra geologiske kart og en grov dybdemodell. Sjekk av mer detaljerte dybdedata som finnes for det meste av fylket, vil påvise flere israndavsetninger. Det trengs ikke nye feltregistreringer, men en gjennomgang av detaljerte dybdedata bør gjøres.
<b>Bløtbumnsområder i strandsonen (108)</b>	+	Dårlig	Høy	Store områder med potensiell forekomst. Få registreringer
<b>Korallforekomster (109)</b>	+	Dårlig-Middels	Lav	Kartlegging av koraller i felt er svært kostbart og krever spesialisert utstyr og kompetanse. Dette anses å være et nasjonalt ansvar og er derfor ikke inkludert i forslag til prioriterte aktiviteter i forbindelse med startpakkene. Undersøkelser basert på intervjuer er mindre kostnadskravende, og vil være aktuelt på fylkes-, kommune- og kommunenivå.
<b>Løstliggende kalkalger (110)</b>	+	Middels	Lav	En god del registreringer i fylket
<b>Ålegrasenger og andre</b>	-	Dårlig	Høy	Ekstra-eunis klassen

## undervannsenger (I11)

tilsier at det er potensiale for forekomst av ålegras i mange av kommunene. Ingen er registrert i startpakkene. Naturtypen anses ferdig kartlagt

## Skjellsandforekomster (I12)

Lav

God-Middels

+

**NØKKELOMRÅDER FOR  
SPESEJELLE ARTER**

## Østersforekomster (X11)

-

Østers forekommer ikke nord for polarsirkelen, og en kartlegging er derfor ikke aktuelt i kystområdene i Troms.

## Større kamskjellforekomster (X12)

Høy

Dårlig-Middels

+

Større forekomster av haneskjell (i kategori A og B) finnes i fylket. Feltverifisering prioriteres derfor høyt, men med utgangspunkt i intervjuer. Bøt sees i sammenheng med 'HI's ressurskartlegging av haneskjell i regionen.

**NØKKELOMRÅDER FOR  
SPESIELLE STAMMER**

Gyteområder for fisk (X13)

-	+	Høy	Feltverifisering av gyteområder er relativt kostbart, men synes å være nødvendig da intervjuer gir et noe varierende resultat. For å få en mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene, må dette arbeidet samordnes med HI's arbeid i forbindelse med kysttorsk-problematikken, samt andre aktuelle fiskeslag.
---	---	-----	---

## Vedlegg D. Status og anbefalinger på kommunegruppenivå

### 11.2 Sør-Troms

Tranøy, Bjarkøy, Sørreisa, Dyrøy, Harstad, Salangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Gråtangen, Skånland	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	+	+	Middels		Middels	Siden modellen ikke inkluderer strøm, er det godt mulig med tareskog i en del områder som er beskyttet for bølgeeksponering, men som er utsatt for strøm
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	+	+	Dårlig	+	Lav	Mangler observasjoner, modellene behøver kanskje verifisering
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	+	-	Middels		Lav-Middels	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	+	+	God		Lav	
Poller (I05)	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)							
Israndavsetninger (I07)			+	Middels		Lav	Nye dybde data foreligger for det meste av klusteret. Det anbefales at dette gâes gjennom for registrering av israndavsetninger.
Bløtbunnsområder i strandsonen	+	+	-	Dårlig-Middels		Høy	

<b>(I08)</b> Korallforekomster ( <b>I09</b> )	+	Dårlig-Middels	+	Lav	Lav prioritering på kommunegruppenivå, kartlegging på nasjonalt nivå. Intervju aktuelt.
Løstliggende kalkalger ( <b>I10</b> )	-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger ( <b>I11</b> )	-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster ( <b>I12</b> )	+	God		Lav	Naturtypen anses ferdig kartlagt
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE ARTER</b>					
Østersforekomster ( <b>X11</b> )	-	-			Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster ( <b>X12</b> )	-	Dårlig	+	Høy	Utbredelsen av haneskjell er dårlig undersøkt, men større bestander forventes å forekomme i regionen Feltverifisering, basert på intervjuundersøkelser, prioriteres, men bør samordnes med 'HI's ressurskartlegging av haneskjell i regionen.
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE STAMMER</b>					
Gyteområder for fisk ( <b>X13</b> )	-	Dårlig	+	Høy	Gyteområder for fisk er dårlig kartlagt både i form av intervju og feltundersøkelser. Intervjuundersøkelser anbefales, og

verifisering i felt bør prioriteres dersom gytefelt indikeres gjennom intervjuer.

### 11.3 Midt-Troms

Tromsø, Lenvik, Berg, Balsfjord, Torsken, Målselv	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Funnet i felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>								
Større tareskogforekomster (I01)	+	+	-	Middels			Høy	Det finnes ingen tareskogregistreringer i felt. Behov for feltvalidering, og kartlegging av naturtypen i beskyttede områder med strøm.
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	+	+	Dårlig-Middels		+	Lav	Ingen observasjoner der det er modellert, og ingen modell der det er observasjon.
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)	+	+	-	Middels			Lav	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God			Lav	
Poller (I05)	+	+	-	Dårlig-Middels		+	Lav	
Litoralbasseng (I06)								
Israndavsetninger (I07)			+	Middels			Lav	Nye dybde data foreligger for store deler av klusteret. Det anbefales at dette gæses

Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)	+	+	+	Dårlig-Middels	Høy	gjennom for registrering av israndavsetninger.
Korallforekomster (I09)	+	+	+	Dårlig-Middels	Lav	Lav prioritering på kommunegruppenivå, kartlegging på nasjonalt nivå. Intervju aktuelt.
Løstliggende kalkalger (I10)	+			Dårlig	Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)	-			Dårlig	Høy	
Skjellsandforekomster (I12)	+			God	Lav	Naturtypen anses ferdig kartlagt
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE ARTER</b>						
Østersforekomster (X11)	-			-		Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)	+			Dårlig-Middels	Høy	Utbredelsen av haneskjell er dårlig kartlagt (bortsett fra i Tromsø kommune), men større bestander forventes å forekomme i regionen
						Feltverifisering, basert på intervjuundersøkelser, prioriteres, men bør samordnes med HI's ressurskartlegging av haneskjell i regionen.
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE STAMMER</b>						

Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy	Gyteområder for fisk er dårlig kartlagt både i form av intervju og feltundersøkelser. Intervjuundersøkelser anbefales, og verifisering i felt bør prioriteres dersom gytefelt indikeres gjennom intervjuer.
----------------------------	---	--------	---	-----	---

## 11.4 Nord-Troms

Skjervøy, Karlsøy, Kvenangen, Lyngen, Nordreisa, Kålfjord, Storfjord	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Funnet i felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESIELLE NATURTYPER</b>								
Større tareskogforekomster (I01)	+	+	-	Middels	Høy			Store områder med sterk strøm som gir tareskoghabitater kan være utelatt fra modellen. Tareskog i nedbeite områder vil være viktige å få kartlagt
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig-Middels		+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	+	-	Middels			Lav	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God			Lav	
Poller (I05)	+			Middels		+	Lav	
Litoralbasseng (I06)								
Israndavsetninger (I07)			+	Middels			Lav	Nye dybde data foreligger for store

deler av klusteret. Det anbefales at dette gæses gjennom for registrering av israndavsetninger.

Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)	+	+	-						
Korallforekomster (I09)			+	Dårlig-Middels	+	Lav	Lav prioritering på kommunegruppenivå, kartlegging på nasjonalt nivå. Intervju aktuelt.		
Løstliggende kalkalger (I10)			+	Dårlig		Lav			
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)			-	Dårlig		Høy			
Skjellsandforekomster (I12)			+	Middels		Lav	Naturtypen anses ferdig kartlagt		
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEILLE ARTER</b>									
Østersforekomster (X11)			-	-			Ikke aktuell		
Større kamskjellforekomster (X12)			+	Dårlig-Middels	+	Høy	Utbredelsen av kamskjell (dvs haneskjell) er dårlig kartlagt i de fleste kommuner, men større bestander forventes å forekomme i regionen		
							Feltverifisering, basert på intervjuundersøkelser, prioriteres, men bør samordnes med HI's ressurskartlegging av haneskjell i regionen.		



## Vedlegg E. Status og anbefalinger per kommune

### 11.5 Sør-Troms

#### 11.5.1 Tranøy

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av felkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster ( <b>I01</b> )	+	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Sterke tidevannsstrømmer ( <b>I02</b> )	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavnet ( <b>I03</b> )	+	+	-	Middels		Lav-Middels	
Spesielt dype fjordområder ( <b>I04</b> )	+	+	+	God		Lav	
Poller ( <b>I05</b> )	+	+	-	Dårlig	+	Lav	
Litoralbasseng ( <b>I06</b> )							
Israndavsetninger ( <b>I07</b> )			+	Middels		Lav	
Bløtbumnsområder i strandsonen ( <b>I08</b> )	+	+	-	Dårlig-Middels		Høy	
Korallforekomster ( <b>I09</b> )			-	Dårlig		Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger ( <b>I10</b> )			-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger ( <b>I11</b> )			-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster ( <b>I12</b> )			-	Dårlig		Lav	Ikke forventet.

### NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER

Østersforekomst (X11)	-	-	-	Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE STAMMER

#### 11.5.2 Bjarkøy

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>							
Større tarekogforekomster (I01)	+	+	-	Dårlig		Høy	
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)	+	-	-	Middels		Lav-Middels	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	+	+	God		Lav	
Poller (I05)	+	+	-	Dårlig	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)				Middels		Lav	
Israndavsetninger (I07)				Dårlig-Middels		Høy	
Bløtbumsområder i strandsonen (I08)	+	+	-	Middels		Lav	
Korallforekomster (I09)			+	Middels	+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå,

Løstliggende kalkalger (I10)	+	Dårlig	+	Lav	kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)	-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)	+	God	+	Lav	Feltregistrert.
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>					
Østersforekomster (X11)	-	-			Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE STAMMER</b>					
Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju viser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### 11.5.3 Sørreisa

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig	+	Lav	

Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	-	-	Middels	+	Lav-Middels	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)							
Israndavsetninger (I07)				Middels	+	Lav	
Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)	+	+	-	Dårlig-Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)			-	Dårlig		Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)			-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)			-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)			-	Dårlig		Lav	Ikke forventet.
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>							
Østersforekomster (X11)			-	-			Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)			-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE STAMMER</b>							
Gyteområder for fisk (X13)			-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### 11.5.4 Dyrøy

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av felkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)	+	-	-	Middels		Lav-Middels	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)							
Israndavsetninger (I07)			+	Middels		Lav	
Bløtbumsområder i strandsonen (I08)	+	+	-	Dårlig-Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)			-	Dårlig		Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)			-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)			-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)			-	Dårlig		Lav	Ikke forventet.
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE ARTER</b>							
Østersforekomster (X11)			-	-			Ikke aktuell

Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE STAMMER</b>					
Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### 11.5.5 Harstad

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	+	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	+	-	Middels		Lav-Middels	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)							
Israndavsetninger (I07)				Middels		Lav	
Bløtbumsområder i strandsonen (I08)	+	+	-	Dårlig-Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)				Dårlig	+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå.

Løstliggende kalkalger (I10)	+	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)	-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)	+	God	+	Lav	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>					
Østersforekomster (X11)	-	-	-		Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE STAMMER</b>					
Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju viser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### 11.5.6 Salangen

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Større tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)	+	+	-	Middels		Lav-Middels	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God		Lav	

Poller (I05)	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)							
Israndavsetninger (I07)		-		Middels		Lav	
Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)	+	+	-	Dårlig-Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)		-	-	Dårlig		Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)		-	-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)		-	-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)		-	-	Dårlig		Lav	Ikke forventet.
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEJELLE ARTER</b>							
Østersforekomster (X11)		-	-	-			Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)		-	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEJELLE STAMMER</b>							
Gyteområder for fisk (X13)		-	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

## 11.5.7 Ibestad

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av felkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	+	Dårlig	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)	+	-	-	Middels		Lav-Middels	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	+	+	God		Lav	
Poller (I05)	+	+	-	Dårlig	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)							
Israndavsetninger (I07)			+	Middels		Lav	
Bløtbumsområder i strandsonen (I08)	+	+	-	Dårlig-Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)			-	Dårlig	+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)			-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)			-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)			-	Dårlig	+	Lav	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>							
Østersforekomster (X11)			-	-			Ikke aktuell

Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEJELLE STAMMER</b>					
Gyteområder for fisk (X13)	+	Middels	+	Høy	Mangler verifisering i felt. Høy prioritet

### 11.5.8 Kvæfjord

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Funnet i modellert	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEJELLE NATURTYPER</b>								
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	Dårlig			Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig		+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	+	-	Middels			Lav-Middels	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God			Lav	
Poller (I05)	+	-	-	Dårlig		+	Lav	
Litoralbasseng (I06)								
Israndavsetninger (I07)			+	Middels			Lav	
Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)	+	+	-	Dårlig-Middels			Høy	
Korallforekomster (I09)			-	Dårlig		+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt

Løstliggende kalkalger (I10)	+	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)	-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)	-	Dårlig	+	Lav	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>					
Østersforekomster (X11)	-	-			Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE STAMMER</b>					
Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju viser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### 11.5.9 Lavangen

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Større tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	-	-	Middels		Lav-Middels	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God		Lav	

Poller (I05)	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)							
Israndavsetninger (I07)		+		Middels		Lav	
Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)	+	-	+	Dårlig-Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)		-	-	Dårlig		Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Inertvju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)		-	-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)		-	-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)		-	-	Dårlig		Lav	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE ARTER</b>							
Østersforekomster (X11)		-	-	-			Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)		-	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE STAMMER</b>							
Gyteområder for fisk (X13)		-	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

## 11.5.10 Gratangen

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Funnet i	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av felkkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESIELLE NATURTYPER</b>								
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	+	-	-	Dårlig	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	-	-	-	Middels		Lav-Middels	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	-	-	-	Dårlig	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)								
Israndavsetninger (I07)			+	+	Middels		Lav	
Bløtbumsområder i strandsonen (I08)	+	+	-	-	Dårlig-Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)			-	-	Dårlig		Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)			-	-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)			-	-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)			-	-	Dårlig	+	Lav	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE ARTER</b>								
Østersforekomster (X11)			-	-	-			Ikke aktuell

Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEJELLE STAMMER</b>					
Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### 11.5.11 Skånland

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEJELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	+	+	Dårlig	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)	+	+	-	Middels		Lav-Middels	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	+	-	Dårlig	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)							
Israndavsetninger (I07)			+	God		Lav	
Bløtbumsområder i strandsonen (I08)	+	+	+	Dårlig-Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)			-	Dårlig	+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt

Løstliggende kalkalger (I10)	+	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)	-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)	-	Dårlig	+	Lav	Sjelden eller mangler.

#### NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE ARTER

Østersforekomster (X11)	-	-			Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell

#### NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE STAMMER

Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju viser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet
----------------------------	---	--------	---	-----	--

## 11.6 Midt-Troms

### 11.6.1 Tromsø

Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modeltering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
+	+	-	Middels	Høy	Modellen dekker ytre områder, men forekomster i beskytta omr med strøm er ikke	

#### SPESIELLE NATURTYPER

Større tarekogforekomster (I01)	+	+	Middels	Høy	Modellen dekker ytre områder, men forekomster i beskytta omr med strøm er ikke
---------------------------------	---	---	---------	-----	--

									inkl
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	+	+	Dårlig-Middels	+	+	+	+	Lav
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	+	-	Middels					Lav
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God					Lav
Poller (I05)	+	+	-	Dårlig-Middels	+	+	+	+	Lav
Litoralbasseng (I06)									
Israndavsetninger (I07)			+	Middels	+				Lav
Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)	+	+	+	Dårlig-Middels					Høy
Korallforekomster (I09)			+	Middels	+				Lav
Løstliggende kalkalger (I10)			+	God					Lav
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)			-	Dårlig					Høy
Skjellsandforekomster (I12)			+	God	+				Lav
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>									
Østersforekomster (X11)			-	-					Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)			+	Middels	+				Høy
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE STAMMER</b>									
Gyteområder for fisk (X13)			-	Dårlig	+				Høy
									Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
									Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt

## 11.6.2 Lenvik

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Funnet i	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av felkkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>								
Større tareskogforekomster (I01)	+	+	-	-	Middels		Høy	Modellen dekker ytre områder, men forekomster i beskytta omr med strøm er ikke inkl
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	+	+	Dårlig-Middels	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	+	-	-	Middels		Lav	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	-	-	-	Dårlig-Middels	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)								
Israndavsetninger (I07)				+	Middels		Lav	
Bløtbumnsområder i strandsonen (I08)	+	+	+	+	Dårlig-Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)				+	Middels	+		Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)				+	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)				-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)				+	God	+	Lav	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>								

Østersforekomster (X11)	-	-	-				Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)	-	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE STAMMER</b> Gyteområder for fisk (X13)	-	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet	

### 11.6.3 Berg

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b> Større tareskogforekomster (I01)	+	+	-	Middels		Høy	Modellen dekker ytre områder, men forekomster i beskytta omr med strøm er ikke inkl
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig-Middels	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	+	-	Middels		Lav	
Speielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	-	-	Dårlig-Middels	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)							
Israndavsetninger (I07)				Middels		Lav	
Bløtbumsområder i strandsonen (I08)	+	-	-	Dårlig-Middels		Høy	Mangel på forekomst i modell kan skyldes

Korallforekomster (I09)	-	Dårlig	+	Lav	dårlig modell pga mangelfulle dybde data Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)	+	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)	-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)	+	God	+	Lav	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE ARTER</b>					
Østersforekomster (X11)	-	-			Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE STAMMER</b>					
Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### 11.6.4 Balsfjord

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig-Middels	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)	+	+	-	Middels		Lav	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	+	-	Dårlig-Middels	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)							
Israndavsetninger (I07)			+	Middels		Lav	
Bløtbumsområder i strandsonen (I08)	+	+	+	Dårlig-Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)			-	Dårlig	+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)			-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)			-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)			-	Dårlig		Lav	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>							
Østersforekomster (X11)			-	-			Ikke aktuell

Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE STAMMER</b>					
Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### 11.6.5 Torsken

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	+	-	Middels		Høy	Modellen dekker ytre områder, men forekomster i beskytta omr med strøm er ikke inkl
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig-Middels	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)	+	+	-	Middels		Lav	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	-	-	Dårlig-Middels	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)							
Israndavsetninger (I07)			+	Middels		Lav	
Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)	+	-	-	Dårlig-Middels		Høy	Mangel på forekomst i modell kan skyldes dårlig modell pga mangelfulle dybde data

Korallforekomster (I09)	-	Dårlig	+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)	+	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)	-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)	+	God	+	Lav	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEJELLE ARTER</b>					
Østersforekomster (X11)	-	-			Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEJELLE STAMMER</b>					
Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt

### 11.6.6 Målselv

Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av felkkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
	+	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut
<b>SPESEJELLE NATURTYPER</b>						
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut

									fra modell
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig-Middels	+	Lav			
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	-	-	Middels		Lav			
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God		Lav			
Poller (I05)	+	-	-	Dårlig-Middels	+	Lav			
Litoralbasseng (I06)									
Israndavsetninger (I07)		+		Middels		Lav			
Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)	+	+		Dårlig-Middels		Høy			
Korallforekomster (I09)		-		Dårlig	+	Lav			Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)		-		Dårlig		Lav			
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)		-		Dårlig		Høy			
Skjellsandforekomster (I12)		-		Dårlig		Lav			
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>									
Østersforekomster (X11)		-		-					Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)		-		Dårlig	+	Høy			Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE STAMMER</b>									
Gyteområder for fisk (X13)		-		Dårlig	+	Høy			Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

## 11.7 Nord-Troms

### 11.7.1 Skjervøy

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>								
Større tareskogforekomster (I01)	+	+	-	-	Middels		Middels	Ingen registreringer, usikker kvalitet på dybdemodellen
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	-	Middels		Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	+	-	-	God		Lav	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	-	-	-	Middels	+	Lav	
Litoralpasseng (I06)								
Israndavsetninger (I07)			+	+	Middels		Lav	
Bløtbumsområder i strandsonen (I08)	+	+	+	+	Dårlig		Høy	
Korallforekomster (I09)			+	+	God	+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt Forventet
Løstliggende kalkalger (I10)			-	-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)			-	-	Dårlig		Høy	Ekstraunis-klassen tilsier at det er potensiale for ålegras i kommunen
Skjellsandforekomster (I12)			-	-	Dårlig	+	Middels	Kan forekomme i eksponerte områder.

### NØKKELOMRÅDER FOR SPEIELLE ARTER

	Østersforekomster (X11)								
	-	-							Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)	+	Middels	+	Høy					Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
Gyteområder for fisk (X13)	+	Middels	+	Høy					Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### NØKKELOMRÅDER FOR SPEIELLE STAMMER

#### 11.7.2 Karlsøy

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPEIELLE NATURTYPER</b>								
Større tareskogforekomster (I01)	+	+	-		Middels		Høy	
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-		Dårlig-Middels	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)	+	+	-		Middels		Lav	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-		God		Lav	
Poller (I05)	+	+	-		Middels	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)								
Israndavsetninger (I07)			+		Middels		Lav	
Bløtubunnsområder i strandsonen (I08)	+	+	-		Middels		Høy	Få registreringer i forhold til potensialet gjennom modellering.

<b>Korallforekomster (I09)</b>	-	Dårlig	+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
<b>Løstliggende kalkalger (I10)</b>	+	Dårlig		Lav	
<b>Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)</b>	-	Dårlig		Høy	
<b>Skjellsandforekomster (I12)</b>	+	Middels	+	Høy	Delvis feltregistrert. Flere forekomster forventes.
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>					
<b>Østersforekomster (X11)</b>	-	-			Ikke aktuell
<b>Større kamskjellforekomster (X12)</b>	+	Middels	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE STAMMER</b>					
<b>Gyteområder for fisk (X13)</b>	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### 11.7.3 Kvæningen

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Funnet i	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av felkkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>								
Større tareskogforekomster (I01)	+	+	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	+	-	-	Dårlig-Middels	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	-	-	-	Middels		Lav	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	+	-	-	Middels	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)								
Israndavsetninger (I07)			+	+	god		Lav	
Bløtbumnsområder i strandsonen (I08)	+	+	-	-	Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)			-	-	Dårlig	+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)			-	-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)			-	-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)			-	-	Dårlig	+	Lav	Sjelden eller mangler.
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>								
Østersforekomster (X11)			-	-	-			Ikke aktuell

Større kamskjellforekomster (X12)	+	Middels	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
-----------------------------------	---	---------	---	-----	---

### NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE STAMMER

Gyteområder for fisk (X13)	+	god	+	Høy	Mangler verifisering i felt. Høy prioritet
----------------------------	---	-----	---	-----	--

### 11.7.4 Lyngen

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Funnet i modell	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESIELLE NATURTYPER</b>								
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	Dårlig			Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig-Middels		+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	+	-	Middels			Lav	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God			Lav	
Poller (I05)	+	+	-	Middels		+	Lav	
Litoralbasseng (I06)								
Israndavsetninger (I07)			+	Middels			Lav	
Bløtbunnsområder i strandsonen (I08)	+	+	-	Middels			Høy	
Korallforekomster (I09)			-	Dårlig		+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt

Løstliggende kalkalger (I10)	-	Dårlig	Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)	-	Dårlig	Høy	
Skjellsandforekomster (I12)	-	Dårlig	Lav	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>				
Østersforekomster (X11)	-	-		Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE STAMMER</b>				
Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### 11.7.5 Nordreisa

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Større tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig-Middels	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnavannet (I03)	+	-	-	Middels		Lav	



## 11.7.6 Kåfjord

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av felkkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESEIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Sterke tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig-Middels	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)	+	+	-	Middels		Lav	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	-	-	Middels	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)							
Israndavsetninger (I07)			+	Middels		Lav	
Bløtubunnsområder i strandsonen (I08)	+	+	-	Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)	-		-	Dårlig	+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt
Løstliggende kalkalger (I10)			-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)			-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)			-	Dårlig		Lav	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>							
Østersforekomster (X11)			-	-			Ikke aktuell

Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESIELLE STAMMER</b>					
Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

### 11.7.7 Storfjord

	Modellert	Funnet i modell	Funnet i felt	Kartleggingsstatus gjennom modellering, felt eller intervju (dårlig, middels, god)	Intervju anbefales	Prioritet av feltkartlegging basert på kartleggingsstatus eller sannsynlighet for forekomst (høy, middels, lav)	Kommentar
<b>SPESIELLE NATURTYPER</b>							
Større tareskogforekomster (I01)	+	-	-	Dårlig		Lav	Lav forventning om store forekomster ut fra modell
Større tidevannsstrømmer (I02)	+	-	-	Dårlig-Middels	+	Lav	
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet (I03)	+	+	-	Middels		Lav	
Spesielt dype fjordområder (I04)	+	-	-	God		Lav	
Poller (I05)	+	-	-	Middels	+	Lav	
Litoralbasseng (I06)						Lav	
Israndavsetninger (I07)		+	+	Middels		Lav	
Bløtbumsområder i strandsonen (I08)	+	+	-	Middels		Høy	
Korallforekomster (I09)		-	-	Dårlig	+	Lav	Lav prioritering på kommunenivå, kartlegging på fylke eller nasjonalt nivå. Intervju aktuelt

Løstliggende kalkalger (I10)	-	Dårlig		Lav	
Ålegrasenger og andre undervannsenger (I11)	-	Dårlig		Høy	
Skjellsandforekomster (I12)	-	Dårlig		Lav	
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE ARTER</b>					
Østersforekomster (X11)	-	-			Ikke aktuell
Større kamskjellforekomster (X12)	-	Dårlig	+	Høy	Bør sees i sammenheng med HI's ressurskartlegging av haneskjell
<b>NØKKELOMRÅDER FOR SPESEIELLE STAMMER</b>					
Gyteområder for fisk (X13)	-	Dårlig	+	Høy	Dersom intervju påviser gytefelt, verifisering i felt. Høy prioritet

NIVA: Norges ledende kompetansesenter på vannmiljø

NIVA gir offentlig vannforvaltning, næringsliv og allmennheten grunnlag for god vannforvaltning gjennom oppdragsbasert forsknings-, utrednings- og utviklingsarbeid. NIVA kjennetegnes ved stor faglig bredde og godt kontaktnett til fagmiljøer i inn- og utland. Faglig tyngde, tverrfaglig arbeidsform og en helhetlig tilnæringsmåte er vårt grunnlag for å være en god rådgiver for forvaltning og samfunnsliv.



Norsk institutt for vannforskning

Gaustadalléen 21 • 0349 Oslo  
Telefon: 02348 • Faks: 22 18 52 00  
[www.niva.no](http://www.niva.no) • [post@niva.no](mailto:post@niva.no)