

ارتباط بین بیماری‌های مزمن و ناتوانی در فعالیت‌های روزانه و فعالیت‌های ابزاری زندگی در سالمندان

سیدرضا حسینی (MD)، علی ذیحی (PhD)، سیده‌رقیه جعفریان‌امیری (PhD)، علی بیژنی (MD)

۱- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل

۲- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل

دریافت: ۹۶/۸/۱۸؛ اصلاح: ۹۶/۱۲/۲۶؛ پذیرش: ۹۷/۱/۲۷

خلاصه

سابقه و هدف: ابتلا به بیماری‌های مزمن از علل مهم ناتوانی در انجام فعالیت‌های روزانه زندگی می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین بیماری‌های مزمن و ناتوانی در فعالیت‌های روزانه و فعالیت‌های ابزاری زندگی در سالمندان می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی سالمندان شهر امیرکلا انجام شد. مشخصات دموگرافیک (سن، جنس، سطح تحصیلات و شغل)، فعالیت‌های روزانه زندگی و فعالیت‌های ابزاری زندگی با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. ناتوانی انجام فعالیت روزانه و ابزاری زندگی بصورت مستقل، به کمک دیگران و کاملاً وابسته دسته‌بندی شد و در نهایت افراد کاملاً وابسته و به کمک دیگران در گروه افراد ناتوان قرار گرفتند. وجود بیماری‌های مزمن در فرد سالمند با مشاهده پرونده یا مدارک پزشکی، مشخص و مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: از ۱۵۰۰ نفر سالمند واحد شرایط ورود به مطالعه، ۸۳۲ نفر (۵۵/۵٪) مرد و ۶۶۸ نفر (۴۴/۵٪) زن بودند. در این بررسی ۳۸ نفر (۲/۵٪) دچار ناتوانی در انجام فعالیت‌های روزانه زندگی و ۲۲۳ نفر (۴۸/۲٪) در انجام فعالیت‌های ابزاری زندگی ناتوان بوده‌اند. تعداد بیماری همراه ($p < 0.003$)، CI-95% = ۱۰۸-۱۴۶، (OR = ۱/۲۶۱، CI-95% = ۱/۳۰۸-۶/۵۰۸)، سن بالا با فعالیت روزانه زندگی ارتباط معنی داری داشته‌اند. بین فعالیت ابزاری زندگی و جنس ($p = 0.000$)، CI-95% = ۱/۵۳-۲/۶۹، (OR = ۲/۰۲۹، CI-95% = ۰/۰۰۰)، سطح تحصیلات ($p = 0.000$)، تعداد بیماری همراه ($p = 0.000$)، CI-95% = ۱/۱۳، (OR = ۱/۹۶۵، CI-95% = ۱/۴۸۷-۲/۵۹۶)، اختلال شناختی ($p = 0.000$)، CI-95% = ۱/۲-۰/۱، (OR = ۱/۲، CI-95% = ۱/۴۷-۰/۵۹)، بیشترین ارتباط معنی داری وجود داشته است.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، ابتلا به بیماری‌های مزمن بخصوص ابتلا به اختلال شناختی از عوامل مؤثر ناتوانی در انجام فعالیت‌های روزانه زندگی و فعالیت‌های ابزاری زندگی می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: فعالیت روزانه‌زندگی، بیماری‌مزمن، ناتوانی، سالمندی.

مقدمه

شایعترین بیماری‌های مزمن در سالمندان بیماری‌های قلبی عروقی (۳۰/۳٪)، سرطان (۱۵/۱٪)، بیماری‌های مزمونی (۹/۵٪)، اختلالات شناختی (۶/۶٪)، اسکلتی‌عضلانی (۷/۵٪)، اختلالات گوارشی (۳/۴٪)، اختلالات حسی (۳/۱٪) و بیماری‌های ادراری تناولی (۲/۹٪) گزارش گردید (۹). بیماری‌های مزمن می‌توانند تهدیدی برای کیفیت زندگی افراد بوده و منجر به ناتوانی‌های زودرس و شدید شوند (۱۰). از مهمترین عوامل ایجاد کننده ناتوانی اعمال کمکی مربوط به فعالیت‌های روزانه زندگی (ADL=Activities of daily living) و Instrumental activities of daily living (IADL) در سالمندان مشکلات مربوط به پا، آرتیت، اختلالات شناختی، مشکلات قلبی، بینایی می‌باشد (۱۲). در مطالعات انجام شده، میزان ناتوانی در

همراه با بهبود شرایط بهداشتی، خدمات پزشکی و اقراض امید به زندگی، جمعیت سالمندان رو به رشد است (۱۰) که از آن به عنوان انقلاب‌ساکت یاد می‌شود (۱۳). براساس آمار سازمان جهانی بهداشت، تعداد سالمندان در کشورهای آسیای جنوب غربی (از جمله ایران) در سال ۲۰۰۰ حدود ۷ درصد کل جمعیت بوده و این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵ درصد خواهد رسید (۱۴). بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، در حدود ۷/۵ میلیون (۲۷) نفر از جمعیت ایران، افراد عالیه و بالاتر بوده‌اند (۱۵). با توجه به برآوردهای بین‌المللی، از سال ۱۴۱۹ جمعیت سالمند ایران نسبت به سایر نقاط، رشد سریع‌تری خواهد داشت (۱۶). بیماری‌های مزمن، به دلیل تأثیر در افزایش مرگ و میر از اهمیت بالایی برخوردار هستند (۱۷). در حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد سالمندان حداقل به دو بیماری مزمن مبتلا هستند (۱۸).

□ این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره ۹۵۴۲۵۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل می‌باشد.

* مسئول مقاله: دکتر علی ذیحی

آدرس: بابل، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی. تلفن: ۰۱۱-۳۲۱۹۰۵۹۷

یافته ها

در این طرح جامع، از ۱۶۱۶ سالمند شرکت کننده، ۱۵۰۰ نفر به دلیل کامل بودن پرونده و اطلاعات، واجد شرایط ورود به مطالعه بودند. میانگین سنی افراد 68.81 ± 7.6 سال بوده است. (جدول ۱)

جدول ۱. توزیع فراوانی و درصد مشخصات دموگرافیک سالمندان شهر امیرکلا

متغیرها	تعداد(درصد)
مرد	۸۳۲(۵۵/۵)
زن	۶۶۸(۴۵/۵)
سن	
۶۰-۶۴	۵۵۲(۳۶/۸)
۶۵-۶۹	۳۱۴(۲۰/۹)
۷۰-۷۴	۲۶۴(۱۷/۶)
۷۵-۷۹	۲۲۹(۱۵/۳)
۸۰-۸۴	۹۵(۶/۳)
و بیشتر	۴۶(۳/۱)
تحصیلات	
بیسوساد	۹۵۵(۶۳/۷)
ابتدایی و راهنمایی	۴۴۱(۲۹/۴)
دبیرستان و دانشگاه	۱۰۴(۶/۹)
شغل	
بیکار	۹۴(۶/۳)
خانه دار	۵۹۲(۳۹/۵)
دارای سابقه شغلی و بازنشسته	۳۲۹(۲۱/۹)
شاغل غیر از خانه داری	۴۷۷(۳۱/۸)
نامشخص	
متاهل	۱۲۸۲(۸۵/۵)
غیرمتاهل	۲۱۸(۱۴/۵)
وضع تأهل	
نهایا	۱۰۲(۶/۸)
باخاتواده	۱۳۹۸(۹۳/۲)
وضعیت زندگی	
کمتر از	۴۹۲(۳۲/۸)
۲۵-۲۹/۹۹	۶۴۲(۴۲/۸)
بیشتر از	۳۶۶(۲۴/۴)

زنان در بیشتر میارهای مربوط به IADL، ناتوان‌تر از مردان بودند ($p=0.000$). ولی در فعالیت آماده کردن غذای خود و انجام دادن کارهای منزل مردان نسبت به زنان ناتوان تر بوده‌اند ($p=0.000$) (جدول ۲). در این مطالعه افزایش سن، وجود بیماری‌های مزمن ($OR=1/۰.۴۱$, $p=0.041$), CI-95%= $1/۰.۷-1/۴۴۲$, $p=0.000$ و داشتن اختلال شناختی ($OR=1/۰.۲۵$, $p=0.009$)، و بیشترین تأثیر را در فعالیت‌های روزانه‌زنندگی فرد سالمند داشتند.

همچنین متغیرهای جنس ($OR=2/0.29$, $p=0.000$), سن، سطح تحصیلات و وجود بیماری‌های مزمن ($OR=1/۰.۱-1/۰.۲۷۵$, $p=0.000$), CI-95%= $1/۰.۱-1/۰.۲۷۵$, $p=0.000$) و اختلال شناختی ($OR=1/۰.۶۵$, $p=0.000$), CI-95%= $1/۰.۸۷-2/۰.۵۶$, $p=0.000$) متغیرهای تأثیرگذار بر روی IADL بودند (جدول ۳).

اجام ADL در سالمندان 13% ($4/۵$) و 14% ($1/۴$) بوده است. همچنین در مطالعه‌ای میزان ناتوانی سالمندان در انجام IADL 38% و در 57% بوده است (۱۵). از آنجاییکه، تعیین گروه‌هایی که مستعد ناتوانی هستند و اقدامات پیشگیرانه و توانبخشی جهت کاهش ناتوانی در سالمندان ضروری می‌باشد (۱۶) و با توجه به اینکه در ارتباط با بیماری‌های مزمن و ناتوانی سالمندان در ایران بررسی جامعی انجام نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین بیماری مزمن و ناتوانی در انجام فعالیت‌های روزانه و ابزاری زندگی سالمندان می‌باشد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه مقطعی بخشی از یک مطالعه کوهورت (AHAP) با عنوان- «بررسی وضعیت سلامت سالماندان شهر امیرکلا» می‌باشد که از سال ۱۳۹۰ بر روی کلیه افراد عسال و بالاتر پس از تأیید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بابل با کد اخلاق MUBABOL.REC.1389.4 در حال انجام است (۱۷)، ۱۶۱۶ نفر در مرحله اول این طرح جامع شرکت داشتند که از این تعداد فقط ۱۵۰۰ نفر به دلیل کامل بودن پرونده، واجد شرایط ورود به مطالعه حاضر بودند. با مراجعه به منازل سالماندان، اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، تحصیلات، شغل) و داده‌ها در مورد فعالیت‌های ADL و IADL از طریق مصاحبه با فرد سالماند یا یک فرد مطلع، توسط کارشناسان آموزش دیده در مدت یکسال جمع‌آوری گردید. ناتوانی عملکردی سالماند در انجام ADL با استفاده از معیار Katz ارزیابی گردید (۱۰)، که روابی و پایابی این مقیاس در مطالعه Habibi sola گزارش گردید (۱۸).

فعالیت‌های روزانه زندگی شامل غذا خوردن، پوشیدن، حمام کردن، رسیدگی به وضع ظاهر، راه رفتن، به بستر رفتن و بیرون رفتن از بستر و دستشویی رفتن Lawton ارزیابی شد که شامل استفاده از تلفن، رفتن به مکان‌های دور، رفتن به مغازه جهت خرید، آماده کردن غذای خود، انجام دادن کارهای منزل، دریافت‌دارو، اداره مسائل مالی خود، انجام کارهای سنتی اطراف خانه، بالارفتن و پایین‌آمدن از پله‌ها و پیاده‌روی تقریباً به اندازه یک کیلومتر سوال شد (۱۷ و ۱۸).

نمره کلی شاخص ADL از صفر تا ۱۴ و نمره کلی شاخص IADL از صفر تا ۲۴ می‌باشد. به طوری در طبقبندی IADL بر اساس میانه نمرات کسب شده نقطه برش تعیین گردید به طوری که نمرات کسب شده بیشتر از 20 ، افراد توانمند و نمرات مساوی و کمتر از 20 ، افراد ناتوان در نظر گرفته شدند، همچنین در بخش ADL کسب نمره 14 ، افراد توانمند و کمتر از آن ناتوان منظور شده‌اند.

در خصوص وجود یا عدم وجود بیماری‌های مزمن، اگر فرد سالماند گزارش می‌کرد که مشکل بهداشتی خاصی دارد، برونده یا مدارک پزشکی بیمار بررسی و اگر مدرک پزشکی نداشت، منفی در نظر گرفته شد. در این مطالعه بیماری‌های مزمن شامل دیابت ملیتوس، دمانس، دپرسیون، فشارخون بالا، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های مزمن انسدادی ریه (COPD)، بی‌اختیاری ادراری، انواع شکستگی، سردرد بوده که حداقل سه ماه وجود داشته باشد. داده‌ها با استفاده از نرمافزار SPSS 19 و آزمون‌های آماری chi-square و تجزیه و تحلیل شدنده $p<0.05$ معنی داری در نظر گرفته شد.

جدول ۲. توزیع فراوانی و درصد فعالیتهای ابزاری زندگی بر حسب جنس در سالمندان شهر امیرکلا

P-value	توانایی در انجام فعالیت			IADL بر حسب جنس
	بدون کمک انجام می‌دهد تعداد(درصد)	با مقداری کمک انجام می‌دهد تعداد(درصد)	قادر به انجام نیست تعداد(درصد)	
.۰۰۰	۳۵(۴۲)	۴۳۲(۵۱/۹)	۳۶۵(۴۳/۹)	مرد
	۳۶(۵۴)	۴۳۸(۵۵/۶)	۱۹۶(۲۹)	زن استفاده از تلفن
.۰۰۰	۴(۰/۵)	۹۰(۱۰/۸)	۷۳۸(۸۸/۷)	مرد رفتن به مکان‌های دور
	۸(۱/۲)	۲۳۸(۳۵/۶)	۴۲۲(۶۳/۲)	زن
.۰۰۰	۱۱(۱/۳)	۵۷(۶/۹)	۷۶۴(۹۱/۸)	مرد رفتن به مغازه جهت خرید
	۴۱(۶/۱)	۱۷۶(۲۶/۳)	۴۵۱(۶۷/۵)	زن آماده کردن غذای خود
.۰۰۰	۳۳(۴)	۶۱۴(۷۲/۸)	۱۸۵(۲۲/۲)	مرد انجام دادن کارهای منزل
	۱۲(۱/۸)	۱۲۲(۱۸/۳)	۵۳۴(۷۹/۹)	زن دریافت دارو
.۰۰۰	۳۳(۴)	۵۹۱(۷۱)	۲۰۸(۲۵)	مرد اداره مسائل مالی خود
	۱۷(۲/۵)	۲۱۶(۲۳/۳)	۴۳۵(۶۵/۱)	زن
.۰۰۰	۷(۰/۸)	۹۷(۱۱/۷)	۷۲۸(۸۷/۵)	مرد
	۱۴(۲/۱)	۱۱۷(۱۷/۵)	۵۳۷(۸۰/۴)	زن
.۰۰۰	۵۱(۶/۱)	۶۳(۷/۶)	۷۱۸(۸۶/۳)	مرد
	۲۶۶(۳۹/۸)	۲۰۴(۳۰/۵)	۱۹۸(۲۹/۶)	زن

جدول ۳. نسبت شانس و حدود اطمینان ۹۵٪ متغیرهای تاثیرگذار بر فعالیتهای روزانه و ابزاری زندگی در سالمندان شهر امیرکلا

P-value	(IADL) فعالیت ابزاری زندگی		(ADL) فعالیت روزانه زندگی		متغیرها
	OR(95% CI)	P-value	OR(95% CI)	P-value	
.۰۰۰	۲/۰۲۹(۱/۵۳۰-۲/۶۹۰)	.۰۴۹۵	۱/۳۱۹(۰/۵۹۵-۲/۹۲۶)	.۰۴۹۵	جنس(مرد/زن)
	رفرنس		رفرنس		۶۰-۶۴
.۰۰۶	۱/۳۵۴(۰/۹۸۰-۱/۸۷۱)	.۰۹۶۸	۰/۹۷۵(۰/۲۷۶-۳/۴۴۲)	.۰۹۶۸	۶۵-۶۹
.۰۰۰	۲/۲۹۹(۱/۰/۶۳۵-۳/۲۳۲)	.۰۸۹۳	۱/۰۹۲(۰/۳۰۵-۳/۹۰۴)	.۰۸۹۳	۷۰-۷۴
.۰۰۰	۴/۶۸۱(۳/۱۸۰-۶/۸۹۰)	.۰۰۳۸	۳/۰۲۱(۱/۰۶۴-۸/۵۸۰)	.۰۰۳۸	۷۵-۷۹ سن
.۰۰۰	۸/۶۴۸(۴/۷۷۴-۱۵/۶۶۳)	.۰۰۰۴	۵/۶۹۳(۱/۷۶۷-۱۸/۳۴۶)	.۰۰۰۴	۸۰-۸۴
.۰۰۰	۱۵/۱۸۱(۵/۹۱۹-۳۸/۹۳۷)	.۰۰۰۲	۸/۷۰۴(۲/۲۱۷-۳۴/۱۶۹)	.۰۰۰۲	۸۵ و بالاتر
	رفرنس		رفرنس		بیسوساد
.۰۰۰	.۰/۴۴۵(۰/۳۳۹-۰/۵۸۳)	.۰/۹۸۸	.۰/۹۹۲(۰/۴۰۱-۲/۴۶۰)	.۰/۹۸۸	ابتدایی و راهنمایی تحصیلات
.۰۰۰	.۰/۱۱۰(۰/۰۴۶-۰/۲۶۳)	.۰/۷۴۷	۱/۴۲۵(۰/۱۶۵-۱۲/۲۹۲)	.۰/۷۴۷	دیپرسن و دانشگاه
.۰۱۹	.۰/۷۸۳(۰/۵۴۸-۱/۱۱۹)	.۰/۵۷۸	.۰/۷۷۸(۰/۳۲۲-۱/۸۸۰)	.۰/۵۷۸	تأهل(متأهل/غيرمتأهل)
	رفرنس		رفرنس		کمتر از ۲۵
.۰۶۳	.۰/۹۳۸(۰/۷۰۴-۱/۲۵۰)	.۰/۰۳۰	.۰/۴۰۴(۰/۱۷۸-۲/۹۱۵)	.۰/۰۳۰	نمایه توده بدنی
.۰۴۳	.۰/۸۷۹(۰/۶۲۷-۱/۲۳۲)	.۰/۲۱۳	.۰/۵۵۴(۰/۲۱۹-۱/۴۰۲)	.۰/۲۱۳	۳۰ و بالاتر
.۰۰۰	۱/۱۸۵(۱/۱۰۱-۱/۲۷۵)	.۰/۰۴۱	۱/۲۰۵(۱/۰۰۷-۱/۴۴۲)	.۰/۰۴۱	بیماری‌ها(بلی/خیر)
.۰۵۴	۱/۰۸۷(۰/۸۳۵-۱/۴۱۶)	.۰/۳۵۶	۱/۴۳۱(۰/۶۶۹-۳/۰۶۴)	.۰/۳۵۶	افسردگی(بلی/خیر)
.۰۰۱	۱/۰۲۶(۰/۹۶۳-۱/۶۵۹)	.۰/۱۳۴	۱/۷۶۶(۰/۸۳۹-۳/۷۱۸)	.۰/۱۳۴	دیابت ملیتوس(بلی/خیر)
.۰۹۲	.۰/۹۸۷(۰/۷۶۰-۱/۲۸۳)	.۰/۵۷۷	.۰/۸۱۰(۰/۳۸۷-۱/۶۹۸)	.۰/۵۷۷	پرفشاری خون(بلی/خیر)
.۰۰۰	۱/۰۶۵(۱/۴۸۷-۲/۵۹۶)	.۰/۰۹	۲/۹۱۷(۱/۳۰۸-۶/۵۰۸)	.۰/۰۹	اختلال شناختی(بلی/خیر)

IADL با سطح تحصیلات ارتباط داشته باشد. در این مطالعه وضعیت تأهله BMI و وضعیت زندگی با فعالیت‌های مربوط به IADL و BMI ارتباط معنی داری نداشته است. مشابه مطالعه‌ما در مطالعه‌ای دیگر نیز بین IADL و BMI وجود ارتباط وجود نداشته است (۸). همچنین در مطالعه‌حضر متغیرهای وجود بیماری‌های مزمن همزمان و ابتلا به اختلال شناختی به طور معنی داری بر فعالیت‌های IADL و BMI مؤثربوده‌اند. در مطالعه Kim شایع‌ترین بیماری‌های منجر به ناتوانی در مردان به ترتیب سلطان، سکته‌مغزی، دیابت و بی‌اختیاری و در زنان سکته‌مغزی، بیماری‌های ریوی، دیابت و بی‌اختیاری گزارش شد (۲۱). در مطالعات مشابه دیگر، سالمدانی که بیماری‌های مزمن را تجربه می‌کردد، به طور معنی داری ناتوانی بیشتری داشته‌اند (۲۳-۲۵). از نقاط قوت مطالعه حاضر انجام یک مطالعه کوهورت، با میزان شرکت‌بالای سالمدان شهر امیرکلا (۲۲۴/۲۲۳/۱۶) می‌باشد. از محدودیت‌های این پژوهش مقطعی بودن آن است که بررسی رابطه علی‌بین بیماری‌های مزمن و ناتوانی در انجام IADL و BMI را مشکل می‌سازد.

خودگزارشی بودن بیماری‌های مزمن، مراجعه‌کمتر سالمدان با شرایط اجتماعی و اقتصادی پایین‌تر و دیر تشخیص دادن بیماری‌ها ما را از شیوع دقیق‌تر این بیماری‌ها در سالمدان محروم می‌سازد. این مطالعه نشان داد که ناتوانی در انجام فعالیت‌های IADL و BMI با افزایش سن توسعه یافته و زنان سالمدان به ویژه در انجام فعالیت‌های مربوط به IADL ناتوانی بیشتری داشته و ناتوانی در افراد با سطح سواد پایین‌تر شایع‌تر بوده‌است. همچنین ابتلا به بیماری‌های مزمن همزمان به خصوص ابتلا به اختلال شناختی از عوامل مؤثر ناتوانی در انجام فعالیت‌های IADL و BMI بوده‌است. لذا با توجه به رشد جمعیت سالمدان، بیسوادی بیشتر زنان سالمدان و شیوع اختلالات شناختی در سالمدانی، مداخلات پیشگیری کننده از ناتوانی و برنامه‌ریزی مناسب جهت رسیدن به‌هدف سالمدانی سالم یک موضوع مهم تلقی گردد.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل به خاطر تأمین منابع مالی این طرح، از همکاران مراکز بهداشتی درمانی شهر امیرکلا و از سالمدان شریف شهر امیرکلا برای شرکت در این مطالعه، تشکر و قدردانی می‌گردد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که ۲/۵ درصد سالمدان در انجام IADL و ۴۸/۲ ناتوانی در IADL ناتوان بوده‌اند. در مطالعه مشابه دیگر در کشور کانادا، ناتوانی عملکردی در IADL ۱۵/۴٪ و در ۳۳/۴٪ بوده است (۱۲). در مطالعه Rajan و همکاران میزان ناتوانی سالمدان در IADL و همکاران Millan-Calenti ۴۸٪ بود (۱۹). همچنین در مطالعه IADL ۳۷٪ و در ۱/۷ سالمدان در انجام IADL و ۵/۵٪ در IADL کاملاً وابسته بوده‌اند (۲۰). در صدپایین ناتوانی در انجام فعالیت‌های IADL در این مطالعه، شاید به فرهنگ و شرایط اجتماعی زندگی سالمدان مربوط شود و سالمدان می‌خواهند تا آنچه که توان اشان اجازه می‌دهد، فعالیت‌های ضروری زندگی خود را مستقلانجام دهند. همچنین در صدبالای ناتوانی در انجام IADL می‌تواند به سطح سواد پایین سالمدان در جامعه ما مربوط شود. براساس نتایج این مطالعه، میانگین نمره مردان در انجام فعالیت‌های مربوط به IADL بیشتر، ولی در فعالیت‌های IADL در دو جنس تفاوت معنی دار وجود نداشت. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، ناتوانی بیشتر مردان نسبت به زنان در زمینه آماده کردن غذا و انجام امور مربوط به منزل بوده‌است. در مطالعه Kim در کره جنوبی، میزان ناتوانی زنان سالمدان در IADL (۸/۲۰٪) بیشتر از مردان (۳/۱۲٪) بوده‌است (۲۱).

در مطالعات دیگر نیز ناتوانی زنان در انجام IADL و IADL بیشتر از مردان بود (۲۰ و ۲۲٪). ناتوانی بیشتر زنان در انجام فعالیت‌های مربوط به IADL شاید به این دلیل باشد که میزان بیسوادی در زنان بیشتر بوده‌است. در مطالعه حاضر میزان ناتوانی در انجام فعالیت‌های IADL در سنین بالای ۷۵ سال و در معیارهای مربوط به IADL در سنین بالای ۷۰ سال بیشتر دیده شد. مشابه نتایج مطالعه ما در مطالعات دیگر نیز میزان ناتوانی در انجام IADL و IADL با افزایش سن بیشتر بوده‌است (۲۲ و ۲۱٪ و ۱۹٪). این موضوع شاید به خاطر کاهش قدرت بدنی افراد سالمدان و افزایش شیوع بیماری‌های مزمن در سنین بالای را بشناسد. در ارتباط با سطح تحصیلات، مطالعه ما همانند مطالعات دیگر (۲۱ و ۱۹٪) نشان داد که عملکرد سالمدان در انجام فعالیت‌های مربوط به IADL با سطح تحصیلات ارتباط معنی دار داشته است.

از آنجاییکه در این مطالعه اکثریت شرکت کنندگان (۷/۶۳٪) بیسواد بوده و اکثر افراد سالمدان (۶۰٪) در انجام فعالیت‌های مربوط به IADL ناتوان بوده‌اند و از طرفی دیگر معیارهای مربوط به IADL مانند توانایی استفاده از تلفن و ... نیاز به داشتن سواد می‌باشد، بنابراین انتظار می‌رفت که میزان ناتوانی در انجام

The Relationship between Chronic Diseases and Disability in Daily Activities and Instrumental Activities of Daily Living in the Elderly

S.R. Hosseini (MD)¹, A. Zabihi (PhD)*², S.R. Jafariyan (PhD)², A. Bijani (MD, PhD)¹

1. Research Center of Social Determinants of Health, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran.

2. Research Center of Nursing Care, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran.

J Babol Univ Med Sci; 20(5); May 2018; PP: 23-9

Received: Nov 9th 2017, Revised: Mar 17th 2018, Accepted: Apr 16th 2018.

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Chronic disease is one of the major causes of disability in doing daily activities. The aim of this study is to determine the relationship between chronic disease and disability in daily activities and instrumental activities of daily living in the elderly.

METHODS: This cross-sectional study was conducted among the elderly of Amirkola. Demographic characteristics (age, gender, level of education and occupation), daily activities and instrumental activities of daily living were collected using a questionnaire. The ability to perform daily activities and instrumental activities was categorized as independently, with the help of others and completely dependent, and ultimately, completely dependent people and those using the help of others were placed in the disability group. The presence of chronic diseases in the elderly was characterized and examined by reviewing the medical records.

FINDINGS: Of 1,500 elderly who were eligible to enter the study, 832 people (55.5%) were male and 668 people (44.5%) were female. In this study, 38 people (2.5%) had a disability in daily activities and 723 (48.2%) had disability in instrumental activities of daily living. The number of associated diseases ($p < 0.003$, CI-95% = 1.08 – 1.46, OR = 1.261), cognitive impairment ($p < 0.009$, CI-95% = 1.308 – 6.508, OR = 2.917) and old age had a significant relationship with daily activity. The highest significant relationship was between the instrumental activities of daily living and gender ($p < 0.000$, CI-95% = 1.53 – 2.69, OR = 2.029), age ($p = 0.000$), education level ($p = 0.000$), the number of associated diseases (P = 0.000, CI-95% = 1.13 – 1.28, OR = 1.2) and cognitive impairment ($p = 0.000$, CI-95% = 1.487 – 2.596, OR = 1.965).

CONCLUSION: According to the results of this study, the presence of chronic diseases, especially cognitive impairment, is one of the effective factors in disability in daily activities and instrumental activities of daily living.

KEY WORDS: Daily Activity, Chronic Disease, Disability, Old Age.

Please cite this article as follows:

Hosseini SR, Zabihi A, Jafariyan SR, Bijani A. The Relationship between Chronic Diseases and Disability in Daily Activities and Instrumental Activities of Daily Living in the Elderly. J Babol Univ Med Sci. 2018;20(5):23-9.

*Corresponding Author; A. Zabihi (PhD)

Address: Babol University of Medical Sciences, Faculty of Nursing and Midwifery, I.R.Iran.

Tel: +98 11 321902597

E-mail: zabihi_alii@yahoo.com

References

- 1.Lashkarboloki F, Aryaei M, Djazayery A, Eftekhari-Ardebily H, Minaei M. Association of demographic, socio-economic features and some health problems with nutritional status in elderly. *Iran J Nutrit Sci Food Technol.* 2015;9(4):27-34. [In Persian]
- 2.Kunstová NŠ, Šídlo L. The future development of elderly care home capacity in South Bohemia. *Kontakt.* 2016;18(2):103-11.
- 3.Azadchehr M, Rahgozar M, Karimloo M, Adib Haj Bageri M. To identify some factors effective on survival of the elderly living in nursing home using copula competing risk model: bayesian approach. *J Health Promot Manag.* 2014;3(4):46-55.
- 4.Mirzaei M, Sahaf R, Mirzaei S, Sepahvand E, Pakdel A, Shemshadi H. Depression and its associated factors in elderly nursing home residents: A screening study in Khorramabad. *Iran J Ag.* 2015;10(1):54-61. [In Persian].
- 5.Statistical Center of Iran. Office of the Head, Public Relations and: International Cooperation. Selection of the results of the census of population and housing in 1395. Statistical Center of Iran; 2017. p. 22.
- 6.Ahrari S, Moshki M, Bahrami M. The relationship between social support and adherence of dietary and fluids restrictions among hemodialysis patients in Iran. *J Caring Sci.* 2014;3(1):11.
- 7.Kabasakal E, Kublay G. Practices of family health professionals regarding chronic disease control and prevention programs. *Health Sci.* 2017;6(10):93-104.
- 8.Ralph NL, Mielenz TJ, Parton H, Flatley A-M, Thorpe LE. Multiple chronic conditions and limitations in activities of daily living in a community-based sample of older adults in New York City, 2009. *Prevent Chronic Dis.* 2013;10:199.
- 9.Prince MJ, Wu F, Guo Y, Robledo LMG, O'Donnell M, Sullivan R, et al. The burden of disease in older people and implications for health policy and practice. *The Lancet.* 2015;385(9967):549-62.
- 10.Chalise HN, Saito T, Kai I. Functional disability in activities of daily living and instrumental activities of daily living among Nepalese Newar elderly. *Pub Health.* 2008;122(4):394-6.
- 11.Omran MT, Khakpour S, Oliae F. Left ventricular function before and after kidney transplantation. *Saudi Med J.* 2009;30(6), 821-23.
- 12.Griffith L, Raina P, Wu H, Zhu B, Stathokostas L. Population attributable risk for functional disability associated with chronic conditions in Canadian older adults. *Age Ageing.* 2010;39(6):738-45.
- 13.Dunlop DD, Song J, Arntson EK, Semanik PA, Lee J, Chang RW, et al. Sedentary time in US older adults associated with disability in activities of daily living independent of physical activity. *J Physical Act Health.* 2015;12(1):93-101.
- 14.Gopinath B, Schneider J, McMahon CM, Teber E ,Leeder SR, Mitchell P. Severity of age-related hearing loss is associated with impaired activities of daily living. *Age Ageing.* 2011;41(2):195-200.
- 15.James BD, Boyle PA, Buchman AS, Bennett DA. Relation of late-life social activity with incident disability among community-dwelling older adults. *J Gerontol Ser Sci.* 2011;66(4):467-73.
- 16.da Silva Alexandre T, Corona LP, Nunes DP, Santos JLF, de Oliveira Duarte YA, Lebrao ML. Gender differences in incidence and determinants of disability in activities of daily living among elderly individuals: SABE study. *Arch Gerontol Geriat.* 2012;55(2):431-7.
- 17.Hosseini SR, Cumming RG, Kheirkhah F, Nooreddini H, Baiani M, Mikaniki E, et al .Cohort profile: The Amirkola health and ageing project (AHAP). *Int J Epidemiol.* 2013;43(5):1393-400.
- 18.Habibi Sola A, Nikpour S, Rezaei M, Haghani H. Relation between Health Promoting Behaviors and activities of daily living and Instrumental activities of daily living among older people in Tehran. *Salmand.* 2008;2(5):332-5.
- 19.Rajan KB, Hebert LE, Scherr PA, Mendes de Leon CF, Evans DA. Disability in basic and instrumental activities of daily living is associated with faster rate of decline in cognitive function of older adults. *Biomed Sci Med Sci.* 2012;68(5):624-30.

- 20.Millan-Calenti JC, Tubío J, Pita-Fernández S, González-Abraldes I, Lorenzo T, Fernandez-Arrutu T, et al. Prevalence of functional disability in activities of daily living (ADL), instrumental activities of daily living (IADL) and associated factors, as predictors of morbidity and mortality. *Arch Gerontol Geriatr.* 2010;50(3):306-10.
- 21.Kim IH. Age and gender differences in the relation of chronic diseases to activity of daily living (ADL) disability for elderly South Koreans: based on representative data. *J Prev Med Pub Health.* 2011;44(1):32-40.
- 22.Hacıhasanoğlu R, Yıldırım A, Karakurt P. Loneliness in elderly individuals, level of dependence in activities of daily living (ADL) and influential factors. *Arch Gerontol Ger.* 2012;54(1):61-6.
- 23.Bowling CB, Sawyer P, Campbell RC, Ahmed A, Allman RM. Impact of chronic kidney disease on activities of daily living in community-dwelling older adults. *J Biomed Sci Med Sci.* 2011;66(6):689-94.
- 24.Giebel CM, Sutcliffe C, Challis D. Activities of daily living and quality of life across different stages of dementia: a UK study. *Aging Ment Health.* 2015;19(1):63-71.
- 25.Jekel K, Damian M, Wattmo C, Hausner L, Bullock R, Connelly PJ, et al. Mild cognitive impairment and deficits in instrumental activities of daily living: a systematic review. *Alzheimer's Res Therapy.* 2015;7(1):17.