

## ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIIS NO PÓS-OPERATÓRIO DE EQUINOS SUBMETIDOS A ORQUIECTOMIA

**PERRONE**, Fernanda Garcia<sup>1</sup>; **BALTAZAR**, Bruna Silva<sup>1</sup>; **SANTOS**, Leticia<sup>1</sup>; **TRISTÃO**, Marina Vicente<sup>1</sup>; **SILVA**, Nádia Chaves<sup>1</sup>; **MOLEZINI**, Flávia Antunes; **SOUSA**, Samuel Santos; **QUEIROZ**, Daniela Junqueira; **DIAS**, Deborah Penteado Martins

A orquiectomia bilateral eletiva é uma cirurgia simples e rotineira na prática equina. Apesar de tecnicamente simples, o potencial para complicações é alto. Edema prepucial e escrotal é a complicação pós-operatória mais comumente observada. Este trabalho objetivou avaliar o uso de flunixin meglumine e meloxicam no pós-operatório de equinos submetidos a orquiectomia. O meloxicam se demonstrou mais eficiente no controle da dor e edema quando comparado com o flunixin meglumine.

---

<sup>1</sup> Faculdade Dr. Francisco Maeda/FAFRAM

---