



ERITROPLASIA NA CAVIDADE BUCAL: UMA PATOLOGIA RARA, MAS DE GRANDE MALIGNIDADE

Laura Luíza Amâncio Braga, Caroline Caixeta Lima, Isabelly Bárbara de Oliveira Mota, Larissa Souza Cunha & Lilian de Barros

Introdução: A Eritroplasia é caracterizada por placas indolores e eritematosas que podem ser localizadas no epitélio das mucosas orais, genitais ou do ânus, que tem alto potencial de malignidade. O potencial de transformação maligna, por sua vez, é quem vai definir o risco de um câncer estar presente em uma lesão ou condição pré-maligna, seja no diagnóstico inicial ou no futuro. (RAMOS RT et. al 2017). O termo Eritroplasia Oral (EO) é empregado para descrever lesão bucal macular ou em placa, de coloração vermelha, para a qual não pode ser estabelecido um diagnóstico clínico específico (HOSNI ES et.al 2009). A maioria dos pacientes afetados é de meia-idade ou homens mais velhos, e sua etiologia está relacionada à exposição dos agentes carcinogênicos principalmente o álcool e o tabaco pois eles potencializam a lesão. Desordens potencialmente malignas são descobertas mais comumente na mucosa bucal, gengiva inferior, língua e assoalho da boca (NAPIER, SPEIGHT, 2008). A grande maioria dos casos de Eritroplasia, histologicamente, são carcinomas epidermoides invasivos, carcinomas in situ ou displasias epiteliais. Microscopicamente é muito comum encontrar perda da camada de ceratina na superfície do epitélio, além de atrofia ou acantose. A relativa raridade da Eritroplasia resulta numa escassa bibliografia sobre essa entidade patológica. (OLIVEIRA RM 2011). **Objetivos:** Este trabalho teve como objetivo realizar uma narrativa descritiva baseada na literatura, fazendo um levantamento sobre os conceitos, de diversos autores, sobre a Eritroplasia Oral. **Metodologia:** Os artigos foram obtidos nas bases de dados Lilacs e Google Acadêmico do ano de 2008 a 2017. Uma revisão de Literatura do ano de 2011 e o Livro Tratado de Patologia Bucal 4ª edição do ano de 1987. **Conclusão:** A avaliação do cirurgião-dentista é de suma importância para o diagnóstico e o tratamento da Eritroplasia, para isto é necessária realizar uma detalhada anamnese, pois o mesmo pode ser o primeiro profissional a diagnosticar o aparecimento de lesões eritematosas na cavidade bucal. Além disso, é importante ressaltar que quanto mais precoce a detecção da patologia, melhor o prognóstico do paciente. Por isto, para chegar a um diagnóstico correto deve-se realizar exames histopatológicos, objetivando não confundir o diagnóstico com outra patologia.

Palavras-chave: Eritroplasia; Mucosa bucal; Assoalho bucal.