

**dr n. med. Piotr Edward Tomczak**

Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

## Przypadek 4

### Parametry wyjściowe

Stopień zaawansowania (TNM)	T3NoMo
Typ histologiczny	Jasnokomórkowy bez elementów innego utkania histologicznego
Stopień złośliwości (G) według Fuhrman	G3
Czas od rozpoznania do uogólnienia/nawrotu (mies.)	24 miesiące, ale przez kolejne 2 lata chory 3-krotnie przebył leczenie operacyjne zmian w płucach i nie był leczony systemowo
Kategoria rokownicza według MSKCC w momencie kwalifikacji do leczenia systemowego	Dobra — 0

G (grade) — stopień złośliwości; MSKCC — *Memorial Sloan Kettering Cancer Center*; TNM (*tumor, nodus, metastases*) — klasyfikacja guz, węzół, przerzuty

### Pierwsza linia leczenia

Lek	Sunitynib
Dawka	50 mg dziennie, schemat 4/2
Stan sprawności w chwili kwalifikacji do leczenia (ECOG)	0
Lokalizacja ognisk nowotworowych	Płuco (początkowo pojedyncze zmiany o średnicy do 1,5 cm, leczone operacyjnie, dopiero po kolejnej operacji, po której nastąpił nawrót (w pierwszym kontrolnym badaniu CT klatki piersiowej stwierdzono liczne zmiany w obu płucach), odstąpiono od leczenia operacyjnego
Czas leczenia (mies.)	34
Najlepsza odpowiedź według RECIST CR/PR/SD/PD	SD
Działania niepożądane (G3/4)	Nadciśnienie tętnicze (3 wg CTC), zespół ręka–stopa (3 wg CTC), niedoczynność tarczycy (3 wg CTC)
Modyfikacja dawkowania	Z ich powodu 2-krotnie zmniejszono dawkę do 37,5 mg sunitynibu dziennie, ale za każdym razem po uzyskaniu poprawy w wyniku optymalizacji leczenia nadciśnienia tętniczego i hormonalnego wracano do dawki podstawowej
Przyczyna zakończenia leczenia	Progresja: wzrost zmian oraz nowe ogniska przerzutowe w płucach

CR (*complete response*) — odpowiedź całkowita; CTC — *Common Toxicity Criteria*; ECOG — *Eastern Cooperative Oncology Group*; G (grade) — stopień; PD (*progression of disease*) — progresja choroby; PR (*partial response*) — odpowiedź częściowa; RECIST — *Response Evaluation Criteria In Solid Tumors*; SD (*stable disease*) — stabilizacja choroby

### Druga linia leczenia

Lek	Aksytynib
Dawka	2 × 5 mg bez zwiększania dawki z powodu nadciśnienia tętniczego
Stan sprawności w chwili kwalifikacji do leczenia (ECOG)	0
Lokalizacja ognisk nowotworowych	Płuco
Czas leczenia (mies.)	> 14 (leczenie jest kontynuowane)
Najlepsza odpowiedź według RECIST CR/PR/SD/PD	SD
Działania niepożądane (G3/4)	Nie występowały

CR (*complete response*) — odpowiedź całkowita; ECOG — *Eastern Cooperative Oncology Group*; G (grade) — stopień; PD (*progression of disease*) — progresja choroby; PR (*partial response*) — odpowiedź częściowa; RECIST — *Response Evaluation Criteria In Solid Tumors*; SD (*stable disease*) — stabilizacja choroby