

dr n. med. Paweł Nurzyński

Zakład Profilaktyki Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Klinika Onkologii i Hematologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

Przypadek 8**Parametry wyjściowe**

Stopień zaawansowania (TNM)	T2aNXMX
Typ histologiczny	Jasnokomórkowy
Stopień złośliwości (G) według Fuhrman	2
Czas od rozpoznania do uogólnienia/nawrotu (mies.)	11
Kategoria rokownicza według MSKCC w momencie kwalifikacji do leczenia systemowego	Pośrednia

G (grade) — stopień; MSKCC — Memorial Sloan Kettering Cancer Center; TNM (tumor, nodus, metastases) — klasyfikacja guz, węzół, przerzuty

Pierwsza linia leczenia

Lek	Sunitynib
Dawka	50 mg dziennie
Stan sprawności w chwili kwalifikacji do leczenia (ECOG)	0
Lokalizacja ognisk nowotworowych	Zmiany przerzutowe w mięszu płuc widoczne w CT, zmiany w węzłach chłonnych
Czas leczenia (mies.)	17
Najlepsza odpowiedź według RECIST CR/PR/SD/PD	PR
Działania niepożądane (G3/4)	Neutropenia
Pozostałe działania niepożądane	Żółte zabarwienie skóry, zgaga, sinica centralna, zespół ręka–stopa, zapalenie błon śluzowych, podwyższone stężenie TSH
Przyczyna zakończenia leczenia	Progresja w zakresie istniejących ognisk nowotworowych

CR (complete response) — odpowiedź całkowita; CT (computed tomography) — tomografia komputerowa; ECOG — Eastern Cooperative Oncology Group; G (grade) — stopień; PD (progression of disease) — progresja choroby; PR (partial response) — odpowiedź częściowa; RECIST — Response Evaluation Criteria In Solid Tumors; SD (stable disease) — stabilizacja choroby; TSH (thyroid-stimulating hormone) — hormon tyreotropowy

Druga linia leczenia

Lek	Aksytynib
Dawka	2 × 5 mg dziennie
Stan sprawności w chwili kwalifikacji do leczenia (ECOG)	1
Lokalizacja ognisk nowotworowych	Płuco Węzły chłonne
Czas leczenia (mies.)	7
Najlepsza odpowiedź według RECIST CR/PR/SD/PD	PD
Działania niepożądane (G3/4)	Białkomocz
Modyfikacja dawkowania	Od 3. kursu zwiększono dawkę do 2 × 7 mg, od 4. kursu do 2 × 10 mg, podczas 6. kursu redukcja dawki do 2 × 5 mg
Przyczyna zakończenia leczenia	Progresja: zmiany przerzutowe w kościach

CR (complete response) — odpowiedź całkowita; ECOG — Eastern Cooperative Oncology Group; G (grade) — stopień; PD (progression of disease) — progresja choroby; PR (partial response) — odpowiedź częściowa; RECIST — Response Evaluation Criteria In Solid Tumors; SD (stable disease) — stabilizacja choroby

Trzecia linia leczenia

Lek	Interferon α
Stan sprawności w chwili kwalifikacji do leczenia (ECOG)	2
Lokalizacja ognisk nowotworowych	Kości
	Płuco
	Węzły chłonne
Czas leczenia (mies.)	1
Najlepsza odpowiedź według RECIST CR/PR/SD/PD	PD
Działania niepożądane (G3/4)	Nie obserwowano
Przyczyna zakończenia leczenia	Progresja: zmiany przerzutowe w OUN

CR (*complete response*) — odpowiedź całkowita; ECOG — *Eastern Cooperative Oncology Group*; G (*grade*) — stopień; OUN — ośrodkowy układ nerwowy; PD (*progression of disease*) — progresja choroby; PR (*partial response*) — odpowiedź częściowa; RECIST — *Response Evaluation Criteria In Solid Tumors*; SD (*stable disease*) — stabilizacja choroby;