

JiIP

JURNAL ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN

ISSN: 2355-0732

Volume 5 Nomor 2, Desember 2019

- Bahrum Nur, Munir, Muh. Jurhadi Kadir : Analisis Kandungan *Acid Detergen Fiber* (ADF) dan *Neutral Detergen Fiber* (NDF) Pakan Kombinasi Serbuk Gergaji Kayu Jati (*Tectona Grandits* L.f) dan Murbei (*Morusalba*) yang Difermentasi dengan Penambahan *Trichoderma* sp. Sebagai Pakan Ternak Ruminansia (55-65)
- Rusli, Muhammad Nur Hidayat, Rusny, Andi Suarda, Jumriah Syam, Astaty : Konsumsi Ransum, Pertambahan Bobot Badan dan Konversi Ransum Ayam Kampung Super yang Diberikan Ransum Mengandung Tepung *Pistia stratiotes* (66-76)
- A. Mushawwir, N. Suwarno, A. A. Yulianti : Thermoregulasi Domba Ekor Gemuk yang Dipelihara pada Ketinggian Tempat (*Altitude*) yang Berbeda (77-86)
- Akbar, Intan Dwi Novieta, Fitriani : Efektivitas Penambahan Bahan Pengenyal yang Berbeda Terhadap Nilai Organoleptik dan pH Bakso Daging Ayam Broiler (87-96)
- N. Suwarno, A. Mushawwir : Model Prediksi Metabolit Melalui Jalur Glikogenolisis Berdasarkan Fluktuasi Mikroklimat Lingkungan Kandang Sapi Perah (97-107)
- I.R. Rumata, D. Darwis, K.A.Kamil : Pengaruh Kitosan Iradiasi Terhadap Fermentabilitas dan Kecernaan (*In Vitro*) (108-119)

Jiip

JURNAL ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN

ISSN 2355-0732

Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember diluar edisi khusus berisi tulisan hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan

Dewan Redaksi

- Penanggungjawab** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
- Pengelola Redaktur** : Ketua Jurusan Ilmu Peternakan
Universitas Islam Negeri Alauddin
- Ketua Dewan Penyunting** : Muhammad Nur Hidayat
- Wakil Ketua Dewan Penyunting** : Aminah Haja Thaha
Penyunting Pelaksana : Khaifah Asgaf
Anas Qurniawan
Suci Ananda
Ayu Lestari
Handayani Indah Susanti
Mutmainnah
- Staf Administrasi** : Muhammad Arsan Jamili
Andi Afriana

Alamat Redaksi

Jurusan Ilmu Peternakan
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Sul-Sel
Telp. (0411) 424835 / Fax. (0411) 424836
Email: jiip.fst@gmail.com

SEMUA TULISAN YANG ADA DALAM JURNAL ILMU DAN INDUSTRI
PETERNAKAN BUKAN MERUPAKAN CERMIN SIKAP DAN ATAU PENDAPAT
DEWAN PENYUNTING, TANGGUNGJAWAB DAN ATAU AKIBAT
DARI TULISAN TETAP TERLETAK PADA PENULIS

JiiP

JURNAL ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN

ISSN: 2355-0732

Volume 5 Nomor 2, Desember 2019

Daftar Isi :

- Bahrum Nur, Munir, Muh. : Analisis Kandungan *Acid Detergen Fiber* (ADF) dan
Jurhadi Kadir *Neutral Detergen Fiber* (NDF) Pakan Kombinasi Serbuk
Gergaji Kayu Jati (*Tectona Grandits* L.f) dan Murbei
(*Morusalba*) yang Difermentasi dengan Penambahan
Trichoderma sp. Sebagai Pakan Ternak Ruminansia (55-
65)
- Rusli, Muhammad Nur : Konsumsi Ransum, Pertambahan Bobot Badan dan
Hidayat, Rusny, Andi Suarda Konversi Ransum Ayam Kampung Super yang
Diberikan Ransum Mengandung Tepung *Pistia*
stratiotes (66-76)
- A. Mushawwir, : Thermoregulasi Domba Ekor Gemuk yang Dipelihara
N. Suwarno, A. A. Yulianti pada Ketinggian Tempat (*Altitude*) yang Berbeda (77-
86)
- Akbar, Intan Dwi Novieta, : Efektivitas Penambahan Bahan Pengenyal yang
Fitriani Berbeda Terhadap Nilai Organoleptik dan pH Bakso
Daging Ayam Broiler (87-96)
- N. Suwarno, A. Mushawwir : Model Prediksi Metabolit Melalui Jalur Glikogenolisis
Berdasarkan Fluktuasi Mikroklimat Lingkungan
Kandang Sapi Perah
(97-107)
- I.R. Rumata, D. Darwis, : Pengaruh Kitosan Iradiasi Terhadap Fermentabilitas
K.A.Kamil dan Kecernaan (*In Vitro*) (108-119)

Pengaruh Kitosan Iradiasi Terhadap Fermentabilitas dan Kecernaan (*In Vitro*)

The Effect of Irradiated Chitosan on Fermentability and Digestibility

I.R. Rumata*, D. Darwis¹, K.A.Kamil²

*Mahasiswa Magister Ilmu Ternak, Program Pascasarjana,
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran
Kampus Jatinangor Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Sumedang,
Jawa Barat, 45363

¹Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR), Badan Tenaga Nuklir Nasional,
Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta 12440

²Departemen Nutrisi Ternak dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan
Universitas Padjadjaran Kampus Jatinangor Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21,
Sumedang, Jawa Barat, 45363

*Korespondensi E-mail : rumata_ir67@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian pengaruh kitosan iradiasi terhadap kinerja fermentabilitas dan pencernaan bahan organik dan bahan kering telah dilakukan teknik *in vitro*. Seperangkat alat dan bahan *in vitro* telah disiapkan untuk menguji level pemberian kitosan iradiasi dalam ransum konsentrat. Level kitosan telah diuji dengan 6 pelakuan, yaitu tanpa kitosan, 300 ppm; 350 ppm, 400 ppm, 450 ppm dan 500 ppm kitosan iradiasi dalam ransum. Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan uji polinomial orthohonal dan kontras orthogonal, menggunakan SPSS IBM 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju fermentabilitas dan pencernaan bahan kering dan organik berbeda nyata lebih tinggi hingga penambahan kitosan iradiasi 450 ppm. Disimpulkan bahwa kitosan hingga 450 ppm mampu mensimulasi kerja mikro rumen dalam proses biokomawi fermentasi dan pencernaan di dalam rumen secara *in vitro*.

Kata kunci: Rumen, Kitosan Iradiasi, *In vitro*

ABSTRACT

The Experiment about the effect of irradiated chitosan (IC) on the fermentability and digestibility were conducted by *in vitro* technique. *In Vitro* equipments were prepared to determination levels of irradiated chitosan in the ration. Six levels of irradiated chitosan were assigned at without IC, 300 ppm IC, 350 IC, 400 ppm IC, 450 IC and 500 ppm IC, with five replication, respectively. All of data were collected and analyzed by polynomial orthogonal and contrast orthogonal test, by using SPSS IBM 21. Based on the result in this experiment showed that additional IC of 450 ppm was optimum level for raising rumen microbes metabolism in the biochemistry proses of fermentabilities and digestibilities at rumen fluid by *in vitro*.

Key word: Rumen, Irradiated Chitosan, *In Vitro*

PENDAHULUAN

Produktivitas ternak sangat ditentukan oleh faktor eksternal dan internalnya. Optimalisasi faktor internal ternak sesungguhnya merupakan manifestasi dari kemampuan genetik ternak tersebut dalam berekspresi dalam merespon seluruh faktor-faktor lingkungan dan pakan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, tahap pencernaan merupakan tahap yang penting sebelum nutrisi tersebut diabsorpsi masuk ke dalam darah dan sel-sel.

Bagi ternak ruminansia, fisiologi pencernaannya unik dibandingkan ternak unggas. Ternak ruminansia memiliki rumen yang di dalamnya dikandung sangat banyak spesies mikroba. Secara parsial, rumen ini adalah sebuah ekosistem yang sangat kompleks (Mushawwir dan Latipudin, 2013) dan secara mandiri harus mampu mempertahankan kondisi idealnya. Kebutuhan serat kasar bagi mikroba rumen adalah sangat esensial. Dalam kenyataannya ternak ruminansia adalah induk semang yang memanfaatkan produk fermentasi dari mikroba sebagai prekursor metabolismenya dalam mendukung pertumbuhan dan produksinya.

Dapat dikatakan bahwa performa ternak ruminansia yang kurang optimal menunjukkan kinerja rumen yang tidak optimal pula. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan fungsional rumen. Penelitian defaunasi hingga rekayasa bahan pakan sebelum dikonsumsi ternak telah banyak dilaporkan. Beberapa kajian menunjukkan belum optimumnya pencernaan bahan pakan meskipun kadar ligninnya telah dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa peran mikroba menduduki fungsi esensial jika dikaitkan dengan pencernaan bahan-bahan organik.

Strategi peningkatan kinerja mikroba perlu terus dikaji dan dilakukan. Pemberian kitosan sebagai feed additif bagi ternak ruminansia juga telah banyak dilakukan. Namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Salah satu penyebabnya adalah ukuran molekul kitosan yang mungkin tidak dapat diabsorpsi secara optimal oleh mikroba dan villi-villi rumen.

Terkait dengan hal ini, maka dalam penelitian telah dilakukan upaya pengurangan ukuran molekul kitosan, dengan mengaplikasikan teknik radiasi sinar gamma dari nuklir. Berat molekul kitosan yang jauh lebih rendah <30 kD, diharapkan mampu diabsorpsi ke dalam sel-sel mikroba dan mampu mensitulasi ekspresi gen (atau DNA) mikroba. Ekspresi DNA mikroba yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan protein-protein (enzim) yang mampu menginduksi fermentasi protein maupun serat kasar atau secara keseluruhan bahan-

bahan organik di dalam cairan rumen. Dengan demikian potensi pemanfaatan nutrisi bagi ternak semakin tinggi.

Oleh sebab itu peneliti tertarik mengkaji dampak pemberian kitosan hasil iradiasi nuklir terhadap kemampuan fermentabilitas dan pencernaan bahan organik dan pencernaan bahan kering di dalam cairan rumen secara *in vitro*.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan penelitian adalah kitosan iradiasi dalam bentuk liquid. Kitosan hasil radiasi dalam bentuk cairan ini diperoleh dari Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR), Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN), Pasar Jumat Jakarta. Kitosan tersebut dahulu diisolasi dari kulit udang dengan teknik kimiawi untuk memisahkan gugus amina dan mineralnya. Kemudian diiradiasi sinar gamma 75 kilogray (Darwis dkk., 2014). Konsentrasi kitosan induk adalah 5% atau 50.000 ppm. Larutan tersebut diencerkan sesuai dengan konsentrasi kitosan perlakuan yang telah ditetapkan.

Cairan rumen sapi pasundan untuk proses *in vitro* diperoleh dari Rumah Potong Hewan (RPH) Banjaran, Kabupaten Bandung. Saliva buatan (larutan McDougall), larutan HgCl_2 jenuh, asam borat (H_3BO_3) berindikator (merah metil/MR dan hijau bromo kresol/BCG), gas CO_2 , vaselin, H_2SO_4 0,005 N, H_2SO_4 15 %, larutan pepsin 0,2 %, Na_2CO_3 jenuh, NaOH 0,5 N, HCl 0,5 N, phenolptalein, aquadest, larutan garam formalin (formal saline).

Peralatan penelitian meliputi tabung fermentor, shaker waterbath inkubator, cawan Conway, pipet, buret, labu Erlenmeyer, pendingin Leibig, sentrifuge, tabung sentrifuge, seperangkat alat destilasi, oven 105°C, cawan porselin, kertas saring, eksikator, timbangan digital dan tanur.

Peubah dan Metode Analisis

1. Kadar NH_3 Cairan Rumen

Kadar NH_3 diukur dengan teknik Mikrodifusi Conway (General Laboratory Procedure, 1966). Sebanyak 1 ml supernatan diletakkan di kiri sekat cawan Conway dan 1 ml larutan Na_2CO_3 jenuh ditempatkan pada sekat kanan. Cawan kecil di tengah diisi asam borat berindikator merah metil dan brom kresol hijau sebanyak 1 ml. Cawan Conway

ditutup rapat dengan tutup bervaselin kemudian digoyang sehingga supernatan bercampur dengan Na₂CO₃. Cawan Conway yang telah berisi supernatant yang tercampur dengan Na₂CO₃ dibiarkan selama 24 jam pada suhu kamar. Amonia yang terikat oleh asam Borat dititrasi dengan H₂SO₄ 0,005 N sampai warna berubah kemerahan. Kadar NH₃ ditentukan dengan rumus berikut :

$$NH_3 = (\text{mL titrasi} \times N \text{ H}_2\text{SO}_4 \times 1000) \text{ mM}$$

Keterangan :

ml : volume asam sulfat yang terpakai titrasi

N : Normalitas asam sulfat

2. Kadar Asam Lemak Terbang Total (VFA total)

Kadar VFA total diukur dengan teknik destilasi uap (General Laboratory Procedure, 1966). Supernatan dimasukan ke dalam tabung destilasi sebanyak 5 mL dan dipanaskan dengan uap air. Tabung segera ditutup rapat setelah ditambahkan 1 ml H₂SO₄ 15 persen. VFA melewati tabung pendingin terkondensasi dan ditampung dengan erlemeyer yang telah dimasukkan NaOH 0,5 N 5 mL hingga volume sekitar 300 ml. Selanjutnya ditambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 2 tetes dan dititrasi dengan HCl 0,5 N. Titrasi akan diakhiri pada saat awal terjadi perubahan warna dari merah menjadi bening. Dilakukan pula titrasi blanko terhadap 5 ml NaOH. Kadar VFA dihitung dengan rumus :

$$VFA \text{ total} = (b - s) \times N \text{ HCl} \times 1000/5$$

Keterangan : b = volume titrasi blanko

s = volume titran sampel

N = normalitas larutan HCl

3. Pengukuran Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik *in Vitro*

Kecernaan bahan kering dan bahan organik akan dilakukan dengan metode Tilley dan Terry (1969). Sebanyak 1 mL larutan kitosan (sesuai perlakuan) dan 1 g ransum dimasukan dalam tabung fermentor, yang berisi 10 ml cairan rumen dan 40 ml larutan saliva buatan (McDougall), kemudian dikocok dengan gas CO₂ agar suasana anaerob dan pH 6,5 - 6,9. Diinkubasikan selama 24 jam dalam waterbath pada suhu 39 °C. Setelah 24 jam tutup tabung fermentor dibuka dan ditetesi larutan HgCl₂ jenuh sebanyak 0,2 ml untuk mematikan mikroba. Tabung disentrifuse dengan kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit. Supernatan

dibuang, dan endapan ditambah 50 ml larutan pepsin 0,2 persen dalam suasana asam. Inkubasi kembali dalam suasana aerob selama 24 jam. Selanjutnya endapan disaring dengan kertas Whatman 41. Kemudian dianalisis kadar bahan kering dan bahan organik. Sebagai blanko digunakan cairan rumen tanpa perlakuan. Koefisien cerna BK dan BO dihitung dengan persamaan :

$$\text{KcBK (\%)} = \frac{\text{BK awal} - (\text{BK residu} - \text{BK blanko})}{\text{BK awal}} \times 100$$

$$\text{KcBO (\%)} = \frac{\text{BO awal} - (\text{BO residu} - \text{BO blanko})}{\text{BO awal}} \times 100$$

Keterangan : KcBK = Kecernaan Bahan Kering; KcBO = Kecernaan bahan Organik

Rancangan Percobaan dan Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik rancangan acak kelompok. Terdiri dari enam (6) perlakuan tanpa dan dengan penambahan kitosan iradiasi dengan tiga (5) ulangan. Keenam perlakuan tersebut, yaitu:

Perlakuan A : Ransum tanpa pemberian kitosan

Perlakuan B : Kitosan iradiasi 300 ppm dalam ransum

Perlakuan C : Kitosan iradiasi 350 ppm dalam ransum

Perlakuan D : Kitosan iradiasi 400 ppm dalam ransum

Perlakuan E : Kitosan iradiasi 450 ppm dalam ransum

Perlakuan F : Kitosan iradiasi 500 ppm dalam ransum

Data fermentabilitas dan pencernaan *in vitro* yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik statistika menggunakan Uji Polinomial Otrhogonal dan Kontras Orthogonal, serta Uji Korelasi Regresi. Analisis dan interpretasi data telah dilakukan dengan menggunakan software SPSS IBM 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan analisis statistika menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata pemberian kitosan iradiasi terhadap fermentabilitas dan pencernaan secara *in vitro*. Pada Tabel 1, tampak bahwa secara keseluruhan lajur fermentabilitas (VFA dan NH₃) maupun laju pencernaan, baik bahan kering dan organik menunjukkan peningkatan yang nyata berbeda seriirng dengan penambahan level kitosan iradiasi, hingga 450 ppm dalam

ransum. Tampaknya pemberian 450 ppm dalam ransum adalah pemberian yang optimal, terutama terhadap KCBK dan KCBO (Tabel 2 dan Gambar 1).

Tabel 1. Pengaruh Chitosan Iradiasi terhadap Fermentabilitas dan Kecernaan Invitro

Peubah	Kitosan iradiasi dalam ransum (ppm)					
	0	300	350	400	450	500
VFA (mM/L)	158,70 ^a	177,10 ^b	183,33 ^c	182,00 ^d	186,50 ^e	124,50 ^f
NH ₃ (mM/L)	2,32 ^a	3,70 ^b	4,20 ^c	4,55 ^d	4,40 ^d	2,65 ^e
KCBK (%)	51,28 ^a	53,68 ^a	56,69 ^b	60,82 ^c	64,03 ^d	62,22 ^d
KCBO (%)	46,99 ^a	50,62 ^b	52,71 ^b	57,21 ^c	61,50 ^d	60,64 ^d

Rata-rata perubah yang diikuti dengan abjad yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata ($P < 0,05$)
VFA = Volatile fatty acid; KCBK = Kecernaan bahan kering; KCBO = Kecernaan bahan organik

Kitosan iradiasi yang ditambahkan dalam ransum tampaknya mampu meningkatkan kinerja fermentasi oleh mikro-mikroba yang terdapat di dalam cairan rumen (Chiu dkk., 2015; Gwase dkk., 2015). Peningkatan kinerja fermentasi tampak dengan meningkatnya proporsi atau volume VFA dan NH₃. Peningkatan VFA menunjukkan bahwa mikroba terutama bakteri di dalam cairan rumen mampu mendegradasi sumber karbohidrat ransum mejadi glukosa (Huang dkk., 2005; Adriani dan Mushawwir, 2008; Araujo dkk., 2015), selanjutnya menjadi prekursor dan menghasilkan VFA dengan volume yang tinggi. Meskipun pada Tabel 2 ditunjukkan koefisien determinasi dan korealsi yang cukup rendah, namun penambahan kitoasan hingga 450 ppm merupakan penambahan yang paling optimal. Pendugaan volume VFA berdasarkan pengaruh kitosan adalah $y = 183,10 + 4,11x$.

Begitu pula dengan kinerja fermentatif terhadap degradasi protein, ditunjukkan dengan besarnya volume *byproduct*-nya yaitu kadar NH₃ (Jeon dkk., 2003; Kittiwongwattana, 2015; Mushawwir, 2015), menunjukkan alur yang sama dengan VFA, dengan persamaan model pendugaan yaitu $y \text{ (NH}_3\text{)} = 3,23 + 01,12x$. Hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan kitosan produksi Polymar, Fortaleza Brazil, pada sapi perah dengan dosis 150 mg/kg berat badan, menunjukkan peningkatan performa dan efisiensi pemanfaatan nutrient (Valle dkk., 2017). Valle juga melaporkan peningkatan konsentrasi asam lemak rantai panjang dan rantai pendek termasuk kelompok asam-asam VFA. Hasil yang sama juga telah ditunjukkan oleh Kong dkk. (2010) dan . Pada ternak domba, asam lemak terbang

propionate menunjukkan peningkatan (Goiri dkk., 2010), Mingoti dkk. (2016), meskipun disertai dengan penurunan ammonia dengan bertambahnya konsentrasi pemberian kitosan (Syinowiecki dan Al-Kateeb, 2003; Oresanya dkk., 2008; Pearce dkk., 2013).

Pemberian kitosan, dilaporkan juga telah meningkatkan nitrogen urea darah (blood urea nitrogen = BUN), menurunkan sekresi nitrogen (N) feces tanpa mempengaruhi keseimbangan N dan sintesis protein oleh mikroba (Mingoti dkk., 2016). Fakta ini berhubungan atau disebabkan bahwa pemberian kitosan mampu meningkatkan pencernaan protein, serta terkait dan berdampak terhadap metabolisme N di hati.


Hasil penelitian terdahulu menunjukkan juga bahwa bila propionat meningkat, maka produksi metan menurun (Tang dkk., 2005; Xu dan Wang, 2005; Tanuwiria dkk., 2007), sehingga kehilangan energi akan berkurang, dan akan kehilangan energi ini akan minimal bila asam propionat tinggi (Tankson dkk., 2001; Tao dkk., 2006; Soeharsono dkk., 2010; Rhoads dkk., 2013) . Meskipun hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sama dengan hasil penelitian sekarang ini dengan penambahan kitosan. Dengan demikian, setiap bahan pakan mempunyai efisiensi tersendiri. Dengan menggunakan teknik stoichiometri maka nilai efisiensi fermentasi bahan pakan yang digunakan lebih akurat (Javaid dkk., 2011; Mushawwir, 2015).

Kitosan iradiasi dengan ukuran berat molekul yang lebih rendah mampu berinterkalis langsung ke dalam sel-sel mikroba (Goiri dkk. 2010). Kenyataan ini menunjukkan kinerja mikroba yang lebih baik, meskipun dalam keadaan ekosistem cairan rumen kurang menguntungkan, dengan ketidak seimbangan mineral kation anion (Crini, 2005; Adriani dan Mushawwir, 2008; Nguyen dkk., 2016), cekaman panas lingkungan eksternal (Latipudin dan Mushawwir, 2011; Mushawwir dan Latipudin, 2011 dan 2012; Loyau dkk., 2014), profil metabolisme yang tidak seimbang (Mushawwir dkk. 2010 dan 2011; Mushawwir dkk., 2019). Keadaan ini dapat dikurang dengan pemberian kitosan, yang ditandai peningkatan volume VFA dan NH_3 .

Kecernaan bahan kering (KcBK) dan bahan organik (KcBO) tampaknya mengalami peningkatan ($P < 0,05$) seiring dengan peningkatan level kitosan iradiasi (Tabel 1 dan Gambar 1). Pengaruh kitosan terhadap kedua indikator pencernaan in vitro tersebut sangat besar, yaitu masing-masing 0,90 dan 0,94, serta model pendugaan masing-masing $\text{KcBK} = 49,13 + 0,57x$ dan $\text{KcBO} = 44,41 + 3,01x$ (Tabel 2).

Tabel 2. Koefisien Deteminasi (R^2), Koefisien Korelasi (r) Pengaruh Chitosan Iradiasi dan Model Regrasinya terhadap Fermentabilitas dan Kecernaan

Peubah	Koefisien Deteminasi (R^2), Koefisien Korelasi (r) dan Model Pendugaan Kitosan Iradiasi dalam ransum		
	R^2	r	Model Pendugaan
VFA	0,10	0,32	$y = 183,10 + 4,11x$
NH_3	0,10	0,32	$y = 3,23 + 01,12x$
KCBK	0,90	0,95	$y = 49,13 + 0,57x$
KCBO	0,94	0,97	$y = 44,41 + 3,01x$



Gambar 1. Profil Fermentabilitas dan Kecernaan dengan Berbagai Level Penambahan Kitosan Iradiasi

Peningkatan pencernaan seiring dengan penambahan level kitosan hingga 450 ppm dalam ransum menunjukkan bahwa terdapat interaksi positif kitosan dengan mikroba-mikroba cairan rumen. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diketahui bahwa setiap

saat dalam rumen terjadi perubahan-perubahan kimiawi akibat proses fermentasi yang terjadi karena kegiatan mikroorganisme (Gyliene dkk., 2003; Mushawwir dan Latipudin, 2013; Paiva dkk., 2016).

Reaksi kimia yang terjadi dalam rumen sangat bervariasi bergantung kepada bahan makanan yang masuk dan jumlah serta jenis mikroorganisme yang terlibat di dalam proses fermentasi tersebut. Secara garis besar mikroorganisme dalam rumen berfungsi sebagai penyelenggara fermentasi, pembentuk vitamin B kompleks dan vitamin K, sumber zat makanan bagi induk semang. Kemampuan ini meningkat dengan pemberian kiroosan (El-Seed dkk., 2002; Goiri dkk., 2010). Sekitar 50% - 60% nitrogen yang diperlukan oleh induk semang dapat dipenuhi dari mikroba rumen yang mati. Nilai hayati protein mikroba rumen cukup tinggi, sehingga adanya mikroba dalam rumen sangat penting pada keadaan kadar dan kualitas protein pakan rendah (Renaudeau dkk., 2012; Wiradimadja dkk., 2014). Pada kondisi kadar dan kualitas protein ransum tinggi, seringkali kehadiran mikroba dapat mengganggu (Vie dkk., 2001; Wang dan Zhang, 2004), karena protein pakan tersebut akan dirombak terlebih dahulu oleh mikroba. Kondisi ini sangat merugikan, sehingga banyak peneliti berusaha mencari bahan yang dapat menimbulkan "protein bypass" (Tan dkk., 2010; Tian dkk., 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kitosan iradasi mampu mempengaruhi fermentabilitas dan pencernaan secara invitro. Pemberian hingga 450 ppm dalam ransum merupakan level yang paling optimum dalam mensimulasi kerja mikro rumen dalam proses biokomiawi fermentasi dan pencernaan di dalam rumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, L. dan Mushawwir, A. 2008. Kadar Glukosa Darah, Laktosa Dan Produksi Susu Sapi Perah Pada Berbagai Tingkat Suplementasi Mineral Makro. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran.
- Araujo, A.P.C., Venturelli, B.C., Santos, M.C.B., Gardinal, R., Consolo, N.R.B., Calomeni, G.D., Freitas, J.E., Barletta, R.V., Gandra, J.R., Paiva, P.G., and Rerno, F.P. 2015. Chitosan affects total nutrient digestion and ruminal fermentation in Nellore steers. *Anim. Feed Sci. and Tech.* 206:114-118.

- Chiu, C.Y., Chan, I.L., Yang, T.H., Liu S.H., and Chiang, M.Y. 2015. Supplementation of chitosan alleviates high-fat diet-enhanced lipogenesis in rats via adenosine monophosphate (amp)-activated protein kinase activation and inhibition of lipogenesis-associated genes. *J. Agric. Food. Chem.* 63 : 2979-2988.
- Crini, G. 2005, Recent Developments in Polysaccharide-based Materials Used As Adsorbents in Wastewater Treatment, *Prog. Polym. Sci.* 30, 38-70.
- Darwis, D., Puspitasari, T., Iramani, D., Susilowati, S., dan Pangerteni, D.S. 2014. Preparation of low molecular weight chitosan by radiation and its application for plant growth promoter. IAEA Tecdoc Series: Radiation processed materials in products from polymers for agricultural applications. IAEA, Vienna.
- El-Seed, A.N.M.A.F., Kamel, H.E.M. ., Sekine, J., Hishinuma, M., and Hamana, K. 2002. Chitin and chitosan as possible novel nitrogen sources for ruminants. *Can. J. Anim. Sci.* 24: 161-163.
- Goiri, I., Oregui, L.M., and Garcia-Rodriguez, A. 2010. Use of chitosan to modulate ruminal fermentation of a 50:50 forage-to-concentrate diets in sheep. *J. Anim. Sci.* 88:749-755.
- Gwaze, F. Rand Mwale, M.. 2015 The Prospect of Duckweed in Pig Nutrition: A Review. *Journal of Agricultural Science*; Vol. 7, No. 11; 2015ISSN 1916-9752 E-ISSN 1916-9760. Published by Canadian Center of Science and Education.
- Gyliene, O., Razmute, I., Taro zaite, R., dan Nivinskiene, O. 2003. Chemical Composition and Sorption Properties of chitosan Produced from Fly larva Shells. *Chemija (Vilnius)*, T.14 Nr.3: 121-127.
- Huang, R. L. , Lin, Y. L., Wu, G. Y Li, ., T. J ., Li, L. L ., Yang, C. B. ., Zhang, J., Wang, B. ., Deng, Z. Y., Zhang, Y. G., Tang, Z. R. ., Kang, P. and Guo, Y. M. 2005. Effect Of Dietary Oligochitosan Supplementation On Ileal Digestibility Of Nutrients And Performance In Broilers. China Agricultural Univ. Press, Beijing, China.
- Javaid, A.M, Shahzad, A., Nisa, M., and Sarwar. M. 2011. Ruminal dynamics of ad libitum feeding in buffalo bulls receiving different level of rumen degradable protein. *Livest Sci.* 135:98-102.
- Jeon, T. I., Hwang, S .G. ., Park, N. G. ., Jung, Y. R., Shin, S. I., Choi, S. D., and Park, D. K. 2003. Antioxidative effect of chitosan on chronic carbon tetrachloride induced hepatic injury in rats. *Toxicology* 187:67-73.
- Kittiwongwattana, C and Vuttipongchaikij, S . 2013. Effect of nutrient media on vegetative growth of *Lemna minor* and *Landoltia punctata* during *in vitro* and *ex vitro* cultivation. *Maejo International J of Sci and Technol.* 7(01):60-69
- Kong, M., Che, X.G. ., Xing, K., and Park, H.J. 2010. Antimicrobial properties of chitosan and mode of action: a state of the art review. *Int. J. Food Microbial.* 144:51-63.
- Latipudin, D. Dan Mushawwir, A. 2011. Regulasi Panas Tubuh Ayam Ras Petelur Fase Grower dan Layer, *Jurnal Sains Peternakan Indonesia.* 6(2) : 77-82.
- Loyau, T., S. Metayer-Coustard, S., Berri, C., Crochet, S., Cailleau-Audouin, E., Sannier, M., Chartrin, P., Praud, C., Hennequet-Antier, C., Rideau, N., Courousse, N., Mignon-Grasteau, S., Everaert, N., Duclos, M.J., Yahav, S., Tesseraud, S., and Collin, A. 2014. Thermal manipulation during embryogenesis has longterm effects on muscle and liver metabolism in fast-growing chickens. *PLoS One* 9:e105339.
- Mingoti, R.D., Freitas, J.E., Gandra, J.R., Gardinal, R., Calomeni, G.D., Barletta, R.V., Vendramini, T.H.A., Paiva, P.G., and Renno, F.P. 2016. Dose response of chitosan on nutrient digestibility, blood metabolites and lactation performance in Holstein dairy cows. *Livestock Sci.* 187:35-39.

- Mushawwir A. dan Latipuddin, D. 2013. *Biologi Sintesis Telur, perspektif Fisiologi, Biokimia dan Molekuler Produksi Telur*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mushawwir, A. 2015. *Biokimi Nutrisi*. Widya Padjadjaran, Bandung.
- Mushawwir, A. Dan Latipudin, D. 2011. Beberapa Parameter Biokimia Darah Ayam Ras Petelur Fase Grower dan Layer dalam Lingkungan “Upper Zonathermoneutral. *Jurnal Peternakan Indonesia*. 13 (3) : 191-198.
- Mushawwir, A. dan Latipudin, D. 2012. Respon fisiologi thermoregulasi ayam ras petelur fase grower dan layer. *Prosiding seminar zootechniques for Indogeneous resources development, ISAA Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. Proceeding of National Seminar on Zootechniques*. 1(1) : 23-27.
- Mushawwir, A., Adriani, L., and Kamil. K.A. 2011. Prediction Models for Olfactory Metabolic and Sows% Rnareticulocyt (Rnart) by Measurement of Atmospheric Ammonia Exposure and Microclimate Level. *J. of the Indon Tropical Anim Agric*, 36:14-20.
- Mushawwir, A., Suwarno, N., dan Yulianti, A.A. 2019. Profil Malondialdehyde (MDA) dan Kreatinin Itik Fase Layer yang Diberi Minyak Atsiri Garlic Dalam Kondisi Cekaman Panas. *Jurnal Ilmu dan Industri Peternakan* 5 (1), 1-11.
- Mushawwir, A., Yong, Y.K., Adriani, L., Hernawan, E., and Kamil, K.A. 2010. The Fluctuation Effect of Atmospheric Ammonia (NH₃) Exposure and Microclimate on Hereford Bulls Hematochemical. *J. of the Indon Tropical Anim Agric*, 35:232-238.
- Nguyen, T.T., Bowman, P.J., Haile-Mariam, M., Pryce, J.E., and Hayes, B.J. 2016. Genomic selection for tolerance to heat stress in Australian dairy cattle. *J. Dairy Sci*. 99:2849-62.
- Oresanya, T. F., Beaulieu, A. D., and Patience, J. F., 2008. Investigations of energy metabolism in weanling barrows: The interaction of dietary energy concentration and daily feed (energy) intake. *J. Anim. Sci*. 86:348–363.
- Paiva, P.G., de Jesus, E.F., Valle, ., T. A. D., del Almeida, G. F., Costa, A.G.B.V.B., Consentini, C.E.C., F.Zanferari, F., Takiya, C.S., da Silva Bueno, I.C., and Renno, F.P., 2016. Effects of chitosan on ruminal fermentation, nutrient digestibility, and milk yield and composition of dairy cows. *Anim. Prod. Sci*. 53:231-236.
- Pearce, S. C., Gabler, N. K., Ross, J. W., Escobar, J., Patience, J. F., Rhoads, R. P., and Baumgard, L. H., 2013. The effects of heat stress and plane of nutrition on metabolism in growing pigs. *J. Anim. Sci*. 91.
- Renaudeau, D., Collin, A., Yahav, S., De Basilio, V., Gourdine, J. L., and Collier, R. J. 2012. Adaptation to hot climate and strategies to alleviate heat stress in livestock production. *Animal* 6:707–728.
- Rhoads, R.P., Baumgard, L. H., and Suagee, J. K., 2013. Metabolic priorities during heat stress with an emphasis on skeletal muscle. *J. Anim. Sci*. 2013.91:2492–2503.
- Soeharsono., Adriani, L., Kamil, K.A., Hernawan, E., dan Mushawwir, A. 2010. *Fisiologi Ternak : Fenomena dan Nomena Fungsi Jaringan dan Organ pada Hewan*. Widya Padjadjaran.
- Syinowiecki, J and Al-Kateeb, N . 2003. Production properties and some new application of chitin and its derivatives. *Critical reviews in food science and nutrition. Pro Quest medical library*. 43(2): 145:171
- Tan, G.Y., Yang, L., Fu, Y.-Q., Feng, J.H., and Zhang, M.H., 2010. Effects of different acute high ambient temperatures on function of hepatic mitochondrial respiration, antioxidative enzymes, and oxidative injury in broiler chickens. *Poultry Science*. 89: 115-122.

- Tang, Z.R., Yin, Y.L., Nyachoti, C.M., Huang, R.L., Li, T.J., Yang, C.B., Yang, X.J., Gong, J., Peng, J., Qi, D.S., Xing, J.J., Sun, Z.H., and Fan, M.Z. 2005. Effect of dietary supplementation of chitosan and galacto-mannan-oligosaccharide on serum parameters and the insulin like factor-I mRNA expression in early-weaned piglets. *Domest. Anim. Endocrinol.* 28:430-441.
- Tankson, J. D., Vizzier-Thaxton, Y., Thaxton, J. P., May, J. D., and Cameron, J. A., 2001. Stress and nutritional quality of broilers. *Poult. Sci.* 80:1384-1389.
- Tanuwiria, U.H., Mushawwir, A. dan Yulianti, A. (2007). Potensi pakan serat dan daya dukungnya terhadap populasi ternak ruminansia di wilayah kabupaten garut. *Jurnal Ilmu Ternak.* 7 (2): 117-127.
- Tao, X., Zhang, Z. Y., Dong, H., Zhang, H., and Xin, H. 2006. Responses of thyroid hormones of market-size broilers to thermoneutral constant and warm cyclic temperatures. *Poult. Sci.* 85:1520-1528.
- Tian, H., Wang, W., and Zheng, N. 2015. Identification of diagnostic biomarkers and metabolic pathway shifts of heat-stressed lactating dairy cows. *J. Proteomics.* 125:17-28.
- Valle, T.A., Paiva, P.G., Jesus, E. F., Almeida, G.F., Zanferari, F., Costa, A.G.B.V.B., Bueno, I.G.S., and Renno, F.P. 2017. Dietary chitosan improves nitrogen use and feed conversion in diets for mid-lactation dairy cows. *Livestock Sci.* 201:22-29.
- Wang, S. Q., and Zhang, C. S., 2004. Chitin, chitosan and their application in aquaculture. *Feed Res.* 5: 25-28.
- Wiradimadja, R., Rusmana, D., Widjastuti, T., and Mushawwir, A., 2014. Chicken slaughterhouse waste utilization (chicken feather meal treated) as a source of protein animal feed ingredients in broiler chickens. *Lucr. Stiint. Ser. Zooteh.*, 62: 120-124.
- Xie, W., Xu, P., and Liu, Q. 2001. Antioxidant activity of watersoluble chitosan derivatives. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 11:1699-1701.
- Xu, Y.Q. and Wang, Y.Z. 2005. The application of chitin in aquaculture. *China Feed.* 7: 30-32.