

## КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

**PREVALENT INDEX OF HIV AMONG PREGNANT FOR EVALUATION PREVALENCE**

H.A. Mokhort, I.P. Kolesnikova

*SUMMARY. Evaluation of the overall prevalence of HIV among the female population of reproductive age in the**case of non-standardized for age structure indicators prevalentnosti HIV infection among pregnant incorrect and exaggerated (the difference with standardized indicators in some years to 37,7 %).***Key words:** *HIV-infection, pregnant, prevalence index.*

Отримано 16.11.2015 р.

© Колеснікова І.П., Петрусевич Т.В., Зубленко О.В., 2015  
УДК 616.98-097:578.828.6:614.253  
DOI

І.П. Колеснікова, Т.В. Петрусевич, О.В. Зубленко

**СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО ЛЮДЕЙ,  
ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ**

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

*Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, у студентів вищих медичних навчальних закладів є дуже важливим аспектом роботи майбутніх лікарів у подоланні наслідків епідемії ВІЛ. Майже половина студентів (48,8 %) ставляться до таких людей упереджено, тому потрібно обирати правильні стратегії медичних освітніх програм.*

**Ключові слова:** *люди, які живуть з ВІЛ, ставлення лікарів.*

Толерантне ставлення студентів медичних навчальних закладів як майбутніх лікарів є запорукою для подальшого успіху лікування та збереження якості життя людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ). Стигма та дискримінація, які обумовлені ВІЛ-статусом, не тільки суттєво обмежують доступ людей, які живуть з ВІЛ, до медичних послуг, але й ускладнюють профілактику розповсюдження ВІЛ та виявлення нових випадків інфікування. Дані дослідження, проведеного в Республіці Білорусь в 2011 р., свідчать про те, що 30,8 % медичних працівників не мали бажання працювати з ВІЛ-інфікованими пацієнтами, а 11,8 % відчували психологічний дискомфорт при роботі з такими пацієнтами; 20 % студентів-випускників мали труднощі при визначенні свого ставлення до ЛЖВ. Небажання надавати медичну допомогу ВІЛ-позитивним пацієнтам у маргінальних групах вислови-

ли 26,4-71,9 % студентів-медиків у Казанському медичному університеті (Bikmukhametov D.A. et al., 2012). Більш ніж п'ята частина студентів-медиків в Англії та Хорватії вважали, що лікарі мають право відмовитися від лікування ЛЖВ (Evans J.K. et al., 1993; Tescic V. et al., 2006). Близько 10-15 % студентів-медиків одного з медичних ВУЗів Малазії висловили небажання надавати медичні послуги ЛЖВ та більше 70 % вважали, що пацієнти з ВІЛ/СНІД мають лікуватись окремо (Chew B. H. et al., 2013).

Для вивчення ставлення до ЛЖВ у майбутніх лікарів було проведено опитування студентів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за модифікованими питаннями стандартних опитувальників, які опубліковані у рекомендаціях з проведення періодичних досліджень в межах вивчення поведінки груп населення, які піддаються ризику інфікування ВІЛ, та адаптованих опитувальників Центру з контролю та профілактики захворювань США. Також були враховані пропозиції «Методичних рекомендацій з дослідження толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ, як компоненту національної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль за епідемією ВІЛ/СНІД».

Опитування було проведено на кафедрі епідеміології серед студентів 5-го курсу медичних факультетів при вивченні дисципліни «Епідеміологія». Навчальний план

## КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

дисципліни включає інтерактивну лекцію «Епідеміологія ВІЛ/СНІДу. Шляхи подолання стигми та дискримінації в медичних закладах до ЛЖВ». Студентів опитали на по-

чатку вивчення дисципліни – первинне опитування (I) та в кінці – вторинне опитування (II). Результати опитування на деякі питання представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Результати опитування студентів-медиків щодо їх ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, %

Питання	Повністю згоден/згоден		Не впевнений		Категорично не згоден/не згоден	
	I	II	I	II	I	II
ВІЛ-інфіковані заслуговують на це захворювання за свою поведінку	4,4	1,6	6,7	15,1	88,9	83,3
ВІЛ-інфікованих осіб повинні лікувати окремо від інших людей, щоб захистити населення від інфікування	48,8	35,0	24,4	31,5	26,8	33,5
Більшість ВІЛ-позитивних працівників медичних закладів інфікуються на робочому місці	57,7	33,4	26,6	46,6	15,7	20,0

Опитування показало, що студенти ставляться до ЛЖВ упереджено: майже половина студентів (48,8 %) вважають, що ВІЛ-інфіковані повинні лікуватись окремо, а після проведення занять на кафедрі кількість таких студентів зменшилася на 13,8 %. Збільшилася частка студентів, які відповіли «не впевнений», що свідчить про більш свідоме ставлення до проблеми ВІЛ-інфікованих.

Формування толерантного ставлення до ЛЖВ у студентів вищих медичних навчальних закладів є дуже важливим аспектом роботи майбутніх лікарів у подоланні наслідків епідемії ВІЛ. Тому потрібно обирати правильні стратегії медичних освітніх програм. Стосовно освітніх програм у сфері ВІЛ/СНІДу потрібно робити акценти на те, що від набутих знань залежить ставлення майбутніх лікарів до ЛЖВ.

### ATTITUDES OF FUTURE DOCTORS FOR PEOPLE LIVING WITH HIV

I.P. Kolesnikova, T.V. Petrushevych, O.V. Zublenko

*SUMMARY. Tolerance to HIV-infected students in higher education is a very important aspect of future doctors in overcoming the consequences of the HIV epidemic. Almost half of students (48,8 %) are biased towards HIV-infected, so you need to choose the right strategy for medical education programs.*

**Key words:** people living with HIV, attitudes of doctors.

Отримано 16.11.2015 р.