

RESUMOS DOS TRABALHOS APRESENTADOS

2. RETENÇÃO PROLONGADA DOS DENTES DECÍDUOS

Silva AH
Pellicari BG
Lansoni BZ
Menezes IP
Ferreira MCD
Long SM

A retenção prolongada de um dente decíduo é a sua permanência no arco dentário após o período esperado para sua esfoliação, pode ocorrer por falta de espaço da erupção do permanente, posicionamento inadequado do germe sucessor, ausência do germe permanente, presença de supranumerários e anquilose dos dentes decíduos, segundo Guedes Pinto (1995). O objetivo desse trabalho é analisar as possíveis causas da retenção dos incisivos superiores decíduos da paciente B.C.T, do sexo feminino, de 8 anos de idade, que compareceu à Clínica Odontológica Infantil da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP. Apresentando dentição mista hígida. Foi realizada radiografia periapical modificada para região anterior, onde foi observada imagem sugestiva de dentes de Hutchinson, e possivelmente dentição permanente impactada pela provável presença de supranumerário. Foram solicitados exames complementares laboratoriais (hemograma completo e sorologia para sífilis), bem como, tomografia computadorizada cone-beam da região da maxila completa. Foi solicitada a sorologia para sífilis, devido a hipótese de sífilis congênita, pela sugestiva imagem de dentes de hutchinson. E o hemograma, para a possível necessidade de exodontia dos supranumerários. Já a tomografia, será auxiliar ao diagnóstico final.

REFERÊNCIAS

- Teixeira Flávia Santos, Campos Vera, Mitchell Constance, Carvalho Laura Maria Barbosa de. Retenção prolongada de molares decíduos: diagnóstico, etiologia e tratamento. Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial 2005 ; 10(3): 125-137.
- Badauy CM. Estudo epidemiológico da retenção prolongada de dentes decíduos. UFES Rev Odontol. 2001;3(2):35-9