

195

PREVALÊNCIA DAS PATOLOGIAS MAIS FREQUENTES DIAGNOSTICADAS POR ANATOMOPATOLÓGICOS ENTRE JUNHO DE 2000 E DE 2001 EM PROCEDIMENTOS REALIZADOS NUM POSTO DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO DE PORTO ALEGRE. *Dei Ricardi, LR; Freiburger, MH; Paganella, RB; Koppe, D; Santos, RK; Dal'alba, C; Napp, G; Almeida, HC.* (Departamento de Cirurgia/ FAMED-

UFRGS).

No Posto de Atendimento Primário de Porto Alegre (PAM-3) são realizadas cirurgias ambulatoriais por alunos de graduação da Faculdade de Medicina da UFRGS, sob supervisão de um professor. Essas cirurgias acarretam na realização de um grande número de exames anatomopatológicos, sendo esses fundamentais para o correto diagnóstico e conduta. Esse trabalho visa obter informações a respeito das prevalências das patologias mais freqüentes diagnosticadas nas cirurgias ambulatoriais desse grupo de estudo, entre junho de 2000 e de 2001. Nesse período foram realizados 521 anatomopatológicos. Os diagnósticos mais freqüentes foram respectivamente: 120 (23%) nevos, 72 (13,8%) cistos epidérmicos e 65 (12,5%) carcinomas basocelulares.