

175

ACALÁSIA TEM ALTA PREVALÊNCIA E MAIOR DEMANDA NO AMBULATÓRIO DE DOENÇAS DO ESÔFAGO E DISMOTILIDADES DIGESTIVAS (AMBESO) DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA). Mario L. Cardoso Filho; Antônio B. Lopes; Pedro Schneider; Antônio C. Grüber; Sérgio G. S. de Barros (Programa de Pós-Graduação em Gastroenterologia e Ciências Aplicadas à Gastroenterologia. FAMED /

UFRGS e Serviço de Gastroenterologia, HCPA).

Introdução: A Acalásia é caracterizada por ausência de movimentos peristálticos no corpo esofágico, associada ou não a um relaxamento incompleto do esfíncter esofágico inferior durante o processo de deglutição. Sua incidência na população é de 1/10.000. **Objetivo:** Determinar a prevalência e a demanda ambulatorial da acalásia no AmbEso. **Métodos:** Foram coletados retrospectivamente os dados referentes aos pacientes atendidos no AmbEso no período de Jan/1999 até Jun/2001. Foram verificados o sexo, idade, queixas, diagnóstico e número de consultas de cada paciente. **Resultados:** Foram estudados 358 pacientes com média de idade de $51,5 \pm 18,2$ anos, sendo 230 do sexo feminino (64,2 %). A distribuição de diagnósticos foi a seguinte: DRGE- 242 (67,7%), Acalásia- 55 (15,4%), trânsito colônico lento- 20 (5,6%), distúrbio motor inespecífico do esôfago- 6 (1,7%), esôfago em quebra-nozes- 5 (1,4%), dispepsia- 5 (1,4%), CREST/Lúpus Eritematoso Sistêmico- 5 (1,4%), Câncer de esôfago- 3 (0,8%), divertículo de Zenker- 3 (0,8%), estenose cáustica- 2 (0,6%), membranas esofágicas- 2 (0,6 %), outros- 10 (2,8%). Entre os pacientes com acalásia as queixas mais frequentes foram: disfagia- 48/55 (87,3%), pirose- 6/55 (10,9%), dor torácica- 5/55 (9,1%), regurgitação- 4/55 (7,3%). No período de estudo foram realizadas 948 consultas, totalizando $2,65 \pm 1,8$ (1 a 12) consultas por paciente. Os pacientes com acalásia apresentaram em média $3,22 \pm 2,26$ atendimentos por indivíduo, consultando mais frequentemente que o grupo geral ($p=0,035$). Quando comparados com os pacientes com DRGE o grupo de acalásicos também apresentou maior número de consultas por indivíduo ($p=0,043$). **Conclusão:** A Acalásia tem alta prevalência no AmbEso e gera maior demanda de consultas comparativamente aos outros grupos diagnósticos.