



Evento	Salão UFRGS 2013: SIC - XXV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2013
Local	Porto Alegre - RS
Título	A INFLUÊNCIA DA NEGLIGÊNCIA EMOCIONAL NA INFÂNCIA NO SURGIMENTO DE SINTOMAS PSICÓTICOS NA ADULTEZ
Autor	GIOVANNA LOPES PICCOLI
Orientador	RODRIGO GRASSI DE OLIVEIRA
Instituição	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Introdução: Eventos traumáticos ocorridos na infância podem resultar em consequências emocionais e/ou físicas na adultez. Diversos estudos apontam para uma associação entre trauma precoce e a ocorrência de sintomas psicóticos posteriores. Os achados evidenciam, de forma consistente, a hipótese de que experiências traumáticas na infância possam influenciar no desenvolvimento de síndromes psicóticas futuras, como a esquizofrenia. A partir do instrumento CTQ (Childhood Trauma Questionnaire), pode-se especificar cinco tipos de trauma precoce: negligência física (NF) e emocional (NE), abuso físico (AF), emocional (AE) e sexual (AS). **Objetivo:** Relacionar cinco tipos de trauma precoce – com sintomatologia positiva e negativa em pacientes ambulatoriais portadores de esquizofrenia. **Método:** Participaram do estudo 36 pacientes ambulatoriais portadores de esquizofrenia (14 mulheres), que responderam ao CTQ (Childhood Trauma Questionnaire) para avaliação de eventos traumáticos na infância – o questionário gera cinco escores (referentes aos tipos de trauma descritos anteriormente). Os participantes também responderam a PANSS, a Escala de Impressão Clínica Global (CGI), o subteste vocabulário da WASI e entrevista de dados sociodemográficos. Para análise, o escore dos cinco tipos de trauma do CTQ foi correlacionado com as demais variáveis. Foram submetidas as correlações significativas encontradas, ao método de regressão linear. **Resultados:** O escore da NE foi positivamente relacionado com o aumento do escore de sintomas positivos ($p=0.03$) e geral da PANSS ($p=0.01$), além de negativamente relacionado com a idade do diagnóstico da doença ($p=0.03$). Após regressão linear, apenas NE foi preditor para a PANSS positiva ($\beta=2.78$, $p<0.05$), a idade do diagnóstico ($\beta= -0.17$, $p<0.05$) e a PANSS geral ($\beta=13.33$, $p<0.05$). **Discussão:** A partir dos resultados obtidos, observa-se a intensidade de NE precoce como maior preditor à sintomatologia positiva de portadores de síndromes psicóticas estáveis. Apesar de algumas limitações do estudo, como investigação de poucas medidas clínicas e amostra restrita, os achados mostram-se consistentes a ponto de evidenciar uma associação a respeito da ocorrência de eventos traumáticos na infância e o surgimento de transtornos psicóticos na vida adulta. Futuras pesquisas são necessárias para ampliar a investigação da influência dos diferentes tipos de traumas sobre o curso de doenças como a esquizofrenia.