

**RELAÇÃO ENTRE HÁBITOS ORAIS DELETÉRIOS COM A MORDIDA ABERTA ANTERIOR E A MORDIDA CRUZADA POSTERIOR: RELATO DE CASO.***D'Amore RM\*, Prietsch JR*

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Os hábitos de sucção são atos reflexos que aparecem durante a vida intra uterina, tendo propósito nutricional, de estimulação do sistema respiratório e tátil, além de tranquilizante. Maioria das crianças pratica algum hábito de sucção não nutritiva (HSNN), mas tais hábitos não vão causar danos à oclusão se interrompidos até os 4 anos de idade. O prolongamento do hábito pode levar a uma malocclusão (MO), já que leva à quebra do equilíbrio muscular, alteração da pressão intrabucal e atua como uma obstrução mecânica. A severidade da MO dependerá da frequência, intensidade e duração do hábito. O uso prolongado de chupeta tem sido associado com mordida aberta anterior (MAA) e mordida cruzada posterior (MCP). O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma paciente do sexo feminino, 9 anos, leucoderma, com hábito de sucção de chupeta, com MMA, MCP unilateral esquerda e maxila atrésica. Trabalhou-se na remoção do hábito, e, após, foi realizada disjunção maxilar com aparelho de Hyrax. Houve autocorreção da MAA. Após o período ativo de tratamento foram mantidas consultas trimestrais a fim de acompanhar trocas dentárias. Houve persistência do diastema interincisal devido à baixa inserção de freio, sendo necessária frenectomia. Atualmente a paciente está em acompanhamento para avaliar se haverá correção espontânea do diastema.

Descritores: Comportamento de sucção, mordida aberta, mordida cruzada