

TUMOR SÓLIDO-PSEUDOPAPILAR DE PÂNCREAS (TUMOR DE FRANTZ)

NAYANE FERNANDES CLIVATTI;CACIO WIETZYCOSKI; GIULIANO CHEMALE CIGERZA; VIVIAN PIERRI BERSCH; SANTO PASCOAL VITOLA; ALESSANDRO BERSCH OSVALDT

Introdução: Tumor pseudopapilar sólidos do pâncreas (TSPP, também conhecidos como tumor de Frantz é lesão rara, de comportamento biológico pouco agressivo e potencialmente curável com o tratamento cirúrgico. Dor epigástrica e lesões volumosas palpáveis cujo diâmetro pela tomografia computadorizada varia de 8-10 cm compõe a apresentação clínica típica. A cauda e a cabeça do pâncreas são as localizações mais comuns. A análise histológica, na maioria dos casos, não discerne o grau de agressividade tumoral. Vinte por cento costumam ser metastáticos ou invadir estruturas vizinhas. **Relato dos Casos:** dois pacientes, uma mulher de 44 anos com uma lesão no pâncreas com 13cm e um homem de 28 anos com lesão pancreática de 12cm. Ambas as lesões em topografia corpo-caudal foram ressecadas com pancreatectomia corpo caudal e margens livres. Não houve evidência de recidiva durante o acompanhamento 9 meses. **Conclusão:** Apesar de raro, o tumor de Frantz deve ser a primeira hipótese diagnóstica em pacientes jovens que apresentam massa pancreática sólida-cística volumosa sem comprometimento do estado geral. O tratamento cirúrgico, mesmo na presença de metástases possui ótimo prognóstico após a ressecção(95% de sobrevida em 5 anos).