

HEMATOMA DE JEJUNO APÓS TRAUMA ABDOMINAL FECHADO EM CRIANÇA

FELIPE COLOMBO DE HOLANDA; JOSÉ CARLOS SOARES FRAGA, MARCIO ABELHA MARTINS, FERNANDA LUCIA CAPITANIO BAEZA

Introdução: Traumas abdominais contusos por guidão de bicicleta ocasionam mais comumente lesões de duodeno, visto que este órgão encontra-se fixo à coluna vertebral pelo ligamento de Treitz. Entretanto, embora raramente, este tipo de trauma também pode ocasionar lesões do restante do intestino delgado. **Objetivo:** Relatar caso de hematoma de jejuno decorrente de trauma abdominal fechado por guidão de bicicleta em criança. **Material e método:** Revisão de prontuário e literatura. **Resultado:** B.Y, 6 anos, sofreu trauma abdominal por guidão durante queda de bicicleta. Quatro dias depois do acidente foi levado à emergência devido a náusea, vômitos e dor periumbilical. Durante o exame foi observada equimose e crosta hemática em região periumbilical. Tomografia computadorizada de abdômen demonstrou hematoma na parede de alça jejunal, estreitando a luz e provocando dilatação a montante. Foi instituído manejo conservador com jejum completo, colocação de sonda nasogástrica, e nutrição parenteral total. Paciente evoluiu satisfatoriamente, com restauração progressiva do trânsito intestinal, sem necessidade de intervenção cirúrgica, tendo recebido alta hospitalar após 18 dias de internação. **Conclusão:** Lesão de jejuno após trauma abdominal fechado, especialmente após trauma por guidão de bicicleta, é muito rara, já que estas alças intestinais são livres e móveis. Quando não há perfuração ou obstrução intestinal completa, o tratamento inicial destas lesões é conservador, sem necessidade de cirurgia imediata.