

P 1537**Avaliação do indicador clínico andar em pacientes com mobilidade física prejudicada**

Bruna Engelman; Mariana Palma da Silva; Manoela Schmarczek Figueiredo; Marcos Barragan da Silva; Miriam de Abreu Almeida - UFRGS

Introdução: A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) é uma cirurgia de substituição da articulação coxofemoral por uma prótese. No pós-operatório, a maioria dos pacientes recebe o Diagnóstico de Enfermagem (DE) Mobilidade Física Prejudicada em função da mobilidade reduzida. A avaliação da eficácia das intervenções de enfermagem pode ser avaliada por meio da Classificação dos Resultados de Enfermagem NOC, cujas escalas likert permitem a mensuração em qualquer ponto de um continuum. **Objetivo:** Avaliar a mobilidade de pacientes submetidos a Artroplastia Total de Quadril por meio do indicador clínico Andar (020806). **Métodos:** Estudo longitudinal, realizado em 2016 em hospital universitário. Os participantes do estudo foram pacientes submetidos a ATQ, de ambos os sexos; idade ≥ 18 anos; internados por, no mínimo, três dias, que tivessem o diagnóstico de enfermagem Mobilidade Física Prejudicada registrado em prontuário. O instrumento de coleta de dados continha o indicador clínico Andar, seguido de sua definição conceitual e operacional. Os pacientes foram avaliados de 3 a 4 dias, aplicando-se escala likert de 5 pontos que variava de 1-Gravemente comprometido a 5-Não comprometido. Utilizou-se as Equações de Estimativas Generalizadas para comparar as médias dos indicadores diariamente. **Resultados:** Foram incluídos 13 pacientes, predominantemente do sexo masculino (62%), com idade média 59 ($\pm 15,2$). O indicador clínico Andar apresentou mudança significativa nos escores ($p < 0,001$), quando comparada a média da primeira e última avaliação. As médias variaram de 1,00 ($\pm 0,00$) a 4,30 ($\pm 0,25$). A melhora do indicador clínico Andar pode estar relacionada ao tratamento médico prescrito, à efetividade dos cuidados de enfermagem como também da fisioterapia. **Conclusões:** O indicador Andar permitiu avaliar a evolução da mobilidade do paciente submetido à ATQ. A NOC evidenciou resultados do paciente influenciados por diferentes profissionais da equipe de saúde. Sugere-se mais estudos com esta classificação para o estabelecimento da correlação estatística entre os cuidados de enfermagem prescritos e os resultados dos pacientes. Projeto aprovado pelo CEP/HCPA 160118. **Unitermos:** Prótese de quadril; Avaliação de resultados; Cuidados de enfermagem