

AVALIAÇÃO DO INDICADOR CLÍNICO MOVIMENTOS REALIZADOS COM FACILIDADE EM PACIENTES PÓS ARTROPLASTIA COXOFEMURAL

Mariana Palma da Silva; Bruna Engelman; Manoela Schmarczek Figueiredo; Marcos Barragan da Silva; Siméia Corrêa de Matos; Miriam de Abreu Almeida

No pós-operatório de Artroplastia coxofemural grande parte dos pacientes recebe o Diagnóstico de Enfermagem (DE) Mobilidade Física Prejudicada em decorrência da mobilidade reduzida. A eficácia das intervenções de enfermagem pode ser avaliada por meio da Classificação dos Resultados de Enfermagem NOC, cujas escalas likert permitem a mensuração em qualquer ponto de um continuum. O objetivo deste estudo foi avaliar o indicador clínico Movimentos realizados com facilidade em pacientes pós Artroplastia coxofemural. Trata-se de um estudo longitudinal, realizado em 2016 em um hospital universitário. Os participantes do estudo foram pacientes submetidos à artroplastia coxofemural, de ambos os sexos; idade ≥ 18 anos; acompanhados por, no mínimo, três dias ou até a alta hospitalar. O instrumento de coleta de dados continha o indicador clínico Movimentos realizados com facilidade, pertencente ao resultado de enfermagem Mobilidade, da Classificação dos Resultados de Enfermagem NOC. Para este indicador, foi realizada a definição conceitual e operacional de acordo com a literatura ortopédica. Os pacientes foram avaliados de 3 a 4 dias, aplicando-se escala likert de cinco pontos em que a avaliação clínica do indicador variava de 1 - Gravemente comprometido a 5 - Não comprometido. Utilizou-se as Equações de Estimativas Generalizadas para comparar as médias dos indicadores diariamente. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (160118). Os resultados do estudo contam com 20 pacientes incluídos, predominantemente do sexo masculino (65%), com idade média de 60 (± 11) anos. O indicador clínico Movimentos realizados com facilidade apresentou mudança significativa nos escores ($p < 0,001$), quando comparada a média da primeira e última avaliação. As médias variaram de 2,60 ($\pm 0,31$) a 4,63 ($\pm 0,15$). Conclui-se que a melhora do indicador clínico Movimentos realizados com facilidade pode estar relacionada à efetividade dos cuidados de enfermagem nas transferências, posicionamento, e conforto desses pacientes. Sugerem-se mais estudos com esta classificação para o estabelecimento da correlação estatística entre os cuidados de enfermagem prescritos e implementados, bem como realizados por outros profissionais, e os resultados alcançados pelos pacientes. Palavra-chave: prótese de quadril; avaliação de resultados; mobilidade.