



Diagnóstico e tratamento dos tumores carcinóides

C PACHECO¹; H DABO²; GABRIELA FERNANDES²; ADRIANA MAGALHÃES²; PEDRO BASTOS³

¹SERVIÇO PNEUMOLOGIA HOSPITAL BRAGA, ²SERVIÇO PNEUMOLOGIA HOSPITAL SÃO JOÃO; ³SERVIÇO CIRURGIA CARDIOTORÁCICA HOSPITAL SÃO JOÃO

INTRODUÇÃO

Os tumores carcinóides são neoplasias pouco comuns com uma incidência crescente.

OBJECTIVO

Análise retrospectiva de dados clínicopatológicos e seguimento de indivíduos diagnosticados com tumores carcinóides pulmonares nos últimos 6 anos.

RESULTADOS

Total de doentes	53
Sexo masculino	58,5%
Sintomas respiratórios	24,5%
NSP em TC tórax	75,5%

Endoscopia respiratória

Alterações endoscópicas	27
Localização brônquio principal	74%
Biópsia com dx	100%
<i>Carcinóides Típicos</i>	10
<i>Carcinóides Atípicos</i>	2
<i>Carcinóides NOS</i>	15

Biópsia transtorácica

Nº doentes que realizou BTT	18
Biópsia com dx	10
<i>Carcinóides Típicos</i>	1
<i>Carcinóides Atípicos</i>	1
<i>Carcinóides NOS</i>	8

Tratamento cirúrgico

Ressecção cirúrgica	46
<i>Lobectomias</i>	31
<i>Pneumectomia</i>	8
<i>Segmentectomias</i>	7
<i>Carcinóides típicos</i>	32
<i>Carcinóides atípicos</i>	14
<i>Kappa ER/Cirurgia</i>	0,85
<i>Kappa BTT/Cirurgia</i>	0,942

Seguimento dos doentes

Sobrevida 5 anos	
<i>T. Carcinóides Típicos</i>	100%
<i>T.Carcinóides Atípicos</i>	85%
Tratamento pós-cirurgia	
<i>Quimioterapia</i>	3
<i>Laser</i>	1

CONCLUSÃO

As características dos tumores carcinóides pulmonares diferem significativamente de outros tumores malignos pulmonares.

A ressecção tumoral completa mantém-se como o principal objectivo no tratamento desta entidade.