

2010 Diciembre, 2(2): 1-2

## EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCIDENTES AGRESIVOS Y ANTISOCIALES EN POBLACIÓN PSIQUIÁTRICO FORENSE BRASILEÑA

de Borba Telles LE, Folino JO, Taborda JGV, Zoratto PHI, Peres Day V

*Instituto Psiquiátrico Forense Mauricio Cardoso, Porto Alegre, Brasil – Cátedra de Psiquiatría, Facultad de Ciencias Médicas, UNLP*

e-mail: *lisieux@telles.med.br – folino@med.unlp.edu.ar*

### Introducción

La evaluación del riesgo y el adecuado dimensionamiento de las conductas agresivas y comportamientos antisociales en un hospital psiquiátrico forense es necesaria para evitar prejuicios y para planificar las acciones preventivas correspondientes. El sesgo que producen el comportamiento agresivo y el antisocial puede tener efectos perjudiciales a la hora de planificar la externación. Sin embargo, no existía hasta este estudio información científica sobre la incidencia de estas conductas en hospitales psiquiátrico forenses brasileños.

### Objetivo

a) Determinar la incidencia de comportamientos agresivos y antisociales en la población internada en el Instituto Psiquiátrico Forense Mauricio Cardoso de Porto Alegre, Brasil. b) Estimar la eficiencia predictiva de los instrumentos de evaluación de riesgo. c) Establecer una sistemática de evaluación y registro de los eventos agresivos y antisociales en la institución.

### Materiales y métodos

Se constituyó una cohorte con los 68 pacientes varones internados por “medida de seguridad” en una de las salas del instituto; se realizó un seguimiento de un año (Mayo de 2007 a Mayo de 2008); los episodios agresivos o antisociales fueron registrados diariamente a través de dos instrumentos específicos, la Escala de Agresión Observada de Yudofsky y el Cuestionario de seguimiento para comportamientos antisociales de Tengström et al. El riesgo de recidiva violenta se estimó con las versiones brasileñas de la Hare PCL-R y la HCR-20.

### Resultados

En la evaluación basal se determinó que el 73,5% de la cohorte era de raza blanca; el 79,4 soltero; el 58,8% tenía algún tipo de ocupación laboral al momento de la internación. Así mismo que el promedio de escolaridad era bajo (3,7 años) y que el promedio de edad era de 42,8 años.

En cuanto a las variables clínicas, se determinó que el 58,8% padecía algún trastorno psicótico; que el 20,6% padecía algún grado de retraso mental; que el 14,7% presentaba algún trastorno de personalidad y que el 5,9% padecía de dependencia al alcohol o alguna otra sustancia. La media de puntuación total de la PCL-R fue de 13,54 y de la HCR-20 fue de 23,32.

Respecto a las variables criminológicas, se halló que la media de edad al momento del delito fue 29,7 años (DT 10,04); que el 29,4% había cometido homicidio; el 22% lesiones corporales; el 20,6% robo o hurto; el 11,8% delitos sexuales.

La incidencia de comportamiento agresivo o antisocial fue de 200 en el año de seguimiento. Cincuenta pacientes fueron los que actuaron de esa manera. Los comportamientos agresivos y antisociales se presentaron predominantemente durante el día. Se destaca que, de acuerdo a la Escala de Agresión Observada, hubo 57,1% de agresiones verbales y 33,3% de agresiones físicas contra personas. Por otra parte, el registro de comportamientos antisocial (no agresivo) se distribuyó de la siguiente manera: 19,5% fue “inadecuado uso de la medicación” (tráfico, desechado); 11,7% violación de las reglas institucionales; 9,8% consumo de alcohol o drogas; 9,8% fuga.

La HCR 20 total tuvo una alta eficiencia predictiva para los eventos agregados (agresión/comportamiento antisocial): AUC 0,82 (SE 0,06;  $p < 0,001$ ); lo mismo ocurrió con la PCL – R total: AUC 0,77 (SE 0,065;  $p < 0,001$ ).

*2010 Diciembre, 2(2): 2-2*

## Conclusiones

La incidencia de eventos agresivos y antisociales en la población psiquiátrico forense del Instituto Psiquiátrico Forense Mauricio Cardoso es alta y requiere ser tenida en cuenta a la hora de la planificación terapéutica y preventiva. La HCR 20 y la PCL-R muestran una alta eficiencia predictiva por lo que es razonable incluirlas en la rutina de evaluación. Fue posible implementar por primera vez una evaluación sistemática del riesgo de recidiva violenta y de los eventos agresivos y antisociales en hospital psiquiátrico forense brasileño.