



Anestesia epidural em cutias (*Dasyprocta azarae*)

Epidural anesthesia in agoutis (*Dasyprocta azarae*)

Fabrcio Singaretti de Oliveira¹, Leandro Lu3s Martins², Juan Carlos Duque³,
Ana Paula Pauloni⁴ & Carlos Augusto Ara3jo Valad3o⁵

RESUMO

Uma das dificuldades no manejo de animais selvagens encontra-se na pouca informa33o existente sobre anestesia segura, principalmente em roedores, como a cutia. Diversos protocolos anest3sicos foram testados sem sucesso na obten33o de analgesia cir3rgica, mesmo com o uso de pr3-medica33o com azaperone (4 mg/kg) e meperidina (4 mg/kg) e altas doses de xilazina (0,8 mg/kg) e cetamina (42 mg/kg). Depois de alguns ensaios, observou-se que o uso de doses menores dos anest3sicos junto com a t3cnica de anestesia epidural com lidoca3na abolia a resposta volunt3ria a est3mulos dolorosos som3ticos. Assim, sete machos, adultos, pertencentes ao Zool3gico Municipal de Catanduva, SP, foram tranq3ilizados com azaperone (4 mg/kg) e meperidina (4 mg/kg). Quinze minutos depois foram administradas cetamina (20 mg/kg) e xilazina (0,4 mg/kg), tamb3m pela via intra-muscular. Posteriormente, foi injetada lidoca3na no espa3o lombossacro, na dose de 5 mg/kg. Foram avaliados o per3odo de lat3ncia da associa33o anest3sica (3,86±1,87 minutos); per3odo de lat3ncia da lidoca3na epidural (6,86±2,85 minutos); o tempo h3bil de analgesia (80,86±16,1 minutos); e a temperatura retal, a qual diminuiu, em m3dia, 1,76±0,53 graus cent3grados desde o come3o da anestesia at3 o final do per3odo h3bil de analgesia. Todos os animais se recuperaram de forma satisf3ria, sem apresentar sinais de excita33o e n3o foram observadas complica33es decorrentes da t3cnica epidural. Concluiu-se que a t3cnica de anestesia balanceada empregada proporcionou analgesia adequada, durante tempo que seria suficiente para a realiza33o de v3rios procedimentos, com a utiliza33o de doses reduzidas de xilazina e cetamina.

Descritores: anestesia, epidural, cutia, *Dasyprocta azarae*.

ABSTRACT

One of the greatest difficulties on management of wild species is the little data on anesthesia, mainly in rodents, as agoutis. Several anesthetic protocols were unsuccessfully tested for surgical analgesia, even using premedication with azaperone (4 mg/kg) and meperidine (4 mg/kg) and high doses of xylazine (0,8mg/kg) and ketamine (42mg/kg). After some tests, the use of low doses of anesthetics together with epidural anesthesia with lidocaine eliminated the voluntary response to somatic painful stimuli. Thus, seven adult males, belonging to the Catanduva City Zoo were tranquilized with azaperone (4 mg/kg) and meperidine (4 mg/kg). After 15 minutes, ketamine (20 mg/kg) and xylazine (0.4 mg/kg) were injected via intramuscular. Posteriorly, lidocaine (5 mg/kg) was injected in lumbosacral space. The time of latency of the anesthetic association (3.86±1.87 minutes); time of latency of epidural lidocaine (6.86±2.85 minutes); and time of analgesia (80.86±16.1 minutes) were analyzed, besides rectal temperature, which decreased, in average, 1.76±0.53°C from the beginning of the anesthesia to the end of the able time. All animals got satisfactory recovery, without presenting excitation signs and not observing complications due the epidural technique. It was concluded that the balanced anesthesia technique provided adequated analgesia during a time considered enough for several procedures, by means of low doses of xylazine and ketamine.

Key words: anesthesia, epidural, agoutis, *Dasyprocta azarae*.

INTRODUÇÃO

A cutia é um dos grandes roedores latino-americanos, como as pacas e as capivaras [2]. Em relação à tranquilização e anestesia desse grupo de animais, pesquisas vêm sendo realizadas visando-se estabelecer protocolos seguros para realização de procedimentos clínicos ou cirúrgicos. Entretanto, não há relatos sobre anestesia epidural nessas espécies, apenas anestesia dissociativa ou geral. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi descrever a anestesia epidural lombossacra em cutias criadas em cativeiro, proporcionando bases para futuros experimentos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Diversos protocolos anestésicos foram testados sem sucesso na obtenção de analgesia cirúrgica, mesmo com o uso de pré-medicação com azaperone¹ (4 mg/kg) e meperidina² (4 mg/kg) e altas doses de xilazina³ (0,8 mg/kg) e cetamina⁴ (42 mg/kg).

Depois de alguns ensaios, observou-se que o uso de doses menores dos anestésicos, junto com a técnica de anestesia epidural com lidocaína, abolia a resposta voluntária a estímulos dolorosos somáticos. Assim, sete machos, adultos, pertencentes ao Zoológico Municipal de Catanduva, SP, e pesando 2,69±0,49 kg, foram capturados e contidos em sacos de polipropileno para aferição dos parâmetros sobre efeito de anestesia.

Os animais foram tranquilizados com azaperone (4 mg/kg) e meperidina (4 mg/kg). Quinze minutos depois foram administradas cetamina (20 mg/kg) e xilazina (0,4 mg/kg), todos os fármacos pela via intramuscular. Posteriormente, os animais foram colocados em decúbito esternal, com os membros pélvicos tracionados cranialmente, para administração da injeção epidural no espaço lombossacro, previamente identificado por palpação. Foi então injetada lidocaína⁵, na dose de 5 mg/kg, durante um minuto. Foram avaliados

o período de latência da associação anestésica (tempo entre a administração de xilazina/cetamina e o momento em que o animal permaneceu em decúbito lateral e permitiu a manipulação); período de latência da lidocaína epidural (tempo entre a injeção epidural e a perda do reflexo anal, do tônus muscular dos membros pélvicos e da resposta ao pinçamento do espaço interdigital e da falange proximal); o tempo hábil de analgesia (tempo entre a aplicação da lidocaína e o momento em que o animal respondeu de forma voluntária ao pinçamento do espaço interdigital e da falange proximal [5]; e a temperatura retal.

RESULTADOS

Os períodos de latência da associação anestésica e da lidocaína foram de 3,86±1,87 e 6,86±2,85 minutos, respectivamente, e o período hábil de analgesia foi de 80,86±16,1 minutos. A temperatura retal diminuiu, em média, 1,76±0,53 graus centígrados desde o começo da anestesia até o final do período hábil de analgesia (Tabela 1). Todos os animais se recuperaram de forma satisfatória, sem apresentar sinais de excitação e não foram observadas complicações decorrentes da técnica epidural.

DISCUSSÃO

A escolha dos fármacos utilizados foi baseada em ampla revisão de literatura, constatando-se que os anestésicos dissociativos empregados via intramuscular foram de fácil aplicação, proporcionando boa segurança [1].

A técnica anestésica empregada nas cutias, utilizando azaperone, meperidina, cetamina e xilazina, foi similar a empregada em pacas [8], para a realização de hemi-ovariossalpingohisterectomia, na qual os autores empregaram azaperone, atropina, cetamina, xilazina e alotano e obtiveram boa analgesia cirúrgica.

Tabela 1. Desvio padrão e média de temperatura corporal e período de analgesia em cutias, tranquilizadas com azaperone (4mg/kg) e meperidina (4 mg/kg), cetamina (20mg/kg) e xilazina (0,4mg/kg).

	Cutia 1	Cutia 2	Cutia 3	Cutia 4	Cutia 5	Cutia 6	Cutia 7	Média Total	Desvio Padrão
Temperatura Retal normal (°C)	36,0	38,0	38,9	39,2	38,6	38,0	38,9	38,2	1,08
Diminuição da temperatura retal (°C)	1,9	2,3	1,2	0	0	2,2	1,2	1,76	0,53
Latência Inicial (min)	7,0	3,0	4,0	4,0	3,0	2,0	4,0	3,86	1,87
Latência Final (min)	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	13,0	4,0	6,86	2,85
Tempo de analgesia (min)	107	84	84	55	68	84	84	80,86	16,1

As doses empregadas foram adaptadas do suíno para o azaperone [6], dos roedores selvagens no caso da cetamina e xilazina [9], e do cão, em relação à meperidina e lidocaína [6], diferentemente de autores que adotaram apenas o cão como modelo de comparação para as doses empregadas nas cutias [1].

Foi obtida boa analgesia com a anestesia epidural pela lidocaína, assim como o descrito para roedores [6]. O período hábil, de $80,86 \pm 16,1$ minutos, encontra-se dentro da faixa de variação de uma a duas horas descrita para os cães [4], mas é superior ao período de 30 minutos descrito em ratos [6].

Houve diminuição da temperatura corporal nas cutias anestesiadas, similarmente ao já descrito nessa espécie [1,7], e em capivaras [3].

CONCLUSÕES

A técnica de anestesia balanceada empregada proporcionou analgesia adequada, durante um período que seria suficiente para a realização de procedimentos clínicos, diagnósticos ou cirúrgicos, com a utilização de doses reduzidas de xilazina e cetamina.

NOTAS INFORMATIVAS

- ¹Stresnil® - Janssen Pharmaceutica, São Paulo, SP/Brasil.
- ²Dolossal® - Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda., Itapira, SP/Brasil.
- ³Coopazine® - Schering-Plough Coopers Brasil Ltda., São Paulo, SP/Brasil.
- ⁴Vetaset® - Fort Dodge Saúde Animal Ltda., Campinas, SP/Brasil.
- ⁵Lidovet® - Bravet Ltda., Rio de Janeiro, RJ/Brasil.

REFERÊNCIAS

- 1 **Araujo R.W., Feitosa JR. F.S. & Fernandes R.M. 2005.** Efeitos cardiorespiratórios da associação tiletamina-zolazepam comparada com a associação tiletamina-zolazepam, atropina, xilazina através da extrapolação alométrica em cutias (*Dasyprocta* sp). In: *Resumos do IX Congresso e XIV Encontro da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagem – ABRAVAS* (São José do Rio Preto, Brasil) p.60.
- 2 **Chaves J.W.N. & Santos J.H.R. 2005.** Disponível em: <<http://www.esam.br/zoobotanico/animais/cutia.htm>>. Acessado em 21 jun 2005.
- 3 **Cruz M.L., Luna, S.P.L., Moura, C.A., Castro, G.B., Teixeira Neto F.J. & Nishida S.M. 1998.** Técnicas Anestésicas Injetáveis em Capivaras (*Hydrochoerus hydrochaeris*). *Ciência Rural*. 28: 411-415.
- 4 **Intelizano T.R., Santos P.R., Futema F, Otsuki D.A. & Almeida T.I. 2002.** Técnicas de anestesia local - anestesia epidural. In: Fantoni D.T. & Cortopassi S.R. (Eds). *Anestesia em cães e gatos*. São Paulo: Roca, pp.190-208.
- 5 **Massone F. 2003.** *Anestesiologia Veterinária: Farmacologia e Técnicas*. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A, 252p.
- 6 **Massone F. 2003.** *Atlas de Anestesiologia Veterinária*. São Paulo: ROCA, 188p.
- 7 **Moura S.G., Fernandes R.M., Silva Júnior J.R., Barradas A.L.B., Araújo W.R., Carvalho M.A.M. & Lopes J.B. 2002.** Cloridrato de tiletamina associado com cloridrato de zolazepam na tranquilização e anestesia de cutias (*Dasyprocta* sp). In: *VI Congresso e XI Encontro da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens* (Guarapari, Brasil). p.70.
- 8 **Oliveira F.S., Toniollo G.H., Machado M.R.F. & Paura D. 2003.** Hemi-ovariossalpingohisterectomia em pacas prenhes e posterior ocorrência de prenhez (*Agouti paca*, Linnaeus, 1766). *Ciência Rural*. 33: 547-551.
- 9 **Sainsbury A.W. 2003.** Rodentia In: Fowler M.E & Miller R.E. (Eds). *Zoo and Wild Animal Medicine*. 5th edn. St Louis: Saunders, pp.420-442.