



**Acta Botanica
Mexicana**

Artículo de investigación

Diversidad de musgos del bosque nublado de la Sierra Juárez, Oaxaca, México

Moss diversity of the cloud forest of the Sierra Juárez, Oaxaca, Mexico

Enrique Hernández-Rodríguez^{1,2,3} , Víctor Aguirre Hidalgo² 

Resumen:

Antecedentes y Objetivos: El bosque nublado de la Sierra Juárez, Oaxaca, presenta el mayor nivel de conservación y es el más grande en términos de extensión en México. Los musgos son un componente clave de la flora del bosque nublado y desempeñan funciones ecológicas importantes. Sin embargo, la composición y diversidad de musgos de esta región continúan siendo desconocidas. Los objetivos de este trabajo fueron determinar la composición florística y estimar la diversidad α y β de musgos del bosque nublado de la Sierra Juárez.

Métodos: La composición florística de musgos del bosque nublado, ubicado dentro del municipio Santiago Comaltepec, Oaxaca, fue evaluada a través de ocho sitios de muestreo. Además, se estimó la diversidad α y β de este grupo florístico. Los análisis fueron realizados para todas las especies, así como para los gremios de especies terrestres y epífitas.

Resultados clave: Se registraron 102 especies de musgos, agrupadas en 64 géneros y 32 familias. De dichas especies, 13 son nuevos registros para el estado. Las familias más diversas fueron Leucobryaceae y Orthotrichaceae. Los géneros con el mayor número de especies fueron *Syrrhopodon*, *Campylopus*, *Fissidens*, *Macromitrium* y *Pogonatum*. En este estudio se reporta una alta diversidad α y β de musgos con un patrón similar entre los musgos de los gremios terrestre y epífito.

Conclusiones: El bosque nublado de la Sierra Juárez, Oaxaca, es un ecosistema con una alta diversidad de musgos y gran posibilidad de incrementar los registros para el estado. Con base en los análisis de diversidad estimada, se hace evidente la necesidad de continuar estudios básicos a nivel microambiente sobre uno de sus componentes más característicos.

Palabras clave: briofitas, bosque húmedo, bosque mesófilo, diversidad α , diversidad β .

Abstract:

Background and Aims: The cloud forest of the Sierra Juárez, Oaxaca, presents the highest level of conservation and is the largest in terms of extension in Mexico. Mosses are a key component of cloud forest flora, playing important ecological functions. However, the composition and moss diversity in this region remains unknown. Hence, our goals were to determine the floristic composition and estimate the α and β diversity of mosses in the cloud forest of the Sierra Juárez.

Methods: The floristic composition of mosses in the cloud forest located within the municipality of Santiago Comaltepec, Oaxaca, was evaluated through eight sampling sites. In this forest, the diversity α and β of this floristic group were also estimated. The analyses were performed for all the species, as well as for the guilds of the terrestrial and epiphytic species.

Key results: In this study, we registered 102 species of mosses, grouped into 64 genera and 32 families. Of those species, 13 are new records for the state. The most diverse families were Leucobryaceae and Orthotrichaceae. The genera with the highest number of species were *Syrrhopodon*, *Campylopus*, *Fissidens*, *Macromitrium* and *Pogonatum*. This study reports a high α and β diversity of mosses with a similar pattern between the terrestrial and epiphytic species.

Conclusions: The cloud forest of the Sierra Juárez, Oaxaca, is an ecosystem with a high moss diversity and a great possibility of increasing the records for the state. Based on the analyses of estimated diversity, the need becomes evident to continue fundamental studies at the microenvironmental level on one of its most characteristic components.

Key words: bryophytes, humid forest, mesophyll forest, α diversity, β diversity.

¹Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Forest Research Institute, 445 Boul. de l'Université, Rouyn-Noranda, J9X 5E4 Québec, Canada.

²Universidad de la Sierra Juárez, Instituto de Estudios Ambientales, Av. Universidad s/n, 68725 Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México.

³Autor para la correspondencia: enrique.hernandezrodriguez@uqat.ca

Recibido: 21 de septiembre de 2019.

Revisado: 14 de noviembre de 2019.

Aceptado por Marie-Stéphanie Samain: 10 de diciembre de 2019.

Publicado Primero en línea: 24 de febrero de 2020.

Publicado: Acta Botanica Mexicana 127 (2020).

Citar como:

Hernández-Rodríguez, E. y V. Aguirre Hidalgo. 2020.

Diversidad de musgos del bosque nublado de la Sierra Juárez, Oaxaca, México. Acta Botanica Mexicana 127:

e1616. DOI: 10.21829/abm127.2020.1616

DOI: 10.21829/abm127.2020.1616



Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons 4.0 Atribución-No Comercial (CC BY-NC 4.0 International).

e-ISSN: 2448-7589

Introducción

Los bosques nublados, boques mesófilos de montaña (Rzedowski, 1978) o bosques húmedos de montaña (Villaseñor, 2010) son repositorios de una alta diversidad de flora y fauna (González-Espinosa et al., 2011, 2012; Gual-Díaz y Rendón-Correa, 2014). En México, estos ecosistemas representan de 0.5 a 1% del territorio del país, siendo uno de los más amenazados (Toledo, 2009; CONABIO, 2010; Gual-Díaz y Rendón-Correa, 2014) y más vulnerables al cambio climático (Ponce-Reyes et al., 2012). En particular, el bosque nublado ubicado en la Sierra Juárez, Oaxaca, se considera el de mayor nivel de conservación y extensión en el país (Rzedowski, 1996; CONABIO, 2010; Ponce-Reyes et al., 2012). Este bosque representa un centro de diversidad de plantas vasculares junto con las regiones Uxpanapa-Chimalapa y Tehuacán-Cuicatlán (Dávila et al., 1997; Rzedowski y Palacios-Chávez, 1977), por lo que alberga una alta diversidad florística (Rzedowski, 1996; Acosta, 2004). Sin embargo, sigue siendo un ecosistema en el que todavía es necesario realizar estudios básicos sobre su flora no vascular, como es el caso de los musgos (Hamilton et al., 1995; Córdova y del Castillo, 2001).

Los musgos (Bryophyta, *sensu stricto*) son considerados el segundo grupo de plantas más numeroso después de las angiospermas (Buck y Goffinet, 2000). Crecen sobre diferentes sustratos y abundan en bosques nublados; desempeñan un rol importante en los ciclos del carbono y del nitrógeno (Gradstein et al., 2001b), así como en el ciclo del agua al almacenarla y liberarla paulatinamente, contribuyendo a mantener la humedad (Ah-Peng et al., 2017).

Se estima que de las casi 13,000 especies de musgos conocidas a nivel mundial, en México se presentan cerca de 8%, de las cuales Oaxaca posee 459, siendo el segundo estado con mayor riqueza (Goffinet et al., 2009; Delgadillo, 2014).

La diversidad de musgos en los bosques nublados del país ha sido documentada por varios trabajos desde hace casi 80 años (Sharp, 1939, 1944, 1946; Hernández et al., 1951; Thornburgh y Sharp, 1975; Delgadillo, 1979; Juárez, 1983; Herrera-Paniagua et al., 2017). El trabajo más reciente de Delgadillo et al. (2017) resalta la importancia de este tipo de ecosistema para la diversidad de estas plantas por la alta riqueza de musgos que puede albergar. En el caso del bosque nublado de la Sierra Juárez, Oaxaca, aunque se ha

documentado gran parte de su diversidad florística vascular (Torres-Colín et al., 2009), no hay información sobre la diversidad de briofitas en general y de musgos en particular.

Este ecosistema es uno de los más amenazados en México, por lo que es importante realizar estudios sobre uno de sus componentes más característicos. De esta manera, los objetivos de este trabajo fueron i) determinar la composición florística de musgos del bosque nublado de la Sierra Juárez, Oaxaca y ii) estimar su riqueza y recambio de especies (diversidad α y β).

Materiales y Métodos

Área de estudio

Este estudio se desarrolló en el bosque nublado en la Región IX - Subregión Ixtlán (CONABIO, 2010), en el municipio Santiago Comaltepec, Oaxaca, México (17°35'N y 96°25'O). La altitud en la zona oscila entre 1000 y 2300 m s.n.m. (Rzedowski, 1978) (Fig. 1). El suelo es permeable, arcilloso o arenoso, poco o medianamente profundo, con materia orgánica y se desarrolla sobre rocas ígneas intrusivas o metamórficas (Ishiki, 1988). El rango de temperatura media anual está entre 16 y 20 °C, con una precipitación media anual entre 2000 y 4500 mm (Trejo, 2004). Además de estas características ambientales, el área posee elementos florísticos representativos del bosque nublado como especies caducifolias y perennifolias, gran cantidad de epífitas junto con palmas del género *Chamaedorea* Willd., helechos arborescentes, arbustos de la familia Ericaceae, enredaderas, así como herbáceas de zonas húmedas. El estrato dominante tiene una altura entre 30 y 60 m (Rzedowski, 1978). La especie arbórea dominante es *Oreomunnea mexicana* (Standl.) J.-F. Leroy (Pacheco-Cruz et al., 2018), asociada con *Ulmus mexicana* (Liebm.) Planch., *Quercus candicans* Née, *Magnolia schiedeana* Schltld., *Persea americana* Mill., *Billia hippocastanum* Peyr. y *Podocarpus matudae* Lundell (Rzedowski, 1978; Torres-Colín, 2004).

Recolección de datos

Para la colecta de musgos se establecieron ocho transectos de 100 m (dos por cada 350 m s.n.m.), tomando como referencia la carretera 175 Oaxaca - Tuxtutepec y los 1300 m del intervalo altitudinal en el que está presente el bosque (Fig. 1). Para evitar un efecto de borde, los transectos se dispusieron de for-




Figura 1: Ubicación de los sitios de muestreo (•) a lo largo del bosque nublado en el municipio Santiago Comaltepec, Oaxaca, México. La línea punteada indica la carretera 175 Oaxaca - Tuxtpec.

ma perpendicular con respecto a la carretera y a una distancia mínima de 150 m. En cada transecto se realizó una búsqueda intensiva de musgos sobre sustratos como rocas, madera en descomposición, árboles y arbustos. Los musgos epífitos solo se colectaron hasta una altura máxima de 3 m.

En la determinación de los ejemplares se utilizaron las claves taxonómicas de Allen (1994, 2002, 2010), Buck (1998), Gradstein et al. (2001b) y Sharp et al. (1994).

La nomenclatura utilizada para las especies corresponde a LATMOSS (Delgadillo, 2010) y para las familias a la clasificación propuesta por Goffinet y Buck (2008). Los ejemplares fueron depositados en el Herbario Nacional de México (MEXU) y en el Herbario de la Universidad de la Sierra Juárez (HUNSIJ).

Análisis de datos

Para el análisis de datos los musgos se clasificaron en dos gremios: 1) terrestres, incluyen especies colectadas sobre

suelo, rocas y humus y 2) epífitos, incluyen aquellas colectadas sobre árboles, arbustos, lianas y madera en descomposición. Los análisis se realizaron para la totalidad de las especies y para cada gremio.

La completitud del inventario y la riqueza de especies (diversidad α) se evaluó mediante el estimador Chao 2, ya que es el menos sesgado para muestras pequeñas (Colwell y Coddington, 1994). Posteriormente se calculó el porcentaje de registro dividiendo el número de especies observadas entre las estimadas multiplicado por cien. Se realizaron curvas de rarefacción/extrapolación (R/E) con intervalos de 95% utilizando el método de Chao et al. (2014), mediante el número de Hill de orden cero ($q=0$), para comparar la diversidad α observada y estimada (Hsieh et al., 2016). Los números de Hill representan una alternativa estadísticamente rigurosa con respecto a otros índices de diversidad (Chao et al., 2014).

Para evaluar la diversidad β se utilizó el método propuesto por [Carvalho et al. \(2012\)](#), que relaciona el reemplazo de especies (β_{repl}) y las diferencias en riqueza (β_{rich}) para explicar el recambio total (β_{Total}).

Los análisis se realizaron en el programa R 3.5.0 (R Core Team, 2018), utilizando los paquetes iNEXT 2.0.14 (Hsieh et al., 2016) para el estimador Chao 2 y las curvas de R/E, y el paquete BAT (Cardoso et al., 2017) para el cálculo de la diversidad β .

Resultados

En el bosque nublado se colectaron 455 muestras pertenecientes a 32 familias, 64 géneros y 102 especies de musgos.

De las especies identificadas, 13 son nuevos registros para el estado: *Acroporium estrellae* (Müll. Hal.) W.R. Buck & Schäf.-Verw., *Atractylocarpus longisetus* (Hook.) E.B. Bartram, *Daltonia longifolia* Taylor, *Diphyscium chiapense* D.H. Norris, *Holomitrium pulchellum* Mitt., *Leucoloma submarginatum* (Müll. Hal.) A. Jaeger, *Orthostichella versicolor* (Müll. Hal.) B.H. Allen & W.R. Buck, *Pilosium chlorophyllum* (Hornsch.) Müll. Hal. ex Broth., *Pilotrichella mauiensis* (Sull.) A. Jaeger, *Porotrichum tenuinerve* B.H. Allen, *Rhynchostegium serrulatum* (Hedw.) A. Jaeger, *Syrrhopodon lycopodioides* (Sw. ex Brid.) Müll. Hal. y *Taxiphyllum ligulifolium* (E.B. Bartram) W.R. Buck.

Las familias con mayor número de especies son Leucobryaceae (9), Orthotrichaceae (8), Calymperaceae, Dicranaceae, Neckeraceae, Pilotrichaceae (7), Polytrichaceae, Sematophyllaceae (6) y Daltoniaceae (5). Las 23 familias restantes estuvieron representadas por una a cuatro especies. Aquellas con el mayor número de géneros son Neckeraceae, Pilotrichaceae (6), Leucobryaceae y Orthotrichaceae (4), el resto incluyen de uno a tres. De éstos, los que presentan mayor riqueza son *Syrrhopodon* Schwägr. (5), *Campylopus* Brid., *Fissidens* Hedw., *Macromitrium* Brid. y *Pogonatum* P. Beauv. (4) (Apéndice).

De las 102 especies, 32 son tanto terrestres como epífitas, 22 exclusivamente terrestres y las 48 restantes exclusivamente epífitas. De esta manera, por las especies compartidas entre gremios, 54 especies fueron registradas como terrestres y 80 como epífitas (Fig. 2).

Las familias con mayor número de especies terrestres son Leucobryaceae (8), Pilotrichaceae, Polytrichaceae

(6) y Dicranaceae (4). En el caso de los musgos epífitos, son Orthotrichaceae (8), Calymperaceae, Leucobryaceae, Neckeraceae (7), Sematophyllaceae (6), Daltoniaceae, Dicranaceae y Pilotrichaceae (5).

Los géneros de musgos terrestres con más riqueza son *Pogonatum* (4), *Campylopus* y *Fissidens* (3). Para los epífitos, son *Syrrhopodon* (5), *Campylopus*, *Macromitrium* (4), *Leucoloma* Brid. y *Sematophyllum* Mitt. (3). Para ambos gremios, los restantes tienen de una a dos especies.

Con base en el análisis Chao 2 se estimó que en el bosque nublado de la Sierra Juárez puede haber hasta 134 especies de musgos, por lo que la completitud del muestreo fue de 76%. Por otra parte, si se analiza de forma independiente la diversidad por gremios, la riqueza de los terrestres es de alrededor de 98 especies, mientras que la de los epífitos de aproximadamente 116 especies. En general, se registró más de 50% de las especies estimadas por el análisis en cada caso (Cuadro 1, Fig. 2). La sobreposición de los intervalos de confianza de las curvas R/E indica que no existen diferencias significativas entre la totalidad de especies de musgos, las encontradas en el suelo del bosque y las epífitas cuando se aumenta el número de transectos (40) (Fig. 2).




Figura 2: Gráfica de R/E en la que se muestran el número total de especies de musgos (■), así como las terrestres (▲) y epífitas (●). La línea continua indica la rarefacción y la línea punteada la extrapolación de la riqueza de especies. Las sombras en cada caso indican los intervalos de confianza a 95%.

Cuadro 1: Riqueza observada y estimada de musgos en el bosque nublado de la Sierra Juárez, Oaxaca, México, mediante el método Chao 2. Total=Totalidad de especies de musgos; Ter=Musgos terrestres; Epi=Musgos epífitos.

Musgos	Riqueza observada	Riqueza estimada	% de especies registradas
Total	102	134	76
Ter	54	98	55
Epi	80	116	69

Con respecto a la diversidad β , se obtuvo un promedio alto de β Total (88%), del cual 61% de la variación está explicada por el reemplazo de especies (β repl) y 27% por diferencias en riqueza (β rich) (Fig. 3).

Discusión

El estado de Oaxaca alberga cerca de 47% de la diversidad de musgos de México, la cual es de alrededor de 459 especies (Delgadillo y Cárdenas, 2011). En el bosque nublado de la Sierra Juárez, el número de especies de musgos registradas fue de 102, es decir, cerca de 22% de la riqueza del estado y aproximadamente 10% de la del país.

El análisis de diversidad α indica que se pueden encontrar 134 especies en este bosque, hasta 98 terrestres y 116 epífitas (Fig. 2). Estos resultados concuerdan con lo descrito por Gradstein et al. (2001a), en que el número de briofitas epífitas es mayor que el de las encontradas en otros microhábitats. Esta alta riqueza también es apoyada por el análisis de diversidad β , donde los altos valores de recambio están explicados en mayor medida por el reemplazo (β remp) que por diferencias en el número de especies entre sitios (β riq). Esto sugiere que la composición de la comunidad en general, y la de las terrestres y epífitas en particular, está representada por una riqueza (diversidad α) notablemente cambiante (diversidad β) entre sitios, dentro de la misma área. Adicionalmente, estos resultados señalan un patrón similar en la variación de la diversidad en el estrato inferior del bosque y en parte del estrato arbóreo (3 m) (Fig. 3). Esta variabilidad puede ser favorecida por una amplia diversidad de microhábitats (Richards, 1984), variaciones ambientales a escala local (p. ej. temperatura, luz) y regional (p. ej. gradientes altitudinales), así como a condiciones




Figura 3: Diversidad β Total de los musgos del bosque nublado (T), así como de los terrestres (Ter) y epífitos (Epi).

constantes de humedad (Gradstein et al., 2001b; Fahey et al., 2016) que proveen este tipo de bosque y que son aprovechadas por estas plantas (Frahm y Gradstein, 1991).

La exploración de la diversidad de musgos en bosques nublados ha enriquecido los listados briológicos en otras partes del país. Herrera-Paniagua y Martínez (2014) reportaron 24 nuevos registros para la flora de Querétaro y San Luis Potosí. En el caso de Oaxaca, el trabajo desarrollado en Sierra Juárez incrementó su flora de musgos a 472 especies. Además, esto ha permitido ampliar el rango de distribución de aquellas con alta especificidad de hábitat como son *Syrrhopodon lycopodioides*, *Holomitrium pulchellum* y *Diphysciium chiapense* que solo se habían reportado para Veracruz y Chiapas, respectivamente, lo que sugiere un buen estado de conservación del área (Sharp et al., 1994; Longton y Hedderson, 2000; Brunialti et al., 2010). Por otra parte, dada la amplia heterogeneidad geográfica en la región, es probable que el número de especies continúe aumentando con la realización de futuros estudios, incluyendo áreas más alejadas de la población y en otras latitudes, con la exploración a nivel del suelo y de partes más altas de los árboles, como el dosel. En el último caso, esto permitiría incluir musgos que se distribuyen en este nivel (Sporn et al., 2010), que por diferentes microambientes a lo largo de los árboles hospederos, son distintos a los

encontrados en estratos más bajos (Boch et al., 2013; Gil-
Novoa y Morales-Puentes, 2014). Por lo anterior y por la
extensión de este bosque, es probable que su riqueza sea
superior a la estimada en este estudio. En comparación con
estos datos, Delgadillo et al. (2017) estiman que en el caso
de Veracruz pueden existir hasta 590 especies de musgos,
es decir, 83% más de lo que se ha registrado para el de la
Sierra Juárez.

Con respecto a la composición florística, se presen-
tan familias, géneros y especies que se han reportado en
otros bosques nublados. En este trabajo, las familias con el
mayor número de especies (Dicranaceae, Leucobryaceae,
Orthotrichaceae y Neckeraceae), así como algunas de las
menos diversas (Prionodotaceae y Phyllogoniaceae), tam-
bién están distribuidas en otros bosques nublados del país
de acuerdo con lo reportado por Delgadillo (1979), Delga-
dillo et al. (2017) y Herrera-Paniagua et al. (2017). Una si-
tuación similar se tiene con los géneros registrados, siendo
Campylopus, *Fissidens* y *Macromitrium*, algunos de los más
frecuentes en estos bosques (Delgadillo com. pers. en Rze-
dowski (1978); Delgadillo et al., 2017).

Es importante destacar que existen familias y géne-
ros representativos para los gremios de musgos terrestres
(Leucobryaceae; *Pogonatum*) y epífitos (Orthotrichaceae y
Calymperaceae; *Macromitrium* y *Syrhropodon*). En ambos
casos, su representatividad se puede explicar porque cons-
tituyen grupos en los que se encuentra el mayor número de
especies en el neotrópico (Gradstein et al., 2001b).

Tomando como referencia los trabajos más recien-
tes de musgos en bosques nublados de México (Delgadillo
et al., 2017; Herrera-Paniagua et al., 2017), el de la Sierra
Juárez comparte 74% de su flora (75 especies) con los de
Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que el 26%
restante no ha sido reportado. Esto por un lado refleja la
afinidad de estas plantas a las condiciones de este ecosiste-
ma y, por el otro, confirma la necesidad de continuar con su
exploración (Delgadillo et al., 2017). De esta manera, este
estudio sugiere que la diversidad de musgos es compatible
con la de otros grupos florísticos en esta vegetación, por lo
que la Sierra Juárez sigue siendo una zona que alberga una
amplia diversidad biótica (CONABIO, 2010).

Finalmente, este trabajo proporciona un listado de
las especies de musgos, así como parámetros de su riqueza

y recambio, que explican su alta diversidad en el bosque
nublado de la Sierra Juárez. Aunque se han realizado tra-
bajos que han permitido conocer gran parte de la flora de
musgos de estos bosques en México, es necesario realizar
trabajos ecológicos para comprender, cuantificar y conser-
var esta diversidad (Legendre et al., 2005). Es así como se
espera que el presente estudio sirva como referencia para
futuras investigaciones en la zona y para otros bosques nu-
blados del país.

Contribución de autores

EHR realizó las determinaciones taxonómicas y, con la asis-
tencia de VAH, los análisis estadísticos. Ambos autores con-
tribuyeron en la interpretación de datos, discusión, revisión
y aprobación del manuscrito final.

Financiamiento

Este estudio fue apoyado por la Secretaría de Educación
Pública (Programa Nacional de Becas para la Educación
Superior, Fol. 20110001312689 y Beca Titulación, Fol.
46508) y la Academia Mexicana de Ciencias (XXII Verano de
la Investigación Científica, ID edd892704e598bdf6543e-
00d6c15524) mediante el otorgamiento de becas al primer
autor.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Colección de Briofitas del Her-
bario Nacional (MEXU), al Instituto de Biología, Universidad
Nacional Autónoma de México y al Laboratorio de Ecolo-
gía y Biodiversidad, Universidad de la Sierra Juárez por el
uso de instalaciones para la realización de este estudio. A
Claudio Delgadillo Moya por su apoyo en la determinación
de ejemplares, así como por sus comentarios en el escrito
original. A Gabriel González Adame, José Arturo Casasola
González, Itandehui Hernández Santos y Violeta Saraí Ji-
ménez Hernández por su ayuda en el trabajo de campo. A
las autoridades de la comunidad de la Esperanza, Santiago
Comaltepec, Oaxaca, por permitir desarrollar el trabajo de
campo en sus áreas naturales. Finalmente, agradecemos a
un revisor anónimo por sus valiosos comentarios y sugere-
ncias sobre el escrito.

Literatura citada

- Acosta, S. 2004. Afinidades de la flora genérica de algunos bosques mesófilos de montaña del nordeste, centro y sur de México: un enfoque fenético. *Anales del Instituto de Biología serie Botánica* 75: 61-72.
- Ah-Peng, C., A. W. Cardoso, O. Flores, A. West, N. Wilding, D. Strasberg y T. A. J. Hedderson. 2017. The role of epiphytic bryophytes in interception, storage, and the regulated release of atmospheric moisture in a tropical montane cloud forest. *Journal of Hydrology* 548: 665-673. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.03.043>
- Allen, B. H., 1994. Moss flora of Central America. Part 1. Sphagnaceae-Calymperaceae. Missouri Botanical Garden Press. Missouri, USA. 242 pp.
- Allen, B. H., 2002. Moss flora of Central America. Part 2. Encalyptaceae-Orthotrichaceae. Missouri Botanical Garden Press. Missouri, USA. 699 pp.
- Allen, B. H. 2010. Moss Flora of Central America, Part 3. Anomodontaceae-Symphodontaceae. Missouri Botanical Garden Press. Missouri, USA. 731 pp.
- Boch, S., J. Müller, D. Prati, S. Blaser y M. Fischer. 2013. Up in the tree - The overlooked richness of bryophytes and lichens in tree crowns. *PLoS ONE* 8(12): e84913 (1-8). DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0084913>
- Buck, W. R. 1998. Pleurocarpous Mosses of the West Indies. New York Botanical Garden Press. New York, USA. 400 pp.
- Buck, W. R. y B. Goffinet. 2000. Morphology and classification of Mosses. In: Goffinet, B. y A. J. Shaw (eds.). *Bryophyte Biology*. Cambridge University Press. Cambridge, UK. Pp. 71-123.
- Brunialti, G., L. Frati, M. Aleffi, M. Marignani, L. Rosati, S. Burascano, S. Ravera. 2010. Lichens and bryophytes as indicators of old-growth features in Mediterranean forests. *Plant Biosystems* 144(1): 221-233. DOI: <https://doi.org/10.1080/11263500903560959>
- Cardoso, P., F. Rigal y J. C. Carvalho. 2017. BAT: Biodiversity Assessment Tools. University of Helsinki. <https://cran.r-project.org/package=BAT> (consultado octubre de 2017).
- Carvalho, J. C., P. Cardoso y P. Gomes. 2012. Determining the relative roles of species replacement and species richness differences in generating beta-diversity patterns. *Global Ecology and Biogeography* 21(7): 760-771. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00694.x>
- Chao, A., N. J. Gotelli, T. C. Hsieh, E. L. Sander, K. H. Ma, R. K. Colwell y A. M. Ellison. 2014. Rarefaction and extrapolation with Hill numbers: A framework for sampling and estimation in species diversity studies. *Ecological Monographs* 84(1): 45-67. DOI: <https://doi.org/10.1890/13-0133.1>
- Colwell, R. K., y Coddington, A. J. 1994. Estimating terrestrial biodiversity through extrapolation. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences* 345(1311): 101-118. DOI: <https://doi.org/10.1098/rstb.1994.0091>
- CONABIO. 2010. El Bosque Mesófilo de Montaña en México: Amenazas y Oportunidades para su Conservación y Manejo Sostenible. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D.F., México. 197 pp.
- Córdova, J. y R. del Castillo. 2001. Changes in epiphyte cover in three chronosequences in a Tropical Montane Cloud Forest in Mexico. In: Gottsberger, G. y S. Liede (eds.). *Life Forms and Dynamics in Tropical Forests*. J. Cramer in der Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung. Stuttgart, Germany. Pp. 79-94.
- Dávila, P., L. Torres, R. Torres-Colín y O. Herrera-McBryde. 1997. Sierra Juárez, Oaxaca, México. In: Davis, S., D. Heywood, V. H. Herrera-MacBryde, O. Villa-Lobos y A. C Hamilton (eds.). *Centres of Plant Diversity: A guide and strategy for their conservation: The Americas*. v. 3. The World Wide Fund For Nature, International Union for Conservation of Nature y The World Conservation Union. Cambridge, UK. Pp. 135-138.
- Delgado, C. M. 1979. Mosses and Phytogeography of the Liquidambar Forest of Mexico. *The Bryologist* 82(3): 432-449. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3242218>
- Delgado, C. M. 2010. LATMOSS 2010. <http://www.ibiologia.unam.mx/briologia/www/index/Bases.html> (consultado septiembre de 2018).
- Delgado, C. M. 2014. Biodiversidad de Bryophyta (musgos) en México. *Revista Mexicana de Biodiversidad* 85: 100-105. DOI: <https://doi.org/10.7550/rmb.30953>
- Delgado, C. M. y A. Cárdenas. 2011. Bryophyta (Musci). In: García-Mendoza, A. J. y J. A. Meave (eds.). *Diversidad florística de Oaxaca: de musgos a angiospermas*. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, D.F., México. Pp. 65-66; 137-148.

- Delgadillo, C. M., J. L. Villaseñor, E. Ortiz y Á. Campos-Villanueva. 2017. Floristic richness of the cloud forest moss flora of Veracruz, Mexico. *Nova Hedwigia* 105(1): 43-63. DOI: https://doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2017/0399
- Fahey, T. J., R. E. Sherman y E. V. J. Tanner. 2016. Tropical montane cloud forest: environmental drivers of vegetation structure and ecosystem function. *Journal of Tropical Ecology* 32(5): 355-367. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0266467415000176>
- Frahm, J.-P. y S. R. Gradstein. 1991. An altitudinal zonation of tropical rain forests using bryophytes. *Journal of Biogeography* 18(6): 669-678. DOI: <https://doi.org/10.2307/2845548>
- Gil-Novoa, J. E. y M. E. Morales-Puentes. 2014. Vertical stratification of epiphytic bryophytes found on *Quercus humboldtii* (Fagaceae) from Boyacá, Colombia. *Revista de Biología Tropical* 62(2): 719-727. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.15517/rbt.v62i2.8482>
- Goffinet, B. y W. R. Buck. 2008. Classification of the Bryophyta. <http://bryology.uconn.edu/classification/> (consultado septiembre de 2018).
- Goffinet, B., W. R. Buck y A. J. Shaw. 2009. Morphology, anatomy, and classification of the Bryophyta. In: Goffinet, B. y A. J. Shaw (eds.). *Bryophyte biology*. Cambridge University Press. Cambridge, UK. Pp. 55-138.
- González-Espinosa, M., J. A. Meave, F. G. Lorea-Hernández, G. Ibarra-Manríquez y A. C. Newton. 2011. The Red List of Mexican Cloud Forest Trees. *Fauna and Flora International, Botanic Gardens Conservation International, The Global Trees Campaign y The International Union for Conservation of Nature/Species Survival Commission Global Tree Specialist Group*. Cambridge, UK. 149 pp.
- González-Espinosa, M., J. A. Meave, N. Ramírez-Marcial, T. Toledo-Aceves, F. G. Lorea-Hernández y G. Ibarra-Manríquez. 2012. Los bosques de niebla de México: conservación y restauración de su componente arbóreo. *Ecosistemas* 21(1-2): 36-52.
- Gradstein, S. R., D. Griffin, M. I. Morales y N. M. Nadkarni. 2001a. Diversity and habitat differentiation of mosses and liverworts in the cloud forest of Monteverde, Costa Rica. *Caldasia* 23: 203-212.
- Gradstein, S. R., N. Salazar-Allen y S. P. Churchill. 2001b. Guide to the Bryophytes of Tropical America. *The New York Botanical Garden Press*. New York, USA. 577 pp.
- Gual-Díaz, M. y A. Rendón-Correa. 2014. Bosques Mesófilos de Montaña de México: diversidad, ecología y manejo. *Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad*. México, D.F., México. 351 pp.
- Hamilton, L. S., J. O. Juvik y F. N. Scatena. 1995. *Tropical Montane Cloud Forests*. *Ecological Studies Vol. 110*. Springer-Verlag. New York, USA. 407 pp.
- Hernández, E., H. Crum, W. B. Fox y A. J. Sharp. 1951. A unique vegetational area in Tamaulipas. *Bulletin of the Torrey Botanical Club* 78(6): 458-463. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2482247>
- Herrera-Paniagua, P. y M. Martínez. 2014. Musgos de bosques húmedos de montaña en la Sierra Madre Oriental: Nuevos registros regionales. *Botanical Sciences* 92(1): 81-88. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.17129/botsci.155>
- Herrera-Paniagua, P., M. Martínez, L. Hernández-Sandoval y J. García-Franco. 2017. Epiphytic Mosses in the Humid Mountain Forests of the Sierra Madre Oriental, Mexico - Species Richness, Rarity and Composition. *Cryptogamie, Bryologie* 38(2): 171-190. DOI: <https://doi.org/10.7872/cryb/v38.iss2.2017.171>
- Hsieh, T. C., K. H. Ma y A. Chao. 2016. iNEXT: an R package for rarefaction and extrapolation of species diversity (Hill numbers). *Methods in Ecology and Evolution* 7(12): 1451-1456. DOI: <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12613>
- Ishiki, I. M. 1988. Las selvas bajas perennifolias del Cerro Salomón, Región de Chimalapa, Oaxaca: flora, comunidades y relaciones fitogeográficas. Tesis de maestría. Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma Chapingo. Estado de México, México. 201 pp.
- Juárez, G. 1983. Los musgos de Coatepec, Veracruz, México. *Biótica* 8: 49-58.
- Legendre, P., D. Borcard y P. R. Peres-Neto. 2005. Analyzing beta diversity: Partitioning the spatial variation of community composition data. *Ecological Monographs* 75(4): 435-450. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1890/05-0549>
- Longton, R. E. y Hedderson, T. A. 2000. What are rare species and why conserve them? *Lindbergia* 25(2): 53-61.
- Pacheco-Cruz, N., R. Clark-Tapia, J. E. Campos-Contreras, M. Gorgonio-Ramírez, M. D. Luna-Krautle, F. J. Naranjo-Luna y C. Alfonso-Corrado. 2018. Demografía de *Oreomunnea mexicana* (Standl.) J. F. Leroy en el bosque de niebla de Sierra Juárez, Oaxaca. *Madera y Bosques* 24(2): 1-11. DOI: <https://doi.org/10.21829/myb.2018.2421509>

- Ponce-Reyes, R., V. H. Reynoso-Rosales, J. E. M. Watson, J. Vanderwal, R. A. Fuller, R. L. Pressey y H. P. Possingham. 2012. Vulnerability of cloud forest reserves in Mexico to climate change. *Nature Climate Change* 2(6): 448-452. DOI: <https://doi.org/10.1038/nclimate1453>
- R Core Team. 2018. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. <http://www.R-project.org/>
- Richards, P. W. 1984. The ecology of tropical forest bryophytes. In: Schuster, R. M. (ed.). *New manual of bryology* Vol. II. The Hattori Botanical Laboratory. Miyazaki, Japan. Pp. 1233-1270.
- Rzedowski, J. 1978. *Vegetación de México*. Limusa. México, D.F., México. 432 pp.
- Rzedowski, J. 1996. Análisis preliminar de la flora vascular de los bosques mesófilos de montaña de México. *Acta Botanica Mexicana* 35: 25-44. DOI: <https://doi.org/10.21829/abm35.1996.955>
- Rzedowski, J. y R. Palacios-Chávez. 1977. El bosque de *Engelhardtia (Oreomunnea) mexicana* en la región de La Chinantla (Oaxaca, México): una reliquia del Cenozoico. *Boletín de la Sociedad Botánica de México* 36: 93-127. DOI: <https://doi.org/10.17129/botsci.1161>
- Sharp, A. J. 1939. Taxonomic and ecological studies of eastern Tennessee bryophytes. *The American Midland Naturalist* 21: 267-354.
- Sharp, A. J. 1944. Some problems in American bryology. *Lilloa* 10: 265-283.
- Sharp, A. J. 1946. Informe preliminar sobre algunos estudios fitogeográficos efectuados en México y Guatemala. *Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural* 7: 35-44.
- Sharp, A. J., H. Crum y P. M. Eckel. 1994. The Moss Flora of Mexico. Part one and two. *Memoirs of the New York Botanical Garden*. New York, USA. 1113 pp.
- Sporn, S. G., M. M. Bos, M. Kessler y S. R. Gradstein. 2010. Vertical distribution of epiphytic bryophytes in an Indonesian rainforest. *Biodiversity and Conservation* 19(3): 745-760. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10531-009-9731-2>
- Thornburgh, K., y A. J. Sharp. 1975. Lista preliminar de musgos colectados en ramas de árboles en México. *Boletín de la Sociedad Botánica de México* 35: 51-58. <https://doi.org/10.17129/botsci.1152>
- Toledo, T. 2009. El bosque de niebla. *Biodiversitas* 83: 1-16.
- Torres-Colín, R. 2004. Tipos de vegetación. In: García-Mendoza, A. J., M. J. Ordoñez y M. Briones-Salas (eds.). *Biodiversidad de Oaxaca*. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, World Wildlife Fund. México, D.F., México. Pp. 105-117.
- Torres-Colín, R., D. Lorence, M. Ramírez de Anda y R. Villa-Arce. 2009. Flora de la Sierra de Juárez, Oaxaca: Distrito de Ixtlán y Áreas Adyacentes (Sierra Norte de Oaxaca). *Listados Florísticos de México XXV*: 7-79.
- Trejo, I. 2004. Clima. In: García-Mendoza, A. J., M. J. Ordoñez y M. Briones-Salas (eds.). *Biodiversidad de Oaxaca*. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, World Wildlife Fund. México, D.F., México. Pp. 67-85.
- Villaseñor, J. L. 2010. El bosque húmedo de montaña en México y sus plantas vasculares: catálogo florístico-taxonómico. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., México. 40 pp.

Apéndice: Listado de musgos del bosque nublado de la Sierra Juárez, Oaxaca, México. Se indica el gremio en el que fue incluida cada especie: T=terrestres; E=epífitos, y el sustrato en el que fue colectada: ARBO=árbol; ARBU=arbusto; LIAN=liana; MADE=madera en descomposición; HUMU=humus; SUEL=suelo; ROCA=roca. * indica los nuevos registros para el estado.

Familias y especies	Transectos								Sustrato específico
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Bartramiaceae									
<i>Leiomela bartramioides</i> (Hook.) Paris				T				E	ARBO, HUMU
Brachytheciaceae									
<i>Meteoridium remotifolium</i> (Müll. Hal.) Manuel			E	E		E			ARBO, ARBU, LIAN
* <i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A. Jaeger						T	E T		MADE, HUMU, ROCA
Bryaceae									
<i>Rhodobryum beyrichianum</i> (Hornsch.) Paris						T			SUEL
Calymperaceae									
<i>Octoblepharum albidum</i> Hedw.						E			ARBO
<i>Octoblepharum erectifolium</i> Mitt. ex R.S. Williams	E			E			E		ARBO, MADE
<i>Syrrhopodon gardneri</i> (Hook.) Schwägr.			E						MADE
<i>Syrrhopodon gaudichaudii</i> Mont.		E T							ARBO, MADE, HUMU
<i>Syrrhopodon incompletus</i> Schwägr.						E	E		ARBO, ARBU, MADE
* <i>Syrrhopodon lycopodioides</i> (Sw. ex Brid.) Müll. Hal.		E		E					ARBO, MADE
<i>Syrrhopodon prolifer</i> Schwägr.	E		E T				E	T	ARBO, MADE, HUMU
Cryphaceae									
<i>Dendropogonella rufescens</i> (Schimp.) E. Britton			E						LIAN
Daltoniaceae									
<i>Adelothecium bogotense</i> (Hampe) Mitt.				E				E	ARBO, ARBU
<i>Daltonia gracilis</i> Mitt.								E	MADE
* <i>Daltonia longifolia</i> Taylor		E							ARBO
<i>Leskeodon andicola</i> (Spruce ex Mitt.) Broth.			E	T					ARBU, ROCA
<i>Leskeodon longipilus</i> (Besch.) E.B. Bartram				E					ARBU
Dicranaceae									
<i>Dicranum frigidum</i> Müll. Hal.		T							HUMU
<i>Dicranum</i> sp.		T							SUEL
<i>Holomitrium arboreum</i> Mitt.		E T	E						ARBO, MADE, SUEL

Apéndice: Continuación.

Familias y especies	Transectos								Substrato específico
	1	2	3	4	5	6	7	8	
* <i>Holomitrium pulchellum</i> Mitt.		E T						E	ARBO, LIAN, MADE, HUMU
<i>Leucoloma cruegerianum</i> (Müll. Hal.) A. Jaeger						E	E		ARBO, MADE
<i>Leucoloma serrulatum</i> Brid.			E	E		E	E		ARBO, ARBU
* <i>Leucoloma subimmarginatum</i> (Müll. Hal.) A. Jaeger	E	E	E						ARBO, MADE
Diphysciaceae									
* <i>Diphyscium chiapense</i> D.H. Norris			T					T	ROCA
Ditrichaceae									
<i>Ditrichum rufescens</i> (Hampe) Hampe		T							SUEL
Fissidentaceae									
<i>Fissidens elegans</i> Brid.				E					ARBU
<i>Fissidens pellucidus</i> Hornsch.	T		T					T	SUEL, ROCA
<i>Fissidens polypodioides</i> Hedw.			T	T				T	HUMU, SUEL, ROCA
<i>Fissidens weirii</i> Mitt.			T	T		T	T		HUMU, SUEL, ROCA
Hylocomiaceae									
<i>Ctenidium malacodes</i> Mitt.			E						ARBO
Hypnaceae									
<i>Caribaeohypnum polypterum</i> (Mitt.) Ando & Higuchi			E		E				ARBU, MADE
<i>Mittenothamnium reptans</i> (Hedw.) Cardot	E		E T	T	E T	E		E	ARBO, MADE, HUMU, ROCA
* <i>Taxiphyllum ligulifolium</i> (E.B. Bartram) W.R. Buck								T	ROCA
<i>Taxiphyllum taxirameum</i> (Mitt.) M. Fleisch.					T				HUMU
Lembophyllaceae									
* <i>Orthostichella versicolor</i> (Müll. Hal.) B.H. Allen & W.R. Buck					T	E			LIAN, HUMU
<i>Pilotrichella flexilis</i> (Hedw.) Ångstr.	E	E	E	E	T	E		E	ARBO, ARBU, LIAN, MADE, ROCA
* <i>Pilotrichella mauiensis</i> (Sull.) A. Jaeger		E	E			E			ARBO
Leucobryaceae									
<i>Atractylocarpus flagellaceus</i> (Müll. Hal.) R.S. Williams					T				HUMU
* <i>Atractylocarpus longisetus</i> (Hook.) E.B. Bartram	E	T		E				T	ARBO, MADE, HUMU, ROCA
<i>Campylopus arctocarpus</i> (Hornsch.) Mitt.	T	E T		T				E	ARBO, SUEL, ROCA

Apéndice: Continuación.

Familias y especies	Transectos								Substrato específico
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.		E T		E				E	ARBO, HUMU
<i>Campylopus savannarum</i> (Müll. Hal.) Mitt.			E				T		MADE, SUEL
<i>Campylopus tallulensis</i> Sull. & Lesq.		E							ARBO
<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) E. Britton			T						ROCA
<i>Leucobryum antillarum</i> Schimp. ex Besch. Hal.) Mitt.	E	E T	E	E					ARBO, MADE, HUMU, SUEL
<i>Leucobryum martianum</i> (Hornsch.) Hampe ex Müll. Hal.			E T	E					ARBO, HUMU, ROCA
Leucomiaceae									
<i>Rhynchostegiopsis flexuosa</i> (Sull.) Müll. Hal.		T	E	E			E		ARBO, MADE, HUMU
<i>Rhynchostegiopsis tunguraguana</i> (Mitt.) Broth.								E	MADE
Meteoriaceae									
<i>Meteorium deppei</i> (Hornsch. ex Müll. Hal.) Mitt.						E			ARBO
<i>Meteorium illecebrum</i> Sull.			E	E					ARBO, MADE
<i>Meteorium teres</i> Mitt.						E			ARBO
<i>Toloxis imponderosa</i> (Taylor) W.R. Buck			E	E	E T				ARBO, MADE, HUMU
Neckeraceae									
<i>Homalia glabella</i> (Hedw.) Schimp.			T	E		T			ARBO, ARBU, ROCA
<i>Homaliodendron flabellatum</i> (Sm.) M. Fleisch.		E	E					E	ARBO, ARBU, MADE
<i>Isodrepanium lentulum</i> (Wilson) E. Britton	E		E	E			E		ARBO, ARBU, LIAN
<i>Neckera urnigera</i> Müll. Hal.						E			ARBO
<i>Neckeropsis undulata</i> (Hedw.) Reichardt						E			ARBO
<i>Porotrichum longirostre</i> (Hook.) Mitt.			E	E T	T			E	ARBO, HUMU, SUEL
* <i>Porotrichum tenuinerve</i> B.H. Allen			E	E					ARBO, ARBU
Orthotrichaceae									
<i>Groutiella apiculata</i> (Hook.) H.A. Crum & Steere						E			ARBO
<i>Macromitrium cirrosum</i> (Hedw.) Brid.			E	E		E			ARBO
<i>Macromitrium longifolium</i> (Hook.) Brid.				E				E	ARBO
<i>Macromitrium punctatum</i> (Hook. & Grev.) Brid.		E				E			ARBO, ARBU, MADE
<i>Macromitrium sharpii</i> H.A. Crum ex Vitt		E							ARBO

Apéndice: Continuación.

Familias y especies	Transectos								Substrato específico
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Schlotheimia rugifolia</i> (Hook.) Schwägr.							E		ARBO, MADE
<i>Schlotheimia tecta</i> Hook. f. & Wilson		E			E				ARBO, MADE
<i>Zygodon reinwardtii</i> (Hornsch.) A. Braun		E							ARBO, ARBU
Phyllogoniaceae									
<i>Phyllogonium fulgens</i> (Hedw.) Brid.				E					LIAN
Pilotrichaceae									
<i>Callicostella pallida</i> (Hornsch.) Ångstr.					T	ET	E		ARBO, LIAN, SUEL, ROCA
<i>Cyclodictyon albicans</i> (Hedw.) Kuntze						T			ROCA
<i>Lepidopilidium portoricense</i> (Müll. Hal.) H.A. Crum & Steere					ET				ARBO, ARBU, HUMU
<i>Lepidopilum amplirete</i> (Sull.) Mitt.				E		T		E	ARBO, MADE, ROCA
<i>Lepidopilum deppeanum</i> (Müll. Hal.) Mitt.			E						ARBO, ARBU
<i>Thamniopsis incurva</i> W.R. Buck				E			T		MADE, SUEL
<i>Trachyxiophium guadalupense</i> (Brid.) W.R. Buck				T					ROCA
Polytrichaceae									
<i>Atrichum angustatum</i> (Brid.) Bruch & Schimp.					T		T		HUMU, SUEL
<i>Atrichum polycarpum</i> (Müll. Hal.) Mitt.	T							T	SUEL
<i>Pogonatum campylocarpum</i> (Müll. Hal.) Mitt.	T								SUEL
<i>Pogonatum oligodus</i> (Kunze ex Müll. Hal.) Mitt.		T							SUEL
<i>Pogonatum subflexuosum</i> (Lorentz) Broth.		T						T	SUEL
<i>Pogonatum tortile</i> (Sw.) Brid.					T				SUEL
Pottiaceae									
<i>Leptodontium viticulosoides</i> (P. Beauv.) Wijk & Margad.		ET	E					E	ARBO, ARBU, MADE, HUMU
Prionodontaceae									
<i>Prionodon luteovirens</i> (Taylor) Mitt.		E	E	E				E	ARBO, ARBU
Pterobryaceae									
<i>Calyptothecium</i> sp.	E								ARBU
<i>Pirella guatemalensis</i> E.B. Bartram						E			ARBO, ARBU
<i>Pterobryon densum</i> Hornsch.	E	E	E	E				E	ARBO

Apéndice: Continuación.

Familias y especies	Transectos								Substrato específico	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Pylaisiadelphaceae										
<i>Pylaisiadelpha tenuirostris</i> (Bruch & Schimp. ex Sull.) W.R. Buck			E							MADE
<i>Taxithelium planum</i> (Brid.) Mitt.					E		T			ARBO, ROCA
Racopilaceae										
<i>Racopilum tomentosum</i> (Hedw.) Brid.							T			ROCA
Rhizogoniaceae										
<i>Pyrrohobryum spiniforme</i> (Hedw.) Mitt.	E T		E	E T		E	E			ARBO, MADE, HUMU, SUEL
Rigodiaceae										
<i>Rigodium toxarion</i> (Schwägr.) A. Jaeger			E							ARBU
Sematophyllaceae										
* <i>Acroporium estrellae</i> (Müll. Hal.) W.R. Buck & Schäf.-Verw.			E							ARBO, ARBU
<i>Acroporium longirostre</i> (Brid.) W.R. Buck		E	E							ARBO
<i>Heterophyllum affine</i> (Hook.) M. Fleisch.		E T								ARBO, MADE, HUMU
<i>Sematophyllum subpinnatum</i> (Brid.) E. Britton		E				E	E			ARBO, ARBU, MADE
<i>Sematophyllum subsimplex</i> (Hedw.) Mitt.			E							ARBU, MADE
<i>Sematophyllum swartzii</i> (Schwägr.) W.H. Welch & H.A. Crum	E T	E	E		E			E		ARBO, ARBU, MADE, SUEL
Sphagnaceae										
<i>Sphagnum meridense</i> (Hampe) Müll. Hal.	T	E T								MADE, HUMU
Stereophyllaceae										
* <i>Pilosium chlorophyllum</i> (Hornsch.) Müll. Hal. ex Broth.			T							ROCA
Thuidiaceae										
<i>Thuidium delicatulum</i> (Hedw.) Schimp.	T	E T	E	E				E		ARBO, ARBU, MADE, SUEL
<i>Thuidium tomentosum</i> Schimp.					T	E				ARBO, LIAN, HUMU