



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE MEDICINA

UNIDAD DE POSGRADO

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA

**Percepción de los pacientes oncológicos hospitalizados
acerca del apoyo familiar en la Clínica Internacional**

2013

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Enfermería Oncológica

AUTOR

Rosa Elvira LOPEZ AGUIRRE

ASESOR

Fabiola QUIROZ VASQUEZ

Lima - Perú

2015

RESUMEN

El cáncer se presenta en cualquier grupo de edad, pero es mayor en individuos mayores de 65 años. En forma global, la incidencia es más alta en varones que en mujeres y su frecuencia es mayor en los sectores industriales y en las naciones industrializadas.

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la percepción que tienen los pacientes oncológicos hospitalizados acerca del apoyo familiar en la Clínica Internacional. **Metodología.** El estudio es de tipo cuantitativo, de nivel aplicativo, método descriptivo, de corte transversal, la técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario estructurado.

Resultados se aprecia que el 32,5 % (13) pacientes tienen de 51 a 60 años, 62,5 % (25) de sexo masculino, con diagnóstico de colon 37,5 % (15). Del 100 % (49), 47,5% (19) tienen una dimensión física, 60% (24) dimensión psicológica, 42,5 % (17) dimensión social, presentan una percepción medianamente favorable. **Conclusiones.** El mayor porcentaje de los pacientes tienen una percepción medianamente favorable sobre el apoyo familiar, siendo el de mayor predominio la dimensión psicológica, debido que los familiares le dan palabras de ánimos, pero no están a su lado, y no ayudan a sus actividades cotidianas.

PALABRA CLAVE: paciente oncológico, percepción, apoyo familiar.

SUMMARY

Cancer occurs in any age group , but is higher in individuals over 65 years. In Overall, the incidence is higher in men than in women and its frequency is greater in industrial sectors and in industrialized nations.

This study aimed to determine the perception of hospitalized cancer patients about family support in the International Clinic. **Methodology.** The study is quantitative, level application; descriptive method of cross section, the technique was the survey instrument and a structured questionnaire.

Results It shows that 32.5 % (13) patients have from 51 to 60 years, 62.5 % (25) were male, with a diagnosis of colon 37.5 % (15). 100 % (49) 47.5 % (19) have a physical dimension , 60 % (24) psychological dimension , 42.5 % (17) social dimension, present a fairly favorable perception. **Conclusions.** The highest percentage of patients have a fairly favorable perception of family support , being the most prevalent psychological dimension , because the family give words of encouragement, but not by his side, and do not help their daily activities.

KEY WORD: cancer patients, awareness, family support.