

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

**FACULTAD DE MEDICINA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**

**Factores asociados a la elección anticonceptiva en  
mujeres post aspiración manual endouterina. 2017**

**TESIS**

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

**AUTOR**

Claudia Delia ALIAGA CHINGA

**ASESOR**

Edita Rumualda CUYA CANDELA

Lima - Perú

2018

## RESUMEN

**OBJETIVO:** Establecer los factores asociados a la elección anticonceptiva en mujeres post aspiración manual manual endouterina atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho en el periodo 2017.

**METODOLOGÍA:** El estudio es de tipo observacional, analítico, retrospectivo y de corte transversal. La muestra está constituida por mujeres post aspiración endouterina en el año 2017 en el Hospital San Juan de Lurigancho. Se estudió una muestra de 188 pacientes. Los datos se procesaron en el programa Statistical Package for the Social Sciences versión 23. Para el análisis estadístico de variables cualitativas se estimaron frecuencias relativas y porcentajes. Para el análisis inferencial se utilizó “Chi-cuadrado”, con el cual se estima la asociación de la elección anticonceptiva con los factores sociodemográficos y obstétricos.

**RESULTADOS:** Los **factores sociodemográficos** fueron estado civil y grado de instrucción, siendo el 50% de pacientes convivientes y el 53% de pacientes culminaron secundaria. De los **factores obstétricos** solo se encontró el factor hemoglobina previa y se estima el 18% de pacientes con anemia severa. Del **factor planificación familiar**, en primer lugar el tipo de método anticonceptivo previo, siendo el 7% su elección previa la ampolla trimestral; en segundo lugar la orientación y/o consejería en planificación familiar del que se observa que el 31% no la recibieron y en tercer lugar, el tipo de método anticonceptivo post aborto, que el 16% eligió ampolla mensual.

**CONCLUSIÓN:** El factor planificación familiar tuvo mayor asociación significativa que los factores obstétricos y factores sociodemográficos. De ese destaca orientación y consejería, tipo de método anticonceptivo previo y post aborto.

**PALABRAS CLAVES:** Elección Anticonceptiva, factores, Mujeres post aborto.

## ABSTRACT

**OBJECTIVE:** To establish the factors associated with the contraceptive choice in post-manual manual vacuum aspiration women attended at the San Juan de Lurigancho Hospital in the 2017 period.

**METHODOLOGY:** The study is of observational, analytical, retrospective and cross-sectional type. The sample is constituted by women after uterine aspiration in 2017 at the Hospital San Juan de Lurigancho. A sample of 188 patients was studied. The data were processed in the Statistical Package for the Social Sciences version 23. For the statistical analysis of qualitative variables, relative frequencies and percentages were estimated. For the inferential analysis, "Chi-square" was used, with which the association of contraceptive choice with sociodemographic and obstetric factors is estimated.

**RESULTS:** Sociodemographic factors were marital status and educational level, with 50% of patients cohabiting and 53% of patients completing secondary school. Of the obstetric factors, only the previous hemoglobin factor was found and an estimated 18% of patients with severe anemia. From the family planning factor, in the first place, the type of previous contraceptive method, with 7% being their previous choice, the quarterly blister; secondly, the orientation and / or counseling in family planning which shows that 31% did not receive it and thirdly, the type of contraceptive method post abortion, that 16% chose a monthly blister.

**CONCLUSION:** The family planning factor had a greater significant association than obstetric factors and sociodemographic factors. Of this, counseling and counseling, type of contraceptive method prior and post abortion.

**KEY WORDS:** Contraceptive choice, factors, post-abortion women.